外臺秘要方

目録



影北宋本外臺秘要方四十卷目錄一卷

原本藏日本紀藩竹田氏森立之訪古志曰此本嘉永己酉官下命郵致使於醫學影抄以二通一納楓山官庫一藏醫學書宋槧醫書以稀存于日本者頗多然率南渡以後物其北宋本今所存僅有補刻特此本真為真為林億等經進之原刊有明諸家所不夢見者而首尾完具宜家

亡缺失豈可不謂天下之至寶乎之之又
言嘗刻寫此書時三之方為醫學校
官以五人分書之越三年乃成
余因之之言先贈得小島學古
校本乃知明程衍道翻本舊誤凡千萬
言因思把（前之於本併混據言）蕭之宋本不而見楓山庫之刻
本二不可得維醫學之一部明治初散出
未知存于誰何之手余過屬伸溫物色之

久之以此本來缺其末一冊蓋以末冊有題
識恐爲官所匿也索價殊昂余以爲
此書宋槧中土久絕程本訛謬不可據乃思
痛得之無卷首有林億等上進名銜
卷末有裴宗元校正及熊子孟校勘名
銜敍有右迪功郎張寔校勘字試寫
之精下真宋刻原本無疑陸立之言以五人之
力三年乃成此末一冊託書記官嚴谷脩

從楓山庫補寫之，仍爲完錄。此書爲
古方淵藪，晉唐遺籍賴是以存，嘗恐
世不亟壽，故作良必君子當寶之以傳也。
又唐書王燾傳（附王珪傳）有祖絮湯，劑諸提
要謂祖絮二字亦詳。按曲禮毋絮羹，鄭注
絮猶調也。釋文絮勅慮反，謂加以鹽梅
也。則祖絮即所調劑之義，非誤字。又提要稱
燾作是書成於守鄴時，據自外臺引高

元裕傳爲證今按玉海引中興書目云以其出守于外故號曰外臺以（與）秘要說合唐高元裕傳校事三司監院官帶御史者稱外臺王燾亦自序信衛不帶御史則謂出守于外郡稱外臺者未確按魏志王肅傳注薛夏曰蘭臺爲外臺秘閣爲內閣云云燾自序云兩拜東掖便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖籍方書等由是覩奧升堂

皆探其秘要繇此則取義於蘭臺為外

臺甚明非出乎外之謂也

光緒癸未四月宜都楊守敬記

外臺祕要方目録

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞撿院上護軍臣林　億等上進

卷第一傷寒上十二門

卷第三 天行二十一門 天行二

欬

卷第四 温病及黃疸二十門

卷第五瘧病一十五門

寒疝不能食方四首

寒疝積聚方四首

心疝方四首

卷第八 淡飲胃反噎鯁等三十門

淡飲論二首

淡飲食不消及嘔逆不下食方九首

懸飲方二首

溢飲方三首

支飲方九首

留飲方二首

酒澼飲方三首

留飲宿食方七首

淡澼方二首

唾

疣

卷第十三 骨蒸傳屍鬼疰鬼魅二十六門

久

卷第十八 脚氣上 十二門

卷第十九脚氣下一十六門

卷第二十一 眼疾十四門

醫

竅

金瘡續筋骨方三首
金瘡止痛方五首
金瘡生肌方四首
金瘡去血多虛竭內補方二首
金瘡中風方八首
諸瘡中風寒水露方五首
被刀箭傷方一十一首
竹木刺不出方一十六首
狐尿刺方二首
狐刺方四首
惡刺方三首
灸瘡方四首
灸瘡膿不差方三首

卷第三十 惡疾大風癩瘡等二十三門

卷第三十二 面部面脂藥頭膏髮鬢衣香澡豆等三十四門

什

卷第三十三 婦人上三十七門

陰中瘡方五首
陰痒方五首
陰痒有蟲方六首
陰下脫方四首
陰挺出方三首
女人傷丈夫頭痛方二首
交接輒血出痛方二首
童女交接他物傷方三首
小户嫁痛方四首
坐藥方三首
婦人欲斷産方四首
卷第三十五 小兒諸疾上三十六門
小兒方序例論一首

卷第三十六 小兒諸疾下五十門

論

英

餺

卷第三十九 明堂灸法七門

蝊螫方六首
蛇毒方三首
青蝰蛇螫方二首
蝮蛇螫方一十首
虺蛇螫方四首
衆蛇螫方七首
蜘蛛咬方六首
蜂螫方一十首
蜈蚣螫方八首
蠍螫方二十七首
蠼螋尿方二十二首
惡蛇方三首
蠆螫方二首

及

外臺秘要方目録

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙 子孟 校勘

外臺祕要方　一

傷寒上

外臺秘要方序

夫外臺者刺史之任也秘要者秘密樞要之謂也唐王燾臺閣二十餘載久知洪文館得古今方上自神農下及唐世無不採摭集成經方四十卷皆諸方秘密樞要也以出守于外故號曰外臺秘要方凡一千一百四門以巢氏病源諸家論辨各冠其篇首一家之學不為不詳王氏為儒者醫道雖未及孫思邈然而採取諸家之方頗得其要者亦崔氏孟詵之流也且古之如張仲景集驗小品方最為名家今多亡逸雖載諸方中亦不能別白王氏編次各題名號使後之學者皆知所出此其所長也又謂鍼能殺生人不能起死人其法亡之且久故取灸而不取鍼亦醫家之蔽也此方撰集之時或得缺落之書因其闕文義理不完者多矣又自唐歷五代傳寫其本訛舛尤甚雖鴻都祕府亦無善本

跋

國家詔儒臣校正醫書臣承
命以其書方證之重者刪去以從其簡經書之異者注解以著
其詳魯魚豕亥煥然明白臣謂三代而下文物之盛者必曰西
漢止以侍醫李柱國校方技亦未嘗命儒臣也臣雖濫吹儒學
但盡所聞見以脩正之有所闕疑以待來哲揔四十卷并目録
一卷恭惟
主上盛德承統
深仁流化
頒此方論
惠及區宇
賛天地之生育
正萬物之性命使歲無疵癘人不夭横熙熙然歌樂於
聖造者也前將仕郎守殿中丞同校正醫書臣孫兆謹上

外臺秘要方序

唐銀青光祿大夫使持節鄴郡諸軍事兼守刺史上柱國淸源縣開國伯王　燾　撰

昔者農皇之治天下也甞百藥立九候以正陰陽之變診以救性命之昏札俾厥土宇用能康寧廣矣哉洎周之王亦有冢卿格于醫道掌其政令聚毒藥以供其事焉歲終稽考而制其食十全爲上失四下之我國家率由茲典動取厥中置醫學頒良方亦所以極元氣之和也夫聖人之德又何以加於此乎故三代常道百王不易又所從來者遠矣自雷岐倉緩之作彭扁華張之起迨茲厥後仁賢閒出歲且數千方逾萬卷專車之不受廣厦之不容然而載祀綿遠簡編虧替所詳者雖廣所略者或深討檢則功倍力煩取捨則論甘忌苦永言筆削未暇尸之余幼多疾病長好醫術遭逢有道遂躡亨衢七登南宮兩拜東掖便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖籍方書等繇是覩奧升堂

皆探其祕要以婚姻之故貶守房陵量移大寧郡提攜江上冒犯蒸暑自南徂北既僻且陋染瘴嬰痾十有六七死生契闊不可問天賴有經方僅得存者神功妙用固難稱述遂發憤刋削庶幾一隅凡古方纂得五六十家新撰者向數千百卷皆研其總領覈其指歸近代釋僧深崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇等十數家皆有編録並行於代美則美矣而未盡善何者各擅風流遞相矛楯或篇目重雜或商較繁蕪今並味精英鈐其要妙俾夜作晝經之營之捐衆賢之砂礫掇羣才之翠羽皆出入再三伏念旬歲上自炎昊迄于聖唐括囊遺闕稽考隱祕不愧盡心焉客有見余此方曰嘻博哉學乃至於此邪余荅之曰吾所好者壽也豈進於學哉至於遁天倍情懸解先覺吾常聞之矣投藥治疾庶幾有瘳乎又謂余曰稟生受形咸有定分藥石其如命何吾甚非之請論其目夫喜怒不節飢飽

失常嗜慾攻中寒溫傷外如此之患豈由天乎夫爲人臣爲人子自家刑國由近兼遠何談之容易哉則聖人不合啓金縢賢者曷爲條玉版斯言之玷竊爲吾子羞之客曰唯唯嗚呼齊梁之間不明醫術者不得爲孝子曾閔之行宜其用心若不能精究病源深探方論雖百醫守疾衆藥聚門適足多疑而不能一愈之也主上尊賢重道養壽祈年故張王李等數先生繼入皆欽風請益貴而遵之故鴻寶金匱青囊綠帙往往而有則知日月所照者遠聖人所感者深至於嗇神養和沐老補病者可得聞見也余敢採而錄之則古所未有今並繕緝而能事畢矣若乃分天地至數別陰陽至候氣有餘則和其經渠以安之志不足則補其復溜以養之溶溶波波調上調下吾聞其語矣未遇其人也不誣方將請俟來哲其方凡四十卷名曰外臺秘要方非敢傳之都邑且欲施於後賢如或詢謀亦所不隱是歲天

寶十一載歲在執徐月之哉生明者也

外臺秘要方卷第一 傷寒上一十二門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林 億等上進

雜療傷寒湯散丸方八首 並是論中所要

諸論傷寒八家合一十六首

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣氷洌此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也仲景病源小品千金同

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治今世人得傷寒或始

不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫又不知次第而治之則不中病皆以臨時消息制方無不効也今搜採仲景舊論錄其證候診詠聲色對病眞方有神驗者擬防世急也又土地高下寒溫不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須兩審也（小品千金同）

又曰夫表和裏病（一作陽盛陰虛）下之而愈汗之則死裏和表病（一作陽虛陰盛）汗之而愈下之則死夫如是則神丹不可以誤發（神丹丸在此卷崔氏部中六味者是也）甘遂何可以妄攻（甘遂者水導散也在第三卷天行狂語部中甘遂等二味者是也出千金方）表裏之治相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則斃（桂枝湯在此卷仲景日數部中桂枝等五味者是也）承氣入胃裏平則亡（承氣湯在此卷仲景日數部中三味者是也）此表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹爲治乃誤使病者隕沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死

尸盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟（千金同）
又凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷生意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言巧似是於理實違安危之變豈不詭哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫於內發表以桂枝溫裏以四逆（四逆湯在第二卷傷寒不得眠部中三味者是也）
華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸即愈若不解者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈若不解者至三日在肌復一發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胷宜服藜蘆丸微吐則愈若病困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蔕散吐之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之（藜蘆丸近用損人不録之瓜蔕散在卷末雜療中范汪方二味者是也）五日在腹六日入胃入胃則可下也若熱毒在胃外未入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病

要當須復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此爲病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黒斑出赤斑出者五死一生黒斑出者十死一生但論人有強弱病有難易攻效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之（五苓散仲景云豬苓散是也在第二卷傷寒中風部中千金翼方五味者是也）當以新汲井水強飲一升許若一升半可至二升益佳令以指刺喉中吐之病隨手愈不即吐者此病輩多不善勿強與水水停即結心下也當更以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以豬苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法鍼之尤佳

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春天寒宜

服神丹丸亦可摩膏火灸（膏在雜療中黃膏七味白膏四味並范汪方是也）若末春夏月初秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散（青散在雜療中范汪方六物者是也）若崔文行度障散（度障散在雜療中范汪方四味者是也）赤散（赤散在雜療中范汪方七味者是也）（本出華佗）雪煎亦善（雪煎在雜療中古今錄驗方三味者是也）若無丸散及煎但單煮柴胡數兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕駛（駛吏切疾也下同）者為實癖也朝平夕駛者非癖也轉湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間

病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣請虛煩但當行竹葉湯（竹葉湯在第三卷天行虛煩部中出文仲方是也）若嘔者與橘皮湯一劑不愈者可重與也（橘皮湯在第二卷傷寒嘔噦部中四味者是也出於深師方）此法宮泰數用甚效

傷寒後虛煩亦宜服此湯仲景千金方同

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何荅曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風法蒸濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出臥單簟中冷得病但苦寒蜷諸醫與丸散湯四日之內凡八發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其然蒸之無不汗出也小品千金同蒸法在此卷崔氏日數部中阮河南法又有桃葉湯熏身法在第三卷天行部中文仲方支太醫法是也

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒盛則生熱熱盛則生寒諸病發熱惡寒脉浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯荅曰數少與桂枝湯使體潤漐漐汗纔出連日如此自當解

也千金同

九卷云黃帝曰傷寒熱病死候有九太素云不可刺者九一曰汗不出大灌發者死太素云汗不出大顴發赤噦者死二曰泄而腹滿甚者死甚一作黃三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出歐下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄女六反汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痓巨郢反者死熱病痓者腰反折瘈尺制反瘲子用反齒噤其禁反齘也熱病七八日脈微小病者便血口中乾一日半而死脈代者一日死熱病七八日脈不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生甲乙太素同

小品論曰古今相傳稱傷寒爲難療之病天行溫疫是毒病之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫爲異氣耳云傷寒是

雅士之辭云天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之衆經其實殊矣所冝不同方說冝辨是以略述其要焉出第十卷中千金同

千金論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行溫疫病者則天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解療皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳則須救療迄至於病愈湯食競進折其毒熱自然而差必不可令病氣自

在恣意攻人拱手待斃斯爲誤矣今博採羣經以爲上下兩卷廣設備擬好養生者可得詳焉

又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部塡塞胷心故頭痛胷中滿當吐之則愈五日以上氣沈結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當須消息爲候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下此醫之大禁也 文仲同

又脉有沈浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時覺視病已積日其疹源結成非復發汗解肌所除當診其脉隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒濕

所中幷時有疾疫賊風之氣而相染易爲惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身温其脉實大者便可吐下之不可發汗也

又凡人有少病若似不如平常則須早道若隱忍不療冀望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行不和當自戒勒若小有不和則須救療尋其邪由及在腠理以時早療鮮有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏則難可制止雖和緩亦無能爲也癰疽丁腫尤爲其急此自養之要也

又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜便治不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須療之也

又凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更與人作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也能飲一斗者

與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦者不可與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者欲愈也出第九卷中

經心録論曰傷寒之病錯療禍及如反覆手耳故諺云有病不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷寒熱病風温濕病陰毒陽毒熱毒温疫天行節氣死生不同形候亦別宜審詳也出第二卷中

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黄帝曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日間其愈皆以十日以上者何也岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死帝曰願聞其狀岐伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脉夾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧三日少陽受

之少陽主膽其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾三陽經絡
皆受其病而未入於藏者故可汗而已四日太陰受之太陰脉
布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡
肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而
絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六腑皆受病榮衛不行
五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少
愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日
太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌
乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日
已矣
帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿
三日者可汗而已其滿三日者可泄而已
又帝曰其病兩感於寒者其脉應與其病形何如岐伯曰兩

傷於寒病者脉一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩滿而渴也二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫（之廉切亦作譫）言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入不知人則六日而死

帝曰五藏已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死出第九卷中（甲乙太素同）

病源傷寒一日太陽受病太陽者小腸之經也爲三陽之首故先受病其脉絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項背膊腰脊痛也

又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脉絡鼻入目故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之閒故可摩膏火灸發汗而愈出第七卷中

仲景傷寒論傷寒一二日心中悸而煩者小建中湯主之方

桂心三兩 甘草二兩炙

生薑三兩 大棗十二枚擘

膠飴一升 芍藥六兩

右六味切以水七升先煮五味取三升去滓內飴更上微火銷令解温服一升日三服如嘔家不可服建中湯以甜故也忌海藻菘菜生葱千金翼同出第三卷中張仲景傷寒論傷寒一二日內麻黃湯主之此云小建中湯非也此方但治心中悸而煩

病源傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脉循於脅上於頸耳故得病三日胸脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解出第七卷中

仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者屬調胃承氣湯方

甘草二兩炙　芒消半升　大黃四兩

右三味切以水三升煮二物取一升去滓內芒消更煮微沸溫溫頓服以調胃氣則愈忌海藻菘菜經心錄同出第十卷中張仲景傷寒論三日亦可服麻黃湯此云調胃承氣湯非也此方但治三日發汗不解蒸蒸發熱者

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之首是知三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脉絡于脾主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾也其病在胷膈故可吐而愈又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈矣並出第七卷中

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之方

柴胡半斤　栝樓根四兩內少黃脉者　桂心三兩　黃芩二兩

牡蠣二兩　甘草二兩炙　乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服初服微煩溫覆汗出者便愈也忌生葱海藻菘菜芫花汪同出第三卷中（張仲景傷寒論名柴胡薑桂也合用柴胡人參甘草黃芩半夏生薑大棗七味小柴胡湯是也玉函千金翼同）

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故可下而愈

又傷寒七日太陽病衰頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病盡故也今七日以後病反甚不除者欲爲再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也並出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其人小便反凊（一本作大便反青）者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者

必効宜桂枝湯方

桂枝三兩　芍藥三兩　甘草二兩炙

生薑三兩　大棗十二枚擘

右五味切以水七升煮取三升去滓温服一升須臾喫稀粥一升助藥力覆取微汗忌生葱海藻菘菜集驗備急文仲范汪同張仲景傷寒論此方六七日病在表者可服之

又傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以佗藥下之柴胡證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病衰身熱少愈傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶存也

又傷寒九日少陽病衰耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或

初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴下之脉浮虛而濇者屬桂枝附子湯若大便鞕小便自利者附子白朮湯方

桂枝附子湯方

桂心四兩　附子三枚炮去皮　生薑三兩

甘草二兩炙　大棗十二枚擘

右五味切以水六升煑取二升去滓温分三服忌生葱豬肉海藻菘菜

附子白朮湯方

白朮四兩　大棗十二枚擘　甘草二兩炙

生薑三兩　附子三枚炮去皮四破

右五味切以水六升煮取二升去滓分溫三服初一服其人身如痺半日許復服之都盡其人如冒狀者勿怪此以附子朮併走皮中逐水氣未除故使人如冒狀也本云附子一枚今加之二枚名附子湯忌生葱豬肉菘菜海藻桃李雀肉等千金翼同出第十一卷中張仲景論法當加桂枝四兩此本一方二法以大便鞕小便自利故去桂也以大便不鞕小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及產婦宜減服之此二方但治風濕非治傷寒也

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣出第七卷中素問甲乙太素並同

仲景傷寒論療吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱譫譫訓戲今荒語也語者屬大承氣湯方

大黃四兩去皮　陳枳實五枚炙　芒消三合　厚朴半斤

右四味切以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒消煮一二沸分爲再服初一服便得利者止後服不必盡劑千金方并翼同出第五卷中

又太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡湯證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下急一云嘔止小安鬱鬱微煩者爲未解也可與大柴胡湯下之即愈方

柴胡半斤　黃芩　芍藥各三兩　半夏半升水洗

大棗十二枚擘　生薑五兩　枳實四枚炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩今不加大黃恐不名爲大柴胡湯也忌羊肉餳兼主天行千金翼肘後同

又傷寒十三日不解胸脅滿而嘔日晡所發潮熱畢而微利

此本柴胡湯下之不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡（二兩十六銖） 黃芩 人參 甘草（炙）

生薑（各一兩） 半夏（五枚） 大棗（四枚擘） 芒消（二合）

右八味切以水四升煮七味取二升去滓下芒消更上火煎一二沸分爲再服未解更作忌海藻菘菜羊肉餳等（玉函經一方芒消三合桑螵蛸五箇大黃四分煮取一升半溫服五合微下愈本云柴胡湯再服以解其外取餘一升加芒消大黃桑螵蛸也）

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此葱豉湯方

葱白（一握） 豉（一升綿裹）

右二味以水三升煑取一升頓服取汗若汗不出更作加葛根三兩一方更加升麻三兩水五升煑取二升分溫再服徐徐服亦得必得汗即差若不得汗更作加麻黃三兩去節服取汗出爲効文仲同

又方

葱白一握切　米三合　豉一升

右三味以水一斗煑米少時下豉後內葱白令大熟取三升分溫三服則汗出

又方

豉一升綿裹

右一味以童子小便三升煑取二升分溫再服汗出爲効集驗方加葱白一升切云神良支太醫文仲備急同

又方

葛根四兩切

右一味以水一斗煑取三升內豉一升更煑取一升半分溫再服取汗爲差又云擣生葛根汁一二升服亦佳

又療傷寒汗出不歇已三四日胷中惡欲令者方

豉三升綿裹　鹽一兩

右二味以水七升煑取二升半去滓內蜜一升又煑三沸頓服一升安臥當吐如不吐更服一升取吐爲効

又方

苦參二分　甘草一分炙　瓜蔕

赤小豆各二七枚

右四味切以水一升煑取半升一服之當吐吐不止者作葱豉粥解之必止忌海藻菘菜

又方

苦參二兩　黃芩二兩　生地黃半斤

右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌蕪荑

深師方四首

深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方

葛根半斤　烏梅十四枚　葱白一握　豉一升綿裹

右四味切以水九升煮取三升分爲三服初一服便厚覆取汗汗出粉之

又麻黃解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方

麻黃三兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去尖皮碎

右四味切以水九升先煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥合煮取二升半絞去滓分服八合以汗出爲度忌海藻菘菜生葱　本仲景麻黃湯千金并翼同

又黃芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利胸脅

痞滿微熱而煩方

黃芩　桂心各三兩　茯苓四兩

前胡八兩　半夏半升洗

右五味切以水一斗二升煮取六升分爲六服日三服夜三服間食生薑粥投取小便利爲度忌羊肉餳生葱酢物

又石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脉滑數昏憒身體壯熱沉重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沉重拘攣由表未解今直用解毒湯則攣急不差直用汗藥則毒因加劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加以解其外是故名石膏湯方

石膏　黃連　黃蘗　黃芩各二兩

香豉一升綿裹　梔子十枚擘　麻黃三兩去節

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服一日併服出汗初

服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微汗出拘攣煩憒即差得數行利心開令語毒折也忌猪肉冷水出第十四卷中

小品方四首

小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方

白薇二兩　麻黄七分去節　杏人去皮尖熬　貝母各三分

右四味擣散酒服方寸匕自覆卧汗出則愈古今録驗千金同

又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方

麻黄一兩去節　甘草一分炙

右二味切以水二升扣雞子白令置於水内合和令勻内藥復攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之蓋覆汗出粉傅之有効忌海藻菘菜古今録驗備急同張文仲療天行

又葛根湯療病三四日不差身體毒熱方

葛根八兩　生薑三兩　龍膽　大青各半兩

桂心　甘草炙　麻黃去節各二兩　萎蕤

芍藥　黃芩　石膏碎　升麻各一兩

右十二味切以水一斗先煮葛根麻黃取八升掠去沫然內餘藥煮取三升分三服日二夜一服忌海藻菘菜生葱

千金同

又療傷寒六七日其人大下寸脉沉遲手足厥逆下部脉不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止者麻黃升麻湯方

麻黃二兩半去節　升麻五分　當歸五分

知母　萎蕤一作昌蒲　黃芩各三分

麥門冬去心一作天門冬　桂心　芍藥

乾薑　石膏碎　甘草炙

茯苓　白朮各一分

右十四味切以水一斗先煑麻黃減二升掠去上沫內諸藥煑取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令盡汗出便愈忌海藻菘菜生葱醋桃李雀肉等並出第六卷中此張仲景傷寒論方

集驗方五首

集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者方

眞丹砂一兩

右一味以水一斗煑之取一升頓服之覆取汗忌生血物千金同

又療疫氣傷寒三日以後不解者方

好豉一升綿裹　葱白切一升

右二味童子小便五升煑取二升分再服覆取汗神効千金同

又療傷寒五六日斑出以後湯方

豬膽合三　雞子一枚　苦酒合三

右三物合和煎令三沸强人盡服之羸人煎六七沸分爲兩服取汗出爲效文仲備急千金同

又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾糞譫語大柴胡湯方

柴胡　半夏湯洗各八兩　生薑四兩　知母

芍藥　大黃　甘草炙　萎蕤各二兩

一方加枳實四枚黃芩二兩

右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳范汪加人參三兩餘並同千金用芍藥不用枳實

又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除及下利不止斑出方

大青四兩　甘草二兩炙　阿膠二兩炙末　豉一升綿裹

右四味切以水八升煑二物取三升半去滓內豉煑三沸去滓乃內膠令烊分溫三服欲盡更作常使有餘渴者當飲但除熱止吐下無毒忌海藻菘菜肘後深師千金同出第二卷中

千金方六首合一十一法

千金治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方一日在右語中

當歸　芎藭　吴茱萸　附子

烏頭　莽草　蜀椒各三兩　白芷三兩

右八味切以醇苦酒漬再宿以豬脂四斤緩火煎候白芷色黄絞去滓以煖酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩之佳忌豬肉

又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯

又陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘雖堅大便反易色必黑宜抵党湯下之

又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲有血不可餘藥宜抵党丸

又太陽病身黄脉沈結少腹堅小便不利者此爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也宜抵党湯下之

又陽明病脉遅雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此爲大便巳堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒爲外未解宜桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不大便可少與承氣湯微和其胃氣勿令至大下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不大便六七日恐胃中有燥糞欲知之法可與小承氣湯若腹中轉

失氣者爲有燥糞乃可攻之若不轉失氣者此爲但頭堅後溏不可攻之攻之必脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅與小承氣湯和之不轉失氣者愼不可攻之
夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也直視譫語喘滿者死若下利者亦死
又傷寒四五日脉沈喘滿沈爲在裏而反發汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語
承氣湯方
枳實五枚陳者炙　大黃四兩　芒消三合　厚朴半斤
右四味切以水一斗先煑二味取五升内大黃更煑取二升去滓内芒消更上微火一兩沸分温再服得下餘勿服也
小承氣湯方
大黃四兩　厚朴二兩炙　枳實大者三枚炙

右三味切以水四升煑取一升二合去滓分溫再服若一服得利讝語止勿服之也

又抵党丸方

水蛭二十枚熬 桃人二十五枚去皮尖兩人 䖟蟲二十枚去足翅熬 大黃三兩

右四味末下篩合分爲四丸以水一斗煑一丸取七合頓服晬時當下血不下更須服之取血下爲效

又抵党湯方

水蛭熬 䖟蟲去足翅熬各三十枚 桃人二十枚去兩人尖皮 大黃三兩

右四味切以水五升煑取三升分爲三服不下更服

又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方

柴胡 芍藥 大青 知母

梔子人各四兩 升麻 黃芩 杏人去雙人皮尖各三兩

香豉一升綿裹 石膏八兩碎

右十味切以水九升煑取二升七合分三服苦熱盛者加大黄四兩並出第十卷中

千金翼方一十三首合一十三法

千金翼療少陰病一二日口中和其背惡寒者當灸之服附子湯方

大附子二枚炮 茯苓 芍藥各三兩 人參二兩 白术四兩

右五味切以水八升煑取三升溫服一升日三忌猪肉桃李雀肉酢

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯甘草湯方

甘草二兩

右一味切以水三升煑取一升半服七合日三服忌海藻菘菜

又桔梗湯方

大桔梗一兩　甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血矣忌猪肉海藻菘菜

又療少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而便膿血桃華湯方

赤石脂一斤一半全用綿裹一半篩末　乾薑一兩切　粳米一升

右三味以水七升煮取米熟去滓服七合內赤石脂末一方寸匕日三服傷寒論千金崔氏范汪同

又療少陰病得之二三日已上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方

黃連四兩　黃芩一兩　雞子中黃二枚

芍藥二兩　阿膠三兩炙一云三片

右五味切以水六升先煑三味取二升去滓內膠煑烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服忌豬肉冷水並出第十卷中

又療傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞堅或心下卒悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯方

柴胡八兩 半夏半升洗 生薑 黃芩

人參 甘草各三兩炙 大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服但胷中煩而不嘔者去半夏人參加栝樓實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝樓根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞堅者去大棗加牡蠣六兩若心下卒悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若

不渴外有微熱者去人參加桂心三兩溫覆取微汗若欬
者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩忌羊肉餳
海藻菘菜崔氏深師同

又療傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此爲未解梔
子湯方

肥梔子十四枚擘　美豉四合綿裹

右二味以水四升先煑梔子取二升半去滓內豉更煑取一
升半去滓溫分再服若一服得吐餘更勿服之若嘔者後梔
子加生薑湯傷寒論備急同傷寒兼療不得眠

又梔子生薑湯方

肥梔子十四枚擘　美豉四合　生薑五兩切

右三味以水四升煑梔子生薑取二升半去滓內豉更煑取
一升半去滓溫分再服若一服安即勿服傷寒論同並療

虚煩不得眠耳

又傷寒六七日結胷熱實其脉沈緊心下痛按之如石堅大陷胷湯主之方

大黃六兩切　甘遂末一錢匕　芒消一升

右三味以水六升先煑大黃取二升去滓内芒消煑一兩沸乃内甘遂末温分再服得快利止後服

又傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎湯主之

又諸亡血家不可與白虎湯虚者亦不可與卒得之腹痛而利者但可温之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之

又傷寒脉浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎湯主之方

知母六兩　石膏一升碎綿裹　甘草三兩炙　粳米六合

右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日三服忌海藻菘菜千金傷寒論備急文仲崔氏范汪經心錄同諸家兼療天行之病

又白虎湯方

石膏　粳米各一升　知母六兩

甘草二兩炙　人參三兩

右五味切以水一斗二升煮米熟內藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可與服與之則嘔利而腹痛忌海藻菘菜

又療傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利誠語謊語一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡四兩　黃芩　生薑　龍骨

人參　牡蠣熬　鉛丹　桂心

茯苓各一兩半　半夏二合半湯洗　大棗六枚擘　大黃二兩

右十二味切以水八升煮取四升內大黃切如博棊子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉餳生葱酢物

又陽明病發熱而汗出此爲熱越不能發黃也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴引水漿此爲瘀熱在裏身必發黃宜服茵蔯湯方

茵蔯六兩　大肥梔子十四枚擘　大黃二兩

右三味切以水一斗二升先煮茵蔯減六升去滓內諸藥煮取三升分三服小便當利如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去並出第九卷中

崔氏方一十五首

崔氏療傷寒始得一二日方

便可灸項三壯又灸大椎三壯各加至五炷益良用之驗大椎平肩斜齊高大者是也仍不得侵項分取之則非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡在節下凡灸刺不得失之毫釐今崔氏不定高下是以言之出黃帝鍼灸經

又療傷寒一日至三日可發汗度瘴散方

麻黃十分去節　桔梗　蜀椒汗　細辛

白朮　吳茱萸　防風各四分　烏頭炮

乾薑　桂心各五分

右十味擣篩爲散溫酒服方寸匕溫覆取汗或數服得汗即止若得病一二日而輕者服此藥皆得汗解若得便重者煩不能解也然可以二大豆許著鼻孔中覺燥涕出一日可三四著必愈兼辟天行病忌猪肉生葱生菜桃李雀

肉等

又療傷寒勑色惡寒發熱體疼發汗神丹丸方

人參五分 烏頭四分炮 半夏五分洗

茯苓五分 朱砂一分研 附子四分炮

右六味擣爲末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發汗出令體中濈濈然如汗未出更以熱粥投之令汗出若汗少不解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此藥多毒飲水解其熱愈周護軍子期自說天行用之甚良故記之忌豬羊肉大酢生血物等刪繁范汪同兼主天行

又療傷寒服度瘴散而不汗出者便作葱豉湯方

葱十四莖 豉一升綿裹

右二味以水三升煮取一升頓服溫暖覆取汗出勝度瘴散也與前肘後方重

又療傷寒服葱豉湯不得汗可服葛根湯方

葱白十四莖　豉一升綿裹　葛根三兩切

右三味以水五升煮取二升分爲再服溫覆取汗汗不出更服余時用此一服輒汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前軍府直吏周虎服葛根湯再服不得汗余吏視之甚惡寒而拘急更思作麻黃湯以解之方

麻黃二兩去節　葛根三兩　葱白十四莖　豉一升綿裹

右四味切以水七升煮取二升半分三服虎再服快汗愈其疹與周虎相似者服之皆汗十餘人差

又療傷寒阮河南蒸法

薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉桑柏葉諸禾糠及麥麩皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等物著

火㸐令厚二三寸布席臥上溫覆用此發汗汗皆出若過熱當審細消息大熱者可重席汗出周身輙使止當以溫粉粉身勿令遇風

又療傷寒三五日疑有黃則宜服此油方

取生烏麻淸油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟攪令相得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來胷脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方 胡洽云出張仲景

前胡八兩 半夏半升洗 生薑五兩 黃芩

人參 甘草炙各三兩 乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服古今錄驗同忌羊肉餳海藻菘菜 仲景方用茈胡不用前胡今詳此方治寒疝腹痛恐性涼耳合用仲景茈胡桂薑湯今崔氏用之未知其可也

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後祕塞者承氣湯方

厚朴炙　大黃各三兩　枳實六片炙

右三物切以水五升煮取二升體強者服一升羸者服七合得下必效止范汪同

又若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若祕而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四物黃連除熱湯承氣湯舊用芒消余以有毒故去之用之數年安穩得下良既服湯亦應外用生薑兌讀作銳下同使必去燥糞若服湯兼兌而並不得下者可依本方芒消一兩

又薑兌法

削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

又方

以猪膽灌下部用亦立通張仲景傷寒論云猪膽和法醋少許灌穀道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧余思作此黄連解毒湯方

黄連三兩　黄芩　黄蘗各二兩　梔子十四枚擘

右四味切以水六升煮取二升分二服一服目明再服進粥於此漸差余以療凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者此湯療五日中神效忌猪肉冷水

又大前胡湯療傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛内外有熱煩嘔不安方胡洽云出張仲景

前胡半斤　半夏半升洗　生薑五兩　枳實八片炙

芍藥四兩　黄芩三兩　乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服古今録

驗同忌羊肉餳等物張仲景用柴胡不用前胡本云加大黃二兩不加大黃恐不名大柴胡湯

又凡少陰病寒多表無熱但苦煩憒默默而極不欲見光有時腹痛其脉沈細而不喜渴經日不差舊用四順湯余根其熱不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止手足徹冷及無熱候者可服增損四順湯方黃連龍骨湯見第三卷天行中

甘草二兩炙　人參二兩　龍骨二兩

黃連　乾薑各一兩　附子中形者一枚炮去黑皮

右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忌海藻菘菜豬肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陟厘丸浩京方

陟厘四兩不用鹹者　當歸四兩　漢防己三兩　黃連三兩

紫石英（別擣末細研三兩） 豉（三升） 厚朴（二兩炙） 苦酒（五升）

右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切炙之燥復內苦酒中盡止又以三升苦酒漬豉一宿小蒸之研絞取汁擣下篩諸藥以酒豉汁和之丸如梧桐子大冷漿水服二十丸丸極燥乃可服之忌豬肉冷水並出第一卷中

張文仲方一十首

張文仲葛氏療傷寒及溫病頭痛壯熱脉盛始得一二日方

破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煑一升水令沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗備急同

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡（半斤） 人參 甘草（炙） 黃芩

生薑（各三兩） 半夏（五合洗） 大棗（十二枚擘）

右七味切以水一斗二升煑取三升分三服微覆取汗半日便差不差更服一劑忌羊肉餳海藻菘菜備急范汪同與前并金翼重

又療傷寒溫病等三日以上胷中滿陶氏云若傷寒溫病已三四日胷中惡欲令吐者服酒膽方

苦酒半升　豬膽一枚

右二味盡和服之吐則愈神驗支云去毒氣妙胡洽集驗備急千金同

又療傷寒近效方凡胷中惡淡飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方

鹽末一大匙

右一味以生熟湯調下須臾則吐吐不快明旦更服甚良備急同

又瓜蔕散主傷寒胷中痞塞宜吐之方

瓜蔕　赤小豆各一兩

右二味擣散白湯服一錢匕取得吐去病差止備急經心錄范汪同

又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利瀉之方

生麥門冬一升去心　生地黄切一升　知母二兩

生薑五兩半　芒消二兩半

右五味以水八升煑取二升半内芒消煎五沸分五服取利爲度忌蕪荑備急同

又療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而譫語方

大黄四兩　厚朴二兩炙　枳實四枚炙

右三味以水四升煑取一升二合分兩服通者一服止此是仲景方備急范汪同與前千金崔氏方重

又療傷寒八九日不差名爲敗傷寒諸藥不能消者方

鼈甲炙　蜀升麻　前胡
烏梅　枳實炙　犀角屑
黃芩各二兩　甘草一兩炙　生地黃八合
右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二服出
支太醫方忌海藻菘菜莧菜蕪荑備急方同
又若十餘日不大便者服承氣丸方
大黃　杏人去皮尖破熬各二兩　枳實一兩炙　芒消一合
右四味擣下篩蜜和丸如彈子以生薑湯六七合研一丸服
之須臾即通不通更服一丸取通爲度備急同
又療晚發傷寒三月至年末爲晚發方
生地黃一斤打碎　梔子二十枚擘　升麻三兩
柴胡　石膏各五兩
右五味切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不解更服

若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升煑取三升分三服忌蕪荑備急同並出第二卷中

古今録驗方八首

古今録驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見神鬼或吐血下利其脉浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可療至七日不可療也宜服升麻湯方

升麻二分　當歸二分　蜀椒汗一分　雄黃研

梔子　桂心各一分　甘草二分炙　鼈甲大如手一片炙

右八味切以水五升煑取二升半分三服如人行五里久再服温覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服亦取得吐佳陰毒去雄黃忌海藻菘菜生葱莧菜張仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒

又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日

以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛喉咽不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數（一本無數字）仲景云此陰毒之候身如被打五六日可療至七日不可療宜服甘草湯方

甘草（炙） 升麻 當歸（各二分）

蜀椒（一分出汗） 鼈甲（大如手一片炙）

右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里頃復服溫覆當出汗汗出則愈若不得汗則不解當重服令汗出忌海藻菘菜莧菜千金集驗備急文仲小品肘後同並出第二卷中

又還魂丸療傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴兩脇裏急飛尸鬼注邪氣或為驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有

時風溫不能久住吐惡水方

巴豆（去心皮熬）　甘草（炙）　朱砂

芍藥（各二兩）　麥門冬（二兩去心）

右五味各擣下篩合和以蜜擣三千下丸如梧桐子大每服兩丸葱棗湯下小兒二歲以上服如麻子大二丸日二服忌海藻菘菜野猪肉蘆笋生血物出第三卷中

又麥奴丸療傷寒五六日以上不解熱在胷中口噤不能言唯欲飲水爲敗傷寒醫所不療方

麻黃（去節）　大黃　芒消

竈突中墨　黃芩（各二分）　麥奴

梁上塵　釜底墨（各一分）

右八味擣篩蜜和如彈丸以新汲水五合研一丸病者渴欲飲水但極飲冷水不節升數須臾當寒寒訖汗出則愈若

日移五丈不汗依前法服一丸以微利止藥勢盡乃食當冷食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名爲麥奴是也肘後胡洽小品刪繁張文仲深師范汪經心録廣濟並同

又解肌湯療傷寒發熱身體疼痛方

葛根四兩 麻黃去節 茯苓各三兩 牡蠣熬二兩

右四味切以水八升煑取三升分三服徐徐服之得汗通則止忌酢物千金有生薑甘草

又調中湯療夏月及初秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血或水或赤帶下壯熱且悶脉微且數宜下之方

大黃 葛根 黃芩

芍藥 桔梗 茯苓

藁本 白朮 甘草炙各二兩

右九味以水九升煑取三升分三服服別相去二食久勿以食隔須取快下壯熱便歇其下亦止也凡秋夏早熱積日忽有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃爲六腑之長最易得傷非意暴寒傷之而下也虛冷人則不在壯熱但下痢或霍亂也少實人有服五石人喜壯熱其適與藥喫斷下則加熱喜悶而死矣亦有不止便作壅熱毒壯熱甚不歇則貝劇是以宜此調中湯下之和其胃氣其表熱者宜前胡大黃下之也忌海藻菘菜猪肉酢物桃李雀肉等

又療往來寒熱胷脅逆滿桃人承氣湯方

大黃四兩漬別下　甘草炙　芒消湯成下

桂心各二兩　桃人五十枚去皮尖碎

右五味以水七升煑取二升半去滓內芒消更煎一兩沸溫分三服太醫校尉史脫方附後傷寒論千金翼同忌海藻

菘菜並出第二卷中

雜療傷寒湯散丸方八首〈並是論中所要者〉

范汪療傷寒勑色頭痛頸強賊風走風黃膏方

大黃　附子　細辛　乾薑

蜀椒〈去目〉　桂心〈各一兩〉　巴豆〈好者五十枚去皮〉

右七味各切以淳苦酒漬藥一宿以臘月猪脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒勑色發熱酒服如梧桐子許又以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之已用有效此趙泉方千金同忌野猪肉生葱生菜蘆笋

又療傷寒白膏摩體中手當千遍藥力乃行并療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之著膏瘡腫上摩向火千遍日再自消方

天雄　烏頭〈炮〉　莽草　羊躑躅〈各三兩〉

右四味各切以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十二聚濕土各一升許成煎豬脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪爲火令膏釋内所漬藥炊令沸下著土聚上沸定頃上火煎如此十二過令土聚盡遍藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚温覆取汗咽痛含如棗核日三咽之不可近目千金同忌豬肉等

又崔文行解散療傷寒發熱者方一名度瘴散

烏頭一斤燒　桔梗　細辛各四兩　白术八兩

右四味擣散皆令盡若中寒服一錢匕覆取汗若不覺復少增服之以知爲度時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服忌生菜豬肉桃李雀肉等千金同

又六物青散療傷寒勑色惡寒者方勑通作赤

烏頭炮　桔梗　白术各十五分

附子炮五分　防風　細辛

右六味擣篩爲散温酒服錢五匕不知稍增服後食頃不汗出者飲薄薄粥一升以發之温覆汗出濈濈可也勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大出不止温粉粉之不得汗者當更服之得汗而不解當服神丹丸千金同忌生菜猪肉桃李雀肉等

又服桂枝湯大汗出後脉洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黃一湯主之方

桂心一兩十七銖　杏人十六枚去尖皮　芍藥一兩六銖　麻黃十六銖去節

生薑一兩六銖切　甘草一兩二銖炙　大棗五枚擘

右七味切以水五升先煮麻黃一兩沸掠去沫乃内諸藥煮得二升去滓温服一升日再本云桂枝湯二分麻黃湯一分合爲二升分再服今合爲一方忌海藻菘菜生葱本張仲景傷寒論方集驗療天行

又療傷寒及天行瓜蔕散吐方

赤小豆一兩　瓜蔕一兩

右二味擣作散温湯二合服一錢匕藥下便臥若吐便且急忍也候食頃不吐者取錢五匕散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐爲度吐出青黃如菜汁者五升以上爲佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虛也藥力過時不吐服湯一升助藥力也吐出便可食無復餘毒若服藥過多者益飲冷水解之與前張文仲方重

又療傷寒熱病辟毒氣疫病七物赤散方

朱砂　烏頭各二兩炮　細辛　躑躅

乾薑　白朮各一兩　栝樓一兩半

右藥擣散服半錢匕用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消疫癘忌桃李雀肉生菜豬肉生血物等出第二

十一卷中

又療傷寒雪煎方

麻黃十斤去節　杏人四升去兩人尖皮熬擣爲膏　大黃一斤十三兩金色者各細剉

右三味以雪水五石四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿入大黃攪調炊以桑薪煑至二石去滓復於釜中下杏人膏煎至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎得二斗六升其藥巳成可丸如彈子大有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也此本出第三卷中千金同

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴　宗元　校正

外臺秘要方卷第一

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺祕要方

二

傷寒下

外臺秘要方卷第二十傷寒下二十一門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億 等上進

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒虛羸方四首

傷寒不得眠方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒䘌瘡方一十首

傷寒陰陽易方八首

傷寒勞復食復方二十五首

傷寒百合病方七首

傷寒狐惑病方四首

傷寒中風方九首 臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非

病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出濇濇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔此其候也

太陽中風以火刧發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身即發黄陽盛則欲衄女六反陰虚小便難陰陽俱虚竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語（荒語也本作譫）甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮緊若下之則腹滿小便難

陽明病若能食爲中風不能食爲中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩者不可吐下吐下之則悸（其季反）而驚

太陰中風四肢煩疼其脉陽微陰濇而長者爲欲愈

少陰中風其脉陽微陰浮者爲欲愈

厥陰中風其脉微浮者爲欲愈不浮爲未愈仲景傷寒論同並出第七卷中

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂心　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五物切薑擘棗次切餘藥以水七升煮棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一服便得汗出者後服小小闊其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自護如服六物青散法若病重者宜夜服特須避風若服一劑晬時不解病證不變者當更服之至有不肯汗出服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二

歠

升加膠飴音夷餳也一升適寒溫分再服若得大汗出者只用桂枝二兩發汗後重發汗亡陽譫語其脉反和者不死發汗已解半日所重發煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯方在上出第二卷中千金胡洽集驗文仲備急范汪同忌海藻生葱菘菜等物

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘麻黄湯方

麻黄三兩去節 桂心二兩 甘草一兩炙 杏人七十枚去皮兩人尖碎

右四味切以水九升煑麻黄減二升去上沫內諸藥煑取二升半去滓服八合覆取微汗不須歠粥餘如桂枝法將息忌海藻菘菜生葱臣億等按張仲景傷寒論麻黄湯惟主傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯

又療太陽病項背強几几反汗不出惡風者屬葛根湯方

葛根四兩 麻黄四兩去節 甘草二兩炙 芍藥

柀

桂心（各二兩） 生薑（三兩） 大棗（十二枚擘）

右七味切以水一斗煑麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煑取三升去滓溫服一升覆取微似汗出不須喫熱粥助藥發汗餘將息依桂枝法忌海藻菘菜生葱並出第三卷中（張仲景傷寒論）

治中風汗出用桂枝此證云汗不出亦傷寒之病非中風也

小品萎蕤湯療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉咽乾舌強胷內疼心胷痞（音柀結病也）滿腰背強方

萎蕤（二兩） 石膏（三分末綿裹） 白薇（二兩） 麻黃（二兩去節）

獨活（二兩） 杏人（二兩去皮尖兩人） 芎藭（二兩） 甘草（二兩炙）

青木香（二兩無可用麝香一分代之）

右九味切以水八升煑取三升分三服取汗若一寒一熱者加朴消一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜並出第六卷中

古今錄驗同（一方有葛根二兩）

千金療傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔栝樓實湯方

栝樓實一兩　柴胡半斤　黃芩三兩　甘草三兩炙

生薑四兩切　大棗十枚擘破

右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煑得六升絞去滓更煎取三升適寒温服一升日三服忌海藻菘菜出第十卷中

千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水飲水而吐此爲水逆五苓散主之方論去豬苓散也

豬苓三分　澤瀉五分　茯苓三分　桂心二分

白朮三分

右五味擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出愈忌桃李醋物生葱雀肉等

又傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹中雷

鳴心下痞（音被）堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞以爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方

甘草（四兩炙） 黃芩（三兩） 大棗（十二枚擘） 黃連（一兩）

乾薑（三兩） 半夏（半升洗去滑）

右六味切以水一斗煑取六升分六服忌海藻菘菜豬羊肉餳並出第九卷中（一方有人參三兩）

古今錄驗療中風傷寒脉浮發熱往來汗出惡風項頸強鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方

大棗（十二枚擘） 桂心（三兩） 芍藥（三兩） 生薑（三兩）

甘草（二兩炙） 黃芩（二兩）

右六物㕮咀以泉水六升煑取四升分四服日三自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝樓三兩利者去芍藥桂

加乾薑三累附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠飴半升分爲再服若脉浮緊發熱者不可與也忌海藻菘菜生葱等物千金同

又大青龍湯療太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛汗不出而煩躁方

麻黃六兩去節　桂心二兩　甘草二兩炙　石膏如雞子大碎綿裹

生薑三兩　杏人四十枚去兩人及尖皮　大棗十枚擘

右七味切以水九升先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥煮取三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者溫粉粉之一服汗者不可再服若復服汗多亡陽逆虛惡風煩燥不得眠也忌海藻菘菜生葱等物並出第二卷中張仲景傷寒論云中風見傷寒脉者可服之

傷寒結胷方七首一十二法

病源結胷者謂熱毒氣結聚於心胷也此由病發於陽而早下

被

之熱氣乘虛而痞結音被結也不散也按之痛其脈寸口浮關上反自沈是也脈大不可下下之則死脈浮而大下之為逆若陽脈浮關上細小沈緊而飲食如故時小便利者名為藏結藏結病舌上白胎滑者為難療不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之出第七卷中

張仲景傷寒論問曰病有結胷有藏結其狀如何荅曰按之痛寸脈浮關脈沈名結胷也問曰何謂藏結荅曰如結胷狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上小細而沈緊名藏結舌上白胎滑者為難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入因作結胷病發於陰而反下之一作汗之因作痞也所以成結胷者以下之太早故也

結胷證悉具煩躁者亦死

結胷證其脈浮大者不可下也下之則死

熬　告　堅

夫結胷病項亦強如柔痓音熾惡也狀下之則和宜大陷胷丸方

蜀大黃半斤　葶藶子半升熬　杏人半升去皮尖熬令赤黑色

芒消半升

右四味擣篩二味杏人合芒消研如泥和散合和丸如彈子大每服一丸用甘遂末一錢匕白蜜一兩水二升同煮取一升溫頓服之一宿乃自下如不下更服取下爲效千金翼同

又太陽病脉浮動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛一云頭痛即眩胃中空虛客熱動膈短氣煩躁心內懊於告反憹音農陽氣內陷心下因堅則爲結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃

大陷胷湯方

蜀大黃六兩破　甘遂末一錢匕　芒消一升

右三味以水六𠌘先煑大黄取二𠌘去滓内芒消煑一兩沸

内甘遂末温服一𠌘得快利止後服千金翼同

又傷寒六七日結胷熱實脉沉緊心下痛按之石堅大陷胷湯主之方依前法

又傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胷無大熱者此水結在胷脅也但頭微汗出者大陷胷湯主之方依前法

大柴胡湯方

柴胡半斤　枳實四枚炙　生薑五兩　黄芩三兩

芍藥三兩　半夏半𠌘洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二𠌘煑取六𠌘去滓更煎取三𠌘温服一𠌘日三服一方加大黄二兩若不加大黄恐不名爲大柴胡湯忌羊肉餳千金翼古今録驗同

又太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者本有久寒也而反下之若利止者必作結胷未止者四日復下之此作協熱利也

又太陽病下之其脉促不結胷者此爲欲解也若心下滿鞕痛者此爲結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之也宜半夏瀉心湯主之方

半夏半升洗　乾薑三兩　人參三兩　甘草三兩炙

黃連一兩　大棗十二枚擘　黃芩三兩

右七味切以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三若須大陷胷湯服者如前法忌羊肉餳海藻菘菜豬肉冷水等千金翼同 一方半夏五兩

又小結胷病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胷湯主之方

黃連一兩上好者　栝樓實大者一枚破　半夏半升洗

右三味切以水六升煮栝樓實取三升去滓内諸藥煮取二升去滓温分三服忌羊肉餳豬肉千金翼同

又病在太陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水而反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散用前篇方

又寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯方如前法白散亦可服

文蛤散方

文蛤五兩

右一味擣篩爲散以沸湯和一方寸匕服之湯用五合千金翼同

又白散方

桔梗三分　貝母三分　巴豆一分去心及皮熬令黑赤别研如脂

右三味擣篩更於臼内擣之以白飲和服強人半錢匕羸人

減之病在膈上則吐在膈下則利利不止飲冷粥一㮎止並

出第四卷中千金翼同忌豬肉蘆笋等

傷寒嘔噦方一十四首

病源傷寒病後胃氣不和此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥

瀉下及飲冷水病折以後熱勢既退冷氣乃動故使心下堅牢

噎噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也出第八卷中

仲景傷寒論療嘔噦心下悸痞鞕不能食小半夏湯方

半夏一升洗 生薑八兩去皮

右二味切以水七升煮取一升半去滓分再服忌羊肉餳

又療嘔噦心下痞鞕者以膈間有水頭眩悸半夏加茯苓湯方

半夏一升洗 生薑八兩去皮 茯苓三兩

右三味切以水七升煮取一升半去滓溫分再服忌羊肉餳

酢等物

又療胷內似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憒憒然無賴者生薑汁半夏湯兼主天行方

生薑汁一升 半夏半升洗切

右二味以水三升煎半夏取一升內薑汁取一升半緜漉小冷分二服一日一夜服令盡嘔噦一服得止者停後服忌羊肉餳救急同

又療乾嘔噦若手足厥冷者小橘皮湯兼主天行方

橘皮四兩 生薑八兩去皮

右二味狹長切以水七升煑取三升去滓小冷服一升下咽則愈救急同出第十六卷中

深師療傷寒病啘不止甘草湯方兼主天行

甘草三兩炙 橘皮三兩

右二味切以水五升煑取一升去滓頓服之日三四服取差

忌海藻菘菜崔氏同

又半夏散方

半夏洗焙乾

右一味末之生薑湯和服一錢匕忌羊肉餳等

又赤蘇湯方

赤蘇一把

右一味水三升煑取一升去滓稍稍飲之肘後同

又乾薑丸方

乾薑六分 附子四分炮

右二味擣篩以苦酒丸如梧子服三丸日三服酒飲下皆得

忌豬肉肘後同

又療傷寒噦甘竹茹湯方

甘竹茹四兩 生白米一升

右二味以水八升煮之取米熟湯成去滓分服徐徐服療風熱氣噦甚神驗諸噦亦佳

又療傷寒嘔噦胷滿虛煩不安大橘皮湯方

橘皮一兩 甘草一兩炙 生薑四兩 人參二兩

右四味切以水六升煮取二升去滓分三服忌海藻菘菜並

出第十四卷中

小品茅根橘皮湯療春夏天行傷寒胃冷變啘方

白茅根一升切 橘皮三兩 桂心二兩切

右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服數數服之盡復合之啘止乃停取微汗有熱減桂心一兩忌生葱文仲同

出第六卷中一方有葛根二兩

千金療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食生蘆根飲方

生蘆根一升切 青竹茹一升 粳米三合 生薑二兩切

右四味以水七升先煑千里鞋底一隻取五升澄清下藥煑取二升半去滓隨意便飲不差重作

又療傷寒後嘔噦通草湯方

通草三兩 生蘆根切一升 橘皮一兩 粳米三合

右四味切以水五升煑取二升去滓隨意便稍飲不差更作取差止古今録驗文仲同出第十卷中

千金翼乾嘔吐涎沫而頭痛茱萸湯主之方

吴茱萸一升炒 大棗十二枚擘 生薑六兩切 人參三兩細剉

右四味以水五升煑取二升去滓分服七合日三仲景同出第十卷中 此張仲景傷寒論方

傷寒咽喉痛方八首

病源傷寒病過經而不愈脉反沈遲手足厥逆者此爲下部脉不至陰陽隔絶邪客於足少陰之經毒氣上熏故喉咽不利或

痛而生瘡出第七卷中

仲景傷寒論少陰病咽喉痛者半夏散及湯主之方

半夏洗　甘草炙　桂心

右三味等分各擣篩畢更合擣之以白飲服方寸匕日三服若不能服散者水一升煮七沸內散兩匕更煮三沸下火令小冷少少含細嚥之半夏有毒不當散服之忌羊肉生葱海藻菘菜餳千金翼同出第六卷中

文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方兼主天行

切商陸炙令熱以布藉喉以熨布上冷復易之肘後同

又方

眞蕳茹爪甲大內口中以手小嚼汁以漬喉當微覺異爲佳亦主天行肘後同

又附子丸方

附子炮　藜蘆等分

右二味末之蜜和丸服如梧子一枚飲下含黃蘗亦佳並出第二卷中忌豬肉狸肉

深師貼喉膏療傷寒舌強喉痛方

蜜一升　甘草四兩切　豬膏半斤

右三味微火煎甘草豬膏令數沸去滓乃內蜜溫令銷相得如棗大含化稍稍咽之忌海藻菘菜出第十四卷中

集驗療傷寒熱病喉中痛閉塞不通烏扇膏方

生烏扇一斤切　豬脂一斤

右二味合煎烏扇藥成去滓取如半雞子薄綿裹之內口中稍稍咽之取差張文仲千金等同忌酒蒜等物

又升麻湯方

升麻三兩　通草四兩　射干二兩　羚羊角三兩屑

芍藥三兩 生蘆根一升切

右六味切以水七升煮取二升半去滓分為三服徐徐服千金古今錄驗同並出第三卷中

千金治傷寒熱病後口乾多唾咽痛乾棗丸方

乾棗二十枚 烏梅十枚

右二味擣合蜜和丸如杏核大綿裹含化嚥津自愈出第十卷中

傷寒吐唾血及下血方三首

病源此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血出第八卷中

仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方

青柏葉三兩 乾薑三兩切 艾三把

右三味以水五升煮取一升去滓別絞取新出馬通汁一升

相和合煎取一升綿濾之温分再服馬通是馬屎汁也一方有阿膠無艾

又吐血下血黃土湯主之方

釜竈下黃焦土半升綿裹　甘草三兩炙　乾地黃三兩

白朮三兩　附子三兩炮破　阿膠三兩炙末　黃芩三兩

右七味切以水八升煮六味取二升去滓內膠令烊余章切下並同分三服忌海藻菘菜蕪荑豬肉桃李雀肉等物並出第十六卷中

古今錄驗蒲黃湯療傷寒溫病天行疫毒及酒客熱傷中吐血不止面黃乾嘔心煩方

蒲黃　桑寄生　桔梗一作栝樓　犀角屑

甘草各二兩炙　葛根三兩

右六味切以水七升煮取三升去滓分三服徐徐服之忌海藻菘菜豬肉出第三卷中

傷寒衄血方四首

病源傷寒病衄血者此由五藏熱結所為也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻出血也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄衄家不可攻其表汗出額上俎急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈出第八卷中

肘後療傷寒大病差後小勞便鼻衄牡蠣散及丸方

左顧牡蠣十分熬　石膏五分

右二味擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大酒服十五丸集驗千金並同出第二卷中

小品芍藥地黃湯療傷寒及溫病應發汗而不發之內瘀有畜血者及鼻衄女人及吐血不盡內餘瘀血面黃大便黑者此主消化

瘀於據反血方

芍藥三兩　生地黃半斤　牡丹二兩　犀角一兩屑

右四味切以水九升煑取三升分三服其人喜忘如狂者加地黃三兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者爲無熱但依方服不須黃芩也忌蕪荑胡荽一方不加地黃

崔氏療傷寒衂鼻熱毒去血若去數升者勿療自住若爲去血不住者外以飛雪湯洗内以苦參湯療之飛雪洗之湯方兼療天行

麻黃三兩去節　石膏三兩碎　芫花一兩熬　大黃二兩

右四味切以水一斗半煑取七升去滓沈冷披髮仰卧因以湯淋其額趣令血住止勿向下卧及坐也湯中有芫花壞人眼勿近之

又療衂鼻苦參湯方

苦參三分　黃連二兩　梔子二七枚擘　大黃一兩

地黃一兩生乾者

右五味切以水五升煮取一升半去滓分再服吾其年已療數十人無不差者都下地黃難得遇無使便闕亦差忌蕪荑豬肉冷水並出第一卷中　一方更用石榴花半兩

傷寒煩渴方九首

病源傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲又經發汗吐下已後腑藏空虛津液竭絕腎家有餘熱故渴也出第七第八卷中

仲景傷寒論療服桂枝湯大汗後煩渴熱不解脉洪大者屬白虎加人參湯方

知母六兩　甘草二兩炙　石膏一升碎綿裹　人參二兩

粳米一升玉函經用糯米

右五味切以水一斗二升煮米熟去米内諸藥煮取六升去滓温服一升日三忌海藻菘菜出第十卷中小品同

又若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方

豬苓一兩去皮 茯苓一兩 阿膠一兩炙 滑石一兩碎綿裹

澤瀉一兩

右五味以水四升先煮四物取二升去滓内阿膠令烊銷温服七合日三服忌醋物千金翼同出第五卷中

范汪栝樓湯主渴飲方

栝樓根內黃脉少者三兩

右一味切以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煮好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾後乃服栝樓湯其銀汁須冷服出第二十卷中

千金療傷寒後結熱在内煩渴青葙子丸方

下

青葙子五兩 龍膽三兩 黃芩一兩 梔子人一兩
苦參一兩 黃蘗二兩 栝樓一兩 黃連二兩
右八味擣篩爲末蜜丸先食服如梧子七丸飲下日三不知稍增忌豬肉冷水集驗同出第九卷中

深師黃芩人參湯療傷寒吐下後內外有熱煩渴不安方
黃芩 人參 甘草 桂心
生薑各二兩 大棗十五枚擘破
右六味切以水八升煮取三升分三服徐徐服忌菘菜海藻生葱等物

又療傷寒除熱止渴欲飲水栝樓根湯方
黃芩三兩 人參二兩 桂心二兩 大黃二兩
栝樓根三兩 芒消二兩 甘草二兩炙
右七味切以水八升煮取三升去滓飲一升須臾當下不下

復飲一升得下止勿復飲湯藥力勢歇乃可食糜耳一方用
生薑二兩忌海藻菘菜生葱油膩等物
又療傷寒下後除熱止渴五味麥門冬湯方
麥門冬去心 五味子 人參 甘草炙
石膏碎各一兩
右五味擣篩三指撮水一升二合煑令沸得四合盡服忌海
藻菘菜並出第十四卷中
古今錄驗黃龍湯療傷寒十餘日不解往來寒熱狀如温瘧渴
胷滿心腹痛方
半夏半升洗 生薑三兩 人參三兩 柴胡半斤
黃芩三兩 甘草三兩炙 大棗十二枚擘
右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服
一升日三服不嘔而渴去半夏加栝樓根四兩服如前忌羊

內錫海藻菘菜等物出第三卷中此本張仲景傷寒論方

又高堂丸療傷寒苦渴煩滿欲死令極飲水法方

大黃二分 消石三分熬 釜底墨一分 竈突中墨一分

黃芩一分 梁上塵一分 竈中黃土一分 麻黃二分去節

胡洽用芒消無黃土

右八味篩末蜜和如彈丸大取一丸著一盞水中盡用服之則自極飲水汗出得熱除矣一名黑奴丸一名駐車丸并療溫瘧神良並出第二卷中此方第一卷用小麥黑奴名黑奴丸

傷寒癖實及宿食不消方二首

病源此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃中有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消也出第八卷中

深師駃豉丸療傷寒留飲宿食不消一名續命丸方

黃芩五兩　大黃五兩　梔子人十六枚大　黃連五兩去毛

豉一升熬　甘遂三兩太山者　麻黃五兩去節　芒消二兩

巴豆一百枚去皮及心熬研

右九味擣篩白蜜和丸如梧子服三丸以吐下爲度若不吐利加二丸一本有杏人七十枚范汪同忌豬肉冷水蘆笋等

出第十四卷中

古今錄驗續命丸療傷寒及癖實痰癊百病方

大黃五兩　黃連一兩　麻黃五兩去節　甘遂三兩熬

黃芩二兩　芒消二兩研　杏人七十枚去皮尖熬　巴豆一百枚去心熬研

豉一升熬

右九味擣篩蜜和丸得傷寒一日服一丸如小梧子大二日二丸至六七日六七九但吐下得汗愈若水澼及痰實服三五丸日二范汪延年删繁同忌豬肉冷水蘆笋出第三卷中

傷寒春冬欬嗽方三首

病源此由邪熱客於肺也上膲有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽出第八卷中

小品射干湯主春冬傷寒秋夏中冷欬嗽曲拘不得氣息喉鳴啞失聲乾嗽無唾喉中如哽者方

射干二兩 半夏五兩洗 杏人二兩去皮尖兩人 乾薑二兩炮

甘草二兩炙 紫菀二兩 肉桂二兩 吴茱萸二兩

當歸二兩 橘皮二兩 麻黃二兩去節 獨活二兩

右十二味切以水一斗煮取三升去滓温分三服始病一二日者可服此湯汗後重服勿汗也病乆者初服可用大黃二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱喜伏於内宜生薑四兩代乾薑除茱萸用枳實二兩炙忌羊肉海藻菘菜餳生葱出第六卷中

古今録驗下氣橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

橘皮　紫菀　麻黃去節　杏人去雙人尖皮

當歸　桂枝　甘草炙　黃芩各三分

右八味切以水七升煑取三升分三服不差重合之忌海藻菘菜生葱出第三卷中

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼欬嗽知母湯方

知母二兩　貝母三兩　乾葛三兩　芍藥三兩

石膏四兩碎裹　黃芩三兩　杏人一兩去皮尖及雙人　梔子人三兩擘

右八味切以水七升煑取二升五合去滓分爲三服如人行八九里再服忌蒜麪七日出第九卷中

傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首

病源目者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯熏蒸於肝

上攻於目則令目赤腫痛若毒氣盛者眼生瞖膜又肝開竅於
目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘡瞖白膜息肉
出第八卷中
肘後療傷寒大病後熱毒攻目方
煑蜂房以洗之日六七度張文仲同
又方
冷水漬青布以掩目張文仲同
又療熱病後生瞖方
燒豉二七粒末内管中以吹之文仲備急同並出第
二卷中
小品漏蘆連翹湯療傷寒熱毒變作赤色癰疽丹瘮腫毒及
眼赤痛生彰瞖悉主之方兼療天行
漏蘆二兩 連翹二兩 黄芩二兩 麻黄二兩去節

挹

白斂三兩 升麻二兩 甘草二兩炙 大黃三兩切
枳實三兩炙
右九味切以水九升煮取三升去滓溫分三服相去二食頃更服熱盛者可加芒消二兩忌海藻菘菜等物千金同
又秦皮湯療毒病衝眼忽生赤瞖或白或腫膚起或赤痛不得視光痛入心肝或眼外浮腫如吹汁出生膜覆珠子方
秦皮二兩 前胡二兩 常山二兩 黃芩二兩
升麻二兩 芍藥二兩 白薇二兩 枳實二兩炙
大黃三兩 甘草二兩炙
右十味以水八升煮取三升分三服相去二食頃更服若盛熱者可加芒消二兩忌海藻菘菜生葱生菜出第六卷中一方加蕤人一兩梔子人半兩
張文仲秦皮湯主傷寒病熱毒氣入眼生赤脉赤膜白膚白瞖

者及赤痛不得見光痛毒煩惱者神効方

秦皮　升麻　黃連略一

右三味切以水洗去塵用水四升煑取二升半冷之分用三合仰眼以綿繞筯頭取湯以滴眼中如屋漏狀盡三合止須臾復用日五六遍乃佳忌豬肉冷水出第二卷中

傷寒口瘡方二首

病源夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其熱毒在藏心脾煩壅表裏俱熱熱不已毒氣熏於上膲故令口舌乾燥生瘡也出第七卷中

深師療傷寒熱病口瘡黃蘗蜜方

黃蘗削去上皮取裏好處薄斜削

右一味以崖蜜半斤極消者以漬蘗一宿唯欲令濃含其汁良久吐之更復如前若胷中熱有瘡時飲三五合尤良

又療傷寒口瘡爛者升麻湯方

升麻一兩 甘草一兩炙 竹葉五合切 麥門冬三分去心

牡丹一分 乾棗二十枚擘

右六味切以水四升煮取一升半去滓分五服含稍稍咽之爲度忌海藻菘菜胡荽等並出第十四卷中

傷寒手足欲脫疼痛方七首

病源此由熱毒氣從內而出循經絡攻於手足也人五藏六腑井滎俞皆出於手足指故毒從藏腑而出也出第八卷中

范汪療傷寒熱病手足腫欲脫方

生牛肉裹之腫消痛止深師同出第三十卷中

崔氏療傷寒手足熱疼欲脫方

取羊屎煮汁以淋之差止亦療時疾陰囊及莖腫亦可煮黃蘗洗之肘後深師集驗千金備急並同出第

一卷中

集驗療毒熱攻手足腫疼欲脫方

濃煑虎杖根適寒溫以漬手足入至踝上一尺范汪肘後千金同兼療天行

又方

酒煑苦參以漬之范汪千金集驗同並出第二卷

千金療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

煑馬糞若羊糞汁漬之豬膏和羊糞塗之亦佳范汪集驗肘後同

又方

取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳范汪集驗肘後同出第十卷中

備急療熱病手足腫欲脫者方兼主天行

以稻穰灰汁漬之佳集驗千金肘後同出第一卷中

傷寒虛羸方四首

病源其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡俱損傷陰陽竭絕熱邪始散眞氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉出第八卷中

集驗療傷寒虛羸少氣氣逆若嘔吐方

石膏一升碎綿裹 竹葉二把 麥門冬一升去心 人參二兩

半夏一升洗 生薑四兩 甘草二兩炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內粳米一升米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第三卷中

又生地黃湯療傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃三斤 大黃四兩 大棗二十枚擘 甘草一兩炙

芒消二合

右五味合擣令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服忌海藻

菘菜出第二卷中

千金療傷寒虛羸少氣嘔吐竹葉石膏湯方

石膏一升碎綿裹 竹葉二把 麥門冬一升去心 人參二兩

半夏半升洗 甘草二兩

右六味以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去米

飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳出第十卷中此張仲景傷寒論方

張文仲雞子豉湯療吐下後虛羸欲死方

雞子一十枚 豉四合綿裹

右二味以水五升先煮雞子取二升內豉又煮三四沸去滓分

再服支同此出姚方第二卷中集驗備急同各用雞子十四枚

傷寒不得眠方四首

病源夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主卧謂陽氣盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也出第八卷中

仲景傷寒論療傷寒發汗若吐下後虛煩不得安眠劇則反覆顛倒心内苦痛懊憹(上奥下農又奴凍反)者屬梔子豉湯證方

肥梔子(十四枚擘) 香豉(四合綿裹)

右二物以水四升先煑梔子取二升半去滓内豉更煑取一升半去豉分温再服得吐止後服

肘後療大病差後虛煩不得眠眼中疼痛懊憹烏梅豉湯方

豉(七合綿裹) 烏梅(十四枚擘)

右二物以水四升煑烏梅取二升半内豉更煑取一升半去滓温分再服無烏梅用梔子四枚

又半夏茯苓湯方

半夏三兩洗 秫米一升 茯苓四兩
右三味切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮諸藥得五升去滓溫分五服忌羊肉餳酢物等並出第一卷中
深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩乏氣晝夜不眠方
酸棗人四升 麥門冬一升去心 甘草二兩炙 蝭母二兩知母也
茯苓一兩 芎藭二兩 乾薑三兩
右七味切以水一斗六升煮酸棗取一斗去棗內藥煮取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜大醋出第十四卷中

傷寒小便不利方九首

病源傷寒發汗後而汗出不止津液少胃中極乾小腸有伏熱故小便不通也出第八卷中
仲景傷寒論少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或欬或小便自利或下利

挼

或嘔者眞武湯主之方

茯苓三兩 白芍藥三兩 附子一枚炮去皮破八片 白术三兩

生薑三兩去皮

右五味切以水八升煮取三升去滓温服七合日三若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便自利者去茯苓若下利者去芍藥加乾薑二兩嘔者去附子加生薑足前成半斤忌酢豬肉桃李雀肉等出第六卷中深師同兼主天行大效

又傷寒六七日已發汗而復下之胷脅滿結小便不利渇而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未解也屬小柴胡桂薑湯主之方

柴胡半斤去土挼 桂心三兩 黄芩三兩 牡蠣二兩熬

甘草二兩炙 栝樓根四兩 乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升温服一升日三初一服微煩後汗出便愈忌生葱海藻菘菜出第四卷中

又療傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯湯主之方

茵蔯六兩　肥梔子十四枚擘　大黃二兩去皮酒洗破三片

右三味以水一斗二升先煮茵蔯減二升去滓內二物煮取三升去滓分溫三服日三小便當利尿如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去出第五卷中張文仲千金並同

又服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

芍藥　生薑切　白朮　茯苓各三兩

甘草二兩炙　大棗十二箇擘

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈

忌海藻菘菜酢桃李雀肉等

肘後療小腹滿不得小便方兼療天行

細末雄黃蜜和爲丸如棗核内溺孔中令入半寸出第二卷中文仲同

千金翼療少陰病四逆其人或欬或悸其悸反或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散方

甘草十分炙 枳實十分炙 柴胡十分 芍藥十分

右四味擣細篩白飲和服方寸匕日三服嗽者加五味子乾薑各五分并主下利肖中悸者加桂心五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚洩利下重者先以水五升煑薤二升取三升以散三方寸匕内湯中煑之取一升半分再服忌海藻菘菜仲景范汪同出第十卷中

崔氏療傷寒熱盛小便不利滑石湯方兼療天行

滑石二兩 葶藶子一合熬

右二物以水二升煑取七合去滓頓服之

又方

擣生葱傅臍下横文中燥易之

又瞿麥湯方

瞿麥三兩 甘草三兩炙 滑石四兩 葵子二合半

石韋三兩去毛令盡

右五味切以水八升煑取二升半分三服忌海藻菘菜並出第一卷中古今録驗同

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

病源傷寒病若表實裏虛熱氣乗虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若温毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦或如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清穀下清穀者不可攻表汗出必脹滿表裏俱虛故也

傷寒六七日不利便發熱而痢其人汗出不止者死但有陰無

噦

陽故也

下痢有微熱其人渴脉弱者今自愈脉沈弦者下重其脉大者爲未止脉微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血下痢脉反浮數尺中自濇其人必圊膿血少陰病下利若痢自止惡寒而欲蜷手足溫者可療

陽明病下痢其人脉浮大此皆爲虛弱强下之故也

傷寒下痢日十餘行其人脉反實者死出第八卷中張仲景傷寒論陽明無下痢證不可下或有云下利其脉浮大者此皆爲虛以强下之故也設脉浮革因爾腸鳴當溫之與水即噦

仲景傷寒論傷寒本自寒下醫復吐之下之不解者寒格更遂吐下食入還吐出者屬乾薑黃連人參湯主之方

乾薑 黃連 黃芩 人參各三兩

右四味切以水六升煮取二升去滓分再服之忌豬肉冷水等出第六卷中

縱

又太陽病桂枝證醫反下之痢遂不止脉促(一作縱)者表未解也喘而汗出者屬葛根黃連湯方

葛根(八兩)　黃連(三兩金色者)　黃芩(三兩切)　甘草(二兩)

右四味切以水八升先煮葛根減二升掠去沫內諸藥煮取二升去滓温分再服忌豬肉冷水海藻菘菜出第七卷中

肘後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方

赤石脂(二兩碎)　乾薑(二兩切)　附子(一兩炮破)

右三味以水五升煮取三升去滓温分三服後臍下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煮忌豬肉范汪張文仲同

又主下痢不能食者兼療天行黃連丸方

黃連(一兩)　烏梅(二十枚炙燥)

右二味擣末臘如博碁子一枚蜜一升於微火煎令可丸如梧子一服十五丸日三忌豬肉冷水出第一卷中

薤 嘔 滯

又白通湯療傷寒泄痢不已口渴不得下食虛而煩方

大附子一枚生削去黑皮破八片 乾薑半兩炮 甘草半兩炙

葱白十四莖

右四味切以水三升煮取一升二合去滓溫分再服渴微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良忌海藻菘菜豬肉范汪同出第十四卷中張仲景傷寒論白通湯惟主少陰下利厥逆無脉乾嘔而煩者白通加豬膽湯主之本無甘草仍不加犀角

范汪療傷寒腹中微痛不止下痢秦皮湯方

秦皮三兩 黃連四兩 白頭翁二兩 阿膠三兩

右四味㕮咀三味以水八升煮得二升絞去滓內膠令烊適寒溫先食飲七合日三服忌豬肉冷水

又豉薤湯療傷寒暴下及滯痢腹痛方

豉一升 薤白一把寸切

右二物以水三升煮令薤熟漉去滓分爲再服不差復作

又蕙草湯療傷寒除熱止下痢方
蕙草二兩 黃連四兩 當歸二兩
右三味切以水六升煮得二升適寒溫飲五合日三忌猪肉冷水等物
又療傷寒下痢脉微足厥冷通草湯方
通草一兩 乾薑一兩 枳實四兩炙 人參一兩
附子一枚炮令裂破
右五味切以水六升煮取二升適寒溫飲五合日三不差稍加至七合忌豬肉並出第三十卷中
小品犀角湯療熱毒下黃赤汁及赤如腐爛血及赤滯如魚腦腹痛壯熱諸藥無效方
黃蘗一兩半 黃芩一兩半 白頭翁一兩 黃連二兩
當歸一兩 牡蠣一兩半熬 犀角半兩屑 艾葉半兩

減　再

石榴皮一兩半　桑寄生一兩　甘草一兩炙

右十一味切以水八升煮取三升分三服忌豬肉冷水海藻菘菜出第六卷中古今錄驗同

集驗療傷寒後下痢膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩　黃連四兩　梔子人十四枚擘　阿膠一兩炙

右四味切以水六升煮三味取二升去滓內膠令烊溫分再服忌豬肉冷水范汪同出第二卷中

千金翼熱痢下重白頭翁湯主之方

白頭翁二兩　黃蘗三兩　黃連二兩　秦皮三兩切

右四味切以水七升煮取二升去滓分服一升不愈更服忌豬肉冷水范汪同出第十卷中此張仲景傷寒論方

崔氏療傷寒後赤白滯下無數阮氏桃華湯方

赤石脂八兩冷多白滯者減四兩　粳米一升　乾薑四兩冷多白滯者加四兩切

右三味以水一斗煑米熟湯成去滓服一升不差復作熱多則帶赤冷多則帶白千金翼方不同加減稍別傷寒論千金范汪同張仲景傷寒論煑湯和赤石脂末一方寸匕服

又療傷寒熱痢黃連丸方

黃連三兩去毛 當歸三兩 乾薑二兩 赤石脂二兩切

右四味擣篩蜜和丸如梧子大服三十丸日三叔尚書以療熱痢是歲傳與東都當方諸軍營及夏口戍人發者數千餘人余時亦復用之亦佳但時用之不及諸湯速耳當服百丸許乃斷忌豬肉冷水並出第一卷中

張文仲陶氏傷寒下痢豉薤湯方

豉一升綿裹 薤白一握 梔子十四枚擘破

右三味以水五升煑取二升半去滓溫分三服小品去此方主溫毒及傷寒內虛外熱攻腸胃下黃赤汁及如爛肉汁并

去赤帶下伏氣腹痛諸熱毒悉主之水四升先煑梔子薤白令熟內豉煑取二升分三服千金備急方同

又療傷寒下痢惡血不止犀角湯方

乾薑一兩 犀角末一兩 地榆一兩 蜜二合

右四味切以水五升煑取一升半去滓下蜜更煑至一升分三服自愈此治熱毒蠱利出千金同並出第十五卷中

傷寒䘌瘡方一十首

病源凡得傷寒及天行熱病日數校多腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部也䘌病之候齒齗無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠如此皆爲蟲食其肛肛爛見五藏則死當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下脣內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人也出第八卷中

肘後若病人齒斷無色舌上白者或喜眠憒憒(音膾)不知痛痒處或下痢宜急療下部不曉此者但攻其上不以爲意下部生䘌蟲食其肛肛爛見五藏便死也療之方

燒馬蹄作灰細末豬膏和塗綿以導下部日數度差

又桃人苦酒湯方

桃人(五十枚去皮尖及兩人) 苦酒(二升) 鹽(一合)

右三味煮取六合去滓盡服之並出第一卷中

深師療䘌食下部桃皮湯方

桃皮(二兩) 槐子(二兩) 艾(二兩) 大棗(三十枚擘一方用黃連)

右四味切以水五升煮取三升去滓溫分三服之

又療䘌蟲食下部方

以泥作甖以竹筒如指所横穿甖肚筒一頭内下孔中内如雞子艾燒之人就甖口吹之常令艾燒強人

可益芠甚良千金同

又龍骨湯治傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人宜服此湯除熱毒止痢神方

龍骨半斤碎

右一味以水一斗煮取四升沈之井底令冷服五合餘漸漸進之恣意如飲尤宜老少無味殆如飲水赤斷下文仲備急千金等同

又療傷寒及諸病之後內有瘡出下部煩者黃連犀角湯方

黃連一兩去毛　烏梅十四枚擘　犀角三兩屑　青木香半兩

右四味切以水五升煮取一升半分再服忌猪肉冷水等並出第十四卷中

范汪療傷寒心中懊憹下痢穀道中爛傷當服懊憹散以䘌藥

內穀道中懊憹散方

藋蘆十分 乾漆二分 萹蓄二分

右三味各異擣篩爲粉粥飲服一錢匕先食日再服千金同

又療䘌懊憹麝香散方

麝香一分研 雄黃一分研 丹砂一分研 犀角一分屑

羚羊角一分屑 青葙子一分 黃連一分 升麻一分

桃人一分熬 貝齒一分

右十味並擣合下篩先食以小麥粥服錢五匕服藥訖復以錢五匕綿裹以導穀道中食頃去之日三忌豬肉冷水生血物等並出第三十三卷中

小品青葙子散療熱病有䘌下部生瘡方

青葙一兩 藋蘆四兩 狼牙三分 橘皮二分

萹蓄二分切之

右五味擣下篩粥飲和合服兩錢匕日三不知稍增之出第六卷中千金同有甘草一分

張文仲療傷寒兼䘌瘡王叔和云其候口脣皆生瘡唾血上脣內有瘡如粟者則心中懊憹痛如此則此蟲在上乃食五藏若下脣內生瘡其人喜眠者此蟲在下食下部方

取雞子一枚扣頭出白與漆一合熟和令調如漆還內殼中仰吞之食頃或半日或下蟲或吐蟲劇者再服乃盡熱除病愈凡得熱病腹內熱食少三蟲行作求食食人五藏及下部人不能知可服此藥不爾䘌蟲殺人集驗深師肘後同

又方

豬膽一具

右一味漬著半升苦酒中和之煎三沸三下三上藥成可放溫空腹飲一滿口蟲即死有人經用之驗並出第二卷中千

金同

傷寒陰陽易方八首

病源傷寒陰陽易病者是男子婦人傷寒病新差未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新差未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不能舉眼内生䁾四肢拘急小腹㽲痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不能舉百節解離經脉緩弱血氣虚骨髓枯竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能動揺起止仰人或引歲月方死出第八卷中

深師療婦人得温病雖差平復未滿一百日不可與交合交合

爲陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以易婦人名爲陽易速當療之可差滿四日不可療也宜令服此藥方

乾薑四兩

右一味擣末湯和一頓服溫覆汗出得解止手足伸遂愈范汪同出第十四卷中

范汪豭音加雄鼠也下同鼠糞湯療傷寒病後男子陰易方

薤一大把　豭鼠糞十四枚

右二味以水五升煮取二升盡飲之溫卧汗出便愈亦理勞復豭鼠屎兩頭尖者是也肘後薤作藍

又丹米湯療傷寒病已後男子陰易方

丹米

右一味末以薄酒和盡飲之溫覆汗出便愈亦隨人大小不必三兩自以意消息之

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便絕死竹皮湯方

刮青竹皮一升

右一味以水三升煮五六沸絞去滓頓服立愈肘後同

又療陰陽易栝樓湯方

栝樓根二兩

右一味以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煮好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾乃服湯小便利即差栝樓湯銀汁須冷服與前療湯方同

千金曰昔者有人得傷寒病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病口舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋王者病愈後六十日已能行射獵以

房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難療多死
近者有士大夫小得傷寒差以十餘日能乗馬行來謂平復以
房室則小腹急痛手足拘拳而死醫者張苗說有婢得病後數
十日有六人姧之皆死婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人
療之燒裩散方兼主温病陰易也

取女人中裩近隱處燒取灰

右一物爲散服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此爲愈矣
女人病可取男子裩如前法酒水服此本仲景方肘後同

又療交接勞復卵腫縮腹中絞痛便欲死者方

取交接婦人衣服以覆男子肘後同

又方

取女人手足爪二十枚　女人中衣裳一尺燒

右二味末以酒服亦米汁飲服之出第十巻中肘後同

傷寒勞復食復方二十五首

病源傷寒病新差津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉沉緊者宜下之又食復傷寒病新差及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食猪肉腸血肥魚及久膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌粢黍飴脯炙膾棗栗諸果牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不可不慎護也夫病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羮汁慎不可食猪狗等肉並出第八卷中

廣濟療傷寒因食勞復頭痛壯熱梔子湯方

梔子十四枚擘　香豉一升綿裹　葱白一握切　粟米三合

雄鼠屎兩頭尖者二七枚燒令煙絕末

右五味以水八升煮取二升三合去滓內鼠屎分三服服別相去如人行六七里須利內芒消五分忌麫炙肉蒜等物出第一卷中

深師療勞復大青湯方

大青四兩　甘草二兩炙　阿膠二兩炙　香豉二兩

右四味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日五六欲盡復作常使有湯渴便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解吐下後熱不除止下痢甚良先煮大青甘草取四升去滓內膠豉膠消盡便漉去勿令豉壞當預漬膠令釋也忌菘菜海藻集驗肘後千金同

又方

取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之

温卧取汗愈雞子殼悉服之肘後崔氏同

又方

取馬糞燒擣為散冷酒服方寸匕良三炊頃便驗神良

又療傷寒差後勞復葵子湯方

葵子二升 粱米一升

右二味合煑作薄粥飲之多多為佳取汗立差並出第十四卷中

范汪療傷寒病差語言書疏坐起行步勞復方

創青竹皮多多煑之令厚濃服三升汁則愈

又傷寒已愈食飲多勞復大黃豉湯方

豉五合 甘草二兩炙 桂心二兩 大黃四兩

芒消半斤

右五味㕮咀以水六升煑得二升去滓先食適寒温飲一升

日再忌海藻菘菜生葱等物

又療傷寒差已後飲食勞復梔子湯方

梔子十四枚　豉一升　桂心二兩　麻黃二兩

大黃二兩

右五味㕮咀以水七升先煮麻黃掠去沫內餘藥更煮取二升去滓温服一升日再服當小汗及下利忌生葱並出第三十四卷中

千金療傷寒温病後勞復或食飲或動作梔子石膏湯方

梔子人二七枚擘　石膏五兩碎　鼠屎尖頭者二十枚　香豉一升綿裹

右四味以水七升煮取三升分三服

又療勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲之一合即愈

又方

又方

取頭垢如棗核大吞一枚

取飯燒爲末飲進一升肘後同

又療大病已差勞復者枳實梔子湯方

枳實三枚炙　梔子十四枚擘

右二味以酢漿一斗先煎取六升煑藥取三升內豉一升煎五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如碁子一枚范汪救急集驗並同出第十卷中張仲景傷寒論內大黃如博碁子五六枚

又療勞復垂死者方

煖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服則愈男兒亦得起死人方

又療食勞方

麴一餅煑取汁服之

又療食勞方

杏人五十枚酢二升煎取一升服之取汗則差

又方

燒人糞灰水服之方寸匕

又療傷寒差後更頭痛壯熱煩悶者方

服黄龍湯三合日三服

又欲令病人不復者方

燒頭垢如梧子大服之並出第十卷中

崔氏療傷寒勞復鼠矢湯方

梔子二七枚擘　豉五合　鼠屎兩頭尖者二七枚

右三味以漿水二升煮取一升去滓頓服數試異驗出第一卷中

古今録驗梔子湯療傷寒勞復方

梔子十四枚擘　麻黄二兩去節　大黄二兩　豉一升綿裹

右四味切以水七升煮取二升分為三服深師肘後同

又療傷寒勞復鼠屎湯方

鼠屎二十一枚　豉一升綿裹　梔子七枚擘　大黃三兩切

右四味以水五升煎取二升七合分三服微取汗應小鴨溏下千金同

又療病新差早起及食多勞復鼠矢豉湯方

鼠屎兩頭尖者二十一枚　香豉一升

右二味以水三升煮取一升盡服之溫卧令小汗千金同

又療食不消勞復脉實者鼠矢梔子豉湯方

豉二升綿裹　鼠屎二十一枚　梔子七枚擘　麻黃三兩去節

右四味以水五升煮取二升分服七合汗微出日三服千金麻黃作大黃

又療傷寒已愈食飲多復發者方

豉五合綿裹　甘草二兩炙　大黃四兩　芒消半兩

右四味切以水九升煮取三升去滓飲一升日再范汪同忌菘菜海藻等

又療傷寒差令不復白芷散方

白芷十二分 白朮十分 防風八分 栝樓五分

桔梗四分 細辛三分 附子二分炮去皮 乾薑二分

桂心二分

右九味擣篩爲散以粳米粥清服一錢匕食已服二錢小兒服一錢常以雞子作羹臾粳米飯多少與病人食之亦未必常雞子羹粳米飯如服藥訖即扶起令行步仍櫛頭洗手面食輒服之勞行如前則不復浩云數用佳范汪同忌豬肉桃李雀肉胡荽蒜青魚鮓生葱生菜出第三卷中一方有人參三分

傷寒百合病方七首

病源傷寒百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒

虛勞大病之後不平復變成斯病也其狀意欲食復不能食常默默欲得卧復不得卧欲出行而復不能行飲食或有美時或有不用時聞飲食臭或如強健人而欲卧復不得眠如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小便赤黃百合之病諸藥不能療得藥則劇而吐利如有神靈所加也身形如和其人脉微數毎尿輒頭痛其病六十日乃愈若尿時頭不痛淅淅然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便硬三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以療之耳出第八卷中

仲景傷寒論療百合之病諸藥不能療若得藥則劇而吐痢如

有神靈所加也身體仍和脉微數毎尿時輒頭痛六十日乃愈尿頭不痛淅淅然者四十日愈尿快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見者悉療之

又發汗已更發者百合知毋湯主之方

百合七枚擘 知毋三兩

右二味以泉水洗先漬百合經一宿上當白沫瀉却其汁更以好泉水二升煑取一升去滓置之一處別以泉水二升煑知毋取一升去滓二味汁相和煑取一升半分温再服之小品千金同

又下之已更發者百合滑石代赭湯主之方

百合七枚擘以泉水漬一宿上當白沫出去之 滑石三兩碎 代赭如彈丸一枚碎

右三味先以泉水二升煑百合取一升去滓置一廂又以泉水二

升煑和二味取一升去滓合煎取一升半分再服千金小品同

又吐之巳更發者百合雞子湯主之方

百合七枚

右一味依前法泉水二升煑取一升去滓扣雞子一枚取中黃內百合湯中攪令調温再服之千金同

又不吐不下不發汗病形如初百合生地黃湯主之方

百合七枚

右一味依前法漬以泉水二升煑取一升生地黃汁一升二味汁相和煑取一升半温分再服一服中病者更勿服也大便當出惡沫千金小品並同

又百合病一月不解變成渴者

以漬百合水洗身法其後千金方中一味是後服栝樓牡蠣散其次則是並出第十七卷中

小品凡百合病見於陰而以陽法攻之其陰不得解也復發其汗此為逆其病難治見於陽而以陰法攻之其陽不得解也復下之其病不愈千金百合病經一月不解變成渴者方

百合根切一升

右一味以水一斗漬之一宿以汁洗病人身也洗身訖食白湯餅今䭔飥也勿與鹽豉也渴不差可用栝樓根并牡蠣等分為散飲服方寸匕日三服小品張仲景方同

又療百合病變而發熱者方

滑石三兩　百合根一兩炙

右二味末飲下方寸匕日三微利者止勿服之熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

又百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令色黃末飲服之方寸匕日

三滿消痛止小品同並出第十卷中

傷寒狐惑病方四首

仲景傷寒論狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿但欲卧目瞑不得眠起則不安蝕於喉咽者爲惑蝕於陰者爲狐狐惑之病並惡飲食不欲聞飲食臭其面乍赤乍黑乍白蝕於上部其聲嗄蝕於下部其咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於下部苦參湯淹洗之蝕於肛外者雄黃熏之

又瀉心湯兼下利不止心中愊愊堅而嘔腸中鳴者方

半夏半升洗　黃芩三兩　人參三兩　乾薑三兩

黃連一兩　甘草四兩炙　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取六升分服一升日三服忌豬肉冷水菘菜海藻羊肉餳千金同出第六卷中

又雄黃熏法兼主䘌病

雄黃一物研末以兩筒瓦合之燒以熏下部

千金療狐惑薫草黃連湯方

黃連四兩去皮　薫草四兩

右二味切以白漿一斗漬之一宿煑取二升去滓分爲二服

小品同忌豬肉冷水

又其人脉數無熱微煩嘿嘿但欲卧汗出得之三四日眼赤如鳩眼者得之七八日其四眥黃黑能食者膿已成也療之方

以赤小豆三升漬之令生芽足復乾之加當歸三兩末漿水服方寸匕日三小品同出第十卷中此本仲景方

凡病形不可灸因火爲邪散走血脉傷脉尚可傷藏則劇井輸穴腫黃汁自出經絡外爛肉腐爲癰膿此爲火疽七居反醫所傷也

凡微數之脉愼不可灸因火爲邪即致煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也

外臺秘要方卷第二

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

外臺祕要方

三

天行

外臺祕要方卷第三十一 天行二十一門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

天行病發汗等方四十二首

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫者此非其時而

有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲溫病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與溫及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火灸愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胷服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蔕散吐之即愈視病者尚未了了復一法針之當解不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意但當諦視節度與病

耳若食不消病亦與時行病俱發熱頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胷五日入胃入胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此爲病三死一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有彊弱病有難易攻效相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散一方寸匕水和服之當以新汲冷水令彊飲一升若一升半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此病輩多不善勿彊與水水停即結心下也更當以餘藥吐之皆令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解之者其死殆速矣亦可先以去

毒物及法鍼之尤佳其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩耳舉又引鬢髪即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱以摩面從上下二七止去肿氣令面有光又摩手令熱從體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈

又時氣病一日太陽受病太陽爲三陽之首主於頭項故得病一日頭項腰脊痛

又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脉絡鼻入目故病二日肉熱鼻乾不得眠夫諸陽爲表表始受病皮膚之閒故可摩膏火炙發汗而愈

又時氣病三日少陽受病少陽脉循於脅上於頸耳故得病三日胷脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於

藏故可汗之而愈

又時氣四日太陰受病太陰爲三陰之首是知三日已後諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脉主於咽嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胷膈故可吐而愈也

又云夫得病四日毒在胷膈故宜取吐有得病二三日便止煩滿此爲毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上焦者其人有淡實故也所以復宜取吐也

又時氣病五日少陰受病少陰脉貫腎絡肺繫於舌本故得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈

又時氣病六日厥陰受病厥陰脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此爲三陰三陽俱受病毒氣入於腸胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之並出第九卷中

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃五兩去節 葛根四兩 梔子二七枚擘 葱切一升

香豉一升綿裹

右五味㕮咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去如人行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸熱食出第二卷中

肘後療天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃一兩去節　升麻一兩　甘草一兩炙　芍藥一兩

石膏一兩碎綿裹　杏人三十枚去尖雙人　貝齒三枚末

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則愈便食豉粥補虛也忌海藻菘菜千金同

又方

麻黃二兩　加黃芩　桂心各一兩　生薑三兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱張文仲同

又葛根解肌湯方

葛根四兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節　大青一兩

甘草一兩炙　黃芩一兩　石膏一兩碎　大棗四枚擘

桂心一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取汗

差忌海藻菘菜生葱炙肉等張文仲同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡八兩　人參三兩　甘草三兩炙　黃芩三兩

生薑三兩　半夏半斤洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌海藻菘菜羊肉餳范汪張文仲同此張仲景傷寒論方

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大柴胡湯方

柴胡半斤　大黃二兩　黃芩二兩　芍藥二兩

枳實四枚炙　半夏五兩洗　生薑五兩　大棗十二枚擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服當微利忌羊肉餳此方四首最第一急疾須預

有幸可得藥處便不可不營之保無傷死諸小療爲以防窮極者耳忌羊肉餳出第二卷中同上

删繁療天行三日外至七日不歇肉熱令人更相染著大青消毒湯方

大青四兩　香豉八合綿裹熬　乾葛　梔子各四兩

生乾地黃一升切　芒消三兩

右六味切以水五升煑諸藥味取二升五合去滓下芒消分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物一方有石膏八兩

又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛彊若參吐毒熱湯方

苦參八分　烏梅七枚　雞子三枚取白

右三味以苦酒三升煑二物取一升去滓澄清下雞子白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈

又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黄湯方

生地黄一升切 黄芩三兩 桂心二兩 甘草二兩炙

竹葉一升切洗 香豉一升綿別裹 蓴心一升 芒消三兩

尖鼠屎三七枚 乾葛一兩 麻黄三兩去節 石膏八兩碎綿裹

右十二味切以水九升煑取三升去滓下芒消分三服忌蕪荑海藻菘菜生葱等

又療天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去噏噏音吸四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安生地黄湯方

生地黄汁一升 生麥門冬汁一升 赤蜜一升 人參二兩

白术三兩 桂心一兩 甘草二兩炙 生地骨皮四兩

升麻三兩 石膏八兩碎綿裹 蓴心一升

右十味細切以水九升煑諸藥味取二升去滓下地黄汁

更煎三兩沸分温五服晝三夜一服忌蕪荑生葱海藻菘菜
桃李雀肉等物

又療天行二七日至四七日勞痟(烏玄反)不歇熱毒不止乍寒乍
熱乍劇乍差發動如瘧鱉甲湯方

鱉甲(三兩炙) 大青(二兩) 石膏(八兩碎綿裹) 牡丹皮(一兩)
烏梅肉(一兩) 常山(三兩) 竹葉(切一升) 牛膝根(三兩)
甘草(一兩) 香豉(一升熬綿裹)

右十味切以水九升煑取三升分温三服日三忌生葱生菜
鯉魚海藻菘菜莧菜蕪荑(一方有生天門冬生地黃各切一升)

千金療天行熱病五六日以上宜服苦參湯方

苦參(三兩) 黃芩(二兩) 生地黃(八兩)

右三味切以水八升煎至二升去滓温服半升日再忌蕪荑
出第九卷中

又凝雪湯療天行毒病七八日熱積胷中煩亂欲死起死搶音塔湯方

芫花一斤

右一味以水三升煑取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也張文仲備急古今錄驗深師范汪並同出第十卷中

千金翼療天行脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證續在此當發其汗服藥已微除發煩目瞑劇者必衂衂乃解所以然者陽氣重故也宜服麻黃湯方千金翼不療天行

麻黃三兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去尖皮兩人

右四味切以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸藥煑取二升半分服八合取汗不須飲粥投此湯易得汗忌菘菜海藻生葱深師同出第九卷中此張仲景傷寒論方

崔氏療時行數四日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有尚在數日便兼除熱止下者也四順湯熱白通苦溫故吾思作此湯以救數十人兼主傷寒

黃連龍骨湯方

黃連三兩止利除熱　黃蘗三兩止利除熱　熟艾如雞子一枚除熱毒止利　龍骨二兩止利除熱

右四味切以水六升煑取二升半分三服無不斷者忌猪肉冷水

又其年時行四五日大下後或不下皆患心中結滿兩脅痞塞胷中氣急厥逆欲絕心起高胷手不得近不過二三日輙便死殁諸醫用瀉心湯余用大小陷胷湯並不得療重思此或是下後虛逆而氣已不理而毒復上攻毒氣相搏結於胷中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸方

人參二兩 白朮二兩 甘草二兩炙 乾薑六分炮

加栝樓根二兩 枳實四枚 茯苓二兩 牡蠣二兩熬

右八味末之以蜜和爲丸服如彈一丸熱水下不歇復服余時用此効的神速下喉即折續復與之不過服五六丸胷中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當加栝樓不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以告領軍韓康伯右衞毛仲祖光禄王道豫靈臺郎顧君苗著作商仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時枳實乃爲之貴難者曰傷寒熱病理中溫藥今不解之以冷而救之以温其可論乎余應之曰夫今詠時行始於項彊欬色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生瘡下痢大齊於此耳忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等深師方同

又阮河南療天行七八日熱盛不解艾湯方

苦酒三升　葶藶子二合熬擣　生艾汁取一升無生艾熬艾乾艾亦可用無艾可取艾根擣取汁

右三味煎得一升頓服愈若有牛黃內一刀圭尤良此宜療內有大熱也阮河南曰療天行凡除熱解毒無過苦醋之物故多用苦參青葙艾葶藶苦酒烏梅之屬此其要也夫熱盛非苦醋之物則不能愈熱在身中既不時治治之又不用苦酢之藥如救火不以水必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青葙葶藶子艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其閒耳無不解千金集驗同並出於第一卷中

又茵蔯丸療瘴氣時氣及黃病痎瘧等方

茵蔯二兩 大黃五兩 豉五合熬令香 常山三兩

梔子人二兩 鱉甲二兩炙 芒消二兩 杏人三兩去尖皮熬

巴豆一兩去心皮熬

右九味擣篩蜜和爲丸初得時氣三日內平旦飲服每服一丸丸如梧子大如人行十里久或吐或利或汗如不吐不利不汗更服一丸五里久不吐利汗則以熱飲投之老小以意量減黃病淡癖時氣傷寒瘖瘧小兒驚熱欲發癇服之無不差者療瘴特神驗有人患赤白痢者服之亦差春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病忌莧菜蘆笋野猪肉生葱生菜出第二卷中千金同

張文仲療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食大黃湯方

大黃半兩 黃連半兩去毛 黃蘗半兩 梔子半兩擘

右四味切以水八升煮取六七沸内豉一升葱白七莖煮取三升分三服此許推然方神良又療傷寒巳五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷水小品備急同

又支太醫桃葉湯熏身法

水一石煮桃葉取七升以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簀下取熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

又廩丘蒸法

經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法後以問張苗苗云曽有人疲極汗出臥單簟中冷但苦寒捲四日凡八過發汗汗不出苗燒地排葉蒸之則得大汗被中傳粉極燥便差後用此法發汗得出療之備急方同

又療天行熱毒垂死破棺千金湯方

苦參一兩

右一味㕮咀以酒二升半舊方用苦酒煮取半升去滓併服當吐如烊膠便愈神驗肘後同延年治天行四五日結胷滿痛壯熱身痛出第二卷中

延年秘録療天行頭痛壯熱一二日水解散方

麻黃四兩去節 大黃三兩 黃芩三兩 桂心二兩

甘草二兩炙 芍藥二兩

右六味擣篩爲散患者以生熟湯浴訖以煖水和服方寸匕覆取汗或利則便差丁彊人服二方寸匕忌海藻生葱菘菜生菜古今録驗同千金無黃芩芍藥

又梔子湯主天行一二日頭痛壯熱心中熱者方

梔子三兩 黃芩三兩 豉一升熬綿裹 葱白一升切

石膏四兩碎綿裹 乾葛四兩切

右六味切以水七升煮取二升六合去滓分溫三服如人行八九里再服忌麪酒生冷等物

又解肌湯主天行病二三日頭痛壯熱者方

乾葛四兩　麻黃三兩去節　芍藥二兩　黃芩二兩　甘草一兩炙　大棗十二枚擘　桂心一兩

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服得汗愈忌海藻菘菜生葱等蒋孝璋處

又療欲似天行四五日熱歇後時來時往惡寒微熱不能食者知母湯方

知母二兩　枳實三兩炙　梔子人三兩　豉一升熬別裹

右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服如人行八里一服忌蒜麪

又療天行五日頭痛壯熱食則嘔者竹茹飲方

竹茹二兩　生薑三兩　黃芩二兩　梔子人二兩

右四味切以水五升煑取一升六合去滓分溫三服忌蒜熱麪等五日

又療天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼痢黃芩湯方

黃芩三兩　梔子人三兩　芍藥三兩　豉一升綿裹

右四味以水六升煑取二升半去滓分三服忌物依前

又柴胡湯天行五六日壯熱骨煩疼兼兩脅連心肋下氣脹急硬痛不能食恐變發黃者方

柴胡三兩　枳實三兩炙　栝樓三兩　黃芩三兩

梔子人三兩　茵蔯三兩　龍膽二兩　大黃三兩切

右八味切以水九升煑取二升七合去滓分溫三服忌熱麪蒜並出第九卷中

又竹茹飲主痢後得天行頭痛三四日食即嘔吐者方

竹茹二兩　橘皮二兩　生薑四兩　人參二兩
蘆根一升切　粳米一合
右六味切以水六升煑取二升五合去滓分溫五六服中間
任食忌熱麪生冷張文仲處
又療天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心滿喘氣麤氣
急者茵蔯丸方
茵蔯三兩　大黃五兩　梔子人二兩　黃芩二兩
鱉甲二兩炙　常山二兩　芒消二兩　巴豆一兩去皮心熬
升麻二兩　豉三合熬
右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大患者飲服三丸以得吐
利則差忌莧菜生葱生菜野猪肉蘆笋出第十卷中
救急療天行熱氣頭痛骨肉酸疼壯熱等疾若初病一日在毛
髮二日在皮膚三日在肌肉必未得取利且宜進豉尿湯方

豉一升　葱白一升切　小便三升童子者爲佳

右三味先熬豉及葱白令相得則投小便煑取一升澄清及熱頓服或汗或利但差則得如未歇依前更進一劑頻用有効

又如不除進柴胡湯方

麻黄二兩陳者去節　柴胡三兩　黄芩五兩　甘草二兩炙

乾葛三兩　石膏五兩碎綿裹　葱白根切一升勿令有青處青即熱白即冷一作桑根皮

豉七合綿裹三沸出之

右八味切以水九升宿漬藥明旦先煑麻黄令沸掠去上沫然後幷諸藥煑取一升七合分三服服別相去三食頃良久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩忌海藻菘菜等

又療天行病不即療經四五日渴引飲心上急強手不得近又不得眠荒亂此則是黄不必得待刺黄始服藥凡是心強氣急不得眠臥服此湯吐即差瓜蔕散方

瓜蔕（按量一合熬令似黃勿令焦）　小豆一合（小弱量）

右二味擣篩爲散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿飲五合和散一錢匕服之二食久必吐不吐更與半錢匕服吐畢即差中男以上量意斟酌服之

又天行病若大困患人舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服乾糞湯一名破棺湯解大熱方

陳久乾人糞（一大升）

右一味以沸湯一大升沃此糞一食久澄清瀝取一升頓服如渴不止者又依前法更服此宜灸從心厭骨向下一寸半名巨闕取患人中指節爲寸灸三十壯若無心厭骨則以中指節前量橫括心上至歧骨上兩頭築著骨當橫量下以前一寸當中直下則是巨闕也

必効療天行一二日者方

麻黃一大兩去節

右一味以水四升煑去沫取二升去滓則著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作生熟湯浴淋頭百餘椀然後服前粥則厚覆取汗於夜最佳

又療天行病經七日以上熱勢彌固大便澁祕心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言浪語脉沉細衆狀之中一無可救宜決計服此鼈甲湯方

鼈甲二兩炙　細辛二兩　桂心二兩　白朮二兩

生薑四兩　吴茱萸二兩　白鮮皮二兩　附子一兩半炮

枳實二兩炙　茵蔯二兩　大黃三兩切

右十一味切以水八升煑取二升六合去滓分三服服別相去如人行五里進一服忌生葱生菜莧菜豬肉桃李雀肉等

又療天行十日以上復微滿讝語或汗出而不惡寒體重短氣

腹滿而喘不大便繞臍痛大便乍難乍易或見鬼者大承氣湯方

大黃四兩 厚朴半斤炙 陳枳實五枚炙 芒消三合

右四味切先以水一斗煑二味取五升去滓內大黃復煑取二升去滓內芒消煎令三兩沸適寒溫分再服得下者止不下更服之並出第三卷中此張仲景傷寒論方

古今錄驗八毒大黃丸療天行病三四日身熱目赤四肢不舉産乳後傷寒舌黃白狂言妄語亦療溫病已後飛尸遁尸心腹痛膈上下不通澼飲積聚癰腫苦痛溫中摩痛上諸毒病方

藜蘆二分炙 大黃三分 朱砂五分 蜀椒四分

雄黃四分研 巴豆四分去皮熬 桂心四分

右七味擣篩蜜和爲丸如麻子大飲服三丸當下不差更服合時勿令婦人雞犬見之忌生葱野猪肉蘆筍狸肉生血物

又牽馬丸療天行病四五日下部生瘡醫所不能療者方

附子一枚炮　藜蘆一兩炙　桂心一兩　巴豆一兩去心皮熬

右四味擣篩研巴豆如膏和散蜜丸如梧桐子空腹服二丸熱在膈上不下飲半升熱飲投吐之後下下部瘡自差神良病家嘗牽馬買藥因名牽馬丸老小半之以意消息之忌野猪肉生葱狸肉蘆笋等物

又療若六七日熱盛心煩狂言見鬼者方

絞人糞汁飲數合服良出第三卷中

近效療天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手心熱則變爲黄不療殺人秦艽湯方

秦艽一兩　紫草一兩　白鮮皮一兩　黄芩一兩

梔子一兩

右五味切以水一大升半牛乳一大升煑取七合分爲二服老小以意量之一劑不愈更與一劑試有効

天行病方七首此方兼療傷寒爲題云天行所以入天行部

許仁則云此病方家呼爲傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾苦肝熱則眼赤暈脾熱則穀道稍澀腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾渴胃熱則嘔逆大腸熱則大便祕澀小腸熱則小便赤少皮膚熱則脉洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則爲寒所傷也寒主陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣既爲寒所傷便致斯疾也

又論陰陽傷寒者則毒氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰爲毒所傷則不能流行陽熱獨王故天行多熱者也以病於諸病之中最難爲療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而多倉卒死者不少或由診候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒温失節故致爾自心不全甄別他醫難得精妙與其療也寧可任之但能滋味適寒温將理中間冷暖守

過七日此最爲得計其中事須服藥不可徒然者唯多日大便不通暫須轉洩耳病經一二日覺身體壯熱頭痛骨肉酸楚背脊強口鼻乾手足微冷小便黃赤此是其候若如是宜先合煮桃柳等三物湯浴之方

桃枝細切五斗 柳葉細切五斗 酢漿水一斗

右藥先以水一石煮桃柳枝葉二物取七斗汁去滓內醋漿水攪帶熱以浴浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸風則於密處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽末厭刺處則入被臥

又後服解肌乾葛等五物飲微覆取汗如病根輕者因此或歇方

葛根切五合 葱白切一升 生薑切一合 豉心一升綿裹

粳米二合研碎

右藥切以水五升煮取豉心以上四味取三升半汁去滓內粳米屑煮令米爛帶熱頓啜候盡微覆取汗無所忌

又依前浴等法不覺歇宜更作雞子湯重溉之方

新殼産雞子五枚

各破頭瀉置一盞中別加一雞子水以筯攪令極渾別用水一升煮極沸則投雞子於湯中微攪纔似熟則瀉置椀中内少醬清似變腥氣帶熱啜令盡覆使汗出

又依前雞子湯出汗汗溉當歇如不覺退合梔子等六味散以下之方

梔子三十枚擘　乾葛五兩　茵蔯二兩　蜀升麻三兩

大黃五兩　芒消五兩

右藥切合擣爲散以飲服三方寸匕服之須臾當覺轉則利也如經一兩食頃不利且以熱飲投又不利即斯須更服一方寸匕還以飲投得利爲度後適寒溫將息更不須服此也

又依前梔子等六味散取利復不覺退加嘔逆食不下口鼻喉

舌乾燥宜合生蘆根八味飲子細細服之方

生蘆根一升切 生麥門冬二升去心 生薑五兩 人參二兩

知母二兩 烏梅十顆 白蜜一合 竹瀝三合

右藥切以水八升煮取三升去滓內蜜瀝等攪令調細細飲不限遍數冷煖亦不限食前後服此飲子雖不能頓除熱病然於諸候不覺有加體氣安穩心腹不冷意又欲得此飲任重合但依前服之如熱勢不退心腹妨滿飲食漸少心上痞結則不可重服之

又依前生蘆根等八味飲子飲之諸狀不歇漸不下食心腹結硬不得手近有時觸著痛不可忍既是熱病體氣合熱骨肉疼痛脉合洪數口合苦爽食合嘔逆體氣反涼脉反沈細飯食反下反不知痛惱大小便祕塞心上如石痛不可近覘脣急鼻張手眼尋繹狂言妄語此由熱極將息醋冷飲食寢味唯冷是

求熱結在心無因通洩如有此者十不收二三更不可以常途守之當須作成敗計耳此非半夏等十味湯無奈之何其中有諸狀與此無別但加身體黃眼白睛色如黃蘗此是急黃如有亦不可守常法還宜合後湯救之方

半夏（五兩熊州者湯洗去滑汁盡疑熊字）　乾薑（三兩）　吴茱萸（二兩）

桂心（二兩）　白朮（三兩）　細辛（三兩）　柴胡（三兩）

牡丹皮（三兩）　大黃（五兩）　芒消（二兩）

右藥切以水一斗煮取三升去滓內芒消攪令消盡分溫三服每服如人行十里久若服一服利後須伺候將息勿更進湯藥但研好粟米作汁飲細細與之如覺利傷多可以酢飯止稠酢漿粥亦得忌羊肉餳生葱生菜桃李雀肉胡荽等

又依前成敗計服半夏等十味湯後雖得毒熱勢退利過不休體力漸弱宜合人參等五味散細細服之方

人參五兩　生犀角末二兩　烏梅肉三兩熬　生薑屑三兩
黃連三兩去毛無亦可以龍骨四兩代之
右藥擣篩爲散以飲服一方寸匕日三服稍加至二匕忌猪肉冷水等吳昇同

天行嘔逆方七首

病源胃家有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後飲水多胃虛冷亦爲嘔也出第九卷中

廣濟療天行惡寒壯熱食則嘔逆前胡湯方

前胡一兩　麥門冬三兩去心　竹茹二兩　橘皮一兩
甘草一兩炙　生薑二兩　生地黃四兩切
右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麪猪犬肉油膩出第一卷中

崔氏療天行數日或十許日而表不解心下有水熱毒相搏遂嘔時復有欬者增損阮氏小青龍湯方

麻黃二兩去節　芍藥二兩　桂心一兩　甘草二兩炙

細辛一兩

右五味切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等分雖未嘗用嫌其大溫今增損其分兩以療十餘人皆愈忌海藻菘菜生葱生菜等出第一卷中

近効療天行壯熱嘔逆不下食橘皮湯方

橘皮三兩　生薑四兩　茯苓三兩

右三味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中間任食一日服盡忌大酢蒜麪李處儉張文仲等並同出第九卷中

必効療天行嘔吐不下食方

取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黒灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令大耗無所忌此用頻効出第一卷中

救急療天行後嘔逆不下食食入則出方

取羊子肝如食法作生淡食不過三兩度則止文仲同

又方

以雞子一枚於沸湯中煑三五沸則出水浸之外熟内熱則吞之神効並出第一卷中無所忌

集驗療天行後氣膈嘔逆不下食生蘆根湯方

燈心一分 生麥門冬十二分去心 人參四分切 生蘆根一大握切

右四味以水一大升煎取八合去滓分温三服

天行嘔啘方七首

病源伏熱在胃令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃

氣虛冷亦令致噦也出第九卷中

肘後療嘔啘不止橘皮甘草湯方

甘草一兩炙　橘皮三兩　升麻半兩　生薑三兩

右四味切以水三升煮取一升盡服之日三四作當止忌海藻菘菜文仲同出第二卷中

文仲近効療嘔逆麥門冬飲子方

麥門冬去心　蘆根　人參各二兩

右三味切以水六升煮取二升七合去滓分溫五服徐徐服常用有驗

又方

飲生薑汁三二合大良

又方

枇杷葉去毛煮飲之作粥亦佳出第一卷中

又方

研油麻汁煑菉豆令爛取半升許以手掌大猬皮燒作灰篩之内豆中和食出第二卷中

救急療天行乾嘔若噦手足逆冷薤豉粥方

薤白一升切　香豉一升　白米四合

右三味以水一升煑豉一沸漉去滓下薤及米煑爲稀粥進兩椀良

又療天行後噦欲死兼主傷寒小半夏湯方

半夏五兩洗去滑　生薑八兩切令薄細勿令濕惡經水浸者爲好

右二味各以水三升别煑各取一升半去滓二汁相和一處共煑取二升分三服服相去如人行十里久當令下食其噦不過俄頃則近二公及任理居中屬纊得之明奉御來彖執秘此方但止者藥送來彖與方郎中隣居後乃方便得之大

良効忌羊肉餳傷寒論同並出在第一卷中

天行喉咽痛方二首

病源陰陽隔絶邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於喉咽故痛或生瘡也出第九卷中

深師療天行毒病或下不止喉咽痛黄連馬通湯方

小豆一升　黄連一兩去毛　馬通汁三升　吴茱萸一兩

右四味以馬通汁令煮取一升盡服不差復作有効忌猪肉冷水出第十四卷中

古今録驗青木香湯療春夏忽喉咽痛而腫兼下痢方

青木香二兩　黄連一兩去毛　白頭翁二兩

右三味切以水五升煮取一升半分温三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水出第三卷中

天行衂血方四首

病源天行衄血者五藏熱結所爲心主於血邪熱中於手少陰之經客於足陽明之絡故衄血衄者血從鼻出也出第九卷中

深師療天行毒病鼻衄是熱毒血下數升者方

勿療自差亦無所苦亦可取好松煙墨擣之以雞子白和丸丸如梧桐子大水下一服十丸並無所忌

又黃土湯療鼻衄去五藏熱氣結所爲或吐血者方

當歸　甘草炙　芍藥　黃芩

芎藭各三兩　桂心一兩　生地黃一斤　釜月下焦黃土如雞子一枚碎綿裹

青竹皮五兩

右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥煮取三升分四服忌海藻菘菜生葱

又方

黃芩四兩

右一味切以水五升煑取二升分三服亦療婦人漏下血
又療脉浮大鼻中燥如此必去血鼻衂方
灸兩臂中脉取止取臂脉法以鼻嗅臂點其鼻所著
處是穴兩臂皆爾出第十四卷中
天行口瘡及口乾苦方四首
病源發汗下後表裏俱虚而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡
也出第九卷中
深師療天行熱盛口中生瘡酪酥煎丸
酪酥三合 蜜三合 大青一兩
右三味合煎三沸稍稍傅口以差爲度
又口瘡方
取蛇莓五升擣絞取汁稍稍飲之並出第十四卷中
集驗療天行熱病口瘡升麻湯方

升麻二兩　通草四兩　射干二兩　羚羊角三兩屑

芍藥三兩　生蘆根一升切

右六味切以水七升煮取三升分爲三服如人行五里更服

古今錄驗同

又療天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴石膏蜜煎方

石膏半斤碎　蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃內蜜復煎取一升去滓含如棗核許盡更含千金同並出第二卷中

天行欬嗽方五首

病源熱邪氣客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而欬也出第九卷中

廣濟療天行壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡　升麻各八分　貝母　紫菀各六分

石膏十二分碎綿裹 麥門冬八分去心 杏人三十枚去尖皮兩人 竹葉切一升
甘草二分炙
右九味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服相去如
人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油膩猪魚等
又療天行肺熱欬嗽喉有瘡地黃湯方
生地黃切一升 升麻 玄參 芍藥
柴胡 麥門冬去心各八分 貝母六分 竹葉切一升 白蜜一合
右九味切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再上火煎三沸
含咽其汁勿停中間不妨食不利忌蕪荑熱麪猪犬肉油膩
又療天行後乍寒乍熱昏昏不省覺脅下痛百節骨痛欬不
能下食兼口舌乾生瘡柴胡湯方
柴胡八分 升麻六分 芍藥六分 黃芩六分
甘草五分 石膏十二分碎綿裹 生麥門冬六分去心 葱白十分

香豉六合綿裹　生薑六分　竹葉切一升洗

右十一味切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不吐不利差忌海藻菘菜熱麪油膩並出第一卷中

集驗療天行病上氣欬嗽多唾黏涎日夜不定生薑煎方

生薑三兩去皮切如豆粒大

右一味以餳半斤和微煎令爛每日無問早晚少少含仍嚼薑滓一時嚥之

必効療天行病後因食酒麪肺中熱擁遂成欬不止方

桑白皮十二分　桔梗十分　肥乾棗二十一枚擘　麻黃六分去節

曹州葶藶子十分熬令紫色令爲膏湯成下

右五味切先以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓下葶藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或

利勿恠忌猪肉油膩生冷果子等物

天行發斑方三首

病源夫熱病在表巳發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此爲表虛裏實熱氣燥於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也出第九卷中

肘後比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周帀狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡瘢紫黯彌歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼爲虜瘡諸醫參詳作療用之有効方

取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又方

以水濃煮升麻漬綿洗之苦酒漬煮彌佳但燥痛難忍也並出第二卷中

文仲陶氏云天行發斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣方

云永徽四年此瘡從西域東流于海内但煑葵菜葉蒜

虀啖之則止鮮羊血入口亦止初患急食之少飯下菜

亦得出第二卷中

天行發瘡豌豆疱瘡方一十二首

病源夫表虛裏實熱毒内盛攻於藏腑餘氣流於肌肉遂於皮

膚毛孔之中結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則

毒輕若色紫黒則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脉洪數者

是其候也出第九卷中

千金療人及六畜天行熱氣病豌豆瘡方

濃煑黍穰汁洗之若是穄穰則不差瘡若黒者擣

蒜封之又煑乾芸薹汁洗之

又方　真波斯青黛大如棗水服之差

又熱病後發豌豆瘡方
黄連三兩去毛水二升煑取八合頓服之忌猪肉冷水
又若赤黑發如疥大者方
煎羊脂摩傅之
又方
青木香二兩水三升煑取一升頓服之効
又方　小豆屑和雞子白傅之
又方　以月布拭之
又療豌豆瘡初發覺欲作者方
煑大黄五兩服之延年同
又療瘡出煩疼者木香湯方
青木香二兩　丁香一兩　薰陸香一兩　白礬一兩
麝香二分

右五味以水四升煑取一升半分再服熱盛者加一兩生犀角如無犀角以升麻代之如病輕去礬石大神効

又方

瘡上以芒消和猪膽塗勿動痂落無瘢仍卧黄土末上良此病小便澀有血者中壞瘡皆黒靨不出膿死不療

又內發瘡盛方

醋四合 大猪膽一具

右二味煎三沸一服一合日五服良驗並出第十卷中

延年療天行壯熱頭痛發瘡如豌豆遍身大青湯方

大青三兩 梔子二七枚擘 犀角一兩屑 豉五合

右四味切以水五升煑取二升分三服之無所忌

古今録驗水解散療天行熱氣則生疱瘡疼痛解肌出汗

方出翟世平

麻黃一兩去節　黃芩二分　芍藥二分　桂心二分

右四味擣篩煖水解服二方寸匕覆令出汗日再服差者減之忌海藻菘菜生葱延年同出第二卷中一方有大黃三分甘草二分

天行虛煩方二首

病源夫天行病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心腑而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則譫語時繞臍痛腹滿皆當察其證候也出第九卷中

文仲療天行表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方

竹葉二把　石膏一斤碎綿裹　麥門冬一升去心　半夏半升洗

人參　甘草各二兩

右六味切以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去之分五服嘔者與橘皮湯湯方在上嘔噦篇中不愈者重作此

宮秦數用甚効若傷寒後虛煩亦宜服此方是仲景方忌羊

肉海藻菘菜餳

又療虛煩不可方

青竹茹升二

右一味以水四升煎至三升去滓分溫五服徐徐服之

天行狂語方三首

病源夫病熱盛則弃衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上

屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并於陽

四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於

身故弃衣而走陽盛故妄言罵詈不避親踈大熱遍身狂言而

妄見妄聞也出第九卷中

千金水道散療天行病煩熱如火狂言妄語欲走方

白芷一兩　甘遂二兩熬

井

右二味擣篩以水服方寸匕須臾令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤也一名濯腹湯此方療大急者出第十卷中文仲范汪同

又五苓散主天行熱病但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當方

猪苓三分　白朮三分　澤瀉五分　茯苓三分

桂心二分

右五味擣篩爲散水服方寸匕日三服多煖水汗出愈忌大酢生葱桃李雀肉等張仲景論深師同出第九卷中

古今録驗療天行壯熱狂言譫語五六日者方

雞子三枚　芒消方寸匕　井花水一杯

右三味合攪盡服之心煩下則愈出第三卷中

天行熱毒攻手足方五首

病源熱毒氣從藏腑中出攻於手足手足則㷿熱赤腫疼痛也人五藏六腑井滎輸皆出於手足指故此毒從内而出攻於手足也出第九卷中

肘後療天行病毒熱攻手足疼痛赤腫欲脱方

鹽豉及羊肉一斤以來

右三味以水一斗煑肉熟以汁看冷煖漬手足日三度差范汪同

又方

細剉黄蘗五斤許以水三斗煑漬之必効亦治攻隂腫

又方

作坈令深三尺大小容兩足燒坈中令熱以酒灌坎中著屐踞坈上衣壅勿令氣泄日再作之

又方

煑羊桃葉汁漬之加少鹽尤好並出第二卷中

崔氏療天行熱毒攻手足方

猪蹄一具去毛剉碎合葱白一握切以水一斗煑熟去滓内少鹽以漬之肘後同出第一卷中

天行大小便不通脹滿及澀方四首

病源天行大小便不通此由脾胃有熱發汗太過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在内故大便不通又汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通出第九卷中

廣濟療天行熱氣惡寒頭痛壯熱大小便澀柴胡散方

柴胡八分　茵蔯十分　青木香十分　黃芩八分

土瓜根十分　白鮮皮八分　梔子仁十分擘　大黃二十四分

芒消十二分

右九味擣爲散平辰空肚以新汲水服五六錢匕少時當一

兩行微利利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明晨更服四錢匕熱歇停藥忌熱食猪犬肉油膩等

又療天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下食飲柴胡湯方

柴胡七分　茵蔯七分　大黃十二分別漬　升麻七分

梔子四枚擘　芒消四分湯成下　芍藥七分　黃芩十二分

右八味切以水四升先漬藥少時猛火煮取一升五合分溫三服服別相去如人行六七里喫一服以快利為度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食並出第一卷中

近効主天行後兩脅脹滿方

熬鹽熨之如小便澀亦用鹽熨臍下如水腫以穀枝汁服愈大効

集驗療天行病腹脹滿大小便不通滑石湯方

滑石十四分研　葶藶子一合紙上熬令紫色擣　大黃二分切

右三味以水一大升煎取四合頓服兼擣葱傅小腹乾即易
之効肘後崔氏同無大黃

天行熱痢及諸痢方四首

病源此由熱氣在腸胃挾毒則下黃赤汁也又熱毒傷於腸胃
故下濃血如魚腦或爛肉汁壯熱而腹絞痛此溫毒熱氣所為
也並出第九卷中

深師療天行毒病酷熱下痢七物升麻湯方

升麻 當歸 黃連去毛 甘草炙
芍藥 桂心 黃蘗各半兩

右藥切以水三升煮取一升頓服之忌海藻菘菜猪肉冷水
生葱等物

又天行諸下悉主黃連湯方之

黃連三兩去毛 黃蘗二兩 當歸二兩

右三味以水六升煑取三升去滓内蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水並出第十四卷中（一方有龍骨一兩）

范汪療天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長四五寸黑頭鋭尾麝香丸方

麝香（一分）　附子（二分炮）　雄黃　丹砂

乾薑（各二分）

右五味各擣下篩訖復更合治之蜜和爲丸如小豆大飲下一丸老小半之効驗忌猪肉生血物等出第三十三卷中

甲乙方療天行熱病差後痢膿血不止方

龍骨（一兩）

右一味擣研爲末米飲下一錢不計時節日三服佳

天行䘌瘡方八首

病源毒熱結在腹内穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令

泄痢下部瘡痒若下脣内生瘡但飲寐者此蟲食下部也重者肚爛見五藏出第九卷中

深師療天行下部瘡爛方

烏梅二七枚去核　大蒜二七枚　屋塵半升篩取細者

右三味擣篩爲散苦酒一升和調於銅器中煎成丸作長挺内下部范汪同出第十四卷中

范汪療人下部中痒方

蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸以綿薄裹内大孔中蟲出差

又療穀道中瘡方

以水中荇葉細擣綿裹内下部日三肘後同

又療天行䘌蟲食下部生瘡雄黃兌散方

雄黃半兩　青葙子三兩　苦參　黃連各三兩

桃人一兩半去皮尖及兩人熬

右五味合擣篩綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸匕日三服忌猪肉冷水及熱麪炙肉蒜等物

又桂枝湯療天行䘌病方

桂心二兩　小藍二兩

右二味㕮咀以水一斗煑取二升半內猪肝十兩去上膜細研著湯中和令相得臨時小溫若毒悉在腹內盡服之在下部者三分藥中用一分竹筒內下部中服藥一時間當下細蟲如髪大五六升小兒半作之忌生葱並出第三十三卷中

文仲姚氏療天行病䘌下部生瘡方

濃煑桃皮煎如糖以綿合導下部中若口中生瘡含之

肘後范汪同出第二卷中

甲乙方療天行病有䘌蟲蝕下部生瘡青葙子散方

未

青葙子一兩　藋蘆二兩　狼牙一兩　橘皮一兩
苦參三兩
右五味擣篩爲散米飲和服方寸匕日三服未差更服以差爲度
又療天行痢膿血下部生䘌蟲黃連丸方
黃連三兩末生用　臘一兩　烏梅肉三兩熬末
右三味鎔臘和蜜爲丸如梧子大空心米飲下三十丸再服加至四十丸差忌猪肉冷水
天行陰陽易方二首
病源天行陰陽易病者是男子婦人天行病新差未平復而與交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名爲陽易其婦人新病差未平復男子與之交接得病者名爲陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰

陽相感動其毒疲著於人如換易也其病狀身體熱衝胷頭重
不能舉眼中生眵四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有
不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經
脉緩弱血氣虛骨髓竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能揺動
起止仰人或歳月方死出第九卷中
深師療丈夫得婦人陰易之病若兩房室及諸虛勞少腹堅絞痛
陰縮困篤欲死方
炙陰頭一百壯便差可至三百壯皆愈良無比後生子
如故無妨范汪同無所忌
又療陰陽易病方
取豚卵二枚温令熱酒呑之則差出第十四卷中
天行虛羸方二首
病源夫人榮衞先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰

陽竭絶虛邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮
養故虛羸而生衆病焉出第九卷中
崔氏療煩躁而渴不止惡寒但熱盛者竹葉湯常用亦佳不徒療
天行凡虛羸久病及瘧後胷上痰熱者服之皆妙方
甘草二兩炙　棗十五枚擘　半夏一兩洗　芍藥三兩
前胡一兩　黄芩一兩　小麥五合　人參二兩
粳米一升　知母二兩　麥門冬四合去心　栝樓一兩
生薑四兩　竹葉一把須以竹篠飲代水煑湯不用其葉
右十四味切以竹篠飲一斗五升煑取五升分五服若非天行
而虛羸久病胷上痰熱亦可服之加黄耆二兩除黄芩減知
母一兩除栝樓用之大効忌羊肉海藻菘菜餳出第一卷中
千金補虛大病後不足萬病虛勞同此方
取五歳以上七歳以下黄牛新生者乳一升以水四升

煎取一升如人肌稍稍飲之不得過多十日不佳服佳

出第十卷中

天行差後禁忌方二首

集驗云凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚油膩等必大下痢醫不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴脯鱠炙棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃中虛冷大利難禁不下必死下之復危皆難救也熱病之後多坐此死不可不愼也病新差但得食糜粥寧可少食令肌愼勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兎雉鹿肉愼不可食猪犬肉也新差後當靜卧愼勿令人梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞復故督郵顧子獻得病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死

臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未經百日氣未平復而以房室者略無不死者蓋正疾愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱病房室名爲陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能乘馬行來自謂平復故以房室則小腹急痛手足拘拳而死出第三卷中千金同

深師說天行病未復殭食黃花菜手足稍重一方云青花天行病差食鮰鱠必變成瘕又食鱧魚肉結氣不化天行病差飲酒合陰陽復必死天行病損未滿三月日食鯔鮰肉則復下血食鹽豉令人四枝不舉天行病差食諸菜有花者三年肌膚不充天行病未好損食生瓜芥三月流腫也天行病差食菜合陰陽復必死出第十四卷中千金天行病差後未滿五日食一切肉麪者病更發困天行病差食芥鱠作疽天行病差新起飲酒及食薤菜病更發天行病新差食生魚作下痢必不止天行病差食生菜顏色絕身不平復天行病新汗解飲冷水者損心包令人虛不復天行病未損食犬肉并葫以合食之復則死天行病差食生棗及羊肉者膈上作熱蒸天行新差食犬肉羊肉作骨中蒸熱天

行病差食魚肉并瓜生菜食者令人身腫天行病差食蒜膾者病發大困出第十卷中

天行勞復食復方六首

病源夫病新差血氣尚虚津液未復因即勞動更成病焉若言語思慮則勞傷於神梳頭澡洗則勞於力未堪勞而強勞之則生熱熱氣既還入經絡復為病者名曰勞復又病新差脾胃尚虚穀氣未復若食肥肉魚膾餅棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復為病者名曰食復並出第九卷中

廣濟療患天行熱氣差後勞發頭痛如初病者鼠矢湯方

雄鼠屎三七枚熬末湯成下 乾葛二兩 梔子十四枚擘 葱白一升

豉八合

右五味切以水三升煮取一升七合去滓內鼠屎末分溫二服服別相去如人行六七里微汗內消不利忌如藥法

又療患數日復勞發者枳實湯方

枳實（三枚炙） 梔子（十四枚擘） 葱白（一升切） 香豉（半升）

鼠屎（二七枚）

右五味以水一斗煎取二升五合分溫三服服別相去如人行六七里進一服內消不利忌如藥法並出第一卷中

深師竹葉湯療天行後虛熱牽勞不腹四肢沈重或一卧一起氣力吸吸羸弱方

竹葉（一把） 小麥（一升） 甘草（一兩炙） 石膏（二兩碎）

茯苓（二兩） 半夏（一升洗去滑） 前胡（二兩） 知母（二兩）

黃芩（二兩） 人參（二兩） 生薑（四兩） 大棗（三十枚擘）

右十二味切以水一斗二升煮竹葉小麥減四升去滓內藥煮取三升分三服忌海藻菘菜醋物羊肉餳等物

備急療勞復方

以粉三升以煖飲和服厚覆取汗又以水和胡粉少許服之亦佳出第一卷中

延年葛根飲主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶葛根湯方

葛根一兩　葱白一握　豉半升　米一合

右四味先切葛根以水九升煑取七升則內葱白更煑取四升去葛及葱滓訖則內豉及少許米煑取三沸並濾去米等滓分四服當有汗出即差明旦又更作服忌猪肉蒜等並出第九卷中

必効療天行勞復鼠矢湯方

雄鼠屎二十五枚兩頭尖者　豉一升　梔子二十枚擘　枳實三枚中破炙令黄

右四味以水五升煑取二升四合分四服相去十里久若覺大便澀加大黄二兩出第一卷中

天行差後勞發方五首

許仁則云此病復發不要起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或爲動轉不常皆成此復若復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而生輕易勞復狀一如傷寒初有如此者宜合葱白等七味飲服之漸覆取汗方

葱白（連鬚切一升） 乾葛（切六合） 新豉（一合綿裹） 生薑（切二合）

生麥門冬（去心六合） 乾地黃（六合） 勞水八升（此水以杓揚之一千過）

右藥用勞水煎之三分減二去滓分溫三服相去行八九里如覺欲汗漸漸覆之兼主傷寒忌蕪荑

又依前葱白等七味飲服之得可但適寒溫將息以取安穩若不覺可宜合萎蕤等五味飲子服之方

萎蕤（五兩切） 葱白（切一升） 豉心（一升綿裹） 粳米（三合研碎）

雄鼠屎（七枚末之）

右藥以水七升先煑豉以上取四升汁去滓內粳米屑煑米

爛訖内鼠屎末攪調頓服覆被安卧取汗差

又凡天行病差後準常合漸健能行履遂過限不堪起動體氣虛羸每覺頭痛脣口乾乍寒乍熱發作有時或雖能行動運轉然每作時節有前狀者名天行後不了了有此宜合地骨白皮等五味飲子白薇等十味丸方細細服之

地骨白皮三兩 知母三兩 麥門冬五兩去心 竹瀝一升

白蜜三合

右藥切知母以上和麥門冬然後以水六升煮取二升去滓内竹瀝蜜攪調分溫三服服相去如人行十里久如覺虛不能空服頓盡欲間食服亦佳兼主傷寒

又若服前地骨白皮等五味飲子不可雖可不能全退宜合白薇等十味丸方

白薇三兩 知母四兩 地骨皮三兩 乾地黃六兩

麥門冬(去心，五兩) 甘草(炙，四兩) 蜀漆(三兩) 萎蕤(三兩)

橘皮(二兩) 人參(三兩)

右藥細切合擣篩紬羅為散蜜和丸如梧桐子大初服以飲下十五丸日再服稍加至三十丸服經三數日後自候腹中若覺熱則食前服如不能以空飲下藥宜合烏梅等四味飲下前丸忌菘菜海藻蕪荑等

烏梅飲方

烏梅(十枚) 萎蕤(五兩) 生薑(五兩) 白蜜(一合)

右藥切以水六升煑三味取二升去滓内白蜜攪調細細用下前丸多少冷煖以意斟酌縱不下丸但覺口乾渴則飲之

吴昇同

外臺秘要方卷第三　右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

外臺祕要方

四

温病 黄疸

外臺祕要方卷第四 温病及黄疸二十門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

溫病論病源一十首

病源經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣氷寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者

以其最爲殺厲之氣中而即病者名爲傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑病者熱極又重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒氣之所致以上與傷寒論同

凡病傷寒而成溫病者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑故曰冬三月早卧晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病溫也又有冬時傷非節之暖名爲冬溫之毒與傷寒大異也有病溫者乃天行之病耳其冬月溫暖之時人感乖候之氣未即發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無眞氣從之精神內守病安從來故曰人淸淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根

本也是以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆之則死故曰精者身之本藏於精者春不病溫也有病溫汗出輒復熱而脉躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何曰病名陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也汗出而脉尚躁盛者死今脉不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死凡膚熱其脉盛躁者病溫也其脉盛而滑者汗且出也凡溫病人三二日身軀熱脉疾頭痛食飲如故脉直疾八日死四五日頭痛脉疾喜吐脉來細十二日死此病不療八九日脉不疾身不痛目不赤色不變而反利脉來牒牒按不彈手指時時大心下硬十七日死

病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不療也
下利腹中痛甚者死不療也其鍼石湯熨別有正方存神攘辟
今附于後養生方導引法去常以雞鳴時心存念四海神名三
遍辟百邪止鬼令人不病温
東海神名阿明　南海神名祝融　西海神名巨乘
北海神名禺強
又存念心中氣赤肝氣青肺氣白脾氣黃腎氣黒出周其身又
兼辟邪鬼欲辟衆邪百鬼常存心為炎火如斗煌煌光明則百
邪不敢干之可以入温疫之中
又温病一日太陽受病諸陽主表表謂皮膚也病在皮膚之間
故頭項腰脊痛
又温病二日陽明受病在於肌肉故肉熱鼻乾不得卧故可摩
膏火灸發汗而愈

又温病三日少陽受病其脉循脅絡於耳故胷脅痛而耳聾三
陽始傳病訖未入於藏故可發汗而愈也
又温病四日太陰受病太陰者三陰之首也三陽受病訖傳入於
陰故毒氣入胷膈之内其病咽乾腹滿故可吐温病大法四日
病在胷膈當吐之愈有得一日至二日便心胷煩滿爲毒已入
兼有痰實亦宜吐之
又温病五日少陰受病毒氣入腹其病口熱舌乾引飲故可下
之而愈也
又温病六日厥陰受病毒氣入腸胃其病煩滿其陰縮故可下
而愈
又温病七日法當愈此是三陰三陽傳病終故也今七日病不
除者欲作再經病也再經病者經絡重受於病
又温病八日以上不解者或是諸經絡重受於病或經發汗吐

下之後毒氣未盡所以病證不罷也
又溫病九日以上病不除者或初一經受病則不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於三陰所以致停滯累日病證不罷皆由毒氣未盡表裏受邪經絡損傷腑藏俱病也並出第十卷中

辟溫方二十首

廣濟療疫氣令人不染溫病及傷寒歲旦屠蘇酒方

大黃十五銖 白朮十銖 桔梗十五銖 蜀椒十五銖汗

烏頭三銖炮 菝葜六銖 桂心十五銖

右七味㕮咀絳囊盛以十二月晦日日中懸沉井中令至埿正月朔日平曉出藥置酒中屠蘇之東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無恙一家飲一里無恙飲藥酒三朝還置井中若能仍歲飲可代代無病當家內外井皆悉著藥辟溫氣也忌豬肉生葱桃李雀肉等經心錄同

千金延年有防風十二銖

又辟温氣太一流金散方

雄黃三兩研 礬石一兩半燒令汁盡 鬼箭羽一兩 雌黃二兩研入

羖羊角二兩炙屑

右五味擣篩爲散三角絳囊盛一兩帶心前并門户上若逢大疫之年月初日青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒熏之肘後千金并翼延年集驗同並出第一卷中

范汪療天氣不和疾疫流行豫備一物柏枝散方

南向社中柏東南枝暴之令乾擣散酒服方寸匕神良肘後千金同出第十二卷中

删繁辟温病粉身散常用方

芎藭四兩 藁本四分 遠志四分 白术四分

米粉一斗研入

右五味擣篩四物爲散和米粉粉身若欲多時加藥增粉用之

一劑法如此出第十卷中

千金辟温虎頭殺鬼丸方

虎頭骨五兩炙　朱砂一兩半研　鬼臼一兩　雄黃一兩半研

皂莢一兩炙　雌黃一兩半研　蕪荑一兩

右七味擣篩以臘蜜和如彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物肘後同

又治瘴氣竹茹湯方

青竹茹二升

右一味以水四升煮取三升分三服

又辟温病粉身散方

芎藭　白芷　藁本

右三味等分下篩内米粉中以粉塗身延年同

又斷温疫朱蜜丸方

白蜜和上上朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立人吞三七丸如麻子大勿令齒近之并吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法

又治温病不相染方

正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中

肘後延年同

又方

新布盛大豆一斗内井中一宿出服七枚（肘後用小豆）

又方

切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年温

又方

常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方

常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚

又方

神仙教子立春後有庚子日温蕪菁葅汁合家大小並服不限多少

又療温氣蒜豉湯方

蒜五十子并皮研之　豉心一升

右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓服並出第九卷中

千金翼老君神明白散方

白朮二兩　桔梗一兩　細辛一兩　附子二兩炮

烏頭四兩去黑皮

右五味擣麤篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫癘

者温酒服一方寸匕覆取汗得吐則差若經三四日者以三寸匕内五升水中煑令大沸分三服忌猪肉生菜桃李雀肉等

又度瘴散方

麻黄去節 升麻 附子炮 白术各一兩

細辛 防已 乾薑 桂心

防風 烏頭炮 蜀椒汗 桔梗各二分

右十二味擣篩爲末密封貯之山中所在有瘴氣之處旦空腹服一錢匕覆取汗病重稍加之忌猪肉生葱生菜桃李雀肉等並出第十卷中

古今録驗許季山所撰干敷散主辟温疫疾惡令不相染著氣方附後作敷干抱朴子作敷干

附子一枚一分者炮 細辛一分 乾薑一分 麻子一分研

柏實一分

右五味擣篩爲散正旦舉家以井華水各服方寸匕服藥一日十年不病二日二十年不病三日三十年不病受師法但應三日服歲多病三日一服之忌猪肉生菜肘後胡洽延年范汪删繁同出第二卷中

又殺鬼丸去惡毒方

雄黃五兩研　朱砂五兩研　鬼臼五兩　鬼督郵五兩

雌黃五兩研　馬兜鈴五兩　皂莢五兩炙　虎骨五兩炙

阿魏五兩　甲香一兩　羚羊角一枚屑　桃白皮五兩

白膠香一兩　昌蒲五兩　羖羊角一枚屑　臘蜜八斤鍊

石硫黃五兩研

右十七味擣篩十六味臘蜜和之丸如杏子將往辟溫處燒之殺鬼去惡若大疫家可燒并帶行忌生血物羊肉餳出第三卷中與胡洽方七味不同

延年祕錄辟温方

正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸著門戸上又令人帶之出第十卷中

辟温不相染方二首

病源此病皆因歲時不和温涼失節人感乖候之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及為法術以防之出第十卷中

千金斷温疫主温病轉相染著乃至滅門延及外人無收視者

赤小豆丸方

赤小豆二兩　鬼臼二兩　鬼箭二兩　丹砂二兩研入

雄黃二兩研入

右五味末之以蜜和如小豆大服一丸可與病人同床傳衣也忌生血物出第九卷中

延年主辟温疫疾惡氣令不相染易豉湯方

豆豉一升 伏龍肝三兩研入 小兒小便三升

右三味用小便煎取一升五合去滓平旦服之令人不著瘴疫天行有瘴之處宜朝朝服出第十卷中

温病噦方四首

病源伏熱在胃令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃中虛冷亦令致噦也並出第十卷中

小品茅根湯療温病有熱飲水暴冷噦者方

茅根 葛根各切半升

右二味以水四升煑取二升稍温飲之噦止則停

又療温病熱未除重被暴寒寒毒入胃熱蘊結不散變噦者方

單煑梓皮稍稍飲之佳温病積飲冷冷結胃中熱入腎中變壯熱大噦者服梓皮温噦得止也夫腎中有

熱者病差後足心皮喜剥脫去頭髮禿落是其證也

又茅根橘皮湯療春夏天行寒傷溫病於胃冷變啘方

白茅根切一升 橘皮三兩 桂心二兩 葛根二兩

右四味切以水六升煮取三升分溫服三合數連服之盡復合啘止乃停耳微有熱減桂一兩文仲古今録驗同忌生葱出第六卷中

古今録驗療溫病有熱飲水暴冷啘枇杷葉飲子者方

枇杷葉拭去毛 茅根各半升

右二味切以水四升煮取二升稍稍飲之啘止則停出第三卷中

溫病渴方二首

病源熱氣入腎藏腎藏惡燥熱氣盛則腎燥腎燥則渴引飲也出第十卷中

深師療毒溫病及吐下後有餘熱渴芍藥湯神方

芍藥五分　黄連四分　甘草二分炙　黄芩二兩

桂心二兩　栝樓二分

右六味切以水五升煮取三升分三服一日令盡忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等出第十四卷中

古今録驗知母解肌湯療温熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶者或是夏月天行毒外寒内熱者或已下之餘熱未盡者或熱病自得痢有虚熱煩渴者方

麻黄二兩去節　知母三兩　葛根三兩　石膏三兩碎裹

甘草二兩炙

右五味切以水七升煮取三升分爲三服若已下及自得下虚熱未歇者除麻黄加知母葛根病熱未除因夢泄者可除麻黄加白薇人參各二兩則止忌海藻菘菜小品同出第二卷中

温病發斑方七首

病源夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時温暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬温毒始發出於肌膚斑爛隱㾕如錦文也出第十卷中

肘後療温毒發斑大疫難救黑膏方

生地黄半斤切打碎　好豉一升

右二味以猪膏二斤合露之煎五六沸令三分減一絞去滓末雄黄麝香如大豆者内中攪和盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑出第二卷中

小品葛根橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱㾕如錦文而

欬心悶嘔但吐清汁宜服此湯則靜方

葛根二兩 橘皮二兩 杏人二兩去尖皮及兩人 麻黃二兩去節

知母二兩 黃芩二兩 甘草二兩炙

右七味切以水七升煮取三升分溫三服嘔悶吐當先定便且消息忌海藻菘菜古今録驗同大劾出第六卷中

刪繁療肺腑藏熱暴氣斑點香豉湯方

香豉一升熬綿裹 葱鬚四兩切 石膏八兩碎裹 梔子人三兩擘

生薑八兩 大青二兩 升麻三兩 芒消三兩

右八味切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒消分三服出第十卷中

備急療溫毒發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸方

麻黃三兩去節 大黃二兩 芒消一兩別下 黃芩一兩

釜底墨一兩研入　竈尾墨一兩研入　屋梁上塵二兩研入

右七味擣末用蜜和如彈子大新汲水五合研一丸服之若渴但與水須臾當寒寒訖便汗則解日移五丈不覺更服一丸此療六日胷中常大熱口噤名壞病醫所不療服此丸多差胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黒勃一兩名爲麥奴丸范汪文方同

古今録驗黃連橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱瘮如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下痢宜服此方

黃連四兩去毛　橘皮二兩　杏人二兩去兩人尖皮　枳實二兩炙

麻黃二兩去節　葛根二兩　厚朴一兩炙　甘草一兩炙

右八味切以水八升煑取三升分三服令盡且消息下當先

止忌猪肉冷水海藻菘菜等

又漏蘆橘皮湯療冬溫未即病至春被積寒所折不得發至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱癮如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡方

漏蘆　橘皮　甘遂　麻黃去節

杏人去皮尖及兩人　黃芩各二兩

右六味切以水九升煑取三升分四服得下爲佳下後餘外證未好除更服葛根橘皮湯方在前小品方忌海藻菘菜等出第三卷中一方有知母枳實白薇升麻大黃甘草爲十二味

又發斑瘡方

黃連三兩切去毛

右一味以水二升煑取八合頓服之忌猪肉冷水

溫病勞復方四首

早

病源溫病勞復謂病新差津液未復血氣尚虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

又凡得溫毒病新差脾胃尚虛穀氣未復若食犬猪羊肉并腸血及肥魚炙脂膩必大下痢下痢則不可復救又食餅餌炙鱠棗栗諸生果難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之並出第十卷中

千金論曰凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚炙膩必大下痢醫所不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴餔炙鱠棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日

轉久可漸食羊肉糜若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新差後當靜卧慎勿早起勿令人梳頭澡洗非但體勞亦不可多語言用心使意勞凡此皆令人勞復有人得病已差而未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內則死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死及熱病房室名陰陽易之病皆難療多死古今錄驗集驗同

又療重病新差早起勞及飲食多致復欲死方

燒鼈甲末服方寸匕忌莧菜肘後集驗文仲備急同

出第十卷中

深師療溫病差愈食復病麻黃散方

麻黃十分去節 大黃十五分炙 附子一分炮 厚朴二分炙

苦參六分 石膏六分碎綿裹 烏頭六分炮

右七味擣篩以酒若米汁和服方寸匕日三夜二服忌猪肉冷水出第十四卷中

古今錄驗療熱病復麻子湯吴正服効方

麻子一升 豉一升綿裹 牡鼠屎一十二枚

右三味以水五升煮取二升半分温三服立愈試之有神驗肘後同

又大黄丸方

大黄一兩蒸之二斗米下 巴豆五十枚去心皮熬 消石三分熬無者以芒消代之

桂心二分 乾薑二分炮

右五味擣篩四味別擣巴豆令如泥合和以蜜更擣二千杵丸如梧子壤一丸湯服之但熱在膈上當吐在膈下當利豫作粥如服他吐下丸法服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若

不得吐下可更服一丸半能藥壯人可二丸此藥優於他下
藥丸故宜大小下多冷粥解之若有瘡綿挺如指蜜和一丸
塗挺頭旦內瘡中䁈出之不差更作溫病不得大便服之得
下佳宿食不消亦服之飛尸遁尸㗻服半丸日一應須臾止
心腹脹滿痛服一丸瘧者依發日宿勿食清晨服一丸丁壯
人服二丸得吐下忍飢過發時乃食婦人產後血結中奔走
起上下或絶產無子或月經不調面目青黃服半丸小兒淋
瀝寒熱臚脹大腹不欲食食不生肌三四歲如麻子服一丸
日一六七歲兒服二丸比三十日心腹諸病差兒小半之愈夫
良忌野猪肉蘆笋生葱出第三卷中

諸黃方一十三首

病源黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後結熱在裏有
血當下去之如㹠肝狀其人小腹滿急若其人眼睛澀疼鼻骨

疼兩膊及項强腰背急則是患黃大便澀但令得小便快則不
慮死不用大便多多則心腹脹不好此由寒濕在表則熱畜於
脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不得消則大小便不
通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脉口鼻氣冷
並不可療之必死出第十二卷中

仲景傷寒論諸黃猪膏髮煎主之方

猪膏八兩　亂髮大如雞子二枚

右二味内髮膏中煎之髮消盡研絞去膏細滓分二服病從
小便去也出第十四卷中肘後備急文仲千金古今録驗深
師范汪同古大醫校尉史脫家婢再病胃中乾糞下便差神驗

删繁療天行毒熱通貫藏腑沉鼓骨髓之間或爲黃疸黑疸赤
疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕瓜蔕散方

瓜蔕二七枚　赤小豆二七枚　秫米二七粒

升

右三味擣篩爲散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不差間日復服之千金范汪集驗同

又方

瓜蔕二七枚

右一味以水一升煑取五合一服之

又方

鹽一升

右一味紙裹漬濕燒之取通赤內三升水中攪令調手巾壓度爲一服已前二方服訖並吐出黃汁

崔氏療黃貧家無藥者可依此方

取柳枝三大升以水一斗煑取濃汁弱半升一服令盡

又療黃兼主心腹方

蔓菁子一大合擻揀使令淨

右一味擣碎熟研以水一升更和研濾取汁可得一大盞頓服之少頃自當轉利或亦自吐腹中便寬亦或得汗便愈備急文仲深師同並出第一卷中

延年秘録療黃瓜蔕湯方

瓜蔕兩　赤小豆四十九枚　丁香二七枚

右三味擣末以水一升煮取四合澄清分爲兩度滴入兩鼻中出第十卷中

救急療三十六種黃方

取雞子一顆并殼燒作灰研破酢一合又溫之愡和頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻中蟲出神効

又療諸黃闇黃眼闇及大角赤黑黃先擲手足內黃患渴疸黃眼赤黃腎黃小便不通氣急心悶五色黃瓜蔕散方

丁香　瓜蔕　赤小豆各十枚

右三味細擣篩取煖水一雞子許和服大神驗並出第十七
卷中廣濟同
必効療一切黃蔣九處得其父遠使得黃服此極効茵蔯湯及
丸方
茵蔯四兩 大黃三兩 黃芩三兩 梔子三兩擘
右四味切以水五升煮取三升分爲三服空肚服之不然下
篩蜜和爲丸飲服二十丸稍稍加至二十五丸日二三量病與
之重者作湯勝服丸日一服忌羊肉酒麪熱物等以差爲限
小便黃色及身黃者並主之
又療諸黃眼已黃亦差瓜蔕散方
丁香一分 赤小豆一分 瓜蔕一分 一方加秫米一分
右三味擣末溫水食前頓服使盡則當利并吐黃水不差更
服並出第一卷中

千金療黃疸大黃丸方

大黃二兩　葶藶三兩

右二味擣篩爲末蜜和爲丸如梧子大未食服十丸日三服病差便止

又大黃丸方

大黃二兩　黃連三兩　黃芩　黃蘗各一兩

麴衣五合

右五味擣篩爲末蜜和丸如梧子大食前服三丸日三服不知可至五丸忌猪肉冷水並出第十卷中

急黃方六首

病源脾胃有熱穀氣鬱蒸因爲熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃

也並出第十二卷中

廣濟療急黃身如金色瓜蔕散方

赤小豆二七枚 丁香二七枚 黍米二七粒 瓜蔕二七枚

麝香 薫陸香等分別研入 青布二方寸燒爲灰

右七味擣篩爲散飲服一錢匕則下黃水其黃則定忌生冷熱麪粘食陳臭等出第一卷中一方止三味

必効療急黃疸內黃等大黃湯方

大黃三兩麤切 芒消二兩

右二味以水二升生漬大黃一宿平旦絞汁一升半內芒消攪服須臾當快利差出第一卷中

延年秘録療急黃心下堅硬渇欲得水喫氣息喘麤眼黃但有一候相當則須宜服此瓜蔕散吐則差方

瓜蔕二小合熬 赤小豆二小合

止

右二味擣篩爲散年大人煖漿水五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐不吐更服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黑豆粒大亦得當鼻中黃水出即歇并宜灸心厭骨下一寸名巨闕灸五七炷以來初小作炷在後漸大仍不得大於梧子

吐訖及灸了訖即渴仍服麥門冬飲子方

麥門冬四兩去心　栝樓三兩　竹葉一升　茯苓四兩

升麻二兩　生蘆根一升　甘草一兩炙

右七味切以水七升煎取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行八九里久服此飲渴即止出第十卷中忌肉麪果子生冷酢物海藻菘菜等

千金療急黃熱氣骨蒸兩目赤脈地黃汁湯方

生地黃汁八合　大黃六分末　芒消一兩

右三味合和一服五合日二服以利爲度忌蕪荑

近効療急黄方

取蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則以蔓菁子擣取汁水和之喫亦得候顔色黄或精神急則是此病韋給事試用之有効忌蕪荑

黄疸方十三首

病源黄疸之病此由酒食過度藏腑不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如飢令身體面目爪甲及小便盡黄而欲安卧若身脉多赤多黒多青皆見者必寒熱身痛而色微黄齒垢黄爪甲上黄此黄疸也疸而渴者其病難療疸而不渴者其病可療發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱出第十二卷中

仲景傷寒論黄癉麻黄醇酒湯主之方

麻黃一大把去節綿裹

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服盡古今方云傷寒熱出表發黃疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良小品古今錄驗張文仲經心錄同

又黃疸茵蔯蒿五苓散主之方

茵蔯蒿末十分　五苓散五分

右二味和先食白飲和方寸匕服之日三忌大酢桃李雀肉生葱深師范汪同

又五苓散利小便治黃疸方

猪苓三分去皮　白朮三分　茯苓三分　澤瀉五分

桂心二分

右五味擣篩和合白飲和服一方寸匕日三多飲煖水以助藥勢汗出便愈並出第十四卷中忌大酢生葱桃李雀肉等千

崔

金深師范汪同

肘後療黃疸方

燒亂髮服一方寸匕日三祕驗酒飲並得備急文仲同出第一卷中

范汪療黃疸散方

取瓠子白瓤及子熬令黃擣爲末服半錢匕日一服十日愈用瓠子數數有吐者當先詳之出第三十四卷中

集驗療黃疸百藥不差者方

驢頭一枚煑熟以薑虀噉之并隨多少飲汁出第二卷中千金備急崔氏張文仲古今録驗同

千金療黃疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四

日便愈無小麥苗穬麥苗亦得范汪云用小麥勝也
備急文仲集驗並同出第十卷中
千金翼療黄疸目黄不除瓜丁散方
瓜丁細末如大豆許内鼻中令病人深吸取入鼻中
黄汁出
又黄蒸湯方
黄蒸一升　麥䴬一升　猪屎一升
右三味以水五升漬一宿煑取三升絞去滓頓服一升覆取
汗必効同出第十八卷中
崔氏療黄疸年六十以上方
茅根一把細切　猪肉一斤
右二味合作羹盡一服愈當灸臍上下兩邊各一寸半一百
壯手魚際白肉側各一灸隨年壯備急范汪同

又療黃疸方

苦胡蘆瓤如大棗許

右一物以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許汁分內兩鼻孔中餘節候與上方同比來常用乃勝瓜蔕散

近効療黃疸苽蔕散方

瓜蔕二七枚　赤小豆二七枚　生秫米二七枚　丁香二七枚

右四味擣篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻須臾鼻中瀝清黃水或從口中出升餘則愈病輕者如一小豆則可一與不盡間日復頻用効李暠用之立驗俗人或使人以竹筒極力吹鼻中無不死者慎之

又療男子女人黃疸病醫療不愈身目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾方

以成煎猪脂一小升溫熱頓盡服之日三燥屎下去乃

愈備急崔氏同

黃疸遍身方一十一首

廣濟療黃疸遍身面悉黃小便如濃梔子汁茵蔯丸方

茵蔯四兩　黃芩三兩　枳實二兩炙　大黃三兩

右四味擣篩蜜丸空腹以米飲服如梧子二十丸日二服漸加至二十五丸微利爲度忌熱麪蒜蕎麥粘食陳臭物出第一卷中一方有升麻三兩

肘後療黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱外以冷迫之熱因留胃中生黃衣熱熏上所致方

猪脂一升

右一味成煎者温令熱盡服之日三燥屎當下下則稍愈便止備急崔氏同出第三卷中與前近效方同

小品療黃疸身目皆黃皮膚麴塵出三物茵蔯蒿湯方

茵蔯蒿一把 梔子二十四枚擘 石膏一斤完者 千金方加大黃三兩

右三味以水八升煑取二升半去滓以猛火燒石膏令正赤投湯中沸定取清汁適寒溫服一升自覆令汗出周身遍以溫粉粉之則愈若不汗更服一升汗出乃愈也深師古今録驗千金翼同出第四卷中

集驗療黃疸身體面目皆黃大黃散方

大黃四兩 黃連四兩 黃芩四兩

右三味擣篩爲散先食服方寸匕日三服亦可爲丸服備急文仲千金同忌猪肉冷水出第二卷中

刪繁療黃疸者通身並黃茵蔯湯方

茵蔯四兩 柴胡四兩 升麻三兩 龍膽二兩

黃芩 大黃各三兩

右六味切以水九升煑取三升分三服古今録驗千金同若

身體羸去大黃加梔子人五六兩生地黃切一升出第十卷中

千金翼論曰凡遇天行熱病多必內瘀著黃但用瓜丁散內鼻中令黃汁出乃愈即於後不復恐病黃矣常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣則須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特忌酒麪犯者死

又凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散方

苦參一兩　黃連一兩　葶藶子熬　瓜蔕

黃芩　黃蘗　大黃各一兩

右七味擣爲散飲服方寸匕當大吐者日一服不吐日二亦得下服藥五日知可消息不知更服忌猪肉冷水古今錄驗

千金小品同出第十八卷中

崔氏療黃疸身體面目盡黃茵蔯湯太醫校尉史脫方

茵蔯蒿三兩 黃連二兩 黃芩三兩 梔子十四枚擘

大黃一兩 甘草一兩炙 人參一兩

右七味切以水一斗煑取三升分三服千金同忌猪肉冷水海藻菘菜出第一卷中

延年秘録梔子湯療遍身黃如橘心肋滿急方

梔子人四兩 黃芩三兩 柴胡四兩 升麻三兩

龍膽二兩 大黃三兩 栝樓三兩 芒消二兩

右八味切以水九升煑取二升八合去滓分溫三服相去四五里進一服出第十卷中

必効黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方

取東引桃根細切如筯若釵股以下者一握取時勿令見風及婦人并雞犬等見之以水一大升煎取弱一小升適寒溫空腹頓服服後三五日其黃離離如

薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不則散遲忌食麪猪魚等肉此方是徐之才家祕方其姪珍惠説密用出第一卷中

近效療發黃身面眼悉黃如金色小便濃如煑黃蘗汁者衆醫不能療良驗茵蔯湯方

茵蔯四兩 黃芩二兩 梔子三兩 升麻三兩

大黃三兩 龍膽二兩 枳實二兩炙 柴胡四兩

右八味切以水八升煑取二升七合分溫三服若身絶羸加生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸猶下者依前著大黃取驗忌如藥法不差更作以差爲限不過三四劑差隔三五日一劑經心録同李暠處得此方神良

癊黃方三首

病源陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名爲癃黃也出第十二卷中

廣濟療癃黃身面眼俱黃小便如豉汁色茵蔯散方

茵蔯四兩 白鮮皮三分 栝樓四分 黃芩三分

梔子四分 芍藥三分 青木香三分 柴胡三分

枳實三分炙 黃連三分 紫雪八分 土瓜根三分

大青三分 大黃十分

右十四味擣篩爲散煮茅根飲待冷平旦空腹以茅根飲服五錢匕一服少間當一兩行微利利後煮稀葱豉粥食之利多以意漸減常取微溏利通一兩行爲度差止忌豬肉冷水魚蒜粘膩及諸熱食出第一卷中

必效療癃黃眼睛黃汗染衣涕唾黃方

好黃蒸二大升

右一味每夜以水二大升浸微煖令熱勿令沸銅器中平旦絞取汁半升飲之餘汁須飲則飲冬日微煖服夏冷飲每夜則浸依前服之亦得每夜小便中浸帛片取色退爲驗兩方並極効忌麪羊肉猪魚

又療癊黄汗染衣涕唾黄者方

取蔓菁子擣細羅平旦以井花水和一大匙服之日再漸加至兩匙以知爲度每夜小便裏浸少許帛各書記日色漸退白則差不過服五升以來必差李潤州傳極効備急肘後張文仲深師同出第一卷中

黄疸小便不利及腹滿喘方二首

仲景傷寒論黄疸家腹滿小便不利而赤身汗出者表和裏實也宜下之大黄黄蘗皮梔子消石湯方

大黄四分　黄蘗四兩　肥梔子十五枚擘　消石四兩末

右四味切以水六升煮三物得二升半去滓內消石更煎取一升先食頓服盡小品千金翼深師范汪並同

又黃疸小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除其熱熱除必噦噦者小半夏湯主之方

半夏五兩洗之　生薑八兩切

右二味以水六升煮取一升半去滓分溫三服忌羊肉餳並出第十四卷中范汪同

黃汗方三首

病源黃汗之為病身體洪腫發熱汗出而渴狀如風水汗染衣者色正黃如蘗汁其脉自沈此由脾胃有熱汗出而入水中若浴水入汗孔得之出第十二卷中

仲景傷寒論師曰黃汗為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣者色正黃如蘗汁脉自沈也問曰從何得之師曰以汗

阻

出水入汗孔水從外入而得之宜黄耆芍藥桂心苦酒湯主之方

黄耆五兩 芍藥三兩 桂心三兩

右三味切以苦酒一升水七升和煑取三升去滓温服一升正當心煩也至六七日稍稍自除其心煩不止者以苦酒咀故也咀一作阻一方用美清醯代酒忌生葱備急張文仲千金古今録驗深師范汪經心録同

又凡黄汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已則汗出又身常夜卧盜汗出者此勞氣也若汗出即發熱者久久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輒輕者久久必身瞤瞤則胷中痛又從腰以上必汗出下無汗腰寬弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黄汗桂枝湯加黄耆五兩主之方

桂心三兩 芍藥三兩 甘草二兩炙 生薑三兩

大棗（十二枚擘）　黃耆（五兩去皮）

右六味切以水八升微火煎取三升去滓溫服一升覆取微汗須臾間不汗者食稀熱粥一升餘以助湯力若不汗者更服湯也忌海藻菘菜生葱古今錄驗范汪同出第十四卷中

療黃疸身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出著衣皆黃黃汗吴藍湯方

吴藍（六分）　芍藥　麥門冬（去心）　桑白皮

漢防已　白鮮皮　山梔子（各六分）

右七味各細切以水二升煎取八合去滓空腹分二服未効再合服（此方未詳所出）

女勞疸方四首

病源女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿急小便難由大勞大熱而房室房室畢入水所致也出第十二卷中

仲景傷寒論黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑癉大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散主之方

消石熬黃 礬石燒令汁盡

右二味等分擣絹篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分熬令燥故注之肘後小品崔氏文仲千金范汪深師並同出第十四卷中

千金翼療黃疸之爲病日晡所發熱惡寒小腹急體黃額黑大便黑溏泄足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石五兩研碎 石膏五兩研

右二味爲散以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則差出第

十八卷中小品千金備急文仲並同

近効女勞疸黄家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黄額上反黒足下熱因作黒疸其大便必黒腹臚脹滿如水狀大便黒溏此女勞之病非水也療與黒疸同穀疸食則眩心忪怫鬱不安久久發黄爲穀疸並以前茵蔯湯圭之方在遍身黄部中

必効女勞之黄氣短聲沈者宜服此方

取婦女月經和血衣燒作灰以酒空腹服方寸匕日再服不過三日必差

黒疸方三首

病源黒疸之狀苦小腹滿身體盡黄額上反黒足下熱大便黒是也夫黄疸酒疸女勞疸久久變成黒疸出第十二卷中

肘後療黄疸變成黒疸者多死急治之方

取土瓜根汁服一小升平旦服至食時病從小便去則愈不忌先須量病兒氣力不得多服力衰則起不得千金并翼文仲集驗崔氏删繁范汪並同第一卷中

深師療黑疸身體及大便正黑赤小豆茯苓湯方

赤小豆三十枚　茯苓六銖　瓜蔕四銖　雄黃二銖

甘草半兩炙　女萎四銖

右六味切以水三升煑小豆茯苓取八合汁擣後四藥爲散取前汁調半錢匕適寒温服之須臾當吐吐則愈一方云療女黃疸忌大醋海藻菘菜千金翼同出第二十卷中千金翼名赤靈散

千金翼茵蔯丸主黑疸身體闇黑小便澀體重方

茯苓四分　茵蔯一兩　枳實五分炙咀熬令黃　白术五分亦如枳實法

半夏三兩洗　甘遂一分　杏人三分去尖皮　椒二升汗

當歸二分 葶藶子四分熬 乾薑四分 大黃三分熬勿令焦

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空肚飲服三丸日三服忌羊肉餳酢桃李雀肉等出第十八卷中

酒疸方十首

病源夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑若下之久久變爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚抓之不仁其脉浮弱故知之酒疸心中熱欲嘔者當吐之即愈小便不利其候當心中熱足下熱是其證明也若腹滿欲吐鼻躁其脉浮者先吐之沈弦者先下之出第十二卷中

仲景傷寒論酒癉者心中懊憹或熱痛梔子枳實豉大黃湯主之方

梔子七枚擘 枳實五枚破水漬炙 香豉一升綿裹 大黃一兩

右四味切以水六升煑取二升去滓温服七合日三服出第十四卷中肘後千金同

肘後療酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃飲酒面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致黃耆散方

黃耆二兩　木蘭皮一兩

右二味爲散酒服方寸匕日三備急文仲同

深師酒疸艾湯方

生艾葉一把無生用乾者半把　麻黃二兩去節　大黃六分　大豆一升

右四味切清酒五升煑取二升分爲三服出第三十卷中

千金茵蔯湯主黃疸酒疸酒癖身體面目盡黃方太醫校尉史脫處

茵蔯三兩　大黃二兩一方一兩　梔子二七枚擘　黃芩三兩一方用一兩

人參半兩一方用一兩　黃連二兩一方用一兩　甘草一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服忌猪肉冷水海藻
菘菜文仲范汪同
又夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱欲嘔
吐之即愈方
取千金翼苦參散吐良在上遍身黄部中七味者是也
又肉疸飲少小便多白如泔色得之從酒寒水石散方
寒水石五分 白石脂五分 栝樓五分 菟絲子三分酒漬
知母三分 桂心三分
右六味擣篩麥粥服五分匕日三服五日知忌生葱古今録
驗深師等並同
古今録驗療酒癖及飲黄疸散方
芫花 椒目各等分
右二味擣下篩爲散平旦服一錢匕老少半服之藥攻兩脅

則下便愈間一日復服使小減相前人與之使盡根源出第
二十七卷中深師同

穀疸方三首

病源穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失飢大食
胃氣衝熏所致陽明病脉遲食難用飽飽則發煩頭眩者必小
便難此欲為穀疸雖下之其腹必滿以其脉遲故也出第十二
卷中

范汪療穀疸茵蔯湯方

茵蔯四兩切以水一斗煑取六升以汁煎大黃二兩梔
子七枚得二升分為三服黃從小便去病出立愈出第
十四卷中肘後同

集驗療勞疸穀疸丸方

苦參三兩　龍膽一兩

右二味下篩牛膽和丸先食以麥粥飲服如梧子大五丸日三不知稍增出第二卷中千金同

刪繁療勞疸穀疸苦參丸方勞疸者因勞爲名也穀疸者因食而勞故曰穀疸

苦參三兩 龍膽二兩 梔子人三七枚

右三味擣篩爲散若病甚取猪膽和爲丸如梧子大一服五丸日三四服以飲汁下之

許仁則療諸黃方七首

許仁則療急黃病此病始得與前天行病不多異五六日但加身體黃甚者洟音夷鼻液也下同淚汗唾小便如蘗色眼白睛正黃其更重狀與天行病候最重者無別如至此困自須依前救天行最重半夏等分七味湯救之若未至是者宜依後法急黃狀始得大類天行病經三兩日宜合麻黃等五味湯服之發汗以泄黃勢方

麻黃三兩去節 乾葛五兩 石膏八兩研裹 生薑六兩

茵蔯二兩

右藥切以水八升煑取二升七合去滓分溫三服服相去十里久服訖當欲汗則覆被微取汗以散之

又依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日又合梔子等五味湯以取利方

梔子二十枚擘 柴胡三兩 黃芩三兩 茵蔯三兩

芒消六兩

右藥切以水八升煑四味取二升六合去滓內芒消攪令消分溫三服如人行十里久更服之効

又依前梔子等五味湯服之取利利後病勢不歇經六七日又合秦艽牛乳二味湯服之方

秦艽六兩 牛乳二升

右藥切秦艽以牛乳煑之可三分減一去滓帶煖頓服令盡極驗文仲必効同西域法也

又依前秦艽等二味湯藥服後不覺病退漸加困篤勢如前天行最重狀則不可更服諸冷物冷物在心唯是瘔速宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蔕等三味散吹鼻孔中并與之服方

瓜蔕七枚　丁香七枚　赤小豆七枚

右藥擣篩末取如大豆分吹兩鼻孔中須臾當出黃水正如煑蘗汁及出黃蟲亦可以新汲水和一方寸匕與患人服或利或吐吐利所出亦如煑黃蘗汁天行用此療亦與崔氏同

又論云此病俗間亦有單煑瓜蔕汁灌鼻孔中者亦有單服生麻油者

又療黃疸病此病與前急黃不同自外狀與平常無別但舉體

正黃甚者眼色如蘗涕涎洟小便及汗悉如蘗汁食消多於尋常稍覺瘦悴乏力此病不甚殺人亦有經年累歲不療而差者此由飲酒多亦是積虛熱所致黃疸初得稍覺心中煩熱滿身黃色眼白睛黃覺如此者宜合白鮮皮等七味湯以洩之黃連十味丸以壓之

白鮮皮三兩 乾葛五兩 黃芩三兩 鬱金三兩

豉五兩綿裹 梔子十枚擘 芒消六兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓內芒消分溫三服服相去如人行二十里久更服此湯當得利利後將息一二日則合後黃連等十味丸服之

又黃連丸方

黃連五兩 黃芩五兩 苦參六兩 沙參五兩

乾地黃六兩 乾葛六兩 梔子人三兩 麥門冬一升去心

地骨白皮五兩　茯苓五兩

右十味擣篩爲末蜜和爲丸以米飲下初服十丸日三服稍稍加至三十丸如梧子大黃疸亦有單服猪脂得差者忌猪肉冷水大酢蕪荑等物吳昇同

雜黃疸方三首

千金濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黃黑七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如㹠肝狀其小腹滿者急下之亦一身盡黃目黃腹滿小便不利礬石散方

礬石五兩　滑石五兩

右二味爲散大麥粥汁服方寸匕日三服當先食服便利如血者當汗出差出第十卷中深師古今錄驗並同

古今錄驗九疸秦王散方

胃癉食多喜飲梔子人主之

心痺煩心心中熱（葛根主之）

腎痺其人脣乾（葶藶子熬主之）

脾痺溺赤出少惕惕若恐（栝樓主之）

肺痺飲少小便多（秦椒汗瓜蔕主之一去膏疸）

舌痺渴而數便（石鍾乳主之）

肉痺其人小便白（凝水石主之研入）

髓痺目䀎深多嗜臥（牡蠣澤瀉主之）

肝痺胃熱飲多水激肝（白术主之）

右十一味名秦王散各等分隨病所在加二分擣合下篩飲服五分匕日三稍加可至方寸匕忌桃李雀肉等

膏痺飲少小便多秦椒散方

秦椒（一分汗）　瓜蔕（二分）

右二味擣下篩水服方寸匕日三服出第二十七卷中深

師千金同

外臺秘要方卷第四

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　孟　校勘

外臺祕要方

五

瘧病

外臺秘要方卷第五 瘧病十五門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

一切瘧方四首

灸瘧法一十三首

禳瘧法六首

許仁則療瘧方四首

療瘧方二十一首

病源夏日傷暑秋必病瘧瘧病之發以時者此由邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作也晏此先客於脊背也毎至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作稍益晏者也其出於風府日下一節二十五日下至尾骶二十六日入於脊內注於伏膂之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日蓄積乃作夫衛氣每

至於風府則腠理乃發發則邪氣入邪氣入則病作今衛氣日下一節則其氣之發也不當風府其日作者奈何曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也風之與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧得以時休者何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中陽遇邪則踡陰遇邪則緊踡則惡寒緊則為慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃來出旦中旦發晚中晚發夫瘧其人形瘦皮必粟起問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解出第十一卷中

廣濟療瘧常山散方

常山五分　升麻三分　蜀漆一分

右三味擣篩爲散一服二錢匕和井華水煑米半合頓服少間則吐吐訖則差忌生葱生菜及諸果子生冷油膩等物

又療瘧常山湯方

常山三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生葱生菜並出第一卷中張文仲備急同近効

療瘧間日或夜發者

張仲景傷寒論辨瘧病師曰夫陰氣孤絶陽氣獨發而脉微者其候必少氣煩滿手足熱而欲嘔也名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣在心藏外舍分肉之間令人消爍脫肉

又辨瘧脉夫瘧脉自絃絃數者多熱絃遲者多寒絃小緊者下

之差絃遲者溫藥愈數緊者可發汗針灸也浮大者吐之差脉絃數者風疾也以飲食消息之

又辨瘧歲歲發至三歲發連日發不解者以脅下有痞也療之不得攻其痞但虛其津液先其時發汗其服湯已先小寒者漸引衣自覆汗出小便利則愈瘧者病人形瘦皮上必粟起

又問病瘧以月一日發當以十五日愈設不差者當月盡解也如期不差當云何師曰此結爲癥瘕名曰瘧母宜急療之大鼈甲煎方

鼈甲十二分炙　烏扇三分　黄芩三分　柴胡六分
鼠婦三分熬　乾薑三分　大黄三分　芍藥五分
桂心三分　葶藶二分熬　石韋二分　厚朴三分炙
牡丹皮五分　瞿麥二分　紫葳三分　半夏一分洗
人參一分　蟅蟲五分熬　阿膠三分炙　蜂窠四分炙

赤消十二分　蟯蜋六分炙　桃人三分去皮尖熬

右二十三味末之取鍜竈下土一斗清酒一斛五斗浸土候酒盡一半著鱉甲於中煑令泛爛如膠漆絞取汁下諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服忌莧菜生葱胡荽羊肉餳等物千金有海藻大戟䖟蟲無赤消鼠婦用鍜竈灰一斛

又瘧發渴者與小柴胡去半夏加栝樓湯方

柴胡八兩　黃芩三兩　人參三兩　大棗十二枚擘

甘草三兩炙　生薑三兩　栝樓根四兩

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服一升日三並出第十五卷中忌海藻菘菜經心錄療勞瘧

肘後療諸瘧方

取青蒿一把

右一味以水一升漬絞取汁盡服之備急張文仲同

又方
鼈甲三兩炙
右一味擣末酒服方寸匕至發時令服三服兼用火炙無不
斷者忌莧菜
又方
牛膝莖葉一把切以酒三升漬一宿分三服令微有
酒氣不即斷更作不過三服止文仲備急集驗同並
出第一卷中
深師療瘧膈淡不得吐宜吐之常山烏梅湯方
烏梅半兩 桂心半兩 芫花半兩 豉五合綿裹
半夏半兩 常山半兩
右六味切以酒三升水四升合煑取二升分三服必得吐一
方取三升忌生葱羊肉餳生菜一方無半夏常山
又療瘧丸神方

人參三分 鉛丹三分 天雄十分熬

右三味擣合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服二丸中當溫熱四肢淫淫痺爲知服藥忌飽飯食瘧斷後食如常萬不失一備急文仲同

又療瘧撩膈湯方

常山三兩 甘草二兩炙 松蘿一兩 烏梅十四枚

黃芩二兩 瓜蔕十四枚 梔子人十四枚擘

右七味切以酒二升漬一宿明旦以水四升煑取三升分三服忌海藻生葱生菜菘菜等

又瘧結實積熱煩擾迷冒寒熱但多綿惙困篤常山大黃湯方

常山三兩 甘草三兩炙 前胡三兩 大黃三兩

右四味切以水一斗煑取三升半下大黃煎取三升分溫令冷初服七合中服八合比欲發服九合王文州大子因瘧危

困此皆愈忌海藻菘菜生葱生菜等

又療瘧醇醨湯方

生薑三兩 烏梅三七枚擘一方十四枚 甘草二兩炙 桂心二兩

常山三兩 蘘荷根三兩

右六味切以水六升煮取一升曰醇未發時須頓服更以水三升煮取一升曰醨至發不斷復頓服甚良別方說發日平旦服醨一升以醇著頭邊若欲發便服醇神良二說不同也出第二十二卷中忌海藻菘菜生葱生菜

千金麻黃湯療瘧須發汗方

麻黃四兩去節 大黃四兩 栝樓四兩 甘草一兩炙

右四味切以水七升煮取二升半分三服未發前食頃服臨發更服服後皆覆取汗出第十卷中集驗同忌海藻菘菜

千金翼療瘧病醫不能救者方

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一帀訖截斷繩取所量得繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定比至過發一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足出第十八卷中

崔氏療瘧會稽賴公常山湯方

常山三兩 石膏八兩碎綿裹 甘竹葉一把切 糯米一百粒

右四味切以水八升明旦欲服今晚漬於銅器中露置星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於銅器裏緩火煎取三升分三服日欲出一服臨發又一服若即定不須後服取藥滓石膏裹置心上餘四分置左右手足心甚驗忌生葱生菜出第四卷中

備急華他常山桂心丸神良方

甘草炙　常山　大黃　桂心各四分

右四味末之蜜和平旦服如兎屎每欲發服六丸飲下之欲服藥時先進少熱粥良忌海藻菘菜生葱生菜文仲同出第二卷中

延年療瘧常山丸方裴右庶送

常山四分　青木香四分南者　蜀漆一分　牡蠣二分熬

大黃二分　烏梅肉一分熬　丹沙二分研　豉二分熬

知母二分　鼈甲二分炙　麻黃一分去節

右十一味擣篩蜜和爲丸丸如梧子未發前粥飲服五丸訖微吐後須臾任食至欲發更服十丸忌莧菜生血物生葱生菜油膩崔氏同

又療瘧丸方

常山三兩　甘草二分炙　知母四分

右三味擣篩蜜和為丸丸如梧子未發前飲服十五丸臨發服十五丸得快吐則愈並出第十五卷中忌海藻菘菜生葱生菜

必效療瘧雞子常山丸方

取雞子一枚斷者開頭出黃及白令盡置小鐺子中又取常山細末量滿前空殼又傾鐺子中又量白蜜還令滿殼復傾鐺子中三味同攪微火煎之勿停手微冷可丸則停丸如梧子如病人午時發巳時服三十丸欲至發時又服三十丸用飲汁下欲吐任吐亦如前服訖更不發者不須服服後禁脂膩油麪生菜瓜果七日此方勑賜喬將軍服之立効小品崔氏文仲延年支家備急並同

又療瘧不差虎骨常山丸方

虎頭骨炙 常山 甘草炙 鼈甲炙
烏梅熬 萎蕤 白薇 升麻
茯苓 石膏研 知母 麥門冬去心
豆豉熬 地骨白皮

右十四味各等分合擣蜜和丸如梧子大未發前日晚空肚服二十丸至發日平旦服四十丸如人行十里食白粥一椀欲發時亦服三十丸三日内慎生冷萬無一觸不吐自差魏右史處得云奇効忌海藻菘菜大酢生葱生菜莧菜

又療瘧常山酒方

常山一兩切 獨頭蒜一顆去根莖橫切 糯米一百粒 烏豆一百粒
清酒一升

右五味病未發前一日以酒浸藥於椀中以白紙一張覆之椀上橫一刀欲發時三分飲一分如未吐更服一分得吐則差

忌生菜生葱並出第一卷中

古今録驗療瘧豉心丸方

香豉五合熬令色變 常山三兩 大黄三分 附子二分炮

右四味擣篩蜜和丸服如大豆十丸當勿食比至發來令服三十丸瘧不止亦可至四十丸瘧必止若膈上有停淡欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨常有驗楊孔思方出第四卷中忌生葱生菜等

又烏梅丸療瘧無問温瘴淡瘧悉皆主之方

烏梅肉二兩 常山二兩 鼈甲二兩炙 香豉二兩

蜀漆二兩生用 人參二兩 肉蓯蓉二兩 桂心二兩

知母二兩 桃人二兩去尖皮別擣如稀餳

右十味擣篩爲末蜜和爲丸如桐子空心以酒飲任下三十丸忌生葱生菜莧菜海藻菘菜一方有升麻甘草各二兩爲十二味

五藏及胃瘧方六首

病源肺病爲瘧者乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲清雄忽爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察病觀疾表裏相應依源審療乃不失也

心病爲瘧者令人心煩甚欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而忽卒急反於常倫或言未訖便住以手剔脚爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可療者明而察之

肝病爲瘧者令人色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未訖以手向眼如有所思若不即病禍必至矣此肝病聲之候也其人若虛則爲寒風所傷若實則熱氣所損陽則瀉之陰則補之

脾病爲瘧者令人寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已則汗出若其人本來少於喜怒而忽反常嗔喜無度多言自笑不荅於人此是脾病聲之候也不盈旬日禍必至矣

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀身掉不定素問作目眴眴然手足寒若人本來不喜不怒忽然謇而好喜怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手爪栅腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜以察之逐而療之

夫瘧脉者自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已若脉數而緊者可發汗針灸之脉浮大者不可針灸之凡瘧先發食頃乃可以療之過之則失時

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇虛嬌切暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血

足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

足陽明之瘧令人先寒洒洒淅淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰則取之

足少陰之瘧令人悶吐嘔甚多寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數小便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚發熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人病寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

腎瘧者令人洒洒腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧者令人且病也善飢而不能食食即支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血並出第十一卷中

千金療肝邪熱爲瘧顏色蒼蒼戰掉氣喘或熱久勞動如瘧積年不差烏梅丸方

烏梅肉四分 蜀漆四分 石膏八分研 鼈甲四分炙

常山六分 香豉一合熬 知母四分 甘草三分炙

細辛三分 苦參四分 萎蕤五分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十九日再飲下亦得

忌莧菜生菜生葱海藻菘菜

又療心瘧令人煩心甚欲得清水多寒少熱者常山湯方

常山四兩 淡竹葉二升切 梔子人三七枚擘 石膏五兩碎綿裹

烏梅三七枚擘 鼈甲四兩炙 甘草一兩炙 香豉一升綿裹
蜀漆二兩
右九味以水九升煮取三升分温三服忌生葱生菜菘菜人莧海藻删繁同
又療脾熱或渴或不渴熱氣内傷不洩轉爲脾瘧令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴轉汗出常山丸方
常山三兩 甘草半兩炙 知母一兩 鼈甲一兩炙
右四味擣篩蜜和丸如梧子大未發前酒服十丸臨發又一服正發又一服忌生葱生菜海藻菘菜人莧等
又療肺熱痰聚胷中來去不定轉爲瘧其狀令人心寒甚即發熱熱間善驚如有所見常山湯方
常山三兩 秫米三百粒 甘草二分炙
右三味切以水七升煮取三升分三服至發時令三服盡忌

生葱生菜海藻菘菜等删繁同

又療腎熱發爲瘧令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目瞤瞤然手足寒常山湯方

常山三兩　烏梅三七枚碎　香豉八合熬裹　淡竹葉切一升

葱白一握除青令盡

右五味切以水九升煮取三升去滓分溫三服至發令盡忌生葱生菜等並出第十卷中

删繁療胃腑瘧者令人善飢而不能食四肢脹滿氣喘藜蘆丸方

藜蘆一兩　皂莢一兩去皮子　常山二兩　巴豆三十枚去皮熬

牛膝一兩

右五味熬藜蘆皂莢色令黃合擣爲末蜜丸如小豆旦服一丸未發前一丸正發一丸一日勿食飲忌野猪肉蘆笋生葱

傷

生菜狸肉等出第六卷中六腑唯胃有瘧不可別列故附於後千金同

温瘧方五首

病源夫温瘧與寒瘧安舍温瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓鑠肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從内出之於外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰温瘧瘧先寒而後熱者此由夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之小寒寒迫之藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰温瘧夫病瘧六七日但見熱者温瘧也出第

十一卷中

甲乙經黄帝曰夫瘧皆生於風夏傷於暑秋爲痎瘧

黄帝問瘧先寒而後熱何也歧伯對曰夫寒者隂氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也名曰寒瘧

又問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也名曰温瘧

其但熱而不寒者隂氣先千金作孤絶陽氣獨發即少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧

又曰温瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春即陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓爍肌肉消釋腠理發洩因有所用力邪氣與汗偕出比邪氣先藏於腎其氣先從内出之於外如是者隂虚而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虚陽虚則復寒矣故先熱而後寒名曰温瘧

又曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之内分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於隂故但熱不寒熱氣内藏於心外舍分肉之間令人銷鑠脫肉故名曰癉瘧出庚卷第七千金同

廣濟療温瘧漸漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方

常山三兩 車前葉一握 甘草二兩炙 獼猴骨三兩炙

烏梅肉二兩 天靈蓋一兩燒作灰末 驢糞汁三合

右七味切以水六升煑五味取三升去滓下糞汁天靈蓋末分三服微吐不利忌生葱生菜海藻菘菜麪粘食等

又療温瘧常山丸方

常山 烏梅肉熬 豉 天靈蓋燒各六分

知母 朱砂 蜀漆 大黃各四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子空肚以温酒下二十丸至三十丸日三服並未發前服不吐利忌生葱生菜生血物等並出第十卷中

千金論曰癉瘧者陰氣孤絶陽氣獨發其候也少氣煩滿手足熱欲嘔熱而不寒氣在心藏

又曰有温瘧者其脉如平人無寒時熱其候骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解皆白虎加桂心湯主之方

知母六兩　甘草二兩炙　石膏一斤碎　粳米六合

右四味切以水一斗二升煑取米爛去滓加桂心三兩煎取三升分温三服覆令汗先寒發熱汗出者愈忌海藻菘菜生葱傷寒論云用秈粳米不熟稻米是也出第十卷中

備急竹葉常山湯療温瘧壯熱微寒温瘧之候也壯熱後如覺微寒或癉瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足煩熱乾

嘔者瘖瘧先大寒後大熱者並主之神効尤宜乳下小兒亦差方

常山三兩切　淡竹葉一握　小麥一升

右三味以水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服忌生葱生菜支小品文仲並同出第三卷中

延年療溫瘧壯熱不能食知母鼈甲湯方

知母　鼈甲炙　地骨皮各三兩　常山二兩

竹葉一升切　石膏四兩碎

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分三服忌蒜猪肉莧菜生葱生菜出第十七卷中

山瘴瘧方一十九首

病源此病生於嶺南帶山瘴之氣也其狀發寒熱休作有時皆由挾溪源嶺嶂溫毒氣故也其病重於傷暑之瘧矣出第十一卷中

小品療山瘴瘧陵鯉甲湯南方山嶺溪源瘴氣毒作寒熱發作無時痿黃腫滿四肢痺弱皆山毒所爲也並主之方

陵鯉甲十片炙千金用十四片　烏賊魚骨去甲　鼈甲一兩各炙

常山三兩　附子一枚炮

右五味切以酒三升漬之一夕先瘧發前稍稍服之勿絶藥味兼以塗身體斷雜人勿食飲過時乃得通人進飲食忌莧菜生葱生菜猪肉出第六卷中千金文仲備急經心録並同

千金療乍寒乍熱乍有乍無山瘴瘧酒方

常山三兩　鼈甲炙　升麻　附子

烏賊魚骨去甲各一兩

右五味並切絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌猪肉生葱生菜莧菜出第十

卷中肘後療老瘧久不斷

備急夫瘴與瘧分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率稱爲瘴江北惣號爲瘧此由方言不同非是別有異病然南方溫毒此病尤甚原其所歸大略有四一山溪毒氣二風溫痰飲三加之鬼癘四發以熱毒在此之中熱毒最重故所用藥物須審病源患瘧瘴之後特須防瘴而發痢死不旋踵所以然者瘴體先虛虛不宜痢又瘴宜冷差痢宜溫斷斷痢則益瘴斷瘴則益痢大率如此不可不慎非直藥療亦須宜加將息取適若能用一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘧最其妙也如不然先須斷痢然後療瘴瘴緩痢急故也仍率須作挾毒防之不得專醫其痢又服瘴藥皆在發前必須平旦空腹服服藥之後勿洗手面漱口勿通外人勿喫食勿勞力既過發時久小進糜粥如此將療無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更是難療得瘧之後復成瘕癖亦有即發

氣者死不救若熱渴者豉汁煖服取足得吐彌善水煮豉研犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如兩棗許大水和飲之并燒猪糞人糞作黃龍湯亦善各可服三二升又擣一大鼠絞汁與服大止熱毒瘴熱病服此俱効其鼠并頭皮五藏等全擣若汁少著少許水和絞亦不難服常用立驗也

又療瘴瘧服藥後灸法

灸大椎三四十壯無不斷若先寒者將欲寒預前以炭火安床下令背煖并灸鼈甲末一方寸匕煖酒和服至發時令得三服被覆過時無不斷此是陶氏法比欲寒時但以火炙其背亦乃即差者從發亦輕効驗

又療瘴瘧常山丸方

常山　黃連　豉各三兩　附子二兩炮

右四味擣篩爲末蜜和丸如梧子發前空腹服四丸欲發更

服三丸飲下之自旦至暮乃食三日勿雜食豬魚肉肥膩及生冷生葱生菜桂廣州家傳已用有效此方兼痢者差

又麻黄散方

麻黄去節　常山　杏人去尖皮熬　人參

乾漆熬　甘草炙　鼈甲炙各二兩

右七味作散平旦空腹温酒三合服方寸匕日再宜七日連服服後七日不得食雜物此許仁則五方元比部云在嶺南服得力大驗年別常服一劑按此兼補虛羸者忌莧菜生葱生菜海藻菘菜

又若患瘴熱實兼吐痢者大黄湯方

大黄　常山　升麻　甘草炙各三兩

右四味切以水七升煮取二升半分三服發前盡服別取吐利此蔣家傳忌海藻菘菜生葱生菜

又若瘴熱兼痢苦渴者烏梅飲方

烏梅二十枚取好者擘破

右一味以水一大升煮取一大盞去梅和一匙蜜細細啜之近方驗並出第二卷中

延年蜀漆丸主嶺南瘴氣發乍熱乍寒積勞似瘧皆主之千金翼方云兼主痻瘧連年不差方

蜀漆　知母　升麻　白薇

地骨皮　麥門冬各五分　烏梅肉　鼈甲炙

葳蕤各四分　石膏八分　甘草三分炙　常山六分

豆豉一合熬

右十三味擣篩爲末蜜和丸如梧子大飲下十丸日再服加至二十丸此方用無不差加光明砂一兩神良崔氏千金翼集驗並同忌海藻菘菜人莧生葱生菜出第十七卷中千金亦療勞瘧

救急療瘧瘴癘經一百日或一年以上諸藥不能差進此方無不損者蜀漆湯方

白薇　蜀漆　知母　甘草炙

苦參　升麻　龍膽各二兩　常山

大黃別漬後下各四兩　鼈甲炙　石膏碎　茯苓

黃芩各三兩　香豉二合裹　獨扶蒜七顆切　淡竹葉切一升

右十六味切以水一斗漬之并春酒二升合煑取三升去滓分三服未發前一服欲至發時又一服皆溫之當發日勿見人在一靜房卧藥滓置病兒頭邊仍以藥汁塗手面過時任出忌肥膩腥臊滑物生冷海藻人莧大酢菘菜生葱生菜

又朱砂丸方

朱砂光明者　牛膝　常山各等分

右三味擣篩爲末蜜和丸如梧桐子候瘧發日平明服七丸

飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差忌生葱
生菜生血物油膩牛肉等

又勑賜長孫祥極効常山散方

常山八分　橘皮六分　牡蠣四分熬　桂心二分

右四味擣爲散發日平旦酒服一方寸匕臨發又一匕發後
又一匕二日不得洗手面七日忌食雜物唯藥用酒得餘皆
斷或吐或不吐皆差忌生葱生菜

又方

取五六歲兒小便一升内白蜜二大匙攪使相得去
白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不得吐但
數小便亦佳以前兩方吐碧淡外更吐白沫出後可
喫食不然瘴氣終不除

又常山酒方

常山苗一握（無苗取根五兩代之） 獨扶蒜（七顆） 淡竹葉（二握）

豉（一合） 鼈甲（三兩炙）

右五味切以苦酒三升煎取一升臨發隨性多少服之盡服之訖當大吐便愈忌人莧生葱生菜

古今錄驗瘴瘧及嶂氣常山酒方

常山（三兩細切）

右一味擣碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒小一升半漬一宿旦去滓煖服盡須臾當吐好適令盡好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生葱生菜生冷肉麪油膩若早發者半夜服要令吐出第四卷中

近効療瘧瘴孟補闕嶺南將來極効常山丸方

常山 豉（熬） 桃人（去皮尖熬等分）

右三味各擣末先以豉和桃人擣如泥然下常山末細攪蜜

丸如梧桐子候欲發前一食時酒下四十丸須臾更服二十
丸如不差更服遠不過三服能信用者無不差忌生葱生菜

又凡跋涉江山防諸瘴癘及蠱毒等常服木香犀角丸方

青木香　犀角屑　羚羊角屑各六分　升麻
玄參　猪苓　檳榔各十分　龜甲炙
甘草炙各八分　豉二十分熬

右十味擣篩為末蜜和丸如梧子酒飲服三十丸日二服若
體熱即去甘草檳榔加大黃二十分忌海藻菘菜

又主瘧兼痢無問赤白水穀鮮血瘴皆差黃連犀角丸方

黃連　犀角屑　香豉熬各二兩　龍骨四兩
牡蠣熬二分

右五味擣篩為末蜜和丸如梧子米飲下三十丸日三服差
止忌猪肉冷水油膩等

又瘴瘧不差蜀漆丸方

蜀漆　青木香　升麻　鼈甲炙

牡蠣熬　朱砂研　豬苓　香豉各四分

常山　大黃各八分

右十味擣篩爲末蜜和爲丸如梧子米湯下十二丸日二服漸漸差至平復止忌人莧油膩陳臭生血物等

十二時瘧方一十二首

千金翼黃帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯荅曰瘧有十二種帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯曰但得瘧鬼字便愈不得其字百方不愈黃帝曰瘧鬼者十二時願聞之岐伯曰

寅時發者獄死鬼所爲療之

右以瘧人著窑上灰火一周莫令火滅即差

卯時發者鞭死鬼所爲療之

薪

右用五色衣燒作灰三指撮著酒中無酒用清水服之

辰時發者墮木死鬼所爲療之

右令瘧人上木高危處以棘子塞木奇間立差

巳時發者燒死鬼所爲療之

右令瘧人坐師以周匝然火差

午時發者餓死鬼所爲療之

右令瘧人持脂火於田中無人處燒脂香假拾薪去即差

未時發者溺死鬼所爲療之

右令瘧人臨發時三渡東流水即差

申時發者自刺死鬼所爲療之

右令瘧人欲發時以刀刺冢上使得姓名字呪曰若差我與汝拔却即差

酉時發者奴婢死鬼所爲療之

右令瘧人碓梢上捧上臥莫令人道姓字即差

戌時發者自絞死鬼所爲療之

右左索繩繫其手脚腰頭即差

亥時發者盜死鬼所爲療之

右以刀子一口箭一枚灰一周刀安瘧人腹上其箭横著底下差

子時發者寡婦死鬼所爲療之

右令瘧人脫衣東廂床上臥左手持刀右手持杖打令聲不絕瓦盆盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所爲療之

右令瘧人當戶前臥頭東向血流頭下即差並出第十八卷中

發作無時瘧方二首

病源夫衛氣者陽氣也一日一夜大會於風府則腠理開腠理

開則邪氣入邪氣入則病作當其時陰陽相并隨其所勝則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪內外失守邪氣妄行所以休作無時也出第十一卷中

肘後療瘧發作無常心下煩熱者常山湯方

常山二兩　甘草一兩半炙　豉五合綿裹

右三味切以水六升煎去滓取二升再服當快吐仍節飲食忌海藻菘菜生葱生菜文仲同

又雞子常山丸療諸瘧並經服諸藥法術不斷發無復定時不可復斷者宜服此丸忌食勿勞即斷方

常山三兩

右一味擣篩爲散以雞子白和併手爲丸如梧桐子大令圓調丸訖分置銅鏂子中以湯煑銅鏂令熱殺得雞子腥氣即止以竹葉清飲服三十丸欲吐但吐比至發時令得三服時

早可食者斷若晩不可斷食者當作竹葉汁糜食之忌生葱生菜經心録同並出第一卷中

瘖瘧方五首

病源夫瘖瘧者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗然其畜作有時以瘧之始發先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則外内皆熱頭痛而渴唯欲冷飲何氣使然此陰陽上下交爭虚實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽明虚陽明虚則寒慄鼓頷太陽虚則腰背頭項痛三陽俱虚則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於内故中外皆寒陽盛則外熱陰虚則内熱外内皆熱則喘而渇故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之内腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗出空疏腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及得以浴水氣舍於皮膚之内與衛氣并居衛氣者晝日

行陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相搏是以日作其間日日作者謂其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作出第十一卷中

小品常山湯療痎瘧先寒戰動地寒解壯熱日日發及間日發並斷方

鼈甲一兩炙 淡竹葉三升切洗 常山三兩 甘草三兩炙

又酒三升

右五味切以酒漬藥刀置上覆頭安露地明旦以水七升煮取三升分五服比未發前令盡當吐吐極傷多不必盡劑但斷人禁飲食得吐過時乃佳忌人莧海藻菘菜生葱生菜出第六卷中

集驗夫瘧必從四肢始療方

先其時一食頃用細左索繩緊束其手足十指過發

時乃解之千金同

又方

先作羊肉臛餅飽食之其進少酒隨所能令其欣欣有酒氣入一密室裏然炭火厚覆取大汗則差燕國公說此方常見用有驗並出第二卷中

又療溫瘧勞瘧烏梅飲子方

烏梅七顆 桃柳心各七莖 葱白七莖 豆豉一合

甘草四分 柴胡四分 知母四分 大黃三分

右八味各細剉以童子小便兩茶椀宿浸明日早煎三兩沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻菘菜

又療溫瘧痰瘧久不差黃連散方

宣州黃連一兩

右一味擣篩末以濃酒一盞調三錢空心頓服相次更服三

錢更飲三兩盞酒任意醉却睡候過時方得食如渴枳實煎湯併三日服差忌猪肉冷水

間日瘧方二首

病源此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣内薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣偕出是以間日而作也出第十一卷中

備急療間日瘧方

燒黒牛尾作灰酒服方寸匕日三服出第十卷中

又桂廣州法醇醨湯方

大黄三分 甘草一分半炙 常山一分半

右三味以水三升煑取一升去滓更以水二升煑滓取一升未發服醨醨是後煑者栢次服醇醇是前煑者差忌菘菜海藻生葱生菜等寸支云極驗文仲經心録方無甘草用石膏三

銖餘同出第二卷中（一方有桂心一分半）

久瘧方八首

病源夫瘧皆由傷暑及傷風所爲熱盛之時發汗吐下過度腑藏空虚榮衞傷損邪氣伏藏所以引日不差仍故休作也瘧歲歲發至三歲發連日發不解脅下有痞療之不得攻其痞但得虚其津液先其時發其汗服湯已先寒引衣自覆汗出小便自利則愈也出第十一卷中

深師療久瘧難斷香豉丸方

香豉（一分熬）　常山（七分）　蜀漆（十分）　附子（一分炮）

大黄（二分好者）

右五味擣下篩蜜和發日早服五丸如梧子須臾又服五丸發晚者至發可三四服令其得吐爲佳欲不即斷畏吐者但則長將久服無不差也忌生葱生菜豬肉

又療三十年瘧常山湯方

常山三兩 黃連三兩

右二味切以酒一斗宿漬之向晚以瓦釜煑取六升一服八合比發時令得三服有熱當吐有冷當下服之者千百無一不斷亦可半合無服全劑者並出第二十二卷中忌猪肉冷水生葱生菜

千金梔子湯主瘧經數年不差者兩劑差一月以來一劑差方

梔子十四枚 常山三兩 車前葉二十枚炙乾 秫米十四粒

右四味切以水九升煑取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行爲差不止冷飲止之忌生葱生菜出第十卷中

崔氏療瘧縱久患者不過五六服以來亦差常山散方

常山三兩 乾漆三兩熬煙盡 牡蠣一兩半熬 桂心二兩

橘皮二兩　杏人二兩去皮尖熬

右六味擣篩爲散一服方寸匕先發熱飲和服若先寒清酒和服之時取未發前一食頃服服藥日唯須晚食七日内慎如藥法忌生葱生菜出第四卷中

備急龍骨丸療久瘧不斷者方

龍骨一兩　常山三兩　大黄二兩　附子二分炮

右四味擣末以雞子黄丸如梧子大先發臨發各飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年瘧出第二卷中張文仲支方同忌生葱生菜猪肉等

備急療瘧連綿積日不差常山散方

常山三兩　羚羊角三兩炙令焦　烏梅肉三兩炙令燥

黄芩二兩　甘草一兩半炙

右五味擣爲散以竹葉煮飲取六七合飲及熱用調常山散

三方寸匕未發前一服若差停不差臨欲發又進二寸匕老
小以意量之忌海藻菘菜生葱生菜

又療瘧無問年月遠近並差烏梅丸方

烏梅肉三兩熬　茯苓三兩　桃人三兩去皮熬　常山三兩熬

升麻二兩炙　桂心二兩　甘草二兩炙

右七味擣篩蜜和丸如梧子大未發時酒服二十丸欲至發時更服二十丸百無所忌唯觸之則易差飲服亦得此藥或吐利或不吐利勿怪五六日頻進佳並出第一卷中文仲備急同忌海藻菘菜生葱生菜一方有豉三兩熬

近効療久難差瘧常山酒方

常山三兩　鼈甲二兩炙　鯪鯉甲一兩炙　烏賊魚骨一兩炙

烏梅肉一七枚　桃人四十九枚去皮尖別擣如泥　竹葉一握切

豉二合熬令香　葱白一升切

右九味細切合以酒三升漬經再宿空腹早朝温服一合良久取吐如不吐至齋午以來服之四服如不差隔日更依前服必差差後十日内不得喫冷水粘滑人莧生菜餘如常粱顥處

勞瘧方三首

病源凡瘧積久不差者則表裏俱虚客邪未散真氣不復故疾雖暫間小勞便發也出第十一卷中

肘後療勞瘧鱉甲酒方

鱉甲二兩炙令黄 常山三兩 蜀漆二兩 烏賊魚骨一兩炙

附子一兩 知母二兩 椒一兩汗

右七味切以酒三斗漬一宿平旦服一合稍稍加至二合日三四服忌莧菜生葱生菜猪肉並出第一卷中

千金勞瘧積久不斷衆療無効此方療之

長生大牛膝一虎口切以水六升煑取二升分再服第一服取未發前一食頃服第二服臨發服張文仲肘後同出第十卷中

集驗療一切瘧勞瘧無問年月深遠阿魏散及丸方

阿魏　安息香　蘿蔔子各二兩　蕪荑一合

右四味擣篩爲散以煖水服半錢如不能散服蜜丸熟水下三十丸須臾吐忌冷水如吐不止喫蒜虀餺飥仍以貼子成散一錢男左女右繫臂上立差出第二卷中

牡瘧方二首

仲景傷寒論牡瘧多寒者名牡瘧牡蠣湯主之方

牡蠣四兩熬　麻黃四兩去節　甘草二兩炙　蜀漆三兩若無用常山代之

右四味切以水先洗蜀漆三遍去腥以水八升煑蜀漆及麻黃去沫取六升内二物更煎取二升去滓温服一升即吐勿

更服則愈忌海藻菘菜

又療牡瘧蜀漆散方

蜀漆（洗去腥） 雲母 龍骨

右三味等分擣篩爲散先未發前一炊以清酢漿水和半錢服臨發時更服一錢溫瘧者加蜀漆半分雲母炭火燒之三日三夜用並出第十五卷中（雲母一作雲實）

一切瘧方四首

崔氏療一切瘧大黃丸方

大黃（三兩） 朴消（二兩） 巴豆（一兩去皮熬令黑研如泥）

右三味擣篩大黃朴消然內巴豆以蜜和擣二千杵丸如梧桐子大米飲下兩丸日二服不斷再服即差忌蘆筍野猪肉等物

救急療一切瘧常山湯方

常山三兩上者 精石膏八兩打破綿裹 白粇米一百二十粒 淡竹葉一握

右四味以水八升漬一宿煮取二升五合去滓分溫三服清旦一服欲發一服正發時一服三服訖靜室中卧莫共人語過時後洗手面與食七日禁勞生葱生菜酒及熱麪毒魚炙瘧不過再劑一方加烏梅二七枚煑之出姚大夫集驗出第一卷中 集驗療瘧間日或夜發

古今錄驗療一切瘧大有驗朱砂丸方

朱砂一兩 蜀常山三兩並須精上大秤

右二味各擣下篩畢別取朱砂瓷器中細研可一日研如麪白蜜和童兒擣一萬七千杵訖作丸如梧子大一服三丸用清酒下行五十餘步隨意坐卧無酒湯下亦得唯須暖將息病人氣力強仍不廢行動者則須於當發日服之如似日西發者臨發之日勿食平旦服三丸巳時服三丸午後更服三

丸則差若不差必定輕微更服則差餘時發者準此日西一時任意消息其病人氣力微弱者不得臨發日服應預前一日服之如似明日發者今日平旦空腹服三丸至齋時食一椀粥至日西更服三丸至日暮復食一椀淡粥並不得飽食至一更盡更服三丸至平明食粥一椀至齋前更進三丸不得食至午時更進三丸必差差後三日以來唯得食甜粥飲漿忌生冷酢滑膩麪及飽食七日以來特忌生血物生葱生菜若後七日餘者漸食生冷二種須復日禁若如百日來患差後還須百日禁忌生冷乃至七日患者差還復禁七日生冷患來雖經多年但得百日以來禁生冷過百日後得食無妨若不禁者必還重發患來日久極重者不過十服差近者三五服則差病人十五以上者一服三丸十五以下七歲以上者一服兩丸七歲以下者一服一丸如小者分此一丸九作

二小丸服之出第四卷中

近効加減療一切瘧無不効比用不過再服入口如神萬不一失桃人常山丸方

桃人（二兩不熬亦不去雙人尖皮） 常山（二兩） 豆豉（三兩）

右三味各别擣五六百杵又和更擣六七百杵然熟好酒如黑泥自成丸不飲酒事須酒下三十丸如梧子未發前服臨發更服三十丸以手捧之於鼻下嗅取氣便定如不得平復更服三十丸或吐或微利勿怪亦有不吐利差者吐了仍不得漱口亦不得喫生葱生菜果子甜物油膩等却發則難差比來者不過再三服便差一服差者多其常山事須直蜀者始堪使用桃人須是毛桃人餘者即無効豉須新美不用陳者渴者取烏梅三枚作漿稍稍咽三五咽其藥唯一人患則少合不堪預合無力不効今方有常山一兩桃人五七枚豉

一合恬多者佳擣常山作散訖次研桃人作泥別擣豉熟酒擣三五百杵次一處和擣又六百杵以來如法服之醫人夏侯拯錄之

灸瘧法一十三首

千金療瘧灸法

灸上星及大椎大椎穴在背從第一椎上節陷中是也至發時令滿一百壯艾炷如黍粒俗人不解取穴務大炷

又法

覺小異則灸百會七壯若後更發又灸七壯極難愈者不過三灸

又法

以足蹋地以綖圍足一匝中折從大椎向百會灸綖頭三七壯炷如小豆許大

又法　灸風池二穴各三壯

又法　從手發者灸三間（穴在虎口第二指節根下一寸）三年瘧瘧欲發慘慘則下火

又法　從頭項發者未發前預灸項大椎尖頭漸灸過時止

又法　從腰發者灸腎俞百壯（穴在第十四椎下兩傍各一寸半是）

又療一切瘧無問遠近法

正仰卧以繩量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右灸

又療五藏瘧及一切諸瘧法

灸尺澤七壯穴（在肘中約上動脉是也）

又療痎瘧法

上星主之（穴在鼻中央直入髮際一寸陷容豆是也）灸七壯

又療瘧日西而發者法

臨泣主之穴在目眥上入髮際五分陷者中是也灸七壯

又療瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔者法

崐崘主之穴在足外踝後跟骨上陷中是也灸三壯

又療瘧實則腰背痛虛則鼻衄法

飛揚主之穴在外踝上七寸灸七壯並出第十卷中

禳瘧法六首

千金療瘧法

未發前抱大雄雞一隻著懷中時時驚動令雞懷中作大聲無不差出第十卷中肘後同

崔氏書瘧法

平旦日未出時閉氣書之先書額上則戴九天次書兩手心作把九江又書背上從右胛骨下向左分作

兩行書之一如後法南山有一木木下不流水水中有一魚三頭九尾不食五穀唯噉瘧鬼急急如律令

又書兩脚心下作履九江

右以前法既不損人又無不差者其有一度書不甚差可更書之書符必不得脫錯亦不可重點畫不成也又勿食五辛書瘧法路州滿上人傳云妙不可道以下二法余用俱効

又法

令所患人未發前正南北眠頭向南五心并額及舌上七處閉氣書鬼字則差隨意任東西肘後同

又法

揔書八行其下七行一准前行通而為八山題子山題子山題子山題子准前計更有七行通前為八行

此符厭瘧鬼一去千里外急急如律令某年某月某
州某縣某鄉某里姓名牒姓名則所患人也右以手
把符勿開男左女右待過時乆然後任開其符仍以
火燒却

呪瘧法

候病者發日日未出時自執一石於水濵一氣呪云
皆皆團團行路非難捉取瘧鬼送與河官急急如律
令即投石沈於水中勿反顧而去並出第四卷中

元希聲侍郎集驗書瘧法

額上書兩金字重胷前書兩火字並背上書兩水字
並兩手書木字單兩足下各書土字臍下作四口字
重右含水閉氣用朱書未發前書之有驗

許仁則療瘧方四首

許仁則此病之候乃有數種亦有宿患痃癖飲食失宜因節氣初交亦生此病亦有痰澼積聚久不通散冷熱相攻亦生此疾亦有地居卑濕時屬暑熱內有宿病外感惡氣亦生此疾亦有盛夏蒸熱飲冷冷熱間隔秋夏氣交亦生此疾以要言之終由飲食失常寒暑乖宜上熱下寒將療之方吐下爲本人有強羸病有輕重自須臨時斟酌不可一槩言之此病別有祈禱厭禳而差者自是人心妄識畏愛生病亦猶弓影成蠱耳必有不誣此法專意信之亦任其從禳禱之道雖然必須資藥以救之比見用藥攻療無不差者以法禳之則有無不効者以此言之明知病在於內徒勞於外耳此病之始與天行不多別亦頭痛骨肉酸楚手足逆冷口鼻喉舌乾好飲水毛聳腰脊強欲反拗小便赤但先寒後熱發作有時可不審察其發作日有準凡經七日以後先服鼈甲等五味散取快吐方

鼈甲三兩生用 常山二兩 甘草二兩炙 松蘿二兩

桂心兩

右藥擣篩爲散煮烏梅湯下初服一方寸匕日二服稍稍加之以得吐爲限忌人莧生葱生菜海藻菘菜

又審自候若體力全強日再服每服皆取吐自覺氣力不甚強則每一服取吐晩不須服如全綿惙事須取吐則三兩日一服經五六度吐訖但適寒温將息并食飲使體氣漸強若知病雖輕吐根本未似得除事須利之以洩病勢宜合當歸等六味散服之取利方

當歸五兩 白术五兩 細辛四兩 桂心三兩

大黃五兩 朴消四兩

右藥擣篩爲散平旦空肚以酒飲下初服一方寸匕日再服稍稍加之得利爲度候氣力強羸取利多少一一如前取吐

忌桃李雀肉生葱生菜

又依前鼈甲等五味散取吐當歸等六味散利後雖經吐下其源尚在如更吐利又慮汪羸宜合鬼箭羽等十味丸服之方

細辛四兩　橘皮四兩　鬼箭羽折看之如色者二兩

白朮五兩　桂心四兩　地骨皮四兩　蜀漆二兩

甘草三兩炙　當歸五兩　丁香三兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子煑烏梅飲下之初服十五丸日再稍稍加至三十丸服經三五日後若覺熱上每服藥後良久任喫三兩口粥飲壓之忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

又療此病曾用釋深師一方大有効其方有巴豆皂莢藜蘆三物作丸服雖經困苦一服永斷並出第一卷中吳昇同

外臺秘要方卷第五　右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

外臺祕要方　六

霍亂　嘔吐

外臺秘要方卷第六 霍亂及嘔吐二十九門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

霍亂病源論三首

病源霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先痢心腹並痛者則吐痢俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐痢虛者但吐痢心腹刺痛而已亦有飲酒食肉好飡腥膾生冷過度或居處不節或露臥濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便生

吐痢水穀不消則令心腹脹滿皆成霍亂霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三名走哺言其哺食變逆者也診其脉來代者霍亂又脉代而絶者亦霍亂霍亂脉大可療微細不可療霍亂吐下脉微遲氣息劣口不欲言者不可療也養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂出第二十二卷中

千金論曰原夫霍亂之爲病也皆因食飲非關鬼神飽食肫膾復飡乳酪海陸百品無所不啖眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戻陽氣欲降陰氣欲昇陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆爲迴轉論時雖小卒病之中最爲可畏雖臨深履危不足以諭之也養生者宜達其旨趣庶可免於天横者矣

又凡霍亂務在温和將息若冷則遍體轉筋凡此病定已後一

日不食爲佳仍須三日少少喫粥三日以後乃可恣意食息也七日勿雜食爲佳所以養脾氣也出第二十卷中

霍亂吐痢方一十二首

廣濟療霍亂吐痢藊豆湯方

藊豆葉一升切 香葇葉一升切 木瓜一枚切 乾薑一兩切

右四味以水六升煑取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里並無所忌

又療冷熱不調霍亂吐痢宿食不消理中丸方

人參八分 白朮八分 甘草八分炙

乾薑六分 高良薑八分 桂心六分

右六味擣篩蜜丸空腹以飲服如梧子大三十丸日二服漸加至四十丸老小以意減之忌生冷油膩生葱海藻菘菜桃李雀肉等物

又療霍亂冷熱不調吐痢高良薑湯方

高良薑五兩　木瓜一枚　杜梨枝葉三兩

右三味切以水六升煮取二升絞去滓空腹溫三服服別如人行六七里無所忌並出第四卷中

小品霍亂吐痢心煩亂髮湯主之方

亂髮一枚如鴨子大燒令焦　人參一兩　吳茱萸一升　甘草一兩炙

右四味切以水三升酒二升煮取二升絞去滓溫服五合忌海藻菘菜

又療霍亂吐痢已服理中及四順湯不解者以竹葉湯方

竹葉一虎口寸切之　小麥一升　生薑十兩　甘草一兩炙
人參一兩　附子一兩炮　肉桂二兩　當歸二兩
芍藥一兩　白朮三兩　橘皮二兩

右十一味以水一斗半先煮小麥竹葉取八升汁去滓內

諸藥煑取二升半分三服吐痢後腹滿加厚朴二兩炙上氣加吴茱萸半升差理中四順則大熱熱毒霍亂冝竹葉湯悉生葱海藻菘菜猪肉桃李雀肉等千金古今録驗並同

又霍亂吐痢而汗出小便復利或下利清穀裏外無熱脉微欲絶或惡寒四肢拘急手足厥逆四逆加猪膽湯主之方

甘草二兩炙　乾薑半兩炮　附子一枚生去皮破八片　猪膽汁半合

右四味切以水二升煑取一升四合温分再服無猪膽以羊膽代之删繁千金經心録同强人可與大附子一枚乾薑至三兩若吐之後吸吸少氣者及下而腹滿者加人參一兩諸藥皆減爲一兩如證者亦宜與理厥人參湯佳忌海藻菘菜猪肉

又四順湯與前療同常用此方

人參三兩一方二兩　乾薑三兩一方一兩　甘草三兩一方一兩炙　附子二兩范汪方用一兩

右四味切以水六升煮取二升絞去滓溫分三服轉筋肉冷汗出嘔噦者良忌海藻菘菜猪肉千金同刪繁范汪方云利甚者加龍骨二兩妙

又白丸療霍亂嘔吐及暴痢良方

半夏三兩洗　附子四兩炮　乾薑四兩炮

人參三兩　桔梗二兩

右五味作散臨病和之若吐痢不止者以苦酒和之飲服二丸如梧子不差復服耐藥者加之以意下者以蜜和丸亦得忌猪羊肉餳范汪同並出第四卷中

崔氏理中丸療三焦不通嘔吐不食幷霍亂吐逆下痢及不得痢悉主之方

人參三兩　乾薑二兩炮　白朮三兩　甘草三兩炙

右四味擣篩蜜和丸丸如梧子平旦取粥清服五丸日再服

一方乾薑三兩忌海藻菘菜桃李雀肉等 出第二卷中

延年理中丸療霍亂吐痢宿食不消方

白朮二兩　乾薑二兩炮　人參二兩

甘草二兩炙　大麥蘖二兩熬令黃

右五味擣篩蜜和爲丸以飲服十五丸如梧子大日再服稍加至二十丸忌海藻菘菜桃李雀肉等出第六卷中

必效理中散主霍亂及轉筋吐痢不止方

青木香六分　桂心八分炙　厚朴八分炙

甘草八分炙　白朮八分　乾薑十分炮

附子六分炮

右七味擣篩爲散飲服兩錢匕如人行五六里不定更服一錢匕差止忌海藻菘菜生葱豬肉桃李雀肉等

又方

若熱霍則渴心煩欲得冷水喫則宜恣意飲冷水及土漿取足定止

霍亂臍上築方三首

病源霍亂而氣築悸者由吐下之後三膲五藏不和而水氣上乘於心故也腎主水其氣通於陰若吐下則三膲五藏不和故脾氣亦虛不能制水水不下宣與氣俱上乘心其狀起臍下上從腹至心氣築築然而悸動不定也出第二十二卷中

仲景論霍亂臍上築者腎氣動也先療氣理中湯去术加桂凡方加术者以內虛也加桂者恐作奔豚也理中湯方

人參三兩　甘草三兩炙　白术三兩　乾薑三兩炮

右四味切以水八升煑取三升去滓溫服一升日三夜一若臍上築者腎氣動也去术加桂心四兩吐多者去术加生薑三兩若下多者復用术悸者加茯苓二兩若病先時渴喜得

水者加朮合前成四兩半若腹中痛者加人參合前成四兩半若惡寒者加乾薑合前成四兩半若腹滿者去朮加附子一枚炮去皮破六片服湯後一食頃歠熱粥一升許汗微出自溫勿發揭衣被也忌海藻菘菜桃李雀肉等千金備急文仲崔氏集驗必效小品古今錄驗並同

又霍亂臍上築者以吐多故也若吐多者理中湯主之方如前法加減霍亂四逆吐少嘔多者附子粳米湯主之方

附子一枚炮去皮破六片　半夏半升洗完用　甘草一兩炙

大棗十枚擘　粳米半升

右五味切以水八升煮米熟去滓溫服一升日三忌羊肉猪肉海藻菘菜餳小品千金同出第十七卷中一方有乾薑一兩

范汪療霍亂臍上築而悸茯苓理中湯方

茯苓大如棗者三枚一方二兩　甘草三兩炙　乾薑一兩炮

人參三兩　木瓜三兩

右五味㕮咀以水六升煑取三升去滓適寒溫分爲四服忌海藻菘菜酢物出第四卷中

霍亂腹痛吐痢方七首

廣濟療霍亂腹痛吐痢方

取桃葉切三升以水五升煑取一升三合分溫二服出第四卷中

范汪理中加二味湯療霍亂胷滿腹痛吐下方

人參三兩　乾薑三兩炮　甘草三兩炙

白朮三兩　當歸二兩　芍藥二兩

右六味㕮咀以水七升煑取三升絞去滓溫服一升日三甚良忌海藻菘菜桃李雀肉等

又主霍亂腹痛吐下方

取桃葉冬〻取皮煎汁服一酒柸有効出第四巻中

千金云擣絞取汁一升服立止

千金理中湯療霍亂吐下脹滿食不消心腹痛方

人參三兩　白朮三兩　甘草三兩炙　乾薑三兩

右四味以水六升煑取三升絞去滓温分三服不差頻進兩三劑遠行防霍亂作丸如梧子服二十丸散服方寸匕酒亦得若轉筋者加石膏三兩忌海藻菘菜桃李雀肉等備急集驗小品文仲古今録驗同出第二十巻中與前仲景方同加減别

備急療霍亂吐痢高良薑酒方

高良薑火炙令焦香每用五兩打破以酒一升煑取三四沸頓服亦療霍亂腹痛氣惡崔氏延年同出第一巻中

救急療霍亂初覺不好則用此方主腹痛吐痢香薷湯方

生香薷一升切 小蒜一升碎 厚朴六兩炙 生薑十兩

右四味切以水一斗煑取三升分三服得吐痢止每服皆須溫如吐痢不止用後方

又蘆根湯方

生蘆根一升切入土者 生薑一斤 橘皮五兩

右三味切以水八升煑取二升分二服服別相去以意消息之並出第一卷中

霍亂不止及洞下泄痢方八首

病源霍亂而下痢者是冷氣先入於腸胃腸胃之氣得冷則交擊而痛故霍亂若先腹痛者則先下痢也出第二十二卷中

廣濟療霍亂不止方

取酢漿水三升煑取一升五合内米粉一抄攪調分二服服別相去如人行三四里出第四卷中

小品霍亂卒吐下不禁脉暴數者人參湯主之方

人參二兩　茯苓二兩　葛根二兩

橘皮二兩　麥門冬二兩去心　甘草二兩炙

右六味切以水五升煑取二升絞去滓溫分三服忌海藻菘菜酢物出第四卷中

刪繁療霍亂洞泄不止臍上築築腎氣虛人參理中湯方

人參　乾薑　甘草各三兩炙　茯苓四兩

橘皮四兩　桂心三兩　黄耆二兩

右七味切以水九升煑取三升去滓分溫三服忌海藻菘菜生葱醋物出第四卷中肘後云洞者宣瀉也

又療中焦虛寒洞泄人參湯補虛泄方

人參三兩　甘草二兩炙　黄芩二兩

當歸三兩　茯苓四兩　乾薑四兩

厚朴四兩炙　芎藭三兩　粟米二升

右九味切以水一斗五升煑米取熟去米澄取七升下諸藥煎取三升分三服忌海藻菘菜大酢等物

又療中焦洞泄下痢或因霍亂後瀉黄白無度腹中虛痛黄連湯方

金色黄連四兩　黄蘗三兩　當歸三兩

厚朴三兩　酸石榴皮四兩　乾薑三兩

地榆四兩　阿膠四兩

右八味切以水九升煑取三升去滓下阿膠更煎取烊分三服忌猪肉冷水並出第四卷中

千金療霍亂洞下不止方

取艾一把水三升煑取一升頓服之備急同出第二十卷中

延年增損理中丸主霍亂下氣能食止洩痢方

人參六分　白术六分　厚朴六分炙

茯苓六分　甘草六分炙　薑屑二分

右六味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十丸飲下酒下亦得加至十五二十丸忌生冷海藻菘菜桃李雀肉大醋出第六卷中

必効療霍亂水痢腹中雷鳴無不差烏梅黃連散方

烏梅肉三兩　黃連三兩　熟艾葉三兩

赤石脂二兩　當歸三兩　甘草三兩炙

附子二兩炮　阿膠三兩碎熬令黃然後末

右八味擣篩爲散有患者每服二方寸匕疑熱則飲下疑冷則酒下忌海藻菘菜猪肉冷水出第二卷中

霍亂後脉絕手足冷方四首

病源霍亂而大吐下後其腸胃俱虛乃至汗出其脉欲絶手足皆冷名爲四逆四逆者謂陰陽卒厥絶也出第二十二卷中

仲景傷寒論旣吐且痢而大汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脉微欲絶或發熱惡寒四肢拘急手足厥逆者四逆湯主之之方

甘草二兩炙　附子一枚生去皮破六片　乾薑一兩半

右三味切以水三升煑取一升二合去滓温分二服加減依後法忌海藻菘菜猪肉千金同

又吐已下斷汗出厥冷四肢拘急不解脉微欲絶者通脉四逆湯主之方

甘草二兩炙　大附子一枚削去皮破六片　乾薑三兩炮强人可至四兩

右三味以水三升煑取一升二合去滓温分二服其脉即出愈若面色赤者加葱九莖若腹中痛者去葱白加芍藥二兩

若嘔者加生薑二兩若咽痛者去芍藥加桔梗一兩若利止脉不止者去桔梗加人參二兩病皆與方相應乃合服之若吐利止身疼痛不休者消息和其外傷寒論中又有療諸發熱霍亂者審取之忌海藻菘菜猪肉並出第十七卷中仲景傷寒論上證合用通脉四逆加猪膽湯又吐利止身痛不休者消息和解其外宜桂枝湯小和之

小品扶老理中散并作丸長服亦得療羸老冷氣惡心食飲不化腹虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗悉主之方

人參五兩　乾薑六兩　白朮五兩　麥門冬六兩去心

附子三兩炮　茯苓三兩　甘草五兩炙

右七味作散臨病煮取三合白湯飲和方寸匕一服不効又服常將蜜丸酒服如梧子二十丸忌海藻菘菜猪肉桃李雀肉大醋出第四卷中千金同

千金四逆湯主多寒手足厥冷脉絶方

吴茱萸二升 當歸三兩 桂心三兩

芍藥三兩 細辛二兩 通草二兩

生薑八兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右九味切水六升清酒六升合煑取三升分温四服舊方棗二十五枚今以霍亂法多痞故除之若除棗入葛根二兩佳忌生葱生菜海藻菘菜小品同 仲景傷寒論此方名當歸四逆加吴茱萸生薑湯

霍亂煩躁方八首

病源霍亂之後煩躁卧不安者由吐下之後腑藏虚極陰陽未理血虚氣亂故血氣之行未復常度内乘於腑藏故煩躁而不得安卧也出第二十二卷中

肘後霍亂後煩躁卧不安葱白大棗湯方

葱白二十枚 大棗二十枚擘

右二味以水二升半煑取一升去滓頓服之文仲同

又療霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

生薑若乾薑一小升

右一味㕮咀以水五升煑三沸頓服若不即愈可更作無新藥煑滓亦得

又方

桂心屑半升以煖飲二升和之盡服忌生葱備急同

並出第二卷中

文仲療霍亂煩躁方

濃煑竹葉飲五升令灼灼爾以淋轉筋處肘後備急同

又方

服乾薑屑三兩方寸匕肘後備急同

又方

小蒜一升㕮咀水三升煑取一升頓服之肘後同並出第二卷中

備急療霍亂煩躁方

黃粱米粉半升水一升半和攪如白飲頓服糯米亦得

又方

燒亂髮如雞子大以鹽湯三升和服之不吐復服出第一卷中

霍亂衆藥療不効方二首

小品療霍亂諸藥不能療亂髮湯方

亂髮握如雞子熬令焦　小蒜十四枚

附子一兩炮　甘草三兩炙

右四味切以水六升煑取三升去滓温分三服忌猪肉海藻菘菜出第四卷中

千金人參湯療毒冷霍亂吐痢煩嘔轉筋虛冷汗出手足指浮腫氣息垂死絕語音聲不出百方不効脉不通者服此湯取差乃止隨吐者續更服勿住方

人參　附子炮　厚朴炙　茯苓

甘草炙　橘皮　當歸　葛根各二兩

桂心　乾薑炮各三兩

右十味以水七升煑取二升半分溫三服忌海藻菘菜生葱大酢出第二十卷中

乾濕霍亂及痰飲方五首

病源霍亂者多吐痢也乾霍亂者冷氣搏於胃飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐痢名爲乾霍亂也出第二十二卷中

救急療霍亂無問乾濕冷熱等木香湯方

青木香長三寸　高良薑二兩　豆蔻子二枚

右三味㕮咀以水一大升煮取半升頓服之則定

又方

取烏牛屎二兩以水二升煮沸絞濾頓服之大良

又生薑湯方

以東壁土一把生薑一大兩碎之

右二味用水一大升煮取半升澄清熱飲之如渴依前進並

出第一卷中

必効療上吐下痢者名爲濕霍亂方

黄牛屎半大升許取水一大升煮三兩沸和牛屎濾取汁服半升即止犁牛子屎亦佳無牛處常將乾者相隨亦好用備急崔氏范汪同出第三卷中

又四神丸主霍亂冷實不除及淡飲百病無所不主方

乾薑一兩　桂心一兩　附子一兩炮　巴豆六十枚去心皮熬研如脂

右四味末之蜜和爲丸如小豆大飲服二丸取快下不下又服一丸忌生葱野猪肉蘆笋胡洽同出第四卷中

霍亂心腹痛方三首

病源霍亂而心腹痛者是風邪之氣客於藏腑之間冷氣與眞氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也出第二十二卷中

廣濟療霍亂心腹痛煩嘔不止厚朴人參湯方

厚朴四兩炙　橘皮二兩　人參二兩

高良薑一兩　當歸一兩　藿香一兩

右六味以水七升煑取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生冷粘膩出第四卷中

肘後療霍亂苦絞痛不止方

薑二累豉二升合擣中分爲兩分手捻令如料熬令

灼灼爾更番以熨臍中取愈出第一卷中

千金霍亂蠱毒宿食心腹痛冷氣鬼氣方

極鹹鹽湯三升一味霍亂心腹暴痛宿食不消積冷煩滿者熱飲一升以指刺口令吐宿食使盡不盡更刺吐訖復飲三吐住靜止此法大勝諸藥俗人以爲田舍淺近法鄙而不用守死而已凡有此疾即須先用之備急崔氏集驗文仲並同出第二十卷中

霍亂煩渴方四首

病源霍亂而煩渴者由大吐逆上焦虛氣不調理氣乘於心則煩悶也大利則津液竭津液竭則藏燥藏燥則渴也煩渴不止則引飲引飲則利亦不止出第二十二卷中

肘後療霍亂吐下後大渴多飲則殺人方

黃粱米五升水一斗煑之令得三升澄清稍稍飲之

勿飲餘飲備急同糯米亦得出第二卷中

備急近効療霍亂不吐不下食氣急而渴方

木瓜一枚切以水四升煑取二升細細飲盡更作吐不止者亦差若渴唯飲此湯佳根莖亦可用此湯令人吐崔氏張文仲同出第一卷中

必効霍亂渴方

糯米二升濤取泔飲訖則定若不渴不須一方渴者服之并當飽又云研糯米取白汁恣意飲之以差爲度逕陽崔尉云奇効偏主乾霍亂出第三卷中

又療霍亂後渴口乾腹痛不止者厚朴桂心湯方

厚朴四兩炙 桂心二兩

右二味切以水四升煑取一升二合絞去滓内分六合細細飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之長安傅少府常服悳

生葱出第二卷中

霍亂乾嘔方五首

病源霍亂而乾嘔者由吐下之後脾胃虛極上焦不理氣痞結於心下氣時逆上故乾嘔乾嘔者謂欲嘔而無所出也若更遇冷冷折胃氣胃氣不通則變噦也出第二十二卷中

肘後療苦嘔不息方

取薤白一虎口切以水三升煮令得一升半服之不過三度備急同

又乾薑茱萸湯方

乾薑切 茱萸各二兩熬

右二味以水二升煮取一升頓服之下不止手足逆冷者加椒百枚附子一枚炮水三升煮取一升頓服出第二卷中

刪繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯方

厚朴四兩炙　乾䕡豆葉二兩　茯苓三兩
白朮五兩　人參三兩
右五味切以水七升煑取二升分三服忌桃李大醋雀肉等出
第二卷中
千金療霍亂引飲飲輙乾嘔方
生薑五兩水五升煑取二升半分二服又煑高良薑
飲之大佳延年祕録備急小品崔氏張文仲同出第
二十卷中
經心録療霍亂後煩嘔厚朴湯方
厚朴二兩一方四兩炙　生薑三兩　枳實三兩炙一方三枚
右三味切以水六升煑取二升分三服出第二卷中
霍亂轉筋方一十四首
病源霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也足之三陰三陽之筋

起於足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於身夫霍亂
大吐下之後陰陽俱虛血氣虛極則手足逆冷而榮衛不理冷
搏於筋則筋爲之轉冷入於足之三陰三陽則脚筋轉入於手之
三陰三陽則手筋轉隨冷所入之筋筋則轉轉者由邪冷之氣
擊動其筋而移轉也又轉筋者由榮衛氣虛風冷搏於筋故也
手足之三陰三陽之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不
足陰陽虛者風冷邪氣中其筋隨邪所中之筋筋則轉轉者謂
其轉動也經云足太陽下血氣皆少則喜轉筋喜踵下痛者是
血氣少則易虛虛而風冷乘之故也診其左手關上肝脉也沈
爲陰陰實者肝實也苦肉動轉筋左手尺中名神門以候脉足
少陰經也浮爲陽陽虛者病苦轉筋其湯熨鍼石別有正方補
養宣導今附於後養生方導引法云偃卧展兩脛兩手外踵者
相向令鼻内氣自極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋又云覆卧傍

視立兩踵生腰𣆋內氣去轉筋又云張脛兩足指號五息止令人不轉筋極自用力張脚痛挽兩足指號言寬大去筋節急攣躄痛久行身開張又云覆卧傍視立兩踵生腰以𣆋內氣自極七息除脚中弦痛轉筋酸疼一本云療脚弱出第二十二卷中

廣濟療霍亂吐痢轉筋欲入腹高良薑湯方

高良薑四兩　桂心四兩

右二味切以水七升煮取二升去滓分三服如人行四五里一服忌生冷生葱

又療霍亂轉筋不止茱萸湯方

吳茱萸一升　甘草二兩炙　乾薑二兩炮

蓼子一把　亂髮一兩灰汁洗却膩　桂心二兩

右六味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱海藻菘菜生冷粘膩等

又療轉筋方

取故綿多取釅醋甑中蒸及熱用裹病人脚冷更易

勿停差止並出第四卷中千金同

肘後療兩臂脚及胷脅轉筋者方

取鹽一升半水一斗煑令熱灼灼爾漬手足在胷脊

者湯洗之轉筋入腹中到檐病人令頭在下腹中平

乃止若劇者引陰陰縮必死猶在到檐之可冀活耳

又方

煑苦酒三沸浸氈裹轉筋上令少粉尤佳又以綿纏

膝下至足崔氏集驗備急同

又若轉筋入腹中如轉者方

取雞屎白一方寸匕水六合煑三沸温頓服勿令病

者知仲景經心録備急集驗必效同

又若霍亂注痢不止而轉筋入腹欲死者方

生薑三兩擣破以酒一升煑三四沸頓服之肘後小品備急同出第二卷中

刪繁療舌强筋縮牽陰股引背腹脹痛霍亂黃龍藤湯方

黃龍藤切一升（黃龍藤者樟木藤也斷以吹氣從裏貫度者好也）

右一物以水四升煑取八合爲一服一劑不止更至一劑良驗或宿食不消霍亂或乾霍亂或吐痢不止或不吐痢並悉療之出第三卷中

千金霍亂轉筋入腹不可奈何方

極鹹作鹽湯於槽中煖漬之則差小品集驗同

又方

以醋煑青布搨之脚膝冷復易之備急文仲崔氏小品集驗救急同

又方

蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服文仲小品

備急同並出第二十卷中一方云梨葉

救急霍亂脚轉筋絶四肢巳冷强氣絶心上微暖者猶可救之方

取朱砂二兩熟研蠟三兩和之爲丸待冷著火籠中

如熏衣被厚覆勿令煙洩兼牀下著火令腹微暖徹

良久當汗則漸氣通便活忌生血物出第一卷中

必効主霍亂脚轉筋及入腹方

以手拗所患脚大母指灸當脚心下急筋上七壯

又方

木瓜子根皮合煮湯服之並出第二卷中

霍亂雜灸法二十六首

肘後療霍亂先腹痛者法

灸臍上一夫十四壯名太倉在心厭下四寸更度之

千金備急崔氏古今録驗並同 銅人經中管一名太倉在臍上四寸胃募也

又療先洞下者法

灸臍邊二寸男左女右十四壯甚者至三十四十壯

名大腸募也千金備急崔氏古今録驗同

又療轉筋者法

灸脚心下名湧泉

又灸當足大毋指聚筋上六七壯神驗

又灸足大指下約中一壯千金及翼同

又療轉筋入腹痛者法

令四人捉手足灸臍左二寸十四壯

又灸股中大筋上去陰一寸

又療若啘者法

灸手腕第一約理中七壯名心主當中指

又療下痢不止者法

灸足大指本節內側一寸白肉際左右七壯名大都

千金同 銅人經大都二穴在足大指本節後陷中

又療吐且下痢者法

灸兩乳邊連黑外近腋白肉際各七壯可至二七壯

又療若煩悶湊滿法

灸心厭下三寸七壯名胃管文仲同

又法

以鹽內臍中灸上二七壯文仲千金翼同

又療若繞臍痛急者法

灸臍下三寸三七壯名關元良文仲同

又療先吐者方

灸心下一寸十四壯又并療下痢不止上氣灸五十
壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也千金翼文仲崔
氏備急同銅人經巨闕在鳩尾下一寸心之募也

又療霍亂神秘起死灸法
以物横度病人口中屈之從心鳩尾度以下灸度下
頭五壯横度左右復灸五壯此三處併當先灸中央
畢更横度左右也又灸脊上以物圍令正當心厭又
夾脊左右一寸各七壯是腹背各灸三處崔氏文仲同

又華佗療霍亂已死上屋喚魂者又以諸療皆至而猶不差
者法
捧病人覆卧之伸臂對以繩度兩肘尖頭依繩下夾
背脊大骨宍中去脊各一寸灸之百壯無不活者所
謂灸肘椎空囊裹歸已試數百人皆灸畢即起坐佗以

此術傳其子孫世世皆祕之不傳千金崔氏備急同

並出第一卷中

千金凡得霍亂灸之或時雖未立差終無死憂不可逆灸或但

先腹痛或先下後吐當隨病灸之

又療霍亂灸法

灸穀門穴在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二

七壯不上又灸如前數甲乙鍼經天樞一名長谿一名穀門夾臍兩傍各二寸陷者中

又療吐下不禁兩手三陰三陽脉俱疾數者法

灸心厭骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

又療乾嘔者法

灸間使穴在手掌後三寸兩筋間左右各灸七壯不

差更灸如前數翼文仲肘後同

又療手足逆冷者法
灸三陰交穴在足内踝直上三寸廉骨際陷中左右
七壯不差更灸如前數肘後古今録驗同
又療轉筋不止者法
灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈
又療走哺轉筋者法
灸踝白肉際左右各二十一壯
又灸小腹下横骨中央隨年壯
又療轉筋四厥者法
灸兩乳根黒際各一壯
又療轉筋在兩脅及胷中法
灸手掌白肉際七壯又灸亶中中府巨闕胃管尺澤
以上并療筋拘頭足掌皆愈

又療轉筋不止者法
若是男子手挽其陰牽之女子挽其乳逐左右邊
又療轉筋欲死者方
令四人手持足灸臍上一寸十四壯自不動勿復持
之
又療霍亂泄痢所傷煩欲死者方
灸慈宮各二十壯慈宮在橫骨兩邊各二寸半橫骨
在臍下橫門骨是也並出第二十卷中甲乙鍼經衝門一名慈宮上去大橫五寸在橫骨兩端約中動脉是
救急療霍亂心腹痛脹吐痢煩悶不止則宜灸之方
令病人覆卧伸兩臂膊著身則以小繩正當兩肘骨
尖頭從背上量度當脊骨中央繩下點之去度又
取繩量病人口至兩吻截斷便中折之則以度向所

點背下兩邊各依度長短點之三處一時下火灸絕
便定神驗艾炷大稍加也
又療霍亂轉筋不止漸欲入腹凡轉筋能殺人起死之法無過
於灸灸法唯三處要穴第一承筋穴在腨腸下際取穴法
以繩從脚心下度至脚踵便截斷度則迴此度從脚
踵縱量向上盡度頭當腨下際宛宛中是穴灸二三七
壯則定
又不止則灸涌泉在足心下當足大指中節後一寸
半正當大筋上是穴又灸足跟後黒白肉交際當中
央此三處要穴灸之不過二三七壯必定並出第一
卷中
三焦脉病論二首
删繁論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名霍

亂下焦名走哺合而爲一有名無形主五藏六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣脾胃之間不可不知也凡上焦三管反射者通三焦名中清之腑也別號玉海水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號爲孤之腑也而榮出中焦衛出上焦榮者是絡脉之氣道衛者是經脉之氣道也上焦如霧霧者霏霏起上也起於胃上管並咽以上貫膈布胸中走腋循足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明常以榮衛俱行於陽二十五度行陰亦二十五度爲一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰手少陽也主心肺之病内而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背或出於身手皆不循衛氣之道而出蓋外傷於風内開腠理毛蒸理泄衛氣走之故不得循其道此氣慓悍滑疾見開而出故不得從其道名曰漏泄其病則肘掌痛食先吐而後下氣不續膈膈間厭悶所

以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便利語聲不出若實則上絕於心若虛則引氣於肺出第四卷中千金同
千金論曰三焦病者腹脹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則爲水留則爲脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于脉取委陽少腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉與厥陰小絡結而血者三焦脹者氣滿在皮膚殼殼然而不堅手少陽之脉是動則病耳聾煇煇焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目兊背痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用爲此諸病寒則留之熱則疾之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎一倍於寸口虛者人迎反小於寸口出第二十卷中

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

删繁療上焦實熱飲食下胃其氣未定汗出面背身中皆熱

名曰漏氣通脉瀉熱澤瀉湯方

澤瀉二兩　生地骨皮五兩　甘草一兩炙　半夏二兩洗

石膏八兩碎　柴胡三兩　茯苓三兩　生薑三兩

竹葉五合切　人參二兩　桂心一兩　蓴心一升

右十二味切以水一斗煑取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳醋生葱千金同

又療上焦熱腹滿而不欲食或食先吐而後下肘脅攣痛麥門冬理中湯方

生麥門冬一升　生薑四兩　白朮五兩　甘草二兩炙

上黨人參三兩　茯苓二兩　橘皮三兩　竹茹一升

生薑根一升　蓴心五合　萎蕤三兩　廩粟一升

右十二味切以水一斗五升煑取三升分三服忌海藻菘菜大醋桃李雀肉等千金同

又療上焦氣不續膈膈間厭悶所以飲食先吐而後下半夏理中續膈破寒湯方

半夏（半升洗四破） 生薑（四兩） 麻黄（三兩去節）

前胡（三兩） 澤瀉（三兩） 竹葉（切一升）

細辛（三兩） 枳實（三兩炙） 杏人（三兩去尖）

右九味切以水九升煑取三升去滓分三服忌羊肉餳生菜等物

又療上焦熱牽肘攣心痛喘欬短氣動而好唾潤肺止心痛大棗湯方

大棗（三十枚去核） 杏人（三兩去皮尖及兩人者） 人參（三兩）

紫菀（二兩） 萎蕤（三兩） 麥門冬（三兩去心）

乾百部（三兩） 通草（三兩） 石膏（八兩碎）

五味子（二兩） 羊腎（三枚四碎去膏） 麻黄（三兩去節）

右十二味切以水一斗煮取二升五合去滓下蜜三合生薑汁三合淡竹瀝三合更上火煎取三升分三服

又療上焦虛寒精神不守泄下便利語聲不出茯苓安心湯方

茯苓三兩 人參三兩 乾薑三兩

桂心一兩 遠志皮三兩 甘草二兩炙

右六味切以水九升煮取三升去滓分三服忌生葱醋物海藻菘菜等物

又療上焦虛寒腸鳴不利心下痞堅半夏瀉心湯方

半夏五兩洗四破 黃芩三兩 甘草三兩炙

人參三兩 乾薑三兩 黃連一兩

桂心三兩

右七味以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜餳羊肉生葱豬肉冷水出第四卷中此仲景半夏瀉心湯方無桂心有大棗十二枚

千金療上焦虛寒短氣語聲不出黃耆理中湯方

黃耆二兩　桂心二兩　丹參四兩一作人參

桔梗三兩　乾薑三兩　五味子三兩

茯苓三兩　甘草三兩炙　杏人四兩去皮尖雙人熬

芎藭二兩

右十味切以水九升煮取三升絞去滓温分三服忌海藻菘菜猪肉生葱大醋刪繁同

又療上焦冷下痢腹內不安食好注下黃連丸方

黃連八兩　乾薑四兩　欅皮三兩

烏梅肉八兩　附子四兩炮　桂心一兩

芎藭三兩　黃蘗三兩　阿膠四兩炙

右九味末之白蜜和爲丸如梧子大飲下二十丸如至三十丸忌猪肉冷水生葱等刪繁同

又療上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸厚朴湯方

厚朴四兩炙　吴茱萸五合　人參三兩

茯苓四兩　桔梗三兩　生薑八兩

玄參三兩　芎藭四兩　白术四兩

附子三兩　橘皮三兩去赤脉

右十一味切以水九升煑取三升絞去滓分三服忌豬肉桃李雀肉大醋刪繁同出第二十卷中

中焦熱及寒洩痢方三首

刪繁論曰中焦如漚漚者在胃中如漚也起於胃中管在上焦之後此受氣泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而爲血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰榮氣主足陽明陽明別號曰豐隆在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脉

上下絡本倉主熟五穀不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下隔絶虛則生寒寒則洞泄便痢霍亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛是精氣榮是神氣故血與氣異形而同類焉奪血無汗（此是神氣）奪汗無血（此是精氣）故人有一死而無載生也猶精神之氣隔絶也若虛則補於胃實則瀉於脾調其中和其源萬不遺一也千金同

又療中焦實熱閉塞上下不通隔絶關格不吐不下腹滿彭彭喘急大黃瀉熱開關格通隔絶湯方

大黃（三兩切以水一升五合別漬）　黃芩（三兩）　澤瀉（三兩）

升麻（三兩）　羚羊角（四兩）　梔子人（四兩）　生地黃汁（一升）

生玄參（八兩）　芒消（三兩）

右九味切以水七升先煑七味取二升三合下大黃更煎數沸絞去大黃滓下消分三服忌蕪荑千金同

千金療中焦熱水穀下痢藍青丸方

藍青汁三升　黃連八兩　黃蘗四兩

白朮三兩　地楡二兩　地膚子二兩

阿膠五分炙　烏梅肉三兩

右八味下篩用藍汁和微火上煎爲丸如杏人大飲服三丸日再七月七日合之良當併手丸之忌猪肉冷水桃李雀肉等

又療中焦虛寒四肢不可舉動多汗洞痢方

灸大橫隨年壯大橫俠臍傍行相去兩邊各兩寸五分删繁同出第二十卷中

下焦熱方六首

删繁論曰下焦如瀆瀆者如溝水決洩也起胃下管別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀常幷居於胃中成糟粕而俱下於大腸主

足陽明灌滲津液合膀胱主出不主入別於清濁主肝腎之病也若實則大小便不通利氣逆不續吐嘔不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絶人飲酒亦入胃穀未熟而小便獨先下者何也蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而先穀出也所以熱則寫於肝寒則補於腎千金同

又療下焦熱大小便倶不通柴胡通塞湯方

柴胡三兩　黄芩三兩　橘皮三兩

澤瀉三兩　梔子人四兩　石膏六兩碎

羚羊角三兩炙　生地黄切一升　芒消三兩

香豉一升綿裹

右十味切以水一斗煑九味取三升去滓下芒消分三服忌蕪荑千金同

又療下焦熱氣逆不續吐嘔不禁名曰走哺止嘔人參湯方

人參 生蘆根 梔子人 萎蕤

黃芩 知母 茯苓各三兩 白朮四兩

石膏八兩 橘皮四兩

右十味切以水九升煑取三升去滓分三服忌桃李雀肉醋

等千金同

又療走哺不止或嘔噫熱氣衝心滿悶香豉湯方

香豉一升熬別裹 生地黃切一升 白朮三兩

甘草二兩炙 竹葉切一升 石膏八兩碎綿裹

茯苓三兩 葱白切一升

右八味切以水七升煑取二升五合去滓分三服須利下芒

消三兩忌蕪荑海藻菘菜桃李雀肉酢物等

又療下焦熱毒痢血如鵝鴨肝不止升麻湯方

升麻三兩 犀角三兩屑 地榆四兩炙

絳草三兩　蘘荷根四兩　黄芩三兩
巴蕉根切一升　桔梗三兩　梔子人三七枚
右九物切以水九升煑取三升去滓分三服忌猪肉出第四卷中
千金療下焦熱或痢下膿血煩悶恍惚赤石脂湯方
赤石脂八兩　烏梅二十枚去核　梔子人十四枚
白朮三兩　乾薑二兩　稟米一升
升麻三兩
右七味切以水一斗煑米取熟去米取七升下諸藥煑取二升五合去滓分三服忌桃李雀肉等刪繁同
又療下焦熱毒痢魚腦雜痢鮮血臍下少腹絞痛不可忍欲痢不出香豉湯方
香豉一升熬　梔子四兩　薤白一升切

黃連三兩　黃蘗三兩　黃芩四兩

地榆四兩炙　白朮三兩　茜根三兩

右九味切以水一斗煑取三升分三服忌猪肉冷水桃李雀肉等　刪繁同出第二十卷中

下焦虛寒方六首

刪繁療下焦虛寒大便洞泄不止蘗皮湯止痢方

黃蘗三兩　黃連五兩　人參三兩

茯苓四兩　厚朴四兩炙　艾葉一升

地榆三兩炙　欅皮四兩炙　阿膠三兩

右九味切以水一斗煑取三升去滓下膠煎取二升分三服忌猪肉冷水醋等　千金同

又療下焦虛寒津液不止氣欲絶人參續氣湯方

人參　橘皮去赤脉　茯苓

烏梅皮　麥門冬去心　黃耆

芎藭　乾薑各三兩　白朮四兩

厚朴四兩炙　桂心二兩　吴茱萸三合

右十二味切以水一斗二升煑取三升去滓分三服忌桃李雀肉生葱醋物千金同

又療下焦虚寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞而短氣茯苓丸方

茯苓八分　甘草七分炙　杏人五十枚熬令黄去皮尖

人參七分　厚朴五分炙　乾薑七分

黄耆六分　桂心四分　當歸八分

芎藭五分　乾地黄八分

右十一味擣篩下蜜和爲丸如梧子初服二十丸加至三十九日再服清白飲進之忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑等

又療下焦虛寒損或先見血後便轉此爲遠血或利不利伏龍肝湯方

伏龍肝五合　甘草二兩炙　乾薑二兩

黃蘗五兩　黃芩二兩　牛膝根二兩

檞脉二兩炙　燒頭髮屑二合　阿膠二兩

右九味切以水七升煮取三升去滓下阿膠更煎取膠烊下髮屑分三服忌海藻菘菜千金幷翼同出第四卷中千金幷翼有乾地黃五兩無黃蘗

千金療下焦虛寒損或先便轉後見血此爲近血或利下或不利好因勞冷而發續斷止利湯方

續斷三兩　當歸三兩　乾薑四兩

蒲黃三分　桂心二兩　甘草二兩炙

乾地黃四兩　阿膠二兩

右八味以水九升煮六味取三升五合去滓下阿膠更煎取膠烊盡下蒲黃分三服忌海藻菘菜生葱蕪荑

又療三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦因起或熱損發或虛寒損發或因勞發或因酒發當歸湯方

當歸（三兩） 白芍藥（四兩） 羚羊角（三兩炙）
伏龍肝（一丸如雞子） 黃芩（二兩） 乾地黃（二兩）
白朮（四兩） 青竹皮（一升） 柏枝（三兩炙）
小薊（三兩） 阿膠（三兩炙） 乾薑（二兩）
甘草（二兩） 蒲黃（五合） 亂髮（一丸如雞子燒灰）

右十五味切以水一斗二升煮十二味取三升五合去滓下阿膠煎取膠烊下髮灰蒲黃分三服忌海藻菘菜蕪荑桃

李雀肉等刪繁同並出第二十卷中

許仁則療霍亂方三首

許仁則云此病有兩種一名乾霍一名濕霍乾霍死者多濕霍死者少俱由飲食不節將息失宜乾霍之狀心腹脹滿攪刺疼痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不通求吐不出求痢不下須臾不救便有性命之慮濕霍之狀心腹亦攪痛諸候有與乾同但吐痢無限此病始得有與天行相似者亦令頭痛骨肉酸楚手足逆冷四體發熱乾霍大小便不通煩寃欲死宜急與巴豆等三味丸服之服取快利方

巴豆 一百枚熬令熟去心皮　乾薑 三兩崔氏以芒消五兩代與千金同

大黃 五兩

右藥先擣乾薑大黃為散後別擣巴豆如膏和前二味同擣令調細細下蜜堪丸出之以飲下初服三丸丸如梧子大服訖數挼肚令轉動速下利良久不覺則以熱飲投之又良久不利更服一丸須臾當利利後好將息食飲寒温以意取

適如渇者煑漿水粥少少啜之張文仲處忌野猪肉蘆笋等物

又療濕霍亂吐痢無限宜合高良薑等三味飲子服之方

高良薑三兩　豆蔻子十二枚　桂心二兩

右藥切以水四升煑取一升去滓細細啜之亦有於此方加乾薑人參二物忌生葱

又木瓜桂心二物飲之方

木瓜一枚濕乾並得　桂心二兩

右藥以水二升煑取七合去滓細細飲之亦有豆蔻子代桂心者亦有單煑木瓜汁飲之忌生葱吴昇同出第一卷中

雜療霍亂方四首

小品療霍亂嘔噦氣厥不得喘息豉湯方

豉一升　半夏一兩洗　生薑二兩

人參一兩　柴胡一兩　甘草一兩炙

右六物切以水五升煮取二升半溫服七合忌羊肉餳海藻菘菜等千金有桂心一兩

又療卒道中得霍亂無有方藥氣息危急醫視捨去皆云必死療之方

蘆蓬蘽一大把煮令味濃頓服二升則差已用有効食中魚蟹毒者服之尤良備急集驗文仲范汪同並出第四卷中蘆蓬蘽蘆花是也

删繁療霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止桔梗湯方

桔梗四兩　白朮五兩　乾薑三兩

茯苓三兩　倉米一升

右五物切以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升絞去滓分服忌桃李雀肉猪肉大酢

近効訶梨勒散療一切風氣淡冷霍亂食不消大便澁方

取訶梨勒三顆擣取皮和酒頓服三五度則差

乾嘔方六首

病源乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔也出第二十一卷中

廣濟療卒乾嘔不息方

破雞子去白呑中黃數枚則愈肘後備急張文仲同

又方

生葛根絞取汁服一升

又方

甘蔗汁溫令熱服一升日三服張文仲同並出第三卷中一云甘草汁

集驗療病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯千金同

又療吐逆乾嘔生薑湯方

生薑四兩　澤瀉三兩　桂心二兩

橘皮三兩　甘草二兩　茯苓四兩

人參一兩　大黃四兩

右八味切以水七升煑取三升服五合日三忌海藻菘菜醋物生葱並出第四卷中

崔氏療患嘔人參湯方

人參一兩　胡麻人八合熬令香　橘皮二兩　枇杷葉半斤拭去毛炙

右四味切以水一斗煑枇杷葉取五升汁內人參等三種煎取三升稍稍飲之徐王張文仲千金同出第三卷中

嘔噦方四首

病源嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不消所爲也胃受邪氣逆則嘔脾受邪脾脹氣逆遇冷折之氣逆不通則噦也出第二十一卷中

廣濟療嘔噦不止橘皮湯方

橘皮一升　生薑八兩　甘草二兩炙　枇杷葉四兩炙令香熟去毛

右四味切以水五升煮取二升五合絞去滓分温三服每服相去如人行六七里進一服内消忌海藻菘菜出第一卷中

肘後療嘔噦方

生蘡薁籐斷之當汁出器承取飲一升生葛籐尤佳

又方

枇杷葉一斤炙拭之去毛水一斗煑取三升分再服

備急同出第一卷中

必効療嘔噦方

取蘆根五兩切以水五升煑取三升頓服兼以童子

小便一兩合不過三服則差出第二卷中

噦方七首

病源脾胃俱虛受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣

與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹脾脹則氣逆因遇冷折之

則噦也右手關上脉沈而虛者病善噦也出第二十一卷中

肘後療卒啘不止方

痛抓眉中央閇氣也

又方

以物刺鼻中若以少許皂莢内鼻中令嚏則差

又方

但閉氣抑引之

又方

好豉二升煑取汁服之千金同

又方

粢米粉二升井華水服之並出第三卷中

集驗療卒噦方

枳實三枚炙去核㕮咀之以三家乳一升以羊脂五兩煎枳實令沸復內乳令沸去滓含咽之范汪同出第六卷中

張文仲陶氏噦方

飲新汲井水數升佳肘後備急千金同出第六卷中

嘔逆吐方八首

病源嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所爲也若風邪在胃則嘔膈間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其狀長大息心裏澹澹然或煩滿而大便難或溏泄並其候養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發寒熱及温病食欲吐或心中停飲不消或爲反胃其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云正坐兩手向後捉腕反向拓席盡勢使腹弦弦上下七左右換手亦然除腹肚冷風宿氣或胃口冷食飲進退吐逆不下又云偃卧展兩脛兩手左右蹻兩足踵以鼻內氣自極七息除腰中病食苦嘔又云坐直舒兩足以兩手挽兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直叉兩脚底兩脚痛舒以頭抵膝上自極十二通愈腸胃不能受食吐逆出第二十一卷中

仲景傷寒論嘔吐病在膈上後必思水者急與之思水與猪苓散方

猪苓去皮　茯苓　白术

右三味各等分擣篩飲汁和服方寸匕日三服欲飲水者極與之本虛與水則噦攻其熱亦噦忌桃李雀肉醋物千金同出第十六卷中

必効小麥湯主嘔吐不止方

小麥一升洗擣宁用　人參四兩　青竹茹二兩半　茯苓三兩

厚朴四兩炙　甘草一兩炙　生薑汁三合

右七味以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜酢物千金同

又凡服湯嘔逆不入腹者方

先單煮炙甘草三小兩以水三升煮取二升服之

得吐但更服不吐益好消息定然後服餘湯則流利更不吐也忌海藻菘菜千金同並出第二卷中

延年人參飲主吐方

人參二兩 橘皮三兩 生薑一兩

右三味切以水四升煮取一升五合分温三服出第六卷中

又麥門冬飲主風邪熱氣衝心心悶短氣吐不下食方

麥門冬二兩去心 人參一兩 橘皮一兩

生薑三兩 羚羊角一兩屑

右五味切以水五升煮取一升五合去滓分温三服

又甘草飲主脾腎冷氣乘心痛悶吐利四肢逆冷或則煩疼方

甘草二兩炙 人參二兩 乾薑二兩

厚朴二兩炙 白朮二兩

右五味切以水五升煮取一升五合去滓分温三四服如人行八九里忌海藻菘菜桃李雀肉等出第六卷中

新附近効療嘔逆方

白油麻一大合以清酒半勝煎取三合看冷熱得所去油麻以酒頓服之立驗無忌

又方

麻人三合熬擣以水研取汁著少鹽喫立効李諫議用有効

嘔逆不下食方八首

廣濟療嘔逆不多能食方

訶梨勒三兩去核熬

右一味擣爲散蜜和丸空腹服二十丸日二服以知爲度利多減無所忌

又療嘔逆不下食腹中氣豆蔻子湯方

豆蔻子七枚碎　生薑五兩　人參一兩

甘草一兩炙

右四味切以水四升煮取一升五合去滓分溫二服相去如人行五六里進一服內消忌海藻菘菜

又療兩脅下妨嘔逆不下食柴胡湯方

柴胡八分　茯苓八分　橘皮六分

人參六分　厚朴八分炙　桔梗六分

紫蘇五分　生薑十六分　訶梨勒七枚去核熬

甘草五分炙

右十味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜醋物豬肉等

又療患身體煩疼頭痛喫食嘔逆不得食柴胡湯方

柴胡十分　茯苓八分　枳實八分炙

白朮八分　生薑八分皮切八合　麥門冬八分去心

甘草六分炙

右七味切以水六升煑取二升三合絞去滓分溫三服每服相去如人行六七里進一服內消不利忌海藻菘菜酢物桃李雀肉熱麪炙肉油膩

又療虛熱嘔逆不下食食則煩悶地黃飲子方

生地黃汁六合　蘆根一握　生麥門冬一升去心

人參八分　白蜜三合　橘皮六分

生薑八分一方云生薑汁一合

右七味切以水六升煑取二升去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里進一服不利忌蕪荑生冷麪炙肉蕎麪猪肉蒜粘食

又療煩熱嘔逆不下食食則吐出麥門冬湯方

生麥門冬三兩去心　青竹茹二兩

茅根五兩　甘草一兩炙　生薑五兩

人參一兩

右六味切以水七升煑取二升五合去滓分温三服如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜並出第一卷中

備急療吐逆水米不下乾薑甘草湯方

乾薑二分炮　甘草一分炙

右二味切以水二合煎取一合去滓頓服則定少間與粥則不嘔神驗忌海藻菘菜張文仲同出第三卷中

延年人參飲主嘔不能食方

人參八分　厚朴六分炙　橘皮六分

白朮八分　生薑八分

右五味切以水四大升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉等蔣孝璋處出第六卷中

許仁則療嘔吐方四首

許仁則療嘔吐病有兩種一者積熱在胃嘔逆不下食一者積冷在胃亦嘔逆不下食二事正反須細察之必其食飲寢處將息傷熱又素無冷疹年壯力强膚肉充滿此則是積熱在胃致此嘔逆如將息食飲寢處不熱又素有冷病年衰力弱膚肉瘦悴此則積冷在胃生此嘔逆若是積冷嘔逆經久急須救之不爾甚成反胃病積熱在胃嘔逆不下食宜合生蘆根五味飲服方

生蘆根切一升　生麥門冬一升去心　青竹茹一升

生薑汁五合　茯苓五兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓加竹瀝六大合攪調分

三服相去如人行十里久始服一劑得可欲重合服亦佳忌醋物

又依前生蘆根等五味飲服之雖可然未能全除者宜合茯苓等五味丸服之方

茯苓（五兩） 人參（三兩） 麥門冬（一升去心）

生薑（屑六兩） 青竹茹（一升）

右藥擣篩蜜和爲丸煎蘆根飲下之初服十五丸日二服稍稍加至三十丸丸如梧子大忌醋物

又積冷在胃嘔逆不下食宜合半夏等二味丸服之方

半夏（一升真熊州者洗去滑） 小麥麪（一升）

右擣半夏爲散以水溲麪丸如彈子大以水煑令麪熟則是藥成初吞四五丸日二服稍稍加至十四五丸旋煑旋服服此覺病減欲更重合服亦佳忌羊肉餳救急同

又依前半夏等二味丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸又慮毒藥不可以服欲不服藥又恐病滋蔓宜合人參等七味丸服之方

人參五兩　白朮五兩　生薑屑八兩

厚朴四兩炙　細辛四兩　橘皮三兩

桂心二兩

右藥擣篩爲末蜜和爲丸如梧子飲下之初服十丸日二服稍稍加至二十丸欲與前半夏丸間服亦得忌桃李雀肉生葱生菜吴昇同並出第一卷中

雜療嘔吐噦方三首

仲景傷寒論夫嘔家有癰膿者不可療也其嘔膿盡自愈若先嘔後渴者爲欲解也先渴後嘔者爲水停在心下此屬飲家

嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲張仲景雜方此證當用小半夏加茯苓湯方在支飲門中

嘔脉弱小便復利身有微熱見厥者難療四逆湯主之方

甘草二兩炙　附子一枚破八片　乾薑一兩半

右三物㕮咀以水三升煮取一升二合去滓溫分再服強人用大附子一枚乾薑三兩忌海藻菘菜猪肉

又嘔心下痞堅者大半夏湯主之方

半夏三升洗全用　人參三兩切　白蜜一升

右三味以泉水一斗二升并蜜和揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升日再服忌羊肉餳本論治反胃支飲

又乾嘔下利黃芩湯主之方

黃芩三兩　人參三兩　桂心二兩

大棗十二枚擘破　半夏半升洗　乾薑三兩強

右六味切以水七升煑取三升溫分三服忌羊肉餳生葱出第十六卷中

噫醋方七首

病源噫醋者由上焦有停淡脾胃有宿冷故不能消穀穀不消脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣息酸臭也出第二十一卷中

廣濟療吐酸水每食則變作醋水吐出檳榔散方

檳榔人十六分　人參六分　茯苓八分

橘皮六分　蓽撥六分

右五味擣篩爲散平晨空腹取生薑五大兩合皮擣絞取汁溫内散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一匕半若利多減以微通泄爲度忌酢物生冷油膩猪魚等

又療常吐酸水脾胃中冷茯苓湯方

茯苓十二分　橘皮十二分　白术八分

人參六分　桂心六分　甘草八分炙
紫蘇十分　生薑十二分　檳榔七枚合皮子碎

右九味切以水九升煮取二升半絞去滓分溫三服每服如人行七八里未好差三兩日更服一劑老小取微利忌生葱酢物桃李雀肉海藻菘菜

又療嘔吐酸水結氣築心白朮散方

白朮八分　茯苓八分　吳茱萸四分
橘皮六分　蓽撥四分　厚朴八分炙
檳榔人十分　人參六分　大黃十分

右九味擣篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕日二服漸加至二匕半覺熱服少飲食三兩口壓之忌酢物桃李雀肉等

又療心頭結氣連胷背痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方

茯苓四兩　厚朴四兩炙　橘皮二兩

白朮二兩 生薑十兩

右五味切以水九升煑取二升七合絞去滓分溫三服每服相去如人行七八里須利加檳榔人末一兩半湯欲熟時內之甚安穩三日服一劑頻服五六劑可則停忌酢物桃李雀肉等並出第一卷中一方有吳茱萸人參各二兩

延年療食訖醋咽多噫吳茱萸湯方

吳茱萸五合 生薑三兩 人參二兩

大棗十二枚破

右四味切以水六升煑取二升絞去滓分爲三服每服相去十里久或中間食時後能服一劑銷淡破冷肘後集驗文仲備急千金並同肘後分兩小別

又增損承氣丸療胸脅支滿背上時有一答熱則痛腹脹多噫醋咽氣逆兩脅滿並主之方

前胡七分　枳實七分炙　桂心五分

乾薑五分　吳茱萸五分　茯苓四分

芍藥六分　厚朴十分炙　橘皮七分

大黃七分　杏人七十枚去雙人皮尖熬令紫色別擣作脂

右十一味擣篩爲末內杏人脂中研調篩度蜜和丸每服食後少時酒飲任性初服七丸如梧子以氣宣下洩爲度忌生葱大醋並出第十七卷中

必効理中散主食後吐酸水食羮粥酪劇方

乾薑二兩　食茱萸二兩

右二味作散酒服方寸匕日三溫服勿冷服之當醋水差干

金同出第二卷中

外臺祕要卷第六

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

外臺祕要方

七

心痛　心腹痛

寒疝

外臺秘要方卷第七 心痛心腹痛及寒疝三十二門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有乆成疹者心爲諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛爲眞心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脉其爲風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死

又心爲火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虚少陰之經氣逆謂之陽虚陰厥亦令心痛其痛引喉是也

又諸藏虚受病氣乗於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰爲脾之經與胃合足陽明爲胃之經氣虚逆乗心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虚而逆逆氣乗心而痛者其狀下重不自收時若泄寒中爲腎心痛也

診其心脉急者爲心痛引背食不下

寸口脉沈緊苦心下有寒時痛

關上脉緊心下苦痛

左手寸口脉沈則爲陰陰絶者無心脉也苦心下毒痛出第十六卷中

備急療心痛方

桂心末温酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服之亦佳文仲集驗肘後同忌生葱出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方

吴茱萸一兩半　乾薑一兩半　桂心一兩　白朮二兩　人參一兩　橘皮一兩　附子一兩半炮　椒一兩去閉口者及目汗　甘草一兩炙　黄芩一兩　當歸一兩細切

右十一味擣篩爲散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至十九十五丸忌猪肉生葱海藻菘菜桃李雀肉等藥盡更合酒飲無在食前後任意出第十五卷中肘後有桔梗一兩

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差肘後同

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効肘

後同出第八卷中

必效療心痛方

當歸末酒服方寸匕頻服備急文仲同

又方

生油半合温服差肘後備急張文仲同並出第五卷中

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連八兩

右一物㕮咀以水七升煑取一升五合絞去滓適寒温飲五合日三忌猪肉冷水肘後范汪同出第八卷中

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胷背撮痛欲變吐當歸鶴蝨散方

當歸八分　鶴蝨六分　橘皮六分　人參六分

檳榔人十二分 枳實六分炙 芍藥六分 桂心五分

右八味擣篩爲散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服漸漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食出第四卷中

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛悉主之幷療冷衝上氣落馬墮車附子丸方

附子一兩炮 巴豆人一兩去心皮熬 人參一兩 生狼毒一兩炙令極香

乾薑一兩 食茱萸一兩

右六味擣末蜜和空腹服如梧子三丸一日一服弱者二丸卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胷痛者亦服之好好將息神効不傳忌野猪肉蘆笋必効經心録同

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮取一升頓

服之並出第十三卷中

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蝨散方

當歸　桔梗　芍藥　橘皮

鶴蝨各八分　人參六分　桂心六分　檳榔人十分

右八味擣篩爲散空腹煑薑棗湯服方寸匕漸漸加至二匕不利忌豬肉生葱油膩小豆粘食等

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢寫著酒中頓服之差無所忌

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方

當歸　橘皮　細辛　甘草炙

生薑各四分　大黃八分別漬　鶴蝨二分

右七味切以水六升煮取二升分温三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之忌海藻菘菜生菜救急同出第四卷中

小品温中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出欲霍亂吐下脉沈細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸　人參　乾薑　茯苓

厚朴炙　青木香　桂心　桔梗

芍藥　甘草炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分温三服日三服不耐青木香者以犀角一兩代之忌海藻菘菜猪肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜瘈瘲如物從後觸其心身傴僂者腎心痛也

厥心痛腹脹滿心痛尤甚者胃心痛也
厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也
厥心痛色蒼蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也千金同
厥心痛卧若從居心間痛動作痛益甚色不變肺心痛也
真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死
心腹中痛發作種聚行來上下痛有休止腹中熱喜涎出是蚘蟲咬也出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作種聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不効有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前小品方中此是增損湯方

芍藥六兩　黃芩四兩　厚朴四兩　桔梗四兩
柴胡四兩　當歸三兩　升麻三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌豬肉出第十三

卷中

張文仲療蛔蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末温酢一盞和服之蟲當出備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再備急同

又方

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲

熱水一升蛔蟲立出必效方去酒下備急同

又方

發時取鹽一匕内口中水下立定蟲即出備急同出

第一卷中

延年療蛔蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和爲丸用蜜漿水平旦服二十丸

日只一服各依前不相妨禁肉若不服則得食古今錄驗

用十兩去韋雲患心痛十年不可過於雜方內見合服之便差

又鶴虱丸療蛔蟲心痛方

鶴虱六兩　吴茱萸五兩　橘皮四兩　桂心三兩

檳榔四兩

右五味擣篩蜜和為丸如梧子大一服二十丸蜜湯下日二服加至三十丸以蟲出為度忌生葱出第十五卷中

救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方

生眞胡麻一合　胡粉半合熬擣

右二味先以猪肉臛一片空腹啖嚥汁勿嚥肉後取胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟酌增減忌生冷猪肉魚雞蒜酢滑等七日若是蛔吐水者是也出第八卷中

必効療蛸於交切作蛕非心痛方

取鰻鱺魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食彌佳

又方

熊膽如大豆和水服大効

又茱萸丸方

吴茱萸一升 桂心二兩 當歸二兩

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三十丸日再服漸加至四十丸以知爲度忌生葱

又丁香散方

丁香七枚 頭髮灰一棗許

右二味並末和酒服之

又鶴蝨檳榔湯方

鶴蝨二兩小兒用一兩 大腹檳榔二七枚切碎皮子

右二味以豬肉汁六升煮檳榔取三升去滓内鶴蝨末先夜不食明旦空腹頓服之須臾病下及吐水永差神効七日禁生

冷酢滑高大處並出第五卷中

冷氣心痛方五首

廣濟主冷氣心痛肋下鳴轉喉中妨食不多消常生食氣每食心頭住不下桔梗散方

桔梗 當歸 芍藥 茯苓

橘皮 厚朴炙 白朮各八分 蓽撥四分

荳蔻子四分 檳榔人六分 桂心六分 訶梨勒皮六分炙

右十二味擣篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服加至一匕半不利忌生葱猪肉酢物桃李雀肉等出第四卷中一方有枳實不用桔梗

深師療胷滿短氣心痛吐虛冷防風茯苓湯方

防風二兩 茯苓二兩 桂心六兩 甘草二兩炙

半夏四兩洗 乾薑四兩炮 人參三兩

右七物切以水一斗煮取三升絞去滓分三服良忌酢物生

葱海藻菘菜羊肉餳出第十六卷中

崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方

烏頭三兩炮 附子三兩炮 赤石脂三兩 蜀椒二兩去目及閉口者汗

桂心二兩 乾薑二兩

右六物擣篩蜜和爲丸痛發時温清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知爲度若早朝服無所覺至午時又服三丸暝又服三丸此方丹陽有隱士出山云得華他法其療略同他云若久心痛每旦服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌生葱豬肉張文仲備急同出第四卷中

延年療冷氣又刺心痛不能食方

當歸 桂心 桔梗 吴茱萸

人參 白朮 高良薑已上各六分 橘皮三分

右八味擣篩爲散蜜和爲丸如梧子大一服十丸酒下日二服加至十五二十丸爲度忌生葱桃李猪肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲齧心痛當歸湯方

當歸三兩 桔梗二兩 吴茱萸三兩 桂心三兩

芍藥二兩 大黃二兩

右六味切以水六升煮取三升三合去滓内鶴蝨一兩攪溫一沸分三服空腹服之微利爲度忌猪肉生葱並出第十五卷中

惡疰心痛方三首

廣濟療惡疰撮肋連心痛當歸湯方

當歸八分 青木香六分 白檳榔十顆碎 麝香一銖研

右四味切以小便一大升半煮取六大合絞去滓下麝香末分溫三服服別如人行四五里進一服微微利忌生菜熱麪猪犬肉粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療疰在心腹痛不可忍方

取東引桃枝削去著皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡則差如不定更依前服之無忌

又療心腹痛不可忍似疰病者或暴得惡疰攪刺欲死桃人大黃湯方

鬼箭羽二兩 桃人六十枚去皮尖兩人 芍藥四兩 鬼臼二兩削去皮

橘皮二兩 當歸二兩 生薑五兩 桂心二兩

柴胡二兩 朱砂一兩研湯成下 麝香一分研湯成下 朴消二兩研湯成下

大黃三兩麤切別浸湯欲熟內之

右十三味切以水九升急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必差忌生葱生血物並出第四卷中

心痛癥塊方二首

廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絶當歸湯方

當歸　桔梗　芍藥各八分　厚朴十分炙

橘皮八分　人參六分　高良薑十分　桃人五十枚去皮尖兩人

生薑八分

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不利忌猪肉生冷油膩雞魚粘食小豆大蒜出第四卷中

張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋柈音盤名爲氣分水飲所結方

枳實七枚炙　白术三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也備急肘後同忌桃李雀肉等出第一卷中此張仲景傷寒論方

心背徹痛方四首

仲景傷寒論心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之方

烏頭一分炮去皮　附子一分炮去皮　赤石脂二分　乾薑二分
蜀椒一分汗
右五味擣篩蜜和丸先食服如麻子大一服三丸少少加之忌猪肉冷水千金必效文仲范汪經心録等同出第十五卷中千金分兩小別

張文仲蜀椒丸療胷中氣滿心痛引背方
蜀椒一升出汗　半夏一升洗　附子一兩炮
右三味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服五丸日三忌猪羊肉餳等出第三卷中

范汪療心下切痛引背胷下畜氣在胃中有宿食茱萸煎方
成擇吳茱萸一升勿㕮咀　蜀椒五升勿㕮咀　甘草二兩炙㕮咀
乾地黄一斤㕮咀
右四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬

五升去心乾漆一斤㕮咀內煎中色黃絞去之內成擇六安石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以湯煎令可丸取如棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服藥溫中下氣稍益體中痾膝脛重痛者加石斛少氣加麥門冬服藥五日愈當下𤸇奉車都尉陳蓋試有驗忌海藻菘菜蕪荑等

又芫花湯主卒心痛連背背痛徹心心腹並懊痛如鬼所刺絞急欲死者方

芫花十分　大黃十分

右二味擣下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈老小從少起此療強實人良若虛冷心痛恐未必可服並出第十八卷中

卒心痛方一十四首

肘後療卒心痛方

先煑三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用水鹽或半升服之古今録驗同

又方

吳茱萸二升 生薑四兩切 豉一升 酒六升

右四味煑取二升半分三服

又方

白艾成熟者三升以水三升煑取一升去滓頓服之若爲客氣所中者當吐蟲物出范汪同

又方

取竈下熱灰篩去炭分以布囊盛令灼灼爾更番以熨痛上冷者更熬令熱

又桂心散方

桂心 當歸各一兩 梔子人十四枚

右三味擣爲散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發作有時節者忌生葱

又桂心丸方

桂心一兩　烏頭一兩炮

右二味擣篩蜜和爲丸如梧子服三丸稍增之忌生葱猪肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方

苦參二兩　龍膽二兩　升麻三兩　梔子人三兩擘

右四味切苦酒五升煮取一升分二服當大吐乃差並出第一卷中

集驗卒心痛桂心湯方

桂心八兩

右一味以水四升煮取一升半分二服肘後范汪千金同忌生葱出第一卷中

張文仲療卒心痛方

取敗布裹鹽如彈子燒令赤末以酒一柸和服之肘後備急同出第五卷中

又方

閉氣忍之數十過并以手大指桉心下宛宛中取差肘後備急同

又方

苦酒一升破雞子一枚著中合攪飲之好酒亦佳肘後備急范汪同

又方

蒸大豆若煑之以囊盛更番熨心上冷復易之肘後同並出第十卷中

救急療卒心痛不能起止方

井華水一大升　蜜半合

右二味相和婦人患令男度與飲男夫患令婦人度與飲必愈出第八卷中

必効療卒心痛人參湯方

人參　桂心　梔子擘　黃芩

甘草各一兩炙

右五味切以水六升煑取二升分三服則愈奇効忌海藻菘菜生葱肘後同出第五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絶瓜蔕散方

雄黃四兩研　赤小豆四分熬　瓜蔕三分

右三味擣篩爲散空肚温漿水服一錢匕半當吐止不吐加至兩錢匕忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香一分研 生犀角二分屑 青木香二分

右三味擣篩爲散空肚以熟水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方

大黃四兩 芍藥四兩 升麻三兩 黃芩三兩

鬼箭三兩 鬼臼二兩 桂心二兩 桔梗三兩

柴胡四兩 朱砂二兩別研 朴消二兩

右十一味切以水九升煑取二升七合分三服先分朱砂作三分一服內一分攪朱砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌猪肉生葱生血物千金同千金去寒氣卒客於五藏六腑中則發心痛方

又方

赤芍藥六兩 桔梗五兩 杏人五兩去尖皮兩人碎

右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌猪肉千金

同出第一卷中

千金療卒中惡心痛方

苦參（三兩切） 好驗醋（一升半）

右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服出第十

三卷中

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所為

也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸心之腑也其水氣下

行於小腸為溲便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱

為腎之腑主藏津液腎之液上為唾腎氣下通於陰若腑藏和

平則水液下流宣利若冷熱相乘致腑藏不調津液水飲停積

上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也出第十六卷中

范汪療胷中寒熱心痛淸唾滿口數數欲吐食不化乾薑丸方

乾薑一分 桂心一分 礬石一分熬令汁盡 半夏一分湯洗

蜀椒一分去閉口者及目汗

右五味擣篩蜜和丸如大豆許服二丸日三不知稍加以知爲度忌生葱羊肉餳出第十八卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方

取六畜心隨得生切作四臠刀縱橫各一割破之内少眞朱砂著中平旦呑之蟲死愈矣無眞朱砂可用雄黄麝香也肘後經心録同出第一卷中肘後云切作十四臠刀縱横各割之以眞丹一兩粉内割中旦悉呑之入雄黄麝香作

心下懸急懊痛方四首

病源心與小腸合爲表裏俱象於火而火爲陽氣也心爲諸藏主故正經不受邪若爲邪所傷而痛則死若支別絡爲風邪所乘

而痛則經久成疢其痛懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢擁
瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也出第十六卷中
仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂心生薑枳實湯主之方
桂心三兩 生薑三兩 枳實五枚炙破四片
右三味切以水六升煑取三升去滓溫分三服忌生葱范汪
同出第十五卷中
肘後薑附丸方
附子二兩炮 乾薑一兩
右二味擣篩蜜和丸如梧子服四丸酒飲並得日三服忌猪
肉冷水出第一卷中本方去治心肺傷動冷痛
古今録驗療人心痛懊憹悁悶築築引兩乳互或如刺困極桂
心湯方
桂心半兩 茱萸二兩 芍藥三兩 當歸二兩

生薑半斤無生薑以乾薑五兩代之

右五味切以水一斗二升煑取四升服一升晝三夜一良有驗忌生葱出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心二兩　膠飴半斤　生薑二兩

右藥切以水四升煑二味取三升去滓内飴分三服忌生葱出第十三卷中

心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在内客於脾而乗心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乗於心陰陽相乗冷熱相擊故令痛也脾主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心爲火脾爲土是母子也俱爲邪所乗故痛復不能飲食也出第十六卷中

廣濟療乂心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方

高良薑十分 當歸十分 橘皮八分 厚朴十分炙

桔梗八分 桃人五十枚去尖皮兩人碎 吴茱萸八分

生薑八分 訶梨勒五分

右九味切以水八升煑取二升八合絞去滓分温三服服别相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食小豆等出第四卷中

肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方

烏頭六分炮 椒六分汗 乾薑四分 桂心四分

右四味擣末蜜丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱出第一卷中

久心痛方六首

病源心爲諸藏主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕死夕發朝死不暇展療其人心痛者是心之支别絡爲風邪冷熱所

乗痛也故成疢不死發作有時經久不差也出第十六卷中

廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴蝨散方

雷丸八分　鶴蝨八分　貫衆八分　狼牙八分

桂心八分　當歸八分　檳榔人八分

右七味擣篩爲散空腹煑蜜水半雞子許服方寸匕日二服若重不過三服則差不利忌生葱生冷油膩猪魚小豆大蒜等出第四卷中

范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方

赤石脂　乾薑　桂心　椒汗去閉口者及目

烏頭炮

右五味等分末之蜜和丸如梧子服三丸日三以知爲度赤石脂當取斑斑赤中者忌猪肉冷水生葱出第十八卷中

必効療三十年心痛方

桃人七枚去皮尖兩人熬

右一味研湯水合頓服酒服亦良肘後經心錄同出第五卷中

古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄立言爲處犀角丸服之數日則差方

犀角二分屑　麝香二分碎　朱砂四分光明者研　桔梗二分

莽草二分炙　鬼臼二分　附子二分炮　桂心二分

貝齒五枚　甘草六分　芫花二分熬　巴豆二十枚去心皮

赤足蜈蚣二枚去足炙

右十三味擣篩蜜和丸如梧子飲服一丸日一漸加至三丸以利爲度忌生葱猪肉野猪肉蘆笋生血物出第八卷中

一方無附子千金有雄黃二分

療心痛如蟲齧痛宛轉欲不救方

又濃擣地黃汁和麪作冷淘不用鹽服一頓蟲即出
不出再服必出便差正元十年通事舍人崔抗女患
心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸以
來狀如蝦蟇無目足微似有口蓋被此物所蝕抗云往
年見親表患心痛因偶食地黃餠餤遂吐一蟲猶動
其時亦不謂地黃冷淘能害此蟲因盛於小竹筒正
食緣其上便以數莖地黃冷淘投於竹筒中須臾覩
之已化爲水然覺此冷淘殺蟲心痛無不永絕絳自
得此方救三四人皆如神効出手抄方

經心録療四十年心痛不差方

黍米瀋汁温服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首

廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入桃人

丸方

桃人八分去皮尖兩人熬　當歸六分　芎藭八分　訶梨勒六分

甘草六分炙　延胡索四分　人參六分　檳榔人十四枚

右八味擣篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十丸漸加至三十丸日再服取快利忌海藻菘菜生菜熱麪蕎麥猪犬肉粘食出第四卷中

古今録驗眞心痛論手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死療心痛痛及已死方

高其枕柱其膝欲令腹皮虛柔灸其臍上三寸胃管有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差緩者止出第八卷中

救急療心痛冷熱方

取伏龍肝末煑水服方寸匕若冷以酒和服差范汪

經心録同出第八卷中

腹痛方四首

病源腹痛者由腑藏虚寒冷之氣客於腸胃募原之間結聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也診其寸口脉沈而緊則腹痛尺脉緊臍下痛脉沈遲腹痛脉來觸觸者少腹痛脉陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有病其脉當沈若細而反浮大故當愈矣其人不即愈者必當死以其病與脉相反故也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云股脛手臂痛法屈一脛臂中所痛者正偃卧口鼻閉氣腹痛以意推之想氣往至痛止俱熱即愈又云偃卧展兩脛兩手仰足指以鼻内氣自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口内氣鼻出之除裏急飽咽氣數十令温中寒乾吐嘔腹痛口内氣七十

所大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹令氣下出第十六卷中

張文仲當歸大黃湯療冷氣牽引腰背肋下腹內痛方

當歸三兩 芍藥八分 桂心三分 乾薑六分

茱萸五分 人參一兩 大黃一兩 甘草二兩炙

右八味切以水六升煑取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生葱出第三卷中

范汪四味當歸湯主寒腹痛方

當歸 桂心 乾薑各三兩 甘草二兩炙

右切以水八升煑取三升一服一升日三服虛冷激痛甚者加黃耆芍藥各二兩忌海藻菘菜生葱出第十五卷中千金無甘草有附子一兩

小品療寒冷腹痛茱萸湯方

吴茱萸二兩 甘草炙 人參 桂心各一兩

生薑五兩 半夏一升洗 小麥一升 當歸二兩

右八味切以水一斗五升煑取三升分温服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第一卷中千金桂二兩生薑切一升

古今録驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭 當歸 桂心 芍藥

甘草各一兩炙 黄芩半兩 乾薑半兩 杏人三十枚去皮尖兩人熬

右八味切以水五升煑取二升分再服忌海藻菘菜生葱出第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方

粳米二升

右一味以水六升煑取六七沸飲之

又方

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之差並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱膝便腹皮踧氣入胷令人爪其齊上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌佳亦療心痛肘後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使火俱下良備急肘後同並出第一卷中

千金療胷腹中卒痛生薑湯方

生薑一斤擣取汁 食蜜八兩 醍醐四兩

右三味微火上耗令相得適寒溫服三合日三出第十六卷中

集驗療卒腹痛葛氏方

桂末三匕酒服人參上好乾薑亦佳忌生葱肘後文仲同

又方

食鹽一大把多飲水送取吐肘後張文仲同並出第一卷中

心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由腑藏虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息診其脉左手寸口人迎以前脉手少陰經也沉者爲陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脉細小者生大堅疾者死心腹痛脉沉細小者生浮大而疾者死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清靜以雞鳴安身卧漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生療心腹痛出第十六卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方

桔梗　茯苓各八分　枳實炙　人參

厚朴炙　芍藥　橘皮各六分　桂心五分

檳榔人八分　麥門冬去心八分

右十味擣篩爲散空肚煮薑棗飲服方寸匕日三服漸加至一匕半熱以茶飲下不利忌猪肉酢物生葱生冷油膩小豆粘食熱麪炙肉等物

又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方

當歸　茯苓　桔梗　橘皮

高良薑　檳榔人各八分　生薑八分

右七味細切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別根去如人行六七里服訖利三兩行宜停後服忌猪肉酢物生冷油膩魚蒜粘食小豆並出第十五卷中

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絶方

梔子十四枚擘 豉七合綿裹

右二味以水二升先煑豉取一升二合去滓內梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之備急文仲同

又方

烏梅二七枚水五升煑一沸內青大錢二七文煑取一升半強人可頓服羸人分再服當下愈文仲同

又方

茱萸二兩 生薑四兩切 豉三合綿裹

右三味酒四升煑取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方

狼毒二兩炙 附子半兩炮

右二味擣篩蜜和丸服如梧子一日服一丸二日二丸三日三

丸再一丸至六日服三丸自一至三以爲常服即差當避食忌猪肉冷水

又方

吴茱萸一合 乾薑四分 附子二分炮 細辛二分

人參二分

右五味擣末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日三忌猪肉生菜等並出第一卷中

深師療久寒冷胷膈滿心腹撮痛不能食惄乏吸吸不足前胡湯方

前胡一兩 羊脂二兩 大棗二十枚擘 當歸一兩

茯苓一兩 白朮一兩 芍藥六分 桂心一兩

半夏二兩洗 乾薑一兩 麥門冬六分去心 吴茱萸三百粒

右十二味切以水八升煮取三升分三服相去如人行十里進一

服忌酢物生葱羊肉餳桃李雀肉等出第十六卷中

小品當歸湯療心腹㽲痛諸虛冷氣滿方

當歸三兩 乾薑四兩 甘草二兩炙 芍藥三兩

厚朴三兩炙 黃耆二兩 蜀椒一兩汗 半夏三兩洗

肉桂三兩 人參三兩

右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升羸人服八合大冷者加附子一枚炮忌海藻菘菜羊肉餳生葱古今録驗千金同

古今録驗通命丸療心腹積聚寒中㽲痛又心迫滿脅下急繞臍痛方

大黃 遠志去心 黃芩 麻黃去節

甘草炙已上各四兩 芒消三兩 杏人六十枚去尖兩人熬 豉二合熬

巴豆五十枚去心皮熬別爲脂

右九味擣合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服三九日三忌
野猪肉蘆笋海藻菘菜出第八卷中

心腹脹滿及鼓脹方一十四首

病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於足小指之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出絡於心藏虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚在內氣并於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而滑者脹滿也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云伸右脛屈左膝內壓之五息引脾去心腹寒熱胷膈邪脹依經為之引脾中熱氣出去心腹中寒熱胷臆中邪氣脹滿久行之無有寒熱時節之所中傷名為眞人之方出第十六卷中

廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方

芍藥　當歸　白朮　鼈甲炙各八分

訶梨勒十顆去核熬　乾薑　人參各六分　豆蔻

雄雀屎各四分　郁李人十分去皮

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十丸漸加至三十丸日再服不吐不利忌生菜熱麪人莧桃李雀肉蒜粘食等物

又療鼓脹氣急衝心硬鼈甲丸方

鼈甲炙　芍藥　枳實炙　人參

檳榔各八分　訶梨勒　大黃各六分　桂心四分

橘皮四分

右九味擣篩爲末蜜和爲丸空肚以酒服如梧子大二十丸漸加至三十丸日二服微利爲度忌生葱莧菜炙肉蒜麪等

又療鼓脹氣急通草湯方

通草　茯苓　玄參　桑白皮
白薇　澤瀉各三兩　人參二兩　郁李人五兩
澤漆葉切一升
右九味切以水一斗煮取三升去滓分溫四服服別相去如人行六七里進一服不利忌熱麪油膩酢粘食等
又療鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仍下赤黑血汁日夜不停者茯苓湯方
茯苓二兩　防己一兩半　橘皮一兩　玄參一兩
黃芩一兩半　澤瀉一兩半　杏人二兩半去尖皮兩人熬　白朮一兩半
大豆一升半　郁李人二兩半　桑白皮二兩半　澤漆葉切一升
猪苓一兩半
右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五升去滓澄去下淀內諸藥煎取二升絞去滓分三服欬者加五

味子二兩停二日服一劑忌酢物桃李雀肉熱麪蒜炙肉粘
食油膩等（茯苓一云茯神 防巳一云防風）

又療患久心痛腹滿升淡飲不下食人參丸方

人參　白朮　枳實（各六分）　茯苓（八分）
厚朴（六分炙）　青木香（六分）　橘皮（五分）　大黃（六分）
檳榔人（六分）

右九味擣篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十丸日二服漸加至三十丸不利忌酢物桃李雀肉等

又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方

柴胡　厚朴（炙各十分）　茯苓　橘皮
紫蘇（各八分）　生薑（十二分）　檳榔人（五分末）

右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物生冷油膩粘食

又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不得

郁李人丸方

郁李人八分　牽牛子六分熬　甘遂四分熬　防葵三分

菴䕡子　桑白皮　檳榔人各四分　橘皮

澤瀉各二分　茯苓　澤漆葉炙　杏人去尖兩人熬各三分

右十二味擣篩蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服服別一丸微利爲度忌酢物生冷油膩熱麪炙肉蒜等

又療患氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方

紫蘇一握　訶梨勒皮　當歸　生薑各八分

人參六分　檳榔子十顆合碎　生地黃汁半升

右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黃汁分溫三服服別如人行四五里溫進一服利三兩行忌蕪荑生菜熱麪炙肉魚蒜粘食陳臭等並出第二卷中

深師療腹脹滿彭彭逆害飲食煩熱不得卧流汗厚朴湯方

厚朴炙　桂心　芍藥　半夏洗各三兩

枳實三枚炙　甘草二兩炙　麥門冬四兩去心　黄芩一兩

乾薑二兩

右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三小便難加朮三兩人參四兩忌生葱海藻菘菜羊肉餳出第十六卷中

千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方

厚朴半斤炙　甘草炙　大黄各三兩　大棗十枚擘

枳實五枚大者四破炙　桂心二兩　乾薑五兩

右切以水一斗煮取五升去滓内大黄取四升服八合日三嘔者加半夏五合利者去大黄寒加生薑至半斤忌海藻菘菜生葱羊肉餳出第十六卷中此本仲景傷寒論方

集驗療胷滿有氣心腹脹中冷半夏湯方

半夏一升洗 桂心四兩 生薑八兩切

右三味切以水七升煑取二升絞去滓適寒温飲七合忌羊肉餳生葱等出第六卷中

古今録驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆頭痛手足煩疼此方出太醫熟藥常用芫花丸方

芫花一兩熬 大黄 葶藶子熬 甘遂

黄芩各二兩 巴豆四十枚去心皮熬別研 消石一兩

右七味擣合蜜和丸如梧子先食服三丸日再服一方無消石忌野猪肉蘆笋等出第十卷中

必効青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方

青木香六分 檳榔人六分 大黄十二分 芍藥五分

訶梨勒五分 枳實五分炙 桂心四分

右七味擣篩蜜和丸如梧子飲服十五丸左側漸漸常加以
利爲度不限丸多少不利者乃至五十六十丸亦得韓同
頻服大効古今常用忌生葱
又療腹脹滿堅如石積年不損者方
取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黄酒五
升淋訖則以絹袋盛滓還内酒中蜜封再宿每服一
合日三並出第二卷中
卒心腹脹滿方六首
肘後療卒心腹煩滿方
剉薏苡根濃煮取汁服三升
又方
黄芩一兩　杏人二十枚去尖皮兩人熬　牡蠣一兩熬
右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方

灸兩手大拇指内邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指爪下一壯愈附後此方本治卒吐逆

此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之例兼宜依霍亂條中法療之人平居有患者亦少皆因他病兼爲之耳或從傷寒後未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源爲療不得專用此法也並出第一卷中

備急療卒心腹脹滿又胷脅痛欲死方

熱煑湯令灼灼爾以漬手足冷則易秘之肘後張文仲同

又桂心散方

枳實炙 桂心

右二味等分下篩以米汁服一匕忌生葱肘後張文仲同並

出第一卷中

救急療卒患心腹脹滿刺痛方

生薑大有功能遠行宜將自隨煮汁服良患久痢虛損嘔逆不下食見食則吐取三兩細切擣絞取汁微煖點少多蜜頓一服則下食大効出第七卷中

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切痛胷脅逆滿附子粳米湯方

附子（一枚炮八破） 半夏（半升洗去滑） 甘草（一兩炙） 大棗（十枚擘）

粳米（半升）

右五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓適寒溫飲一升日三仲景傷寒論同集驗加乾薑二兩忌海藻菘菜猪羊肉餳出第十五卷中

延年療患腹內氣脹雷鳴胷背痛方

丹參　枳實炙各三兩　桔梗　白朮
芍藥各二兩　生薑四兩　檳榔人七枚
右七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌猪肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等出第十五卷中
又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方
丹參　茯苓各三兩　桔梗二兩　生薑四兩
細辛　厚朴炙　食茱萸各二兩
右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每服如人行七八里忌生菜猪肉酢物出第四卷中
腹内諸氣及脹不下食方一十一首
廣濟療腹内諸氣脹滿昆布散方
昆布　海藻　人參　玄參
橘皮　升麻各三兩　芎藭　桂心

乾薑各二兩　小麥一升大醋一升半漬之一宿出暴醋盡止

右十味擣篩爲散別擣小麥作散合藥散一處更擣千杵酒服方寸匕日三服漸加至二匕不利忌熱麪炙肉生葱蒜粘食等物

又療冷氣薏苡人飯粥方

細伐薏苡人炊爲飯氣味欲匀如麥飯煑粥亦好豉漿粥並任意無所忌

又療氣蘇子粥方

蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著葱豉薑並得無所忌

又療氣膀胱急妨宜下氣方

蕪荑擣和食鹽末令調以綿裹如棗大内下部乆時或下惡汁并下氣佳無所忌

又療氣昆布臛法

高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一斗煑令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更合熟煑令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大効無所忌

又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

檳榔十顆合子碎 生薑 青木香各三兩 橘皮

枳實炙 甘草炙 大黃各二兩

右七味切以水六升煑取二升半絞去滓分溫三服服別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜等

又療一切氣妨悶不能食檳榔丸方

檳榔七箇 芍藥五分 枳實七枚炙 人參五分

大黃十六分　青木香六分　桂心四分

右七味擣篩蜜和丸空腹服如梧子二十丸日再服漸加至二十五丸微溏爲度忌生菜熱麪豕肉蒜粘食生葱等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹温服三合日二服漸漸加之以知爲度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹烏牛尿方

取烏牛尿空心温服一小升日一服氣散則止無所忌並出第二卷中

近効燒鹽通一切氣尤療風方

取鹽花以生麻油和之以濕布一片急裹以繩子繫如打牆鎚許大置瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖

更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰収取鹽擣破如患心腹脹滿氣隔不通取碁子大含嚥之立差如煮訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病韋特進用之極効驗

又訶梨勒丸療氣脹不下食尤除惡氣方

訶梨勒　青木香

右二味等分擣篩融沙糖和衆手一時捻爲丸隨意服之氣甚者每服八十丸日再稍輕者每服四五十丸則得性熱者以生牛乳下性冷者以酒下不問食之前後禮部蕭郎中處得云自服大効

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療臚脹脅腹滿法

灸膈俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿水腫法

灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿雷鳴酒沸法

灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半翼同

又療脹滿氣聚寒冷法

灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之翼同

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法

灸中守百壯穴在齊上一寸一名水分翼同

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法

灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針翼同

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法

灸膀胱募百壯穴在中極齊下四寸翼同

又療脹滿腎冷瘕聚泄痢法

又療冷脹胷滿心腹積聚疞痛法

灸天樞百壯翼同（銅人經天樞二穴俠臍二寸）

灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半翼同

又療五藏六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法

灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半翼同並出第十六卷中

又療結氣法

扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名闕俞主胷中膈氣灸隨年壯

又主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法

灸太倉穴一名胃募在心下四寸胃管下一寸灸百壯

又主結氣囊裹針藥所不及法

灸肓募二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下行度頭是灸隨年壯銅人腧穴依法量度乃得日月膽募之穴然主療差別肝募期門穴在此穴上五分然主療與此頗同

又凡臍下㧾痛流入陰中發作無時此冷氣療之法

灸臍下三寸名關元百壯

又療短氣不語法

灸肘後兩筋間名天井百壯

又方

灸大椎隨年壯

又方

灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方

灸肝俞第九椎百壯

又方

灸尺澤百壯

又方

灸手十指頭各十壯

又方

灸小指第四指間交脉上七壯

又少年房室多短氣者法

灸鳩尾頭五十壯並出第十七卷中

胷脅痛及妨悶方四首

病源胷脅痛者由膽與肝及腎之支脉虛爲寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脉從目兊貫眥下行至胷循脅裏足厥陰肝之經也其支脉起足大指聚毛上循入腹貫膈布脅肋足少陰腎之經也其支脉起肺出絡心注胷中此三經之支脉並循行胷脅邪氣乘於胷脅故傷其經脉邪氣之與正氣交擊故令胷脅相引而急痛也診其寸口脉弦而滑弦則爲痛滑則爲實痛則爲急實則爲躍弦滑相搏則胷脅搶息痛也

又卒苦煩滿又胷脅痛欲死候此由手少陽之絡脉虛爲風邪所乘故也手少陽之脉起小指次指之端上循入缺盆布膻中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胷或下引於脅故煩滿而又胷脅也若經久邪氣留

連搏於藏則成積搏於腑則成聚也並出第十六卷中

廣濟療氣結築心脅脅悶痛不能喫食訶梨勒散方

訶梨勒四顆炮去核　人參二分

右二味擣篩爲散以牛乳二升煑三四沸頓服之分爲二服亦得如人行三二里進一服無所忌

又療脅肋下利腹中脹氣急妨悶半夏湯方

半夏一升洗去滑　生薑一斤合皮切　桂心六兩　檳榔人二兩末

右四味細切以水八升煑取二升四合絞去滓分溫五服服別相去如人行六七里進一服快利爲度忌羊肉餳生葱油膩小品有吳茱萸三十顆無檳榔人餘並同

又療脅肋妨胃中客氣大便苦難大黃丸方

大黃十二分　厚朴四分炙　枳實四分炙　芒消八分

杏人六分去皮尖兩人熬　葶藶子四分熬

右六味擣篩蜜和丸空腹以飲服如梧子十丸日二服稍稍
加以大便微調爲度忌生冷油膩粘食出第二卷中
千金療冷氣脅下往來背膈痛引脅背悶當歸湯方
當歸　芍藥　吴茱萸　桂心
人參　大黄　甘草各二兩　茯苓
枳實各一兩　乾薑三兩
右十味細切以水八升煑取二升半一服八合日三服治尸
注亦佳忌海藻菘菜生葱酢物等出第十六卷中
脅肋痛方二首
小品療脅下偏痛發熱其脉緊弦此寒也當以溫藥下之大
黄附子湯方
大黄三兩　附子三枚炮　細辛二兩
右三味切以水五升煑取二升分三服若強盛人煑取三升

半分爲三服服別如人行四五里進一服仲景同忌豬肉冷水生菜等

又半夏茯苓湯療胷膈心腹中淡水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故也其脉喜沉弦細遲悉主之方

半夏五兩洗 生薑五兩 茯苓三兩 旋復花一兩

陳橘皮 人參 桔梗 芍藥

甘草炙各二兩 桂心三兩

右十味切以水九升煑取三升分三服欲得利者加大黃須微調者用乾地黃病有先時喜水下者加白朮三兩除旋復花去下便調差也宜加大黃及乾地黃者並用三兩足也忌羊肉餳酢物生葱豬肉海藻菘菜集驗同出第一卷中

胷膈氣方三首

廣濟療胷膈氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方

枳實六分　犀角四分　前胡四分　青木香八分

麥門冬八分去心　赤茯苓八分　苦參六分　芍藥六分

右八味擣篩爲末蜜和丸如梧子以飲空腹下二十丸漸加至三十丸日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉酢蒜

又療胷膈滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方

柴胡六分　當歸六分　青木香六分　犀角六分屑

檳榔十箇和子碎　甘草二分炙

右六味切以水七升煑取二升半絞去滓內麝香末入分溫三服如人行四五里微利爲度忌海藻菘菜生菜熱麪蕎麥猪魚蒜

又療胷膈間伏氣不下食臍下滿柴胡湯方

柴胡三兩　枳實三兩　生薑三兩　白朮三兩

甘草炙一兩 檳榔七箇合子破

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫三服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻菘菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十三首

病源疝者痛也此由陰氣積於內寒氣結搏而不散腑藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒疝腹痛也出第二十卷中

廣濟療丈夫虛勞寒疝腹痛幷主產後方

生乾地黃三兩 甘草炙二兩 茯苓二兩 人參二兩

當歸二兩 大棗十四枚擘 白羊肉去脂三斤

右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸藥煮取五升內葱白一把煮取四升絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里後藥消進少食食消服藥忌蕪荑海藻菘菜

酢物餘無忌出第四卷中

仲景傷寒論寒疝遶臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若脉沉弦者二物大烏頭煎主之方

大烏頭十五枚炮不㕮咀　白蜜二斤

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服日止一服不可再也忌猪肉冷水千金同

又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不能治者抵党烏頭桂枝湯主之方

秋烏頭實中大者十枚去皮生用一方五枚　白蜜二斤一方一斤　桂心四兩

右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如醉狀得吐者

爲中病也忌豬肉冷水生葱等范汪方云

桂心三兩 芍藥三兩 甘草二兩炙 生薑三兩切

大棗十二枚擘

右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和前烏頭蜜令得一升餘並同前法服仲景傷寒論千金同

又療寒疝腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方

當歸三兩 生薑五兩 肥羊肉一斤去脂

右三味切以水一斗合煮取三升去滓温服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而嘔者加橘皮二兩朮一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前經心録范汪同無忌

又療寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方

柴胡四兩 大棗六枚擘 黃芩一兩半 人參一兩半

甘草一兩炙 半夏二合半洗 桂心 生薑各一兩半

芍藥一兩半

右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服本云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩復如柴胡法今著人參作半劑忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十五卷中

小品寒疝氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味湯主之方

當歸 生薑 芍藥各三兩 羊肉三斤

右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有効古今錄驗經心錄范汪同出第一卷中

集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方

桂心四兩 生薑三兩 吳茱萸二兩

右三味切以酒一大升煎至三合去滓分温三服如人行六七里一服忌生葱

又療寒疝下牽少腹痛附子丸方

附子二兩炮去皮　桃人三兩去皮尖兩人熬　蒺藜子一升去角尖熬

右三味擣篩末蜜和丸梧子大空腹酒下十丸漸加至十五丸及二十丸日再服忌生菜熱麪炙肉笋蒜豬魚出第六卷中

又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等香豉丸方

香美爛豉暴乾微熬令香即止

小芥子揀去土石微熬令赤即止各一升

右二味擣篩蜜和丸空腹酒服二十丸漸加至三十丸日二服初服半劑以來腹中微絞痛勿怪之是此藥攻病之候

又療疝瘕冷氣方

採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日兩服漸加至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝胸脅支滿食飲不化寒中腹痛及嘔痢風痙臍項強急不得俛仰方

桂心五分　茱萸三兩　白薇一分　乾薑四分

烏頭二分炮　椒五分熬汗　芎藭四分　防葵二分

白芷三分

右九味末之合蜜和為丸如梧子先食服一丸日三不知稍稍增之以腹中溫身中憹憹為度忌生葱猪肉冷水范汪等同出第八卷中（方中無瓜子未詳方名）

寒疝心痛方三首

病源夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故令心痛也出第二十卷中

范汪大茱萸丸療心腹寒疝胷中有逆氣時上搶心痛煩滿不得卧面目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食而嘔變發寒熱方

吴茱萸半升 細辛 芍藥 柴胡一方用前胡

旋復花 黄芩 紫菀 人參

白朮 茯苓 乾薑 桂心

附子炮 甘草炙 半夏洗 當歸各半兩

右十六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日三不知稍加忌生葱羊肉餳酢物桃李雀肉猪肉生菜海藻菘菜此更無所忌深師同出第十四卷中一方有蜀椒無桂心又一方有乾地黄無黄芩

小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺繞齊腹中盡痛白汗出欲絶方

蜀椒二百枚汗 附子一枚炮 粳米半升 乾薑半兩

半夏十二枚洗 大棗二十枚擘 甘草一兩炙

右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更服一升數用療心腹痛栲徼困急欲死解結逐寒上下痛良忌猪羊肉餳海藻菘菜肘後古今録驗范汪方無甘草餘同經心録同出第一卷中

古今録驗療心痛寒疝牡丹丸方

牡丹去心　桂心各二兩　烏頭炮二枚

右三味末之合蜜和爲丸如大豆旦起未食服三丸日二不知稍增之藥少急寧少服并治遁尸發動無烏頭附子亦可用炮之忌胡荽猪肉冷水生葱等出第八卷中

卒疝方三首

集驗療卒疝暴痛方

灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上出第六卷中

文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方

擣沙參下篩酒服方寸匕立愈肘後備急同
又若不差服諸利丸下之走馬湯亦佳此名寒疝亦名陰疝張
仲景飛尸走馬湯方
巴豆二枚去心皮熬　杏人一枚去心皮
右二味取綿纏搥令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾
差未差更一服老小量之通療鬼擊有尸疹者常畜此藥用
驗忌野猪肉蘆笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝胕疝狼疝也厥
逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也腹中氣乍滿心下盡
痛氣積如臂名曰癥疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝
也腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍傍名曰盤疝
也腹中齊下有積聚名曰胕疝也少腹與陰相引而痛大便難

名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒温不調之所生也

出第二十卷中

文仲小器七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背膂名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悪主之方臣等看詳七疝已載前序

椒四分汗　桔梗　芍藥　乾薑

厚朴炙　細辛　附子炮各二分　烏頭一分炮

右八味末之蜜和丸服如大豆三丸加至七八丸日三服忌猪肉冷水生菜出第一卷中

古今録驗七疝丸療疝諸寒臍傍痛上叉脅中滿少氣太醫丞樊之方

蜀椒汗五分　乾薑　厚朴炙　黃芩
細辛　芍藥　桂心各四分　桔梗二分
烏喙炮一分　柴胡一分　茯苓一分　牡丹皮一分
右十二味擣篩蜜和丸梧子大先餔以酒服七丸日三不知漸
加以知爲度忌猪肉冷水生葱生菜酢物胡荽范汪同出第十卷中

集驗疝氣桃人湯方
桃人去皮尖及雙人　吳茱萸　橘皮　海藻各三兩
生薑　茯苓　羌活　蒺藜子去角各三兩
右八味切以水三大升煮取九合分爲三服空心服忌酢物

寒疝不能食方四首

深師療虛冷心腹寒疝胷脅支滿飲食不消腹中痛久痢頸強
芎藭丸方
芎藭七分　烏頭炮四分　防葵三分　蜀椒汗九分

白薇二分　桂心十分　白芷五分　茱萸六分
乾薑八分
右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服二丸日三稍加至五六丸以知爲度忌猪肉冷水生葱芢汪同
又主虛冷痰澼疝食不消心腹痛氣弱不欲食虛惙羸瘦吴茱萸丸方
吴茱萸十分　紫菀三分　白薇三分　烏頭十分炮
桂心六分　前胡　芍藥　細辛
芎藭　黄芩各五分
右十五味下篩蜜和酒服如梧子五丸日三稍加之忌猪肉冷水桃李生葱生菜等出第十六卷中謹按別本有此方元欠五味據忌法有桃李即當用白朮恐後古今錄驗治寒疝積聚是全方
芢汪療手足熱腹中寒疝不能食飲數心腹痛十一物七熬飯後丸方

茯苓五兩　乾薑六兩今倍併十二兩　大黃二斤　柴胡十兩
芎藭七兩　蜀椒一兩汗　芒消一升重十兩今減五合　杏人一升去皮尖兩人熬
葶藶子一升　加桂心五兩　附子三兩炮

右藥乾薑茯苓不熬餘皆熬擣篩以蜜和丸如梧子飲服七丸日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熬方忌猪肉冷水醋物生葱等出第十四卷中

集驗療寒疝不能食方

取馬藺子一升每日取胡桃許以麪拌熟煮吞之然後依常飯日再服服盡必愈亦除腹內一切諸疾消食肥肌仍時燒塼熱以羖羊毛作氊裹却氊上熨之日一度尤佳

寒疝積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑藏

寒多則氣澁氣澁則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成也故無根本上下無所留止但諸藏腑受邪初未能爲積聚邪氣留滯不去乃成積聚其爲病也或左右脅下如覆杯或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或洒淅寒熱四肢不收飲食不爲肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉駃(所吏反)而緊積聚浮而牢積聚牢強急者生虛弱急者死出第二十卷中

深師破積丸療寒疝久積聚周走動搖大者如鼈小者如杯乍來乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下寒氣上搶肖脅支滿芫花丸方

芫花(一分洗炒)　椒(一分汗)　大黃(六分)　細辛(六分)

桔梗(五分)　烏頭(四分炮)　茱萸　芍藥

茯苓(各三分)　龍膽(二分)　半夏(一分洗)

右十一味擣篩蜜和丸如梧子大飲服五丸日三當下如泥病愈忌猪羊肉餳酢物生菜等

又當歸丸療心腹勞強寒疝邪氣往來牢堅固結聚苦寒煩悁(於緣切下同)不得卧夜苦汗出大便堅小便不利流飲在腹中食不生肌方

桔梗(二分)　葶藶子(五分熬)　藜蘆(二分炙)　厚朴(五分炙)

杏人(五十枚去尖皮兩人熬)　附子(五分炮)　桂心　人參(各三分)

沙參(三分)　特生礜石(一兩燒半日)

右十味擣篩蜜和如梧子服三丸日三稍加之忌猪肉生葱冷水出第二十二卷中

古今錄驗療久寒三十歲心腹疝瘕積聚邪氣往來厥逆搶心痛大痺羸瘦少氣婦人產乳餘疾胸脅支滿不嗜食手足悁煩月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命丸方

食茱萸(十分)　芍藥(五分)　細辛(五分)　前胡(五分一云柴胡)

乾薑十分　烏頭十分炮　紫菀　黄芩
白朮　白薇各三分　芎藭　人參
乾地黄各五分　蜀椒十分汗　桂心十分
右十五味擣篩蜜和爲丸如梧子大先食服三丸日三不知稍加至七丸忌生菜生葱猪肉冷水桃李雀肉蕪荑等范汪同出第十卷中
集驗療腎冷及疼疝氣滯後灌方
鹽花一大合　漿水半大升
右二味和煖灌下部少間即下膿日一度再灌之即止
心疝方四首
病源心疝者由陰氣積於内寒氣不散上衝於心故使心痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或四肢逆冷或脣口變青皆其候也出第二十卷中

范汪療心疝復繞臍痛上支脅心下痛方

芍藥　桔梗　細辛　蜀椒汗

桂心　乾薑各三分　附子一分炮

右七味末之合蜜和爲丸如梧子服七丸以酒下日二服忌

猪肉冷水生葱生菜等

又療三十年心疝神方

眞射茵飊好者新好茱萸一名殺子

右二味等分擣篩蜜和丸服如麻子二丸日三藥勢盡乃熱

食良祕已用得差劉國英所祕

又主心疝方

灸兩足大指甲宍之際甲宍各半炷隨年壯良

又心疝發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後横理節上及大指岐間白黑肉

際百壯則止足心者在足下偏近大指本節際不當足心中央也並出第十八卷中

外臺秘要方卷第七

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺祕要方　八

淡飲　胃反

噎　哽

外臺秘要方卷第八 淡飲胃反噎鯁等三十門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進

淡飲論二首

病源淡飲者由氣脉閉塞津液不通水飲氣停在胷腑結而成淡又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之淡飲其爲病也胷脅脹滿水穀不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胷背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也脉偏弦爲飲浮而滑爲飲其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云左右側卧不息十二通

療淡飲不消右有飲病右側臥左有飲病左側臥又有不消氣排之左右各十二息療淡飲出第二十卷中

千金淡飲論問曰夫飲有四何謂師曰有淡飲一云留飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之淡飲飲後水留在脅下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即爲虛先熱即爲實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支滿嚏而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脈偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘

而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能飲食脉沈滑者留飲病病有留飲者脅下痛引缺盆欬嗽轉甚一云輙已其人欬而不得卧引項上痛欬者如小兒掣瘲狀夫脅中有留飲其人短氣而渴四肢歴節痛心下有留飲其人背寒冷大如手病人脅息上引此皆有溢飲在脅中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此爲氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱皆痛惡寒自泣出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沈細此非風也必有飲在上膲其脉虚者爲微勞榮衛氣不周故也出第十八卷中

淡飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫淡水結聚在於脅腑膀胱之間久而不散流行於脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虚滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也出第二十卷中

廣濟療心頭淡積宿水嘔逆不下食前胡丸方

前胡 白朮 甘草炙各五分 旋復花

豆蔻人各三分 人參 麥門冬去心各六分 枳實炙

大黃各四分

右九味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以酒下二十丸漸加至三十丸日再服不利忌桃李雀肉海藻菘菜熱麪炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心胷中淡積氣噎嘔逆食不下方

柴胡 橘皮各六分 茯苓十分 人參

麥門冬去心 雞蘇各八分 生薑二十分 檳榔人四分末湯成下

右八味切以水八升煑取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行七八里進一服未差三日更服一劑以利爲度忌酢物生冷油膩粘食並出第一卷中

千金療淡飲飲食不消乾嘔湯方

澤瀉　杏人(去尖皮)　枳實(炙)　白朮(各三兩)

茯苓　柴胡　生薑　芍藥(各四兩)

旋復花　人參　橘皮　細辛(各二兩)

半夏(四兩洗)

右十三味切以水九升煑取二升七合分爲三服忌桃李雀肉大酢生菜羊肉餳等物

又療胷中淡飲腹中水鳴食不消嘔吐水湯方

大腹檳榔(四十枚合子碎)　生薑(八兩)　半夏(半升洗)

杏人(四兩去尖皮熬)　橘皮(三兩)　茯苓(五兩)　白朮(四兩切)

右七味切以水一斗煑取三升去滓分三服忌羊肉餳大酢桃李雀肉等古今録驗同並出第十八卷中

范汪薑椒湯主胷中積聚淡飲飲食減少胃氣不足欬逆吐哯方

半夏洗三兩　生薑汁七合　桂心　附子炮

甘草炙　茯苓　桔梗各一兩　蜀椒汗二合

橘皮切二兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取二升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻菘菜羊肉餳生葱猪肉冷水酢物千金翼深師同

又白朮茯苓湯主胷中結痰飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白朮五兩　茯苓三兩　橘皮　當歸

附子炮各二兩　生薑　半夏各四兩切　桂四兩

細辛四兩一作人參

右九味切以水一斗煮取三升分三服服三劑良忌羊肉餳

桃李雀肉猪肉冷水生葱生菜醋物等千金翼同

又旋復花湯主胷膈淡結唾如膠不下食者方

烏頭五枚去皮熬 旋復花 細辛 前胡

甘草炙 茯苓各二兩 半夏一兩洗 生薑八兩

桂心四兩

右九味切以水九升煮取三升分爲三服忌羊肉餳海藻菘菜生葱酢物猪肉冷水等並出第十六卷中

延年茯苓飲主心胷中有停淡宿水自吐水出後心胷間虛氣滿不能食消淡氣令能食方

茯苓三兩 人參二兩 白朮三兩 生薑四兩

枳實二兩炙 橘皮一兩半切

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等仲景傷寒論同出第十七卷中

古今録驗療胷膈淡飲食噉經日則併吐出食皆不消出如初
空腹一兩日聚食還復吐之極不便此由淡飲聚下絶不通服
此丸宣通下氣方
呉茱萸　澤瀉　芍藥　白朮
漢防巳　赤茯苓各二兩　蜀大黃二兩
右七味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李
雀肉酢物出第十九卷中
懸飲方二首
病源懸飲謂飲水過多留在胷下令胷間懸痛欬唾引胷痛故
云懸飲出第二十卷中
范汪大甘遂丸療久澼留水澼飲方
芫花熬　甘遂　葶藶子熬　大黃
苦參　大戟　芒消　貝母

桂心各一兩 杏人三十枚熬 巴豆三十枚去心皮熬 烏喙三分炮令拆

右十二味擣篩其巴豆杏人擣如膏合以蜜和丸如大豆許服二丸日三服不知稍加以意將息之大佳療大水飲病忌食蘆笋猪肉生葱等出第十六卷中

千金療懸飲十棗湯方

芫花 甘遂 大戟

右三味等分擣篩以水一升五合煑大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取一錢匕羸人半錢匕頓服之平旦不下者益藥半錢下後以糜粥自養出第十八卷中此本仲景傷寒論方

溢飲方三首

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也出第二十卷中

范汪溢飲者當發其汗大青龍湯主之方

麻黃六兩去節　桂心二兩　甘草二兩炙　生薑三兩

石膏如雞子一枚　杏人四十枚去雙人尖皮　大棗十枚擘

右七味㕮咀以水九升先煑麻黃減二升乃內諸藥煑取三升絞去滓適寒温服一升温覆令汗汗出多者温粉粉之一服汗出者勿復服汗出多亡陽逆虛惡風煩躁不得眠脉微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也忌海藻菘菜生葱出第十六卷中此本仲景傷寒論方

千金溢飲者當發其汗宜青龍湯方

麻黃去節　芍藥　細辛　桂心

乾薑　甘草炙各三兩　五味子半升　半夏半升洗

右八味切以水一斗先煑麻黃減二升乃內餘藥煑取三升去滓温服一升忌海藻菘菜羊肉餳生菜生葱出第十八卷中此仲景傷寒論小青龍湯也

千金翼大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水澼在兩脅下三曰淡飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲後傷寒飲冷水過多所致方

遠志去心　苦參　烏賊魚骨　藜蘆

白朮　甘遂　五味子　大黃

石膏　桔梗　半夏洗　紫菀

前胡　芒消　栝樓　桂心

蓯蓉　貝母　芫花　當歸

人參　茯苓　芍藥　大戟

葶藶　黃芩各一兩　常山　甘草炙

署預　厚朴　細辛各三分　巴豆三十枚去皮心熬

附子三分炮

右三十三味擣篩蜜和爲丸如梧子大酒服三丸日三稍加之忌狸肉桃李雀肉猪羊肉餳生葱酢物生菜野猪肉蘆筍等胡洽同出第十九卷中

支飲方九首

病源支飲謂水飲停於胷膈之間支乘於心故云支飲其病令人欬逆喘息身體如腫之狀謂之支飲出第二十卷中

深師療心下有支飲其人喜眩（一作苦冒）澤瀉湯方

白术（二兩）　澤瀉（五兩）

右二物切以水二升煮取一升又以水一升煮取五合合此二汁分爲再服忌桃李雀肉等（此本仲景傷寒論方）

千金療支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶子（熬令紫色擣爲丸如彈丸大）　大棗（二十枚）

右二味先以水三升煮大棗得汁二升內葶藶煎取一升

頓服三日服一劑可服三四劑此本仲景傷寒論方

又嘔家不渴者爲欲解本渇今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是也先渇却嘔此爲水停心下小半夏加茯苓湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸小半夏加茯苓湯方

半夏一斗洗 生薑半斤 茯苓四兩

右三味切以水七升煑取一升五合分再服忌羊肉餳大醋

仲景傷寒論茯苓三兩餘並同

又假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也五苓散主之方

猪苓去皮 白朮 茯苓各三分 桂心二分去皮

澤瀉五分

右五味下篩水服方寸匕日三多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等此本仲景傷寒論方

又心下有淡飲胷脅支滿目眩甘草湯主之方

甘草二兩炙　桂心　白朮各三兩　茯苓四兩

右四味細切以水六升煑取三升去滓服一升日三小便當利忌海藻菘菜生葱桃李醋物等此本仲景傷寒論方

又夫酒客欬者必致吐血此坐而極飲過多所致也其脉虛者必冒其人本有支飲在胷中也支飲胷滿厚朴大黃湯主之方

厚朴一兩炙　大黃六兩　枳實四兩炙

右三味細切以水五升煑取二升去滓分温再服之此本仲景傷寒論方

又夫上氣汗出而欬者此為飲也乾棗湯主之若下後不可與也乾棗湯主腫及支滿澼飲方

大黃　大戟各一兩　芫花炒　蕘花各半兩

甘草炙　甘遂　黃芩各一兩　乾棗十枚

右八味切以水五升煑取一升六合分四服空心服以快下

爲佳忌海藻菘菜

又膈間支飲其人喘滿心下痞堅面黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木防已湯主之方

木防已三兩 石膏十二枚雞子大碎綿裹 桂心二兩 人參四兩切

右四味以水四升煑取二升去滓分再服虛者即愈實者三日復發則復與不愈者宜去石膏加茯苓芒消湯方

木防已三兩 桂心二兩 人參 茯苓各四兩

芒消三合

右五味以水六升煑四味取二升去滓內芒消分温再服取微下利則愈忌生葱深師同並出第十八卷中此本仲景傷寒論方

留飲方二首

病源留飲者由飲酒後飲水多水氣停留於胷膈之間而不宣散乃令人脅下痛短氣而渴皆其候也出第二十卷中

范汪海藻丸療腹中留飲方

海藻　木防已　甘遂　茯苓

椒熬　芫花熬　葶藶子熬各一兩

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子服十丸不差當增之出第十六卷中

千金療病者脉伏其人欲自痢痢者反快雖利心下續堅滿此爲留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂大者三枚　半夏十二枚洗以水一升煑取半升去滓　芍藥一兩又云三枚

甘草如指大一枚炙以水一升煑取半升去滓

右四味以蜜半升內藥汁及蜜合一升煎取八合頓服之忌海藻菘菜羊肉餳出第十八卷中此本仲景傷寒論方

酒澼飲方三首

病源夫酒澼者因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲俱不散停

滯在於脅肋下結聚成澼時時而痛因却呼爲酒澼其狀脅下弦急而痛出第二十卷中

深師消飲丸療酒澼飲酒停淡水不消滿逆嘔吐目視𥉮𥉮耳聾腹中水聲方

乾薑 茯苓各三兩 白术八兩 枳實四枚炙

右四物擣篩蜜和丸服如梧子五丸日三稍加之若下去枳實加乾薑二兩名爲五飲丸忌桃李雀肉大醋生冷之類大神驗

又倍术丸療五飲酒澼方

白术一斤 桂心 乾薑各半斤

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服十丸稍加之取下先食服之日再常將不復取下忌桃李雀肉生葱

又溫脾丸療久寒宿食酒澼方

乾薑三兩熬黃 芍藥三兩熬干 蜀椒二兩汗 大黃八兩切熬令黃黑

小草一兩熬干 芎藭熬黃 茯苓 桃人去尖皮熬

柴胡熬干各三兩

右九味擣篩蜜和更擣萬杵服如大豆許十九日三忌大醋並出第二十三卷中

留飲宿食方七首

病源留飲宿食者由飲酒宿食後飲水多水氣停留於脾胃之間脾得濕氣則不能消食令人噫氣酸臭腹脹滿亦壯熱或吞酸所以謂之留飲宿食也出第二十卷中

深師通草丸療積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目 附子炮 半夏洗 厚朴炙各一兩

芒消五兩 大黃九兩 葶藶子三兩熬 杏人三兩去尖皮熬

右八味擣篩爲末別擣葶藶杏人令如膏合諸末以蜜和

丸擣五千杵服如梧子二丸忌猪羊肉餳等大効出第二十

三卷中方中無通草未詳其名

范汪千金丸療心腹留飲宿食方

沙參　丹參　苦參　桂心各二分

石膏五分研　人參一分　大黄一分　半夏五分洗

乾薑五分　戎鹽一分　巴豆六十枚去皮心以湯百練之復熬令黄色別研

附子一分炮

右十二味皆擣合以白蜜和如小豆吞一丸日再令人先食服一丸不知稍益以知爲度忌猪肉冷水羊肉餳蘆笋生葱

又療留飲宿食桑耳丸方

桑耳二兩　巴豆一兩去皮熬蒸五升米下

右二味擣和以棗膏丸如麻子先食服一丸不下服二丸病下即止忌野猪肉蘆笋

又主留飲宿食芫花丸方

芫花一兩熬 大黃 甘遂 黃連

麻黃去節 杏人去尖皮兩人熬各二兩 甘草炙 附子炮令坼各一兩

巴豆五十枚去心皮湯練百遍令變色

右九味擣篩杏人巴豆別擣如膏合和以蜜丸如小豆先食服一丸日再不知稍增以知爲度忌海藻菘菜猪肉冷水蘆笋等

又順流紫丸療百病留飲宿食心下伏痛四肢煩疼男子五勞七傷婦人產有餘疾等方

當歸 岱赭各一分 茯苓 烏賊魚骨

桂心各三分 肉蓯蓉二分 藜蘆五分小熬 巴豆六十枚去心皮熬

右八味擣篩白蜜和丸先食服如小豆一丸日再不知增之欲下倍服之別擣巴豆令如膏忌生葱狸肉酢物野猪肉蘆

笋等並出第十六卷中

千金療留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方

當歸　人參　桂心　甘草炙

芒消　芍藥各二兩　大黃四兩　生薑

黃芩　澤瀉各三兩

右十味切以水一斗煮取三升分三服空心食後服忌生葱

海藻菘菜出第十八卷中

集驗淡飲積聚嘔逆兼風虛勞陰疝方

霜後蒺藜苗子擣汁一石先以武火煎減半即以文火煎攪勿停手候可九止空腹酒下梧子大三十九

煎服亦得出第五卷中

淡澼方二首

病源淡澼者由飲水未散在於胷府之間因遇寒熱之氣相搏沉

滯而成淡也淡之停聚流移於胷脇之間有時而痛則謂之淡

澼出第二十卷中

延年療左脇下停淡澼飲結在兩脅脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利或赤或黃腹中有時水聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅下痛旋復花丸方

旋復花五分 大黃七分蒸 茯苓三分 澤瀉四分

人參 桂心 皂莢去皮子炙 附子炮去皮各二分

芍藥四兩 蜀椒三分去目汗 乾地黃四分 防葵取水中浮者

乾薑 枳實炙 杏人去雙人尖皮熬別擣作脂各三分

葶藶子四分熬令紫色別擣

右十六味擣篩爲末內杏人葶藶脂中碎研調篩度蜜和爲丸每食後少時白飲服三丸如梧子日二服稍增以微利爲度禁食猪肉魚䴵蒜生葱酢今既在肋下有澼氣水飲結聚不

散數發則悶刺心痛又未曾服如此破澼飲藥雖服補藥澼氣不除終是不損恐久積聚更急飲食减少此方正與澼氣相當更有三兩種毒藥今商量除訖其方内有附子及别本續命丸有烏頭此並破澼疾不得不用復聽臨時不如服烏頭丸澼氣得减亦未必須服旋復花丸忌酢物生葱猪肉蕪荑出第十六卷中

集驗療癖澼心腹痛兼冷方

鱉甲炙 柴胡 赤芍藥各八分 甘草炙

枳實炙 生薑 白术各六分 檳榔七箇末湯成後下

右八味切以水六升煑七味取二升半去滓内檳榔末分服八合當利忌海藻菘菜莧菜桃李雀肉等出第五卷中

飲澼方二首

病源飲澼者由飲水過多在於脅下不散又遇冷氣相觸而痛

呼爲飲澼也其狀脅下弦急時有水聲出第二十卷中

深師附子湯療氣分心下堅如盤邊如旋柸水飲所作此湯主之方

桂心三兩　生薑三兩　麻黃三兩去節　甘草二兩炙

細辛三兩　大附子一枚炮　大棗十二枚擘

右七味切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥煮取二升去滓分服七合當汗出如蟲行皮中即愈神驗忌海藻菘菜猪肉生葱冷水生菜等並出第二十二卷中　仲景傷寒論名桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

備急療心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實朮湯方

枳實七枚炙　白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中輭即散此出姚大夫方忌桃李雀肉等物出第三卷中　此本仲景傷寒論方

癖飲方七首

病源此由飲水多水氣停聚兩脅之間遇寒氣相搏則結聚而成塊謂之癖飲在於兩脅下弦亘起按之作水聲也出第二十卷中

深師朱雀湯療久病癖飲停淡不消在胷膈上液液時頭眩痛苦攣眼睛身體手足十指甲盡黃亦療脅下支滿飲輒引脅下痛方

甘遂 芫花各二分 大戟三分

右三味爲散以大棗十二枚擘破以水六升先煎棗取二升內藥三寸方匕更煎取一升二合分再服以吐下爲知未知重服甚良無比出第二十三卷中

千金中候黑丸療癖飲停結悶滿目闇方

巴豆八分去皮心熬 芫花三兩熬 桂心四分 桔梗四分

杏人五分去尖皮熬令熟

右五味擣篩蜜和丸飲服如胡豆三丸日一稍增得快下爲
度忌猪肉蘆笋生葱等肘後同
千金半夏湯療淡冷澼飲胷膈中不理方
白朮三兩　半夏一升洗　生薑八兩　茯苓二兩
人參　桂心　甘草　附子炮各二兩
右八味切以水八升煮取三升絞去滓分温三服忌羊肉餳
桃李雀肉大酢生葱海藻菘菜猪肉冷水
又旋復花丸療停淡澼飲結在兩脅腹脹滿羸痩不能食食不
消化喜唾乾嘔大小便或澀或痢水在腸胃動揺作水聲方
旋復花　桂心　枳實炙　人參各五分
乾薑　芍藥　白朮各六分　茯苓
狼毒炙　烏頭炮　礜石燒各八分　細辛
大黃　黃芩　葶藶子熬　厚朴炙

芫花熬　吴茱萸　橘皮各四分　甘遂三分

右二十味擣篩蜜和丸酒服如梧子五丸日再服加之以知爲度忌生葱桃李雀肉大酢猪肉生菜等大驗並出第十八卷中

千金翼前胡湯主胷中久寒澼實宿淡膈塞胷痛不通利三焦冷熱不調食飲損少無味或寒熱體重卧不欲起方

前胡三兩　生薑四兩　黃芩一兩　人參二兩

吴茱萸一兩　大黃二兩　防風一兩　杏人三十枚去皮尖熬

當歸　甘草各二兩炙　半夏三兩洗　麥門冬一兩去心

右十二味切以水一斗煑取三升去滓分温三服日三服三劑良深師云若脅下滿加大棗二枚利水亦佳忌海藻菘菜羊肉餳

又半夏湯主淡飲澼氣吞酸方

半夏三兩洗 生薑六兩切 附子一枚燒 吴茱萸三百粒炒

右四味切以水五外煑取二外半去滓分温三服老小服半合日三服忌豬羊肉餳

又薑附湯主淡澼氣方

生薑八兩切 附子四枚生用四破

右二味水五外煑取二外分再服亦主卒風大良忌豬肉冷水深師同出第十九卷中

冷淡方四首

病源冷淡者言胃氣虚弱不能宣行水穀故使淡水結聚停於胸膈之間遂令人吞酸氣逆四肢變青不能食飲出第二十卷中

范汪病淡飲者當以温藥和之療心腹虚冷遊淡氣上胸脅滿不下食嘔逆胸中冷半夏湯方

半夏一外洗 生薑一斤 橘皮四兩

右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂心四兩若腹痛內當歸四兩羸瘦老小者服之佳忌羊肉餳

又方

半夏一升湯洗 生薑一斤 桂心三兩 甘草三兩炙

右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻松菜羊肉餳生葱並出第十六卷中

千金茯苓湯主胸膈痰滿方

茯苓四兩 半夏一升洗 生薑一斤 桂心八兩

右四味切以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩氣滿者加檳榔三七枚忌酢物羊肉生葱餳出第十八卷中

千金翼論曰凡痰飲盛吐水無時節其源為冷飲過度遂令固冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停

者赤石脂散主之方

赤石脂三斤

右一味擣下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍加至三匕服盡三斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人一名淡飲諸藥不差惟服此一斤則愈出第十九卷中

淡結實及宿食方三首

病源此由淡水積聚在於胷腑遇冷熱之氣相搏結實不消故令人心腹痞滿氣息不安頭眩目暗常欲嘔逆故言淡結實出第二十卷中

集驗療宿食結實及淡澼癖實瓜蔕散方

瓜蔕一兩　赤小豆四兩

右二味擣篩温湯三合以散一錢匕投湯中和服之須臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如吐不止飲冷水備急救急

同出第四卷中

千金松蘿湯主胷中淡積熱皆除之方

松蘿二兩　烏梅　梔子各二七枚　常山三兩

甘草一兩炙

右五味切以酒三升漬一宿平旦合水三升煮取二升半去滓頓服之亦可再服得快吐止忌海藻菘菜生葱菜

又撩膈散療心上結淡實寒冷心悶方

爪丁二十八枚　赤小豆二十枚　人參　甘草各一分炙

右四味擣爲散酒服方寸匕日二亦療諸黃忌海藻菘菜並

出第十八卷中

胷中淡澼方三首

肘後療胷中多淡頭痛不欲食及飲酒則瘀阻淡方

礬石一兩

右一味以水二升煑取一升內蜜半合頓服之須臾未吐飲少熱湯

又方

杜蘅（三兩） 瓜蔕（三七枚） 松蘿（三兩）

右三味切以水酒一升二合漬之再宿去滓温分再服一服不吐晚更一服千金同並第三卷中

千金治膈湯主胸中淡澼方

常山（三兩） 甘草（一兩） 松蘿（一兩） 瓜蔕（二七枚）

右四味酒水各二升半煑取一升半初服七合取吐吐不盡餘更分二服得快吐差後須服半夏湯在前冷淡部中忌海藻菘菜生葱生菜備急肘後同出第十八卷中

淡厥頭痛方八首

病源謂淡水在於胸膈之上又犯大寒使陽氣不行令淡水結

聚不散而陰氣逆上上與風淡相結上衝於頭即令頭痛或數歲不已久連腦痛故云膈淡風厥頭痛若手足寒冷至節則死出第二十卷中

千金療卒頭痛如破非中冷又非中風其病是胷膈中淡厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之則差方

但單煑茗作飲二三升許適冷煖飲三升須臾適吐適吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人渴而則差集驗同出第十八卷中

千金翼葱白湯主冷熱膈淡發時頭痛悶亂欲吐不得方

葱白莖二七　烏頭炮二分　甘草炙二分　眞朱研二分

常山二分　桃葉一把

右六味切以酒四升水四升合煑取三升去滓内眞朱服一升得吐止忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜生血物等千金

深師同

又療淡飲頭痛往來寒熱方

常山一兩　雲母粉二兩

右二味爲散熟湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服忌生葱生菜深師云用雲母半兩錬之餘同並出第十九卷中

備急葛氏主卒頭痛如破非中冷又非中風是胷膈中淡厥氣上衝所致名厥頭痛吐即差療方

釜下墨四分　附子三分炮

右二味擣散以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一分忌猪肉冷水文仲肘後同

又方

以鹽湯吐不吐摘出張文仲同

又方

苦參　桂心　半夏洗

右三味等分爲末苦酒和以塗痛上則差忌生葱羊肉
餳肘後同

又方

常山四分　甘草半兩

右二味切以水七升煑取三升服一升不吐更服亦可内蜜
半升忌生葱生菜海藻菘菜千金肘後延年同

又方

烏梅三十枚　鹽三指撮

右二味以酒三升煑取一升一服當吐愈肘後同

風痰方五首

延年白术丸主除風痰積聚胃中冷氣秋發動令人嘔吐食或
吐清水食飲減少不作肌膚方

白术五分　白芷三分　乾薑　石斛各六分

五味子　細辛　橘皮　厚朴炙
桂心　防風　茯苓　甘草各四分
右十二味擣篩蜜和丸如梧桐子服十丸飲下日二加至二十丸忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢物蔣孝璋處一方有人參五分十三味
又茯苓湯主風淡氣發即嘔吐欠呿煩悶不安或吐淡水者方
茯苓三兩　人參　生薑　橘皮
白朮各二兩
右五味切以水五升煮取一升五合去滓温分三服中間任食忌大醋桃李雀肉等出第十七卷中
又木蘭湯主熱淡飲氣兩肋滿痛不能食者方
木蘭　枳實炙　黃芩　白朮各三兩
漏蘆根　白斂　升麻　芍藥
桔梗各二兩　生薑　大黃各四兩

右十一味以水八升煮取二升六合分爲三服如人行三四里進一服忌桃李猪肉雀肉（一方有玄參二兩）

又茯苓飲主風淡氣吐嘔水者方

枳實（炙一兩） 茯苓 白朮 人參（各二兩）

生薑（四兩） 橘皮（一兩半）

右六味切以水五升煮取一升半分三服中閒任食忌桃李雀肉大醋張文仲處並出第六卷中

又療風淡飲氣逆滿惡心不能食方

人參（二兩） 枳實（炙） 白朮（各三兩） 生薑（四兩）

桂心（一兩半）

右五味切以水五升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉生葱張文仲處出第十七卷中

療諸淡飲方四首

廣濟療飲氣淡膈食則嘔吐方

茯苓八分 橘皮六分 甘草四分炙 生薑八分

雞蘇六分 人參四分

右六味切水五升煮取一升五合去滓分溫二服服別相去如人行六七里進一服不利忌海藻菘菜酢物出第一卷中

千金順流紫丸療心腹積聚兩脅脹滿留飲淡澼大小便不利小腹切痛膈上寒方

岱赭三分 烏賊魚骨三分炙 半夏三分洗

巴豆七分去心皮熬 桂心四分 石膏五分研

右六味擣篩蜜和丸平旦服一丸如胡豆至二丸忌羊肉餳猪肉蘆笋生葱出第十八卷中

延年前胡湯主胷背氣滿膈上熱口乾淡飲氣頭風旋方

前胡三兩 枳實炙 細辛 杏人去皮炙碎

芎藭　防風　澤瀉　麻黃[去節]
乾薑　芍藥[已上各三兩]　茯苓[一作茯神]　生薑[各四兩]
桂心　甘草[炙各二兩]
右十四味切以水九升煮取二升六合分三服微汗忌生冷油滑猪牛肉麪海藻菘菜生葱生菜酢物出第十七卷中

古今錄驗薑附湯療冷胷滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方
附子[六分]　生薑[十二分]
右二味切以水八升煎取三升二合分爲三服忌猪肉冷水等出第九卷中

胃反方二十首

病源夫榮衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則藏冷藏冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如柸往來寒熱甚者食已則吐其脉緊

而弦緊則爲寒弦則爲虛虛寒相搏故食已則吐名爲反胃也

出第二十一卷中

集驗療胃反不受食食已嘔吐大半夏湯方

人參一兩　茯苓四兩　青竹茹五兩　大黃六兩

橘皮　乾薑各三兩　澤瀉　甘草炙

桂心各二兩

右九味切以水八升煑取三升服七合日三夜一巳利去大黃用泉水東流水尤佳忌海藻菘菜生葱大酢𦵔金備急

張文仲同方中無半夏未詳其名

又療胃反吐而渴者茯苓小澤瀉湯方

茯苓　澤瀉　半夏各四兩洗　桂心

甘草各二兩炙

右五味以水一斗煑取二升半去滓服八合日三忌海藻菘

菜羊肉餳生葱酢物等（千金加生薑四兩）

又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷者方

橘皮（三兩）　白朮　人參（各二兩）　椒（一百二十粒出汗）

桂心（一兩）　薤白（一握去青）

右六味切以水二升漬一宿内猪肚中縫合三升水煑水盡出之決破去滓分三服忌桃李雀肉生葱（千金用羊肚）

又療胃反大驗方

前胡　生薑（各四兩）　阿膠（一兩）　大麻子人（熬）

吴茱萸（各五合）　桂心（三寸）　甘草（五寸炙）　大棗（十枚擘）

右八物切以酒二升水三升煑取一升七合分再服忌生葱

海藻菘菜等物（一方有橘皮三兩）

又療胃反吐食者方

擣粟米作粉水和作丸如梧子大七枚爛煑内酢中

細細吞之得下便已麪亦得用之

又方

好麪十斤麤地黃二斤二味擣日乾酒服若飲三方寸匕日三服（千金太治酥咽）

又主胃反食則吐出上氣者方

灸兩乳下各一寸以差爲度

又方

灸臍上一寸二十壯

又方

灸内踝下三指稍邪向前有穴三壯即差

又方

蘆根茅根各二兩

右二味切以水四升煑取二升頓服得下食並出第十六卷中以上並與千金同

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸

削唯飲水亦同此方朱靈感録送

半夏六兩削去皮湯洗 人參三兩 生薑一兩 橘皮二兩

舂杵頭糠一升綿裹 牛涎一升 厚朴二兩炙 羚羊角三兩削

右八味切以水八升煮取三升分温三服相去十里久欲頓服者可至三劑氣噎病者胃閉不受食唯飲水水入吐出積年不差乃至於死人間多有此病此方救療有効忌羊肉餳粘食

又華他療胃反胃反爲病朝食夜吐心下堅如柸往來寒熱吐逆不下食此爲寒癖所作療之神効方

眞珠 雄黃 丹砂以上研各一兩 朴消五兩

乾薑累十

右五味擣篩蜜丸先食服如梧子二丸小煩者飲水則解之忌生血物備急集驗千金張文仲同並出第四卷中一方有桂心一兩必

效云治心一堅痛胃反寒癖所作久變成肺瘘方

救急療胃反方

昔在幼年經患此疾每服食餅及羹粥等物須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勅令療罄竭口馬所患終不能瘳漸羸憊候絶朝夕忽有一衛士而云服驢小便極驗此日服食二合然後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐便即定迄至今日午時奏知之大内中有五六人患胃反同服用一時俱差此藥稍有毒服時不可過多承取尿及熱服二合病若深七日以來服之良後來療人並差必効同出第六卷中

必効人參湯主胃逆不消食吐不止方

人參　澤瀉　桂心各二兩　橘皮

甘草炙　黄耆各三兩　茯苓四兩　生薑八兩

加至三十丸腹中有痛加當歸二兩忌熱麪海藻菘菜桃李雀肉等出第一卷中

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方

人參　麥門冬去心　橘皮　白朮　厚朴各二兩炙　茯苓四兩　生薑三兩切　甘草一兩炙切

右八味切以水八升煑取三升分為三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉等蔣孝瑜處大効

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方

厚朴三兩炙　白朮　人參各二兩　茯苓三兩　生薑五兩　橘皮二兩

右六味切以水四升煑取一升二合分為三服忌桃李雀肉酢物蔣孝瑜處出第六卷中

脾胃病日漸瘦困不食方三首

廣濟主脾胃中熱消渇小便數骨肉日漸消瘦方

黃連　麥門冬各十二分去心　苦參　栝樓

知母　茯神　土瓜根各八分　人參

甘草炙各六分　一

右九味擣篩蜜和丸每食後少時煮蘆根大麥飲服如梧子二十丸日二服漸加至四十丸不利忌海藻菘菜猪肉冷水酢物等

又主胃氣冷弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒如故帶酸氣而羸計日漸困者方

吴茱萸二兩　白朮三兩　人參　乾薑

甘草炙　五味子各二兩　麴末　麥蘖末各五合熬令黃色

厚朴一兩半　桂心一兩

右十味擣篩爲散空腹煮生薑湯服方寸匕一日三服漸加

麥門冬二升去心 半夏一升洗 大黃一兩半

右十一味切以水一斗二升煮取三升二合服八合日三夜一服若羸人服六合已下去大黃忌海藻菘菜酢物生葱羊肉餳千金同

又療胃反朝食夜吐夜食朝吐諸藥療不差方

羊肉去脂膜作生以好蒜虀空腹任意多少食之立見効驗

又療胃反吐水及吐食方

大黃四兩 甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升去滓分溫再服如得可則隔兩日更服一劑神驗千金不傳忌海藻菘菜並出第二卷中此本仲景傷寒論方

萬全方療脾飲食吐逆水穀不化此爲胃反半夏飲子方

半夏八分湯洗滑盡 厚朴炙 人參 白朮

生薑切 棗各六分 半夏八分湯洗滑盡 厚朴六分炙

粳米兩合 橘皮四分 京棗七枚 生薑六分切

右六味細切以水二大升煎取一升去滓分溫四服空肚服二服忌羊肉餳並出第一卷中

脾胃弱不能食方三首

病源脾者藏也胃者腑也脾胃二氣相爲表裏胃爲水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虛弱故不能食也尺脉浮滑速疾者食不消脾不磨也出第二十一卷中

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢方

白朮八兩 神麴五兩末熬香 甘草二兩炙 乾薑二兩

枳實二兩炙

右五味擣篩蜜和丸空腹溫酒服如梧子二十丸日二服漸

至二匕忌生葱桃李雀肉海藻菘菜出第一卷中

延年白术丸療惡心數吐水不多能食少心力者方

白术 乾薑 人參 厚朴炙

桂心各八分 細辛 茯苓 當歸

茯神 枳實炙 五味子 附子各六分炮

吴茱萸六分 遠志五分去心 旋復花四分 澤瀉五分

右十六味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸日再服加至三十五丸忌桃李雀肉大酢生菜生葱猪肉冷水出第十七卷中

胃實熱方二首

千金凡右手關上脉陽實者足陽明經也病苦頭痛脉經云腸中堅痛而熱汗不出如温瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫名曰胃實熱也

療胃實瀉胃熱湯方

梔子人二兩　芍藥四兩　白术五兩　茯苓二兩

生地黄汁一升　射干三兩　赤蜜一兩　升麻三兩

右八味切以水七升煑六味取一升五合去滓下地黄汁兩沸次下蜜煎取二升分三服老小以意服之忌桃李雀肉酢物蕪荑等

又方

炙膝下三寸兩脚三里空各三十壯主胃中熱病

胃虛寒方七首

千金右手關上脉陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡風寒洒洒目急腹中痛耳虛鳴時寒時熱脣口乾面浮腫名曰胃虛冷也又療胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃湯方

防風　栢子人　細辛　桂心

橘皮各二兩　芎藭　吴茱萸　人參各三兩

甘草一兩炙

右九味切以水一斗煑取三升分温三服忌海藻菘菜生葱生菜等物

又補胃虛寒身枯絶骨諸節皆痛人參散方

人參　細辛　甘草各六分炙　桂心

當歸各七分　麥門冬七分去心　乾薑八分　遠志皮四分

蜀椒三分汗　吴茱萸二分

右十味爲散食後服方寸匕温清酒進之忌海藻菘菜生葱生菜並出第十六卷中

范汪療胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五藏并療諸病調中湯方

薤白一升切　枳實六枚炙　橘皮三枚　大棗十二枚擘

粳米三合　香豉六合

右六味切枳實橘皮棗以水六升先煑薤得四升内諸藥煑

取一升半適寒溫服中分服之良出第二十一卷中（一方生薑四分）

刪繁療胃虛苦飢寒痛人參補虛湯方

人參　當歸　茯苓　桔梗

芎藭　橘皮　厚朴（炙各三兩）　桂心

甘草（炙各二兩）　白朮（五兩）　吳茱萸（二兩）　大麥蘖（炒二升）

右十二味切以水一斗二升煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜桃李雀肉生葱猪肉酢物等出第十一卷中

又白朮八味等散方（與前療同）

白朮　厚朴（炙）　人參　吳茱萸

麥蘖（炒）　茯苓　芎藭　橘皮（各三兩）

右藥擣篩爲散食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大酢出第四卷中

延年補胃飲主胃氣虛熱不能食兼渴引飲方

茯苓四兩　人參三兩　橘皮二兩　生薑三兩
薤白一升切　豉五合綿裹　糯米二合

右七味切以水七升煑取三升去滓分温六服中間任食一日令盡忌酢物張文仲處出第一卷中

五膈方八首

病源五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之爲病胷中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦不爲氣力恚膈之爲病心下苦實滿噫輙酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣膈之爲病胷脅逆滿噎塞胷膈不通噫聞食臭寒膈之爲病心腹脹滿欬逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛食不消不能食肥熱膈之爲病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胷痺引背食不消不能多食羸瘦少氣及癖也此是方家所說五膈形證也經云陽脉

結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神而氣之與神並爲陽也傷動陽氣致陰陽不和而腑藏生病結於胷膈之間故稱爲膈氣衆方説五膈互有不同但傷動之由有五故云五膈氣出第十三卷中

備急膈中之患名曰膏肓湯丸徑過鍼灸不及所以作丸含之令氣勢得相熏染有五膈要丸方

麥門冬十分去心 椒六分汗 遠志 附子炮

乾薑 人參 桂心 細辛各六分

甘草十分炙

右九味擣篩以蜜和丸如彈子以一枚著牙齒間含稍稍嚥汁日三主短氣胷滿心下堅冷氣此病有十許方率皆相類此丸最効五膈者謂憂膈氣膈恚膈熱膈寒膈也忌猪肉生菜海藻菘菜生葱千金肘後文仲同出第三卷中

張文仲五膈丸方

吴茱萸 麴 杏人(去皮尖熬) 乾薑

蜀椒(汗去閉口者及目) 好豉(熬令色變)

右六味等分擣篩蜜和丸如梧子飲服七丸日三忌生冷此方出隱居効驗備急肘後同出第三卷中

延年秘錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常以憂愁思慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病苦心滿不得氣息引脊痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則差飲食不得下甚者乃手足冷上氣欬逆喘息氣短療之丸物五膈丸方

麥門冬(去心) 蜀椒(汗各三兩) 遠志(三兩去心) 甘草(五兩炙)

附子(一兩炮) 乾薑(三兩) 人參(四兩) 桂心(三兩)

細辛(三兩)

右藥擣篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈子丸一

丸置喉中稍嚥之喉中背中當熱藥力稍盡復含一丸日三四夜一二服服藥七日愈二十日平復若不能含者可分一大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不異神良椒當以銅器熬如火上使極熱下置地內椒器中熟攪之須臾汗出便擣名曰起椒力有熱亦去其毒非令有熱也忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜千金集驗同不能具於此方録用之耳

古今録驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處藏有虛冷氣迫咽喉背滿氣逆脅有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉強筋骨利五藏好顏色補不足益氣力方

細辛 桂心 黄芩 食茱萸

厚朴炙各三分 杏人三十枚去尖皮并兩人熬 乾薑 椒汗

遠志(各三分去心) 小草 芍藥 附子(炮)
當歸(各二分) 黄連(二分)
右十四味擣篩蜜和服如梧子二丸日三不知加之以知爲度忌猪肉冷水生葱生菜等
又五膈丸療憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方
人參 附子(炮) 遠志(去心) 桂心
細辛(各四分) 乾薑 蜀椒(各五分汗)
右七味擣篩以蜜和服如彈丸著牙下㕮咀嚥之若病劇者日三夜再并療諸毒風注氣腹中百病皆應當得眞新好藥即可中病耳神祕妙方不傳忌生葱生菜猪肉冷水等物
又療邪氣嘔逆吸氣五膈爲病五藏俱虛則受風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂語言無常俠舌左右狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣衰微藏凝冷氣成之服此

丸安穀通氣溫藏五膈丸出僧深方

蜀椒（一升汗） 乾薑（二兩） 桂心（二兩） 芍藥（一兩半）

半夏（洗） 細辛 茯苓（各一兩） 前胡（一兩半）

右八物擣篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩佳日再忌羊肉餳生葱生菜醋物

又療胷痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方

半夏（一分削去皮熬） 甘草（炙） 遠志（去心各四分） 乾薑

桂心 細辛 椒（去目汗） 附子（炮各二分）

右八味擣篩以蜜和爲丸先飯酒若粳米飲服如梧子五丸日三稍增至十丸忌海藻菘菜羊肉餳猪肉冷水生葱生菜並出第十八卷中

經心録五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽之不入食飲少方

乾薑三兩　麥門冬二兩去心　附子一兩炮　細辛二兩

蜀椒一兩汗　遠志一兩去心　甘草一兩炙　人參二兩

食茱萸二兩　桂心三兩

右十味蜜和爲丸如梧子服五丸日二忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜千金同出第二卷中

七氣方三首

病源七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若柈一作盤蒲官切在心下腹中疾痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不竟言而迫一云悅惚不章怒氣則上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得氣息恚氣則積聚在心下心滿不得飲食喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮卧不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急則四肢手

足筋攣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則産中風餘疾出第十三卷中千金同千金七氣丸方

烏頭炮七分　紫菀　前胡　半夏洗

細辛　丹參　茯苓　芎藭

桃人去尖皮并兩人熬　吴茱萸　桂心　桔梗

石膏各三分研　人參　甘草　防葵各四分千金作防風

大黄七分　乾薑二分　蜀椒二分汗　昌蒲三分

右二十味擣篩爲末蜜和丸酒服如梧子三丸日三加至十丸一方去半夏加甘遂三分忌海藻菘菜羊肉餳猪肉冷水生葱大酢生菜一方有芍藥無昌蒲

又七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此七氣爲病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上

氣不可當熱痛上衝心短氣欲絶不得喘息恚氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作卧不安席愁氣狀平故怒氣善忘四肢胕腫不得舉止亦療産後中風餘疾方

大黄十分 椒二分 人參 半夏洗

芎藭 柴胡 甘草炙 桔梗

石膏 昌蒲 桃人去皮尖兩人熬 吴茱萸

茯苓各三分 乾薑四分 細辛三分

右十五味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三加至十丸忌羊肉餳生葱海藻菘菜猪肉生菜酢物

又七氣湯療虚冷上氣勞氣方

半夏一升洗 生薑十兩 人參 桂心

甘草各一兩炙

右五味切以水一斗煮取三升分爲三服日三忌羊肉餳生葱海藻菘菜並出第十七卷中

氣噎方六首

病源此由陰陽不和藏氣不理寒氣塡於胷膈故氣噎塞不通而謂之氣噎令人喘悸胷背痛也出第二十卷中

廣濟療噎胷脅氣滿每食氣噎通氣湯方

半夏洗 生薑各六兩 橘皮 桂心各三兩切

右四味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服忌羊肉生葱餳等出第一卷中

深師療胷滿氣噎通氣湯方

半夏八兩洗 生薑六兩 桂心三兩 大棗三十枚擘

右四味切以水八升煮取三升分服五合日三夜一忌羊肉餳生葱千金同出第二十二卷中

集驗療氣噎煎方

蜜 酥 薑汁各一升

右三味合和微火煎五六大沸取如大棗二枚内酒中飲之直抄服之亦好千金古今録驗同

又通氣噎湯方

半夏洗三兩 桂心三兩 生薑八兩 羚羊角三兩

右四味切以水八升煮取三升分服半升日再服忌羊肉生葱餳古今録驗同並出第四卷中

救急療喉中氣噎方

半夏洗 柴胡 生薑各三兩 羚羊角屑一法三兩

犀角屑 桔梗 昆布 通草

甘草炙各二兩

右九味切以水八升煮取三升分三服忌羊肉餳猪肉海藻菘菜等

古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方

羚羊角屑二兩 厚朴炙 吴茱萸 乾薑各三兩

通草 橘皮各二兩 烏頭十五枚炮

右七味切以水九升煮取三升分三服日三忌猪肉冷水深師千金同出第二十七卷中

諸噎方一十二首

病源夫陰陽不和則三焦隔絶三焦隔絶則津液不利故令氣塞不調理也是以成噎此由憂恚所致憂恚則氣結氣結則不宣流使噎噎者噎塞不通也出第二十卷中

深師療噎方

羚羊角屑 前胡 甘草各一兩 人參

橘皮各二兩

右五味切以水六升煮取二升分四服忌海藻菘菜

又方

鸕鷀喙

右一物當噎時以銜之則下肘後同

又方

羚羊角

右一物多少自在末之飲服亦可以角摩噎上良並出第二十二卷中

廣利方療因食即噎塞如炙肉臠在咽中不下方

吴射干六分 升麻四分 桔梗四分 木通十二分

赤茯苓八分 百合八分 紫菀頭二十一枚

右七物切以水二大升煎取九合去滓分温三服食後良久服忌豬肉酢物出第四卷中

千金理諸噎方

常食乾粳米飯即不噎

又方

炭末細羅蜜丸如彈子大含少細細嚥津即下集驗同並出第十六卷中

集驗療噎方

取頭垢如棗大以粥若漿水和服之肘後深師同出第十卷中

必効主噎方

鏉捺大推盡力則下仍令坐之

又方

以酢煮麪糊噉之則差此只可一兩日差欲長久絶者取㮣爲丸如彈子酢中煮熟於水中漉却及熱則食二十丸神驗不過三兩度則差大効

又半夏湯主噎方

生薑四兩 半夏一升洗 石膏四兩碎 小麥一升完用

吴茱萸一升 赤小豆二十顆 大棗二十一顆 人參

甘草炙 桔梗 桂心各二兩

右十一味切以酒二升水八升煮取三升分三服忌猪羊肉

海藻菘菜餳生葱等古今録驗有栝樓無桔梗名乾薑湯不用生薑

又方

杏人二兩去尖皮并兩人熬 桂心二兩

右二味末之蜜和丸含之如棗核許稍稍嚥之臨食先含彌

極効忌生葱千金同並出第二卷中

古今録驗療噎方

蘆根三斤

右一味切以水一斗煮取四升分四服出第二十七卷中

卒食噎方九首

病源此由藏氣冷而不理津液澀少而不能傳行飲食故食入則噎塞不通故謂之食噎胸內痛不得喘息食不下是故噎也出第二十卷中

肘後療卒食噎方

橘皮三兩

右一味切以水三升煑取一升頓服之

又方

舂杵頭糠置手巾角以拭齒立下集驗深師千金同並出第五卷中

深師療卒噎法

傍人可緩解衣帶勿令噎者知則愈

又療卒噎方

與共食人當以手捉噎人筋問曰此等何物噎人當

荅言筯共食人云噎下去則立愈

又療卒噎不下方

水一柸　刀一口

右二物先以刀橫畫水已後盡飲之則下出第二十二卷中

集驗療醋噎方

羌活五兩

擣用水一升浸三宿每日温服五合差

又療氣噎不下食兼嘔吐方

半夏四兩洗　生薑三兩各切

右二味以東流水二大升煎取一升去滓温服三合三日服

忌羊肉餳並出第五卷中

備急療卒食噎不下方

取蜜含之則下千金集驗肘後同

又方

取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不有噎必効肘後深師千金同並出第三卷中

五噎方三首

病源夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絶津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也出第二十卷中

古今録驗五噎丸療胷中久寒嘔逆逆氣隔飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胷脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣隔脅下支滿胷中塡塞令手足逆冷不能自温食噎者食無多少唯胷中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮

脏比皆憂恚嗔怒寒氣上叉胷脅所致療之方

乾薑　蜀椒汗　食茱萸　人參

桂心各五分　細辛　白朮　茯苓

附子炮各四分　橘皮六分

右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子酒服三丸日再不知漸增忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱生菜酢物出第二十七卷中

經心録五噎丸主五種之氣皆令人噎方

人參　半夏　桂心　防葵一方用防風小草各二兩

附子炮　細辛　甘草炙各二兩　食茱萸五合

紫菀　乾薑　芍藥　枳實炙

烏頭各六分炮

右十三味擣篩以蜜和爲丸如梧子大服五丸日三不知加

至十五丸忌羊肉餳海藻菘菜猪肉生葱生菜千金同出第二卷中

集驗噎塞不通方

　　嘗實根十二分

右一味擣爲散酒下方寸匕日三服出第五卷中

　　諸骨哽方三十五首

肘後療食諸魚骨哽百日哽者方

　　用綿二兩以火煎蜜内一段綿使熱灼灼爾從外薄哽所在處灼熨以熨綿上若故未出復煑一段綿以代前并以皁莢屑少少吹鼻中使得哽出矣祕方不傳禮云魚去乙謂其頭間有骨如乙字形者哽入不肯出故也

又方

　　取捕魚竹笱鬚灒燒末飲之魚網亦佳

又療食諸肉骨哽方

白雄雞左右翮大毛各一枚燒末水服一刀圭也仍取所食餘者骨左右手反覆擲背後則丁也文仲備急同

又方

燒雞足末服方寸匕酒下立出深師同

又方

生艾蒿數升水酒共一斗煑取三四升稍稍飲之深師同

凡療病皆各以其類豈宜以鸕鷀療肉骨狸虎療魚哽耶至於竹篾薤白嚼筋綿蜜事乃可通爲諸哽用耳又有呪術小小皆須師解故不備載出第五卷中

深師療食魚骨哽方

捕魚網燒飲服刀圭匕良是魚哽燒魚網服之良

又療哽及刺不出方

服薔薇灰末方寸匕日三亦療折箭刺入膿囊不出堅燥及鼠撲服之十日哽刺皆穿皮出效

又療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不下方

半夏（洗二兩） 白斂（二兩）

右二物擣篩酒服半錢匕日三寧從少少起者半夏戟人喉中故也忌羊肉餳等加乾薑一兩尤佳

又方

鼠腦厚塗瘡上則出亦可用墳鼠大效

又療哽方

螻蛄腦

右一物呑即下亦療刺不出塗刺瘡上

又療咽哽方

又方

取魚尾著衣領令下推立下

又療食哽方

白斂白芷等分擣散飲服刀圭

鷹糞燒

右一物下篩服方寸匕虎狼鵰屎皆可服之佳

又療骨哽咽不得下飲食方

白雞翼翮大毛各一枚著銅器中燒之焦作灰飲

服一刀圭立下

又療哽方

半夏五兩洗　白芷五兩

右二物擣篩服方寸匕則嘔出忌羊肉餳

又方

以東流水一杯東向坐以手指畫水上作龍字訖飲

水不自燒書令他人持手書良

又方

凡書文曰天有門地有根諸家入口者皆當得吞集驗同並出第二十二卷中

千金療哽方

取鹿筋漬之濡索之大如彈丸持筋端吞之候至哽處徐徐引之哽著筋出集驗同

又方

極吹之食骨鯁燒虎狼屎服

又方

末虎骨若狸骨服方寸匕集驗同

又方

服瞿麥末方寸匕集驗同古今錄驗云兼主折刺不出

又方

吞猪膏如雞子大不差更吞差止古今錄驗同

又療諸哽方
作竹篾刮令滑綿纏内咽中令至哽處可進退引之
哽即出小品古今録驗深師同
又療諸哽方
鸕鷀屎末服方寸匕集驗古今録驗同
又療魚骨哽方
口稱鸕鷀鸕鷀則下並出第二十六卷中
張文仲療食諸魚骨哽方
以魚骨插頭上則立下陶云因謦欬則出肘後備急同
又方
小嚼薤白令柔以繩繫中央持繩一端吞薤到哽處
引哽當隨出集驗古今録驗深師備急千金同
又療魚骨哽在喉中衆法不能去者方

取飴糖丸如雞子黃大呑之不去又呑亦漸大作丸比用得効也肘後備急千金集驗小品同

又療食中呑髪哽不去繞喉者方

取梳頭髪燒灰飲服一錢匕肘後備急集驗千金同並出第三卷中

救急療哽方

好蜜以一匙抄稍稍嚥之令下良文仲同

又療魚骨哽在喉中方

以少多硇砂口中咀嚼嚥之立下出第七卷中

必効療魚骨哽方

含水獺骨立出小品同

又方

魚網覆頭立下千金云燒灰服半匕小品同出第二卷中

古今録驗療魚哽骨攅喉中六七日不出方

取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出也未出更服之取出爲度出第二十九卷中

雜誤吞物方一十七首

肘後療誤吞鈎方

若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若薏子輩就貫之著繩稍稍令推至鈎處小小引之則出

又方

以小羊喉以沓繩推至鈎處當退脫小引則出

又方

但大戾頭四向顧小引之則出

又方

常思草頭一把二升水淘灌之十餘過而飲之

又療誤吞諸木竹叉輩方

取布刀故鋸燒漬酒中以女人大指甲二枚燒末內
酒中飲之
又方
若是桃枝竹釵但數數多食白糖自消去
又療以銀釵簪筯擿吐因氣吸誤吞不出方
多食白糖漸漸至十斤當裹物自出此說與葛氏
小品並出第五卷中
深師療誤吞鉤方
虎珀珠
右一物貫著鉤繩推令前入至鉤所又復推以牽引出矣若
水精珠卒無珠堅物摩令滑用之也出第二十二卷中
千金療誤吞環若指彄方
燒鴈毛二七枚末服之鵝羽亦佳備急文仲同

又誤吞珠銅鐵而哽者方

燒弩銅牙令赤内酒中飲之立愈出第二十六卷中

張文仲療吞諸珠璫鐵而哽方

燒弩銅牙令赤内水中飲其汁立愈肘後備急同

又療誤吞錢方

擣火炭末服方寸匕則出肘後小品集驗千金備急深師同

備急葛氏誤吞釵方

取薤暴令萎煮令熟勿切食一大束釵則便隨出生

麥菜若筋縷皆可用良効千金肘後同

又誤吞釘及箭金鍼鐵物等方

多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出肘後千金文仲同

並出第五卷中

古今録驗療誤吞銀鐶及釵者方

取飴糖一斤一頓漸漸食盡多食之鏁及釵便出小品集驗千金同

又方

取水銀一兩分服之釵便下去也亦可以胡粉一兩擣調之分再服食銀令如泥也若吞金銀物在腹中皆服之令消烊出之

又療誤鯁鍼方

取精吸鍼磁石末酒白飲服一方寸匕解曰磁石特能吸取鍼難云令吞鍼哽在喉中而服磁石末入腹耶若含磁石口中者或吸錢出耳二理詳取其義焉

小品集驗千金同出第二十九卷中

外臺祕要方卷第八

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔校勘

外臺祕要方

九

欬嗽

外臺秘要方卷第九 欬嗽二十三門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

欬嗽方三首

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑爲表裏皆禀氣於肺以四時更王五藏六腑皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬者乗秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音聲甚則唾血乗夏則心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乗春則肝先受之肝欬之狀欬則兩（一作左）脅下痛甚則不可轉側兩胠下滿乗季夏則脾先受之脾欬之狀欬則右脅下痛陰陰引於肩背甚則不可以動動則欬乗冬則腎先受之腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬逆此五藏之欬也五藏欬久不已傳與六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺糞心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣失氣者

與欬俱出腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺溺久欬不已則三膲受之三膲欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種欬一曰風欬欲語因欬言不得終是也二曰寒欬飲冷食寒注入於胃從肺脉上氣內外合因之而欬是也三曰支欬心下硬滿欬則引四肢痛其脉反遲是也四曰肝欬欬而引脅下痛是也五曰心欬欬而唾血引手少陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹是也七曰肺欬欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬欬則耳聾無所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口苦是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以前脉手陽明經也其脉浮則爲陽實陽實者病苦腹滿善喘欬脉微大爲肝痺欬引少腹欬嗽脉浮大者生沈小伏匿者死又云脉浮直者生沈硬者死欬且嘔腹脹且泄其脉弦弦欲絶者

死欬脫形發熱脉小硬急者死欬且羸瘦絡脉大硬者死欬而尿血羸瘦脉大者死出第十四卷中

小品療欬嗽紫菀七味湯方

紫菀半兩　五味子一兩　桂心二兩　杏人七十枚去皮尖兩人碎

乾薑四兩　麻黄四兩去節　甘草二兩炙

右藥切以水九升煎取二升半去滓溫服七合日三服經心録古今録驗同忌海藻菘菜生葱蒜麪腥膩出第二卷中

延年紫菀飲主欬嗽方

紫菀　貝母　茯苓　杏人去皮尖兩人者

生薑各三兩　人參二兩　橘皮一兩去脉

右七物切以水五升煑取一升五合去滓分溫三服如人行七八里更進一服忌葱蒜麪酢張文仲處古今録驗同出第

五卷中

古今録驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬六兩去心　杏人三升去雙人皮尖碎　椒三升熬令汗出　桂心

厚朴炙　杜仲　苦參各三兩　附子六兩炮

乾薑六兩　烏頭二枚炮　人參六兩　蜈蚣一枚去頭足炙

右十二味別擣杏人其餘者合擣下篩以五斤膠飴和擣千杵服如大棗一枚日三忌冷水猪肉生葱鯉魚出第九卷中

五嗽方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰鱢嗽四曰冷嗽五曰邪嗽四滿丸方

乾薑　桂心　躑躅花　芎藭

紫菀　芫花根皮各二分　人參　細辛

甘草炙　半夏洗　鬼督郵各一分　蜈蚣一枚去頭足炙

右十二物擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方祕不傳忌羊肉餳生葱生菜海藻菘菜

又方

特生礜石（一兩泥包燒半日） 款冬花（一兩） 豉（三百枚擣千杵）

巴豆（十六枚去心皮熬別擣如脂）

右四味擣篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增至四五丸忌野猪肉蘆笋並出第十八卷中（古今錄驗療三十年欬）

備急華佗五嗽丸方

皂莢（炙） 乾薑 桂心

右三物等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三忌葱出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一爲氣嗽二爲痺嗽三爲燥嗽四爲

邪嗽五爲冷嗽悪療之方
蜈蚣二枚炙　芫花根五分熬　躑躅花四分　乾薑
芎藭　桂心各四分　人參　細辛各二分
右八味擣篩蜜和爲丸一服米飲下五丸如大豆許日三稍加至十丸忌生葱生菜出第十九卷中
新久欬方三首
深師療新久欬嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黄湯方
麻黄四兩去節一方二兩　桂心二兩　甘草二兩　大棗十四枚擘
右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有効忌海藻菘菜生葱等物
又療新久欬嗽前胡丸方
前胡六分　烏頭二枚炮　桔梗　乾薑各二分
桂心八分　蜀椒八分汗

右六味擣篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之汁日三又療
久欬晝夜不得卧咽中水雞聲欲死者療之良忌猪肉冷水
生葱並出第十八卷中

千金療新久欬嗽欵冬花煎方

欵冬花　乾薑爲末　芫花根熬爲末各二兩

五味子　紫菀各三兩

右五味先以水一斗煑三物取三升半去滓内芫花乾薑末
加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如飴可一
升半服棗核大含之日三服曽數用甚良忌蒜麪腥膩深師
同出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

釜月下土一分　豉七分熬

右二物熬擣蜜丸如梧子大米飲服十四丸曽用有驗

又方

飴糖六分　乾薑六分末　豉二兩

右三味先以水二升煑豉三兩沸去滓内飴糖消後内乾薑末分爲三服

又方

生薑汁　百部根汁

右二物合煎服二合並出第一卷中

張文仲卒欬方

百部根四兩

右一物酒一斗煑之再宿火温服一升日再服之効肘後同

又方

温清酒一升　驢膏一升

右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒欬嗽方

芫花熬二兩

右一物水二升煮四沸去滓内白糖一斤服如棗大勿食鹹酸物亦療久欬肘後同

又方

爐中取鈆屑一分 桂心二兩 皂莢二兩去皮子炙

右三物擣篩蜜和丸如梧子許大人米飲下服十五丸小兒五丸日二服忌生葱肘後同並出第三卷中

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黄湯方

麻黄去節 細辛各二兩 甘草半兩炙 桃人二十枚去皮尖兩人者研

右四味切以水七升煮取三升去滓分三服祕方忌海藻菘菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏人飲方

杏人四十枚去皮尖兩人研　柴胡四兩　紫蘇子一升　橘皮一兩

右四味切水一斗煑取三升分三服常服飲之不妨出第十八卷中本方無紫蘇子有乾棗

延年貝母煎主暴熱欬方

貝母三兩　紫菀　五味子　百部根

杏人去皮尖兩人者研　甘草炙各二兩

右六味切以水五升煑取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好蘇二合生薑汁一合又先取地黃麥門冬及湯汁和煎減半內蘇薑汁攪不得停手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚥之日三夜再蔣孝璋處忌海藻菘菜鹹物出第五卷中

冷欬方三首

深師療冷欬逆氣乾薑湯方

乾薑四兩　紫菀一兩　杏人七十枚去皮尖雙人切　麻黃四兩去節

桂心　甘草二兩炙各　五味子一兩

右七味切水八升煑取二升七合分三服平體人加射干一兩

代乾薑忌海藻菘菜生葱等

又療冷飲欬芫花煎方

芫花二兩　乾薑二兩　白蜜二升

右三味擣篩二味内蜜中攪令相和微火煎令如糜服如棗核一枚日三夜一欲痢者多服並出第十八卷中千金主新久欬

千金療冷嗽方

乾薑三兩末　膠飴一斤

右二味攪令和調蒸五升米下令熟以棗大含化稍稍嚥之

日五夜三出第十八卷中

欬失聲方四首

廣濟療咽喉乾燥欬嗽語無聲音桂心散方

桂心三兩 杏人三兩去皮尖雙人熬擣

右二味擣篩爲散以蜜和綿裹如棗大含之嚥汁日三夜二

忌生葱油膩出第二卷中

古今録驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中瘂塞失音聲者方

取芫花根一虎口切暴

右一味令病人以薦自縈就裏舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆罹刺郎達切畢畢耳勿住令芫花根盡則止病必於此差

又療忽暴欬失聲語不出杏人煎方

杏人一升去皮尖兩人者熬 通草四兩 紫菀 五味子各三兩

貝母四兩　桑白皮五兩　蜜一升　清糖一升
生薑汁一升
右九味切以水九升煑五味取三升去滓內杏人脂薑汁蜜糖和攪微火上煎取四升初服三合日再夜一稍稍加之千金同忌蒜麪炙肉等

又通聲膏方

五味子　款冬花　通草各三兩　杏人一升去尖皮兩人者熬
人參　桂心　細辛　青竹皮
昌蒲　酪酥各二兩　棗膏三升　白蜜一升
薑汁一升
右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏煎令調和酒服如棗二枚忌生菜生葱羊肉餳並出第十九卷中千金用蘇五升棗膏蜜各二升餘同

氣嗽方八首

病源夫肺主氣候皮毛人有運動勞役其氣外泄腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故爲暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫出第十四卷中

古今録驗療患氣嗽并下焦冷結方後四方同療姚大夫別録要方

紫菀　貝母　百部根　款冬花

五味子　半夏洗各五分　射干十分　芫花根皮四分切熬令焦

乾薑　橘皮各四分　杏人八分去皮尖雙人者熬　蘇子四分

白石英八分研　鐘乳十分研

右十四味擣篩以蜜和爲丸如梧桐子酒服十丸日再稍加至三十丸忌羊肉餳諸生冷等物

又方

乾地黄　桂心　山茱萸　五味子各三兩

茯苓四兩　茯苓　丹參　澤瀉

甘草炙　鍾乳研各二兩

右十味擣篩蜜和酒服十五丸如梧子日增至三十丸忌海藻生葱醋物菘菜蕪荑

又酒方

丹參　乾地黃各五兩　芎藭　石斛

牛膝　黃耆　白朮　茯苓各四兩

防風　獨活　附子炮　秦艽

桂心　乾薑各三兩　鍾乳六分研

右十五味切以酒三斗浸七日初服二合日再稍稍加之忌食桃李雀肉生葱豬肉冷水蕪荑

又丸方

乾地黃四兩　防風　茯苓　澤瀉各三兩

山茱萸　丹參　五味子　茯神各二兩一方作茯苓
桂心一兩半
右九味擣篩蜜和丸如梧子酒服二十丸日再稍加至三十丸忌醋物生葱蕪荑並出第十九卷中

延年杏人煎主氣嗽方
好杏人一升去皮尖兩人者酥熬　糖一合　蜜五合　酥一合
生薑汁一合　貝母八合別篩末　蘇子汁一升以七小合蘇子研水和濾取汁
右七味先擣杏人如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之忌猪肉蒋孝瑜處

又療氣嗽煎方
貝母　紫菀　百部根炙　款冬花
甘草炙各三兩　桂心二兩
右六味切以水六升煑取一升五合去滓內後

生地黃汁三升 生麥門冬汁五合 生薑汁五合 白蜜五合
酥五合 白糖五合 杏人三合去皮尖雙人熬擣作膏
煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忌海藻生葱
菘菜蕪荑蒜醋鹹食猪肉等

又療氣嗽杏人煎方

杏人五合去皮尖擣研 生薑汁二合 酥一合 蜜三合
右四味以水三升研杏人取汁內銅鐺中煎攪可減半內
薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三服夜一
服稍加至兩匙忌猪肉

又杏人煎主氣嗽方

杏人一升去尖皮兩人者研濾取汁 酥三合 白蜜三合
右三味以水三升研濾杏人令味盡內銅鐺中煎可減半內
酥蜜煎二十沸內貝母末四分紫菀末三分甘草炙末一

分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以欬嗽止爲度大驗忌蒜猪肉並出第五卷中

呷欬方二首

病源呷欬者猶是欬嗽也其胷膈淡飲多者欬則氣動於淡上搏咽喉之間淡氣相擊隨欬動息呼呷有聲謂之呷欬其與欬嗽大體雖同至於投藥則應加消淡破飲之物以此爲異耳出第十四卷中

崔氏三十年以來呷欬並療之方

莨菪子新者　南青木香眞者　熏黃無石臭者

右三味等分擣篩爲散以羊脂塗青紙一張以散藥著紙上卷裹之平旦空腹燒裹頭令煙出吸取十嚥日中時復吸十嚥日晚後吸十嚥七日內禁生冷醋滑三日則差出第六卷中

古今録驗療呷欬書墨丸方大神驗萬年縣令席君懿送

書墨二分　甘遂二分　葶藶子二分熬　前胡五分

大黄五分　巴豆二分去心皮熬

右六味擣篩爲散巴豆葶藶别細研蜜和丸如梧子以白蜜粥清飲旦空腹服三丸人弱服二丸則利水或吐三日以後更一服還如上法不過三服愈療三十年欬如利不止者以冷白飲止之吐利止後食禁生冷醋滑猪魚雞麪油酒冷水蒜蘆笋此藥宜春夏服之有毒之藥寧從少起出第十九卷中廣濟療瘕嗽上氣喉中作水雞鳴

熏欬法六首

千金療欬熏法

細熟艾薄薄布紙上廣四寸復以石硫黄末薄布艾上務令調匀以荻一枝如紙長卷之作十枚先以火燒纒下去荻其

煙從荻孔中出口吸取煙嚥之取吐止明旦復熏之昨日餘者後日復熏之三日止自然差惟得食白糜餘皆禁之古今録驗同

又法

熏黃（研令細一兩）

以蠟蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻卷之如前法裹之亦如上法日一二止以吐爲度七日將息後羊肉羹補之

又法

爛青布廣四寸上布艾艾上又布青礬石末礬上布少熏黃末又布少鹽又布少豉末急卷之燒令著内燥罐中以紙蒙頭作小孔以口含取煙嚥之以吐爲度悶時復息煙盡止日一二用三卷用不盡差三七日慎油膩並出第十八卷中

崔氏療久欬不差熏法

款冬花

右一味每旦取如雞子許用少許蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一瓷椀合鐺椀底鑽一孔孔內插一小竹筒無竹葦亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆麪埿之勿令漏煙氣鐺下著炭火少時款冬煙自從筒中出則口含筒吸取煙嚥之如覺心中少悶須暫舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是三日一度爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓則永差出第六卷中

古今錄驗療欬欱呼合切下同煙法

鍾乳研　白石英研　人參　丹參研

雄黃各七分研　水銀二分研　烏羊腎脂一具　淨紙十張

右八味各擣篩爲末以水銀投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置紙中令均平使厚一分散藥令周遍翦紙一張作三分

瘦弱婦人五日用半寸熏末服藥前齊五日服藥後一百日
忌五辛酒肉此一劑得瘵五十人上氣悉皆愈忌生血物

又療欬腹脹氣上不得卧身體水腫長孫振熏法

蠟紙一張熟艾薄布遍紙上

熏黄末一分　款冬花末二分

右三味並遍布艾上著一葦筒卷之寸別以繩繫之燒下頭
飲煙嚥之亦可三十寸嚥飲訖則差飲盡三劑一百日斷鹽醋
日一每飲三寸三日盡一劑出第十九卷中

療欬方一十四首

深師療欬方

巴豆炮去殼勿傷肉

右完吞初日飲服二枚日三服良忌野猪肉蘆笋千金同

又方

蜀椒一合汗去目　杏人去皮熬倍少於椒　豉少多與杏人相似熬　款冬花如豉一半多

右四味擣蜜和爲丸晚間不食含一丸如彈丸大含一丸則知効驗十年者五六日知良並出第十八卷中

小品療欬生薑五味子湯方

五味子五合　生薑八兩　紫菀一兩　半夏二兩洗

吴茱萸一兩　款冬花半兩　細辛一兩　附子一枚炮

茯苓四兩　甘草二兩炙　桂心一兩

右十一味切以水一斗煑取五升分温三服老人可服五合忌海藻菘菜猪肉冷水羊肉餳生菜醋物生葱古今録驗同出第一卷中

備急療欬方

杏人半斤去尖皮兩人者熬　紫菀二兩

右二味先研杏人取汁使盡細切紫菀更煎少濃去滓内蜜

使稠細細飲之立定出第三卷中

崔氏療欬方

杏人一升去尖皮兩人熬 蘇子汁五合 生薑汁五合煎 蜜五合煎令沫盡

右四味先擣杏人作脂訖內諸藥和煎攪調三四沸藥成含嚥如棗大日三四忌蒜麪出第六卷中

延年紫菀飲主欬方

紫菀一兩半 貝母二兩 杏人一兩半去皮尖兩人者研 人參一兩

橘皮半兩 生薑一兩

右六味切以水二升五合煑取八合分三服欲再服亦得慎鹹醋蒜麪蔣孝璋處出第五卷中

必効療欬方

棗一百二十顆去核 豉一百粒 桃人一百二十顆去皮尖兩人者熬令色黃

右三味合擣爲丸如棗大含之無不差

又方

雞子白皮（十四枚熬令黄） 麻黄（三兩去節）

右二味擣成散每服方寸匕日二食後飲下之無所忌

又方

麻黄（二兩去節） 紫菀（二兩） 貝母（三兩去心）

右三味擣篩蜜和丸如杏核綿裹含稍稍嚥汁盡更作日四五度

又方

杏人（一百二十枚去皮尖熬） 豉（一百枚熬令乾） 乾棗（四十枚去核）

右三味合擣如泥丸如杏核含嚥令盡日七八度盡更作出第一卷中

古今錄驗百部湯療欬晝夜不得眠兩眼突出方

百部（半兩） 生薑（半斤） 細辛（三兩） 貝母（三兩）

甘草二兩炙 杏人四兩去皮尖兩人者 紫菀三兩 桂心二兩
白朮二兩 麻黃六兩去節 五味子二兩
右十一味切以水一斗二升煮取三升分三服忌桃李雀肉海藻菘菜生葱千金無杏人紫菀餘同

又療欬噏散方
細辛 紫菀 天雄炮 石膏
款冬花 鍾乳各二分
右六味擣篩作散如大豆七聚以小竹筒噏服日二不得食生魚醬醋生菜但食糜七日欬愈乃止若大豆聚不知亦小益勿太多甚良忌生菜冷水猪肉千金同

又療欬麻黃五味子湯方
麻黃四兩去節 五味子五合 甘草二兩炙 半夏三兩洗
乾薑五合 細辛二兩 桂心六兩 杏人三兩去皮尖兩人者

右八味切以水一斗煮取四升去滓分温五服日三夜二忌海藻菘菜羊肉餳生菜生葱

又療欬羊肺湯太醫史脫方

款冬花（一兩） 紫菀 乾薑 細辛（各一兩）

桂心 甘草（炙各半兩） 五味子（半升） 白前

食茱萸（各半兩） 羊肺（一枚細切）

右十味切以水八升合煮取三升去滓一服三合日三禁食鹽蒜生菜海藻菘菜生葱並出第十九卷中

積年久欬方二十一首

病源肺感於寒微者則成欬嗽久欬嗽是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有欬嗽不已則各傳其腑諸久欬不已三膲受之其狀欬而腹滿不欲食飲此皆寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而變面浮腫氣逆故也出第十四卷中

深師療五藏欬積年劇則上氣不得卧喉中如有物醫所不療

五愈丸方

桂心　細辛　乾薑　白菀

甘草炙各三分　蜀椒汗　代赭　通草

款冬花　芫花熬各一分　伏龍肝　紫菀

牡蠣各二分熬

右十三味擣篩以飴糖和之擣令調和如棗核一丸含之稍稍嚥其汁盡復含令胷中熱爲候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲欬者一月愈十歲欬者百日愈忌海藻菘菜生葱生菜等

又療三十年欬芫花煎方

芫花二兩　乾薑三兩末之

右二味以水五升煮芫花取三升去滓内薑末加蜜一升合

煎之如糜一服如半棗日三不知加之一方不用乾薑取芫花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸日三

又療三十年欬氣奔上守死醫所不療海藻丸褚仲堪方

海藻三分 麥門冬五分去心 昆布 乾薑

細辛 文蛤 桂心 蜀椒各二分汗

右八味擣篩蜜和服如杏人許夜卧一丸著舌上稍稍嚥汁盡更著一丸忌生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四肢煩疼食飽則劇時有發甚不能行步夜不得卧多夢香豉丸

香豉四分熬 杏人二分去尖皮兩人熬 紫菀三分 桂心三分

甘草八分炙 乾薑二分 細辛三分 吳茱萸二分

右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚼嚥汁亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽款冬花丸方

款冬花六分　桂心四分　紫菀六分　杏人四分去尖皮兩人熬

附子二兩炮　藜蘆四分　乾薑六分　甘草七分炙

細辛六分　防風八分　芫花六分熬　蜀椒八分汗

野葛四分去心

右十三味擣篩蜜和丸如梧子服三丸稍加日三服忌生葱辛鹹醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味此方忌酢恐有茯苓

又療三十年欬逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血師藥不能療者方

香豉三升熬　蜀椒一升汗　乾薑一斤　猪肪三分

右四味擣篩內肪藥中以水五升合豉等物熟煎每以二合服之大効

又療三十年欬嗽七星散方

蜀椒 斤 桑根白皮 芫花根皮 款冬花

紫菀 代赭 細辛 伏龍肝 各一兩

右八物擣爲散取作七星聚聚如藊豆大以竹筒口當藥上一噏䗾之令藥入腹中先食訖即服藥日三服後三日不差復作七聚以一臠肉炙令熟以轉展藥聚上令藥悉在炙肉中仰卧㕮咀炙肉汁令藥力歆歆皆毒螫咽中藥力盡吞肉前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法必愈乃止羊牛鹿肉皆可用勿用猪肉忌生菜並出第十八卷中 千金延年

不用椒與芫花根餘同

千金療三十年欬嗽方

蜜一斤 生薑 二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖内蜜復秤知斤兩次内薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日

三禁一切雜食

又療三十年欬方

紫菀二兩　款冬花三兩

右二味爲散先食飲服一錢匕日三七日愈張文仲古今錄驗深師同

又療三十年欬方

百部根二十斤

右一味擣取汁煎之如飴以温粥飲服方寸匕日三服深師方白蜜二升更煎五六沸服三合有驗

又療久欬不差方

兎矢四十九枚　胡桐律一分　硇砂三分

右三味擣篩蜜和爲丸服如梧子三丸令吐冷物盡則差並出第十八卷中

延年療久欬不差方

猪腎一具去脂膜 椒二十八顆開口者

右二味取腎一顆上作十四孔取椒内孔中兩腎揔著二十八顆了以水緩煑令熟劃破細切噉之令盡有驗張文仲處出第五卷中

崔氏療積年欬喉中啞聲方

芫花根白皮六分切熬令焦黑 貝母十二分 款冬花六分

百部根八分切熬 杏人十分去尖皮熬 皂莢四分去皮子炙 五味子六分

蜈蚣半枚炙 桑白皮六分 麻黃八分去節 紫菀八分

右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子一服五丸日再服加至十五丸煑棗汁送之出第六卷中

必効療欬嗽積年不差者胷膈乾痛不利方

紫菀一大兩 杏人四十九枚去兩人尖皮熬 酥一大合 蜜一大合

右四味紫菀及杏人各别擣先煑酥蜜攪令和内紫菀杏人研破塊煎十餘沸藥成出瓷器中每日空腹服一彈丸細細含嚥之忌酒麪及猪肉等凌空道士得此方傳効不復可言

又方

莨菪二分以水淘去浮者水煑令牙出焙乾炒令黄黒色 酥一雞子許 大棗七枚

右三味鐺中煎令酥盡取棗去皮食之日二

又方

生薑五兩 餳半大升

右二味取薑刮去皮如筭子切之置餳中微火煎薑使熟食使盡則差叚侍御用之極効

又方

款冬花

右一味和蜜火燒含取煙嚥之三數度則差

又方

取莨菪子三指撮吞嚥蟲之日五六度光祿李丞自服之極神効並出第一卷中

古今錄驗療人三十年寒冷欬逆上氣麻黃湯方

麻黃八分去節　蜀椒四分汗　細辛三分　藁本二分

杏人五十枚去皮尖兩人者碎

右五味切以水七升煑取三升分爲三服日三忌生菜

又許明療人久欬欲死方

取厚榆皮削如指大去黑皰令如鋸長尺餘内喉中頻出入當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年欬氣久寒冷痺脾中客熱變爲冷方

食茱萸一兩　甘草一兩　香豉二十枚　細辛

杏人去尖皮兩人者熬各一兩　紫菀二兩

右六味擣篩爲末別擣杏人如膏乃內末攪令勻蜜和丸如梧子服三丸日三不知增之至五丸暮臥時含十丸著咽喉中嚥之忌海藻菘菜生菜出第十九卷中

久欬坐臥不得方二首

集驗療久患氣嗽發時奔喘坐臥不得并喉裏呀聲氣欲絶方

麻黄去節 杏人去尖皮兩人者碎 紫菀各三兩 柴胡

橘皮各四兩

右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不差頻兩三劑從來用甚驗張文仲同出第四卷中

備急療久欬奔喘坐臥不得并喉裏呀聲氣絶方

麻黄去節 乾蘇葉 橘皮各三兩 杏人四兩去尖皮兩人者碎

柴胡四兩

右五味切以水六升煮取二升半分三服服兩劑必差甚効

張文仲同出第三卷中

欬嗽短氣方七首

病源肺主於氣候於皮毛氣虛爲微寒客於皮毛傷於肺氣不足則成欬嗽夫氣得溫則宣和得寒則否澀虛則氣不足而爲寒所迫併聚於肺間不得宣發故令欬而短氣也出十四卷中

深師療傷中欬嗽短氣腸中痛流飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五內不調肉蓯蓉湯方

肉蓯蓉五兩 乾地黃四兩 大棗三十枚擘 烏頭一兩炮

甘草炙 桂心 紫菀 五味子各二兩

生薑 石膏碎綿裹 麥門冬去心各三兩

右十一味切以水一斗五升煮取七升去滓分爲七服日四夜三一方用大棗五十枚水一斗二升煮取九升忌海藻生葱菘菜蕪荑猪肉冷水

又療上氣咽喉窒塞短氣不得卧倚壁而息腰背苦痛支脅滿不能食面色痿黃貝母飲方

貝母　石膏（綿裹碎）　桂心　麻黃（去節）

甘草（炙各二兩）　杏人（三十枚去尖皮兩人者）　生薑（五兩）　半夏（五兩洗）

右八味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉生葱餳等

又療欬而下利胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒海藻湯方

海藻（四兩）　茯苓（六兩）　半夏（五合洗）　五味子（五合）

細辛（二兩）　杏人（五十枚去尖皮兩人者）

右六味切以水一斗煮取二升分三服忌羊肉餳生葱醋物千金同出第十八卷中（一方有生薑一兩）

古今録驗五味子湯療逆氣欬嗽胷膈中寒熱短氣不足方

五味子一兩 前胡三兩 紫菀 甘草炙

桂心 生薑各二兩 棗三十枚擘 山茱萸三兩

右八味切以水一斗煮取七升絞去滓服一升日三夜三忌生葱海藻菘菜廣濟方用橘皮不用茱萸

又胡椒理中丸療欬嗽逆氣不能飲食短氣方

胡椒 畢撥 乾薑 款冬花

甘草炙 橘皮 高良薑 細辛各四兩

白朮五兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀肉生菜海藻菘菜

又瀉肺湯療欬逆短氣方

人參三分 生薑四分 半夏五分洗 甘草四分炙

橘皮十二分 竹葉二兩

右六味切以水六升煮取二升分三服此方亦療霍亂忌羊肉餳海藻菘菜

又療欬嗽及短氣脅痛薑椒湯方

生薑　椒去目汗各一兩

右二味切以水五升煮取三升每服一合並出第十九卷中

九種欬嗽方一首

千金九種氣欬嗽欲死百病方

乾薑二分　半夏洗　細辛　紫菀

吳茱萸　芫花　茯苓　甘遂

防葵　甘草炙　人參　烏頭炮

大黃　葶藶子熬　巴豆去皮心熬　厚朴炙

杏人去皮尖兩人者熬各一分　五味子　遠志去心　枳實炙

皂角去皮子炙　當歸　桂心　前胡

昌蒲　大戟　蜀椒各半分　白薇三分

右二十八味擣合蜜丸先食服如梧子二九日三以知爲度不知增之忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物野豬肉蘆笋出第十八卷中一方無巴豆有䗪蟲半分恐非

欬逆及厥逆飲欬方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣爲陽流行腑藏宣發腠理而氣肺之所主也欬病由肺虛感微寒寒所成搏寒於氣氣不得宣胃逆聚還迫肺肺則脹滿氣逆不下故爲欬逆其狀欬而胷滿氣逆髆背痛汗出尻陰股膝踹䯒足皆痛也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云先以鼻內氣乃閉口欬還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃臥伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復爲之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑又云還迫向

反望側𫎇不息七通治欬逆胷中病寒熱出第十四卷中

深師療欬嗽短氣不得息發熱胷苦滿不得飲食五味子湯方

五味子二兩　桂心　甘草炙　細辛各一兩

乾薑三兩　紫菀二兩一方一兩　大棗二十枚擘　麻黃二兩去節

右八味切以水八升煮取三升分三服無乾薑生薑亦得忌

海藻菘菜生菜生葱出第十八卷中

千金竹皮湯主欬逆下血不息方

生竹皮三兩　紫菀二兩　飴糖一斤　生地黃汁一升

右四味切以水六升煮取三升分三服忌蕪荑深師同

又大逆上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方

麥門冬二升去心　半夏一升洗　人參　甘草各二兩炙

粳米三合　大棗十四枚

右六味切以水一斗二升煮取六升服半升日三夜一忌羊

肉餳海藻菘菜並出第十八卷中（此本仲景傷寒論方）

古今録驗療厥逆藏氣有餘寒氣虚勞憂氣驚氣其人善悸胷中或寒上下無常多悲傷流四肢臍四邊常有核遊腫大便不利遊氣湯方

厚朴（四兩炙） 人參 甘草（炙） 牡蠣（各二兩熬）

茯苓（四兩） 桂心 半夏（各一兩洗） 梔子（四枚）

生薑（八兩） 黄芩（三兩）

右十味切以水九𠂤煮取三𠂤半去滓分服七合日三夜再若腹痛去黄芩加芍藥（三兩）良驗忌海藻菘菜生葱羊肉餳醋物等

又療欬逆上氣丸方

乾薑（四兩） 桂心 款冬花（各一兩） 附子（四箇炮）

五味子（二兩） 巴豆（六十枚老者三十枚去皮心熬）

右六味先擣上五味下篩別擣巴豆如膏內藥末以蜜和丸如麻子以一丸著牙上咬咀常暮臥時服亦可日三服忌生葱猪肉蘆笋

又小胡椒丸療寒冷欬逆胷中有冷咽中如有物狀吐之不出方

胡椒五分　乾薑六分　款冬花三分

右三味擣篩蜜和丸如梧子大米飲服三丸日再服以知爲度禁如前法並出第十卷中

十欬方六首

千金問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證何以爲異師曰欲語因欬言不得終謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脉反遲謂之支欬欬引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎

出續續不止下引少腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬夫風欬者下之寒欬支欬肝欬灸足太衝心欬灸刺手神門脾欬灸足太白肺欬灸手太泉腎欬灸足太谿膽欬灸足陽陵泉厥陰欬灸手太陰留飲欬者其人欬不得卧引項上痛欬者時如小兒瘈瘲狀夫久欬爲水欬而時發熱脈在九菽（一云卒弦）者非虚也此爲胷中寒實所致也當吐之欬家其脈弦欲行吐藥當相人彊弱無熱乃可吐耳

又欬家其人脈弦爲有水可與十棗湯下之不能卧出者陰不受邪故也

又夫有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日一歲與十棗湯方

芫花　甘遂　大戟（並熬等分）

右三味擣下篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末彊人取重一錢羸人半錢匕頓服之平旦服而不下者明旦更益藥半錢下後自補養古今錄驗同（此方仲景傷寒論方）

又欬而引脅下痛者亦十棗湯主之（用前方）

又夫酒客欬者必致吐血此坐以極飲過度所致也其脈沈者不可發汗以欬數歲其脈弱者可療實大數者死其脈虛者必苦冒也其人本有支飲在胷中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗發汗出則厥逆冷

又欬逆倚息不得臥小青龍湯主之

麻黃（去節）　芍藥　細辛　桂心

乾薑　甘草（炙各三兩）　五味子（半升）　半夏（半升洗）

右八味切以水一斗先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥煮得三升去滓服一升若渴者去半夏加栝樓根三兩微利者去

麻黄加芫花如雞子大熬黄若食飲噎者去麻黄加附子一枚炮去皮六片破小便不利少腹滿者去麻黄加茯苓四兩若喘去麻黄加杏人半升去尖皮兩人者熬芫花不主利麻黄止喘今語反之疑非仲景意加減忌海藻菘菜生葱生菜羊肉餳此本仲景傷寒論方

青龍下已多唾口燥寸脉沈而尺脉微手足厥逆氣從少腹上撞胷咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者可與茯苓桂心甘草五味子等湯主之治其氣撞方

茯苓四兩　桂心一兩　甘草三兩炙　五味子半升

右四味切以水八升煑取三升去滓温分三服忌海藻菘菜生葱以千金校之亦脱此方今於仲景方録附之

衝氣則抵而反更欬胷滿者與茯苓甘草五味子去桂心加乾薑細辛以治其欬滿方

茯苓四兩 甘草炙 乾薑 細辛各三兩

五味子半升

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘

菜生菜醋物等

欬滿即止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥此法不

當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復

內半夏以去其水方

茯苓四兩 甘草炙 乾薑 細辛各三兩

五味子半升 半夏半升洗

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘

菜生菜羊肉餳酢等

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐痺故不內麻黃乃

內杏人也若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛

麻黄發其陽故也方

茯苓四兩 乾薑三兩 細辛三兩 五味子半升

半夏半升洗 杏人半升去皮尖兩人者 甘草三兩炙

右七味切以水一斗煑取三升去滓温服一升日三忌海藻菘菜生菜羊肉餳酢等

若面熱如醉狀者此爲胃中熱上衝熏其面令熱加大黄利之方

細辛 甘草炙 乾薑各三兩 茯苓四兩

五味子 半夏洗 杏人去皮尖各半升 大黄三兩蒸

右八味切以水一斗煑取三升去滓温服一升日三服忌海藻菘菜生菜餳醋羊肉並出第十八卷中

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

病源久欬嗽上氣者是肺氣虚極風邪停滞故其病積月累年久不差則胷背痛面腫甚則唾膿血也出第十四卷中

深師療肺氣不足欬逆唾膿血咽喉悶塞胷滿上氣不能飲食卧則短氣補肺湯方

款冬花三兩 桂心二兩 鍾乳二兩 乾薑二兩

白石英二兩 麥門冬四兩去心 五味子三兩 粳米五合

桑根白皮一斤 大棗一百枚擘

右十味切以水一斗二升先煮桑白皮棗令熟去滓内藥煮取二升二合分三服忌生葱等千金同、

又療欬逆上氣時時唾濁但坐不得卧皂莢丸方

長大皂莢一挺去皮子炙

右一味擣篩蜜和服如梧子一丸日三夜一以大棗膏和湯下之千金經心録延年同此本仲景傷寒論方一名棗膏丸

又療欬逆上氣吐膿或吐血胷滿痛不能食補肺湯方

黄耆五兩一法 桂心 乾地黄 茯苓

厚朴　乾薑　紫菀　橘皮
當歸　五味子　遠志去心　麥門冬去心各三兩
甘草炙　鍾乳　白石英各二兩　桑根白皮
人參各三兩　大棗二十枚擘
右十八味切以水一斗四升煮取四升分溫四服日三夜一忌
海藻菘菜生葱醋物千金同並出第十八卷中
古今錄驗療寒冷欬嗽上氣胸滿唾腥膿血四味石鍾乳散方
鍾乳碎研　白礬石鍊　款冬花　桂心各一分
右四味擣合下篩以筒吸之如大豆許七聚先食日三不知
稍增之數試有驗當作七聚遂吸之忌生葱千金集驗同出
第十九卷中
必効療上氣唾膿血方
灸兩乳下黑白際各一百壯良千金同

欬嗽膿血方一十一首

病源欬嗽膿血者損肺傷心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陽脉則有血血與氣相隨而行欬嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也出第十四卷中

廣濟療瘕瘷吐膿損肺方

人參二分　瓜蔕三分　杜蘅五分

右三味擣篩爲散平旦空腹以熱湯服方寸匕當吐痰水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未盡停三日更進一服忌生冷油膩猪魚肘後古今録驗用杜蘅三分人參一分服一錢匕出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方

雞子一枚　甘草二分炙　甘遂一分　大黄二分

黃芩二分

右五味切以水六升煮取二升去滓内雞子攪令調盡飲之忌海藻菘菜

又療傷肺唾血方

茅根

右一味擣篩爲散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴

出第四卷中

删繁療肺偏損胷中應肺偏痛唾血氣欬款冬花散方

款冬花　當歸各六分　桂心　芎藭

五味子　附子炮各七分　細辛　貝母各四分

乾薑　乾地黃各八分　白术　甘草炙

杏人去尖皮各五分　紫菀三分

右十四味擣篩爲散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜

桃李雀肉海藻菘菜猪肉蕪荑出第五卷中

千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方

百部根二兩 升麻半兩 桂心 五味子

甘草炙 紫菀 乾薑各一兩

右七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日三以知爲度忌生葱

海藻菘菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸澀背氣不欲食惡風目闇䀮䀮足膝

脛寒湯方

乾地黄半升切 桑白皮二升切 芎藭一升切 白膠五兩

桂心二尺 人參 紫菀各二兩 大棗二十枚擘

生薑五兩 飴糖一升 大麻人一升 大麥三升

右十二味切以水一斗五升煮麥濾取一斗去滓內藥煎取

三升分三服忌生葱

又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方

好酥五十斤

右三遍鍊停凝當出醍醐服一合日三以差止

又方

三遍鍊酥如雞子黄適寒温灌鼻中日二夜一

又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方

杏人二升去尖皮兩人者 猪脂二合 糖一升 生薑汁二升

蜜一升

右五味先以猪膏煎杏人黄黒出以紙拭令淨擣如膏合煎五物令可丸服如杏核日夜六七漸漸加之並出第十八卷中

古今録驗瀉肺湯療肺中膿欬唾血氣急不安卧方

芎藭 麻黄去節 細辛 椒汗

當歸各一兩

右五味切以水七升煮取三升分爲三服日三微汗或吐膿血忌生菜（一方有生薑一兩）

又羊肺湯療欬晝夜無閑息氣欲絶肺傷唾血方

鍾乳（五兩）　牡蠣（熬）　桂心（六兩）　射干

桃人（去尖皮）　貝母　橘皮　百部根

五味子（各三兩）　生薑（六兩）　白石英　半夏（洗各五兩）

款冬花　甘草（炙）　厚朴（炙各二兩）　羊肺（一具）

右十六味切先以水二斗三升煮羊蹄取一斗去肺內諸藥煑取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第十九卷中

久欬嗽膿血方四首

病源久欬嗽膿血者肺感於寒微則成欬嗽欬嗽極甚傷於經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯瘀與膿

相雜而出也出第十四卷中

廣濟療積年欬嗽膿血方

莨菪二升 大棗一百顆青州者

右二味以水三大升取馬糞燒火煎熟之候令汁盡取棗早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾脣熱則以爲度不吐不利忌並如前法

又療欬經年不差氣喘欲絶傷肺見血方

桑白皮切三合 白羊肺一具切 芍藥十分 款冬花六分

茯苓十二分 貝母十二分 麥門冬六分 杏人六分去尖皮熬爲脂

升麻十二分 生地黃汁一升 黃芩十二分 蜜一升

右十二味切以水一斗煮取三升去滓内杏人脂地黃汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布濾每食後含一合日夜三四度老小以意減之微煖含之佳

忌生冷油醋𩛰魚蒜蕪荑並出第二卷中

深師療欬逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣連年款冬花丸方

款冬花十八分　紫菀十二分　杏人八分去尖皮兩人者熬　香豉十分熬

人參二分　甘草三分炙　蜀椒三分汗　天門冬六分去心

乾薑　桂心　乾地黃各三分

右十一味擣篩蜜和如彈丸含稍稍嚥汁日四夜再神良忌

海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚出第十八卷中

近効療久欬兼唾血方

白前三兩　桑白皮　桔梗各二兩　甘草一兩炙

右四味切以水二大升煑取半大升空腹頓服若重者十數

劑忌猪肉海藻菘菜李子劉方

欬嗽唾粘方二首

廣濟療肺熱欬嗽涕唾多粘甘草飲子方

甘草六分炙　款冬花七分　豉一合　生麥門冬八分去心

葱白一握　檳榔十顆合子碎　桔梗六分　地黄汁半升

右八味切以水六升煮取二升絞去滓下地黄汁分温三服如人行四五里進一服不利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜魚蒜粘食猪肉蕪荑出第二卷中

延年紫蘇飲療欬嗽短氣唾涕稠喘乏風虛煩損發無時者宜服此方

紫蘇　貝母各二兩　紫菀一兩　麥門冬一兩去心

棗五枚擘　葶藶子一兩熬令黄別擣　甘草一兩炙

右七味切以水六升煮取二升分爲四服每服如人行七里禁猪魚肉蒜海藻菘菜出第五卷中

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有熱嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲氣嗽

熱嗽者年少力壯體氣充滿將息傷熱積熱所成故致熱嗽此但食飲取冷兼以藥壓之自歇冷嗽者年衰力弱體氣虛微如復寢食傷冷故成冷嗽此亦但將息以温兼進温藥則當平復肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺癰若此將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停澄在胷水氣上衝衝入於肺肺得此氣便成嗽久而不除漸成水氣若作此病亦難療之熱嗽之狀更無其餘但遇於熱便發此者宜合生地黃等七味湯服之方

生地黃一升切 生薑二合切 桑根白皮切一升 射干切二升

乾葛切六合 紫蘇三合 竹瀝一升

右藥細切六味以水一斗煑取三升去滓內竹瀝攪調每食後良久則服之分一劑作四服若覺可則重合服之病輕者

三數劑則差忌蕪荑

又依前生地黃等七味飲雖得暫差於後還發宜合紫菀等十味丸方

紫菀五分 桑白皮六合 射干四兩 百部根五兩

麻黃二兩去節 乾葛五兩 地骨皮 升麻各四兩

乾地黃六兩 芒消六兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子以竹瀝下之初服十五丸日再服稍稍加至三十丸忌蕪荑

又冷嗽之狀但遇諸冷此疾便發有如此者宜合大棗等七味湯主之方

大乾棗三十枚擘 桂心四兩 杏人一百枚去尖皮兩人研 細辛五兩

吳茱萸 當歸各三兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓温分三服每服如人

行十里久服一劑覺得力至三四劑亦佳隔三四日服一劑
此湯元欠一味忌生葱生菜
又依前大乾棗湯服之雖可未能斷其根
遇冷便發宜合當歸等十味丸服之方
當歸切 細辛 甘草炙各五兩 桂心
吴茱萸 人參各三兩 蜀椒三合汗 橘皮
乾薑各四兩 桑白皮八兩
右藥擣篩蜜和丸煮乾棗飲下之初服十丸日再服稍加
至三十丸如梧子服此丸經三五日覺熱每服藥後良久喫
三數口粥食壓之忌海藻菘菜生葱生菜
又肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜嗽常不斷
唾白如雪細末稠粘喘息氣上乍寒乍熱發作有時脣口喉舌
乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青白毛聳此亦成

蒸有此狀者宜合白前等七味湯服之兼有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎

又肺氣嗽經久有成肺癰者其狀與前肺痿不多異但唾悉成膿出無多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃耆三兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芎藭三兩於桑白皮煎中加黃耆切三升共桑白皮地骨皮同煎又加水三升同煎忌羊肉餳

白前湯方

白前三兩 桑白皮四兩 生地黃一升 茯苓五兩

地骨皮四兩 麻黃二兩去節 生薑六兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓加竹瀝五合分溫四服食後服之晝三夜一覺得力重合服五六劑佳隔三日服一劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服覺可根本未除宜合麻黃等十味丸服之方

麻黃二兩去節　白前二兩　桑白皮六兩　射干四兩

白薇三兩　百部根五兩　乾地黃六兩　地骨皮五兩

橘皮二兩

右藥擣篩蜜和丸煮桑白皮飲下之初服十丸日再服稍稍加至十五丸丸如梧子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在胸膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在上已晝服丸夜無憑準宜合桑白皮汁等十味煎每夜含咽之方

桑白皮一升切　地骨皮三升切

二味用水七升熟煎取三升汁去滓澄清

生地黃汁五升　生麥門冬汁二升　生薑汁一升　竹瀝三升

生葛根汁三升　白蜜一升　牛酥三合　大棗膏一升

右八味先於微火上取生地黃汁以下生葛汁以上和煎減半則內桑白皮等二物汁和煎之三分減一則內酥蜜棗膏攪之勿停手得如稠飴狀煎成訖置別器中服之每夜欲臥時取一胡桃大含之細細嚥汁稍加至雞子大欲晝日間丸服亦得忌蕪荑

又飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動嗽物便致困劇甚者乃至雙眼突出氣即欲斷汗出大小便不利吐淡飲涎涕沫無復窮限氣上喘息肩息每旦眼腫不得平眠有如此者宜合細辛等八味湯葶藶子十五味丸服之方

細辛　半夏洗　桂心　桑白皮各五兩

乾薑　當歸各四兩　芒消六兩　杏人六合去尖兩人者研

右藥切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服每服如

人行十里久當得快利後好將息經三四日合丸服之忌生葱生菜羊肉餳

丸方

葶藶子六合熬　細辛　五味子各五兩　乾薑

當歸各四兩　桂心　人參　丁香

大黃　商陸根各三兩　橘皮四兩　桑白皮六兩

皂莢肉二兩炙　大腹檳榔二十枚　麻黃二兩去節

右藥擣篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十丸日再服稍加至十五丸如梧子大若利則減秘則加以大便通滑爲度時時得鴨溏亦佳忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯葶藶子等十五味丸不覺可漸成水病餘一如前況更加大小便秘澀頭面身體浮腫宜合大乾棗三味丸服之方

大棗六十枚擘去核 葶藶子一升熬 杏人一升去尖皮兩人者熬

右藥合擣令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作丸依還以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍稍加之以大便通爲度病重者時令鴨溏佳亦有以前三味煮湯服之

又依前大棗等三味丸服雖覺氣暫歇然病根深固藥力微弱且停服大棗丸合巴豆丸五味細細服之蕩滌宿病方

巴豆人二十枚熬去心皮 杏人一百顆去尖皮兩人者熬 牽牛子五合熬 葶藶子六合熬

大棗六十枚擘去核

右藥合擣一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三四丸日再稍加利即減祕即加常以大便調爲候病甚時時取鴨溏亦佳忌蘆笋野豬肉吳昇同出下卷中

雜療欬嗽方三首

古今錄驗五藏六腑皆令人欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜

受邪故肺獨易爲嗽也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脅痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如鯁狀甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脅痛陰陰則引肩背甚者不得動動便欬劇脾欬經久不已則傳入胃其狀欬即嘔甚則長蟲出久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非時有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間入腑藏爲欬上氣如此也又非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胷脅又痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服温藥

欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也

又療欬嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲者方

吴茱萸　五味子　大黃　桂心

甘草炙　細辛　人參　紫菀

款冬花各一兩　大戟　竹茹各三分

右十一味切以水一斗煑取三升分爲三服亦療陰冷欬至良忌海藻菘菜生菜生葱深師同並出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絶杏人煎方

杏人四兩去尖皮末　猪膏二斤　白蜜二升　生薑汁三升

右四味著銅器中於微火上先煎薑汁次内蜜膏令如餳置器著地乃内杏人末復令得一沸煎成服如棗大一丸含之日三不知稍稍增之

又療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔蘇子湯方

蘇子一升　乾薑三兩　半夏四兩洗　桂心

人參各二兩　橘皮　茯苓各三兩　甘草一兩炙

右八味切以水八升煑取二升半分爲三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黃芩二兩忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物等

並出第十八卷中

外臺秘要方卷第九

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘

外臺祕要方

十

肺痿 肺氣
上氣 欬嗽

外臺秘要方卷第十 肺痿肺氣上氣欬嗽二十八門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林　億　等上進

溺

肺痿方一十首

千金論曰寸口脉數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此爲肺痿之病肺痿之病何從得之師曰病熱在上膲因欬爲肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難被駃藥下利重亡津液故得肺痿又寸口脉不出而反發汗陽脉早索陰脉不澀三膲踟蹰入而不出身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此爲肺痿傷於津液便如爛爪亦如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脉浮弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以

然者上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也出第十七卷中

仲景傷寒論療肺痿吐涎唾不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制偃下故也此爲冷必眩甘草乾薑湯主之以溫其臟方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味切以水三升煮取一升半分溫二服服湯已小溫覆之若渴者屬消渴忌海藻菘菜

又療肺痿涎唾多心中溫溫液液者炙甘草湯方

甘草四兩炙　生薑三兩去皮　人參二兩　地黃一斤

阿膠三兩炙　大麻子人半升　大棗四十枚擘　麥門冬半升去心

桂心二兩

右九味切以美酒七升水八升相和先煮八物取四升絞去

滓内膠上微火烊銷温服七合日三夜一忌海藻菘菜

蕪荑並出第八卷中

肘後療肺痿欬嗽吐涎沫心中温温咽燥而渴者方一云不渴

生天門冬一升擣取汁 酒一升 飴糖一斤 紫菀四合末

右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏人一丸日三忌鯉魚出第一卷中范汪經心録同

集驗療肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方一云不渴

生薑五兩 人參三兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右四味切以水五升煮取一升半分再服忌海藻菘菜仲景傷寒論備急范汪千金經心録同

又療肺痿欬嗽涎沫心中温温咽燥而渴方一云不渴

生薑五兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右三味切以水五升煮取一升半分再服一方乾薑三兩代

生薑忌海藻菘菜文仲千金古今録驗同深師云溫脾湯范

汪亦同

又療肺痿時時寒熱兩頰赤氣急方

童子小便每日晚取之去初末少許小便可有五合

取上好甘草量病人中指節男左女右長短截之炙

令熟破作四片內小便中置於閑淨處露一宿器上

横一小刀明日平旦去甘草頓服之每日一劑其童

子勿令喫五辛忌海藻菘菜熱麪並出第四卷中

删繁療虛寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方

半夏一升湯洗四破　毋薑一斤　橘皮一斤　白朮八兩

桂心四兩

右五味切以水九升煑取三升去滓分溫三服忌羊肉餳桃

李雀肉生葱一方有桑白皮切一升

又療凡虛實肺痿喘氣乾地黃煎方

乾地黃五兩 桑根白皮切二升 芎藭五兩 桂心

人參各三兩 大麻人一升熬研爲脂

右六味切以水九升先煮五味取三升去滓内大麻人煎數沸分三服忌生葱蕪荑並出第二卷中

千金療肺痿涎唾多出心中溫溫液液甘草湯方

甘草二兩炙

右一味切以水三升煮取一升半分溫三服忌海藻菘菜范汪同

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方

桂心三兩 甘草二兩炙 大皂莢一挺去皮子炙 生薑三兩

大棗十二枚擘

右五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻菘

章楷

菜范汪經心録同並出第十七卷中

肺氣客熱方二首

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒因嗽不安方

百部根一兩半 天門冬二兩去心 紫菀一兩半 貝母

乾葛 白前 橘皮各一兩 生薑二兩

葱白切三合 豉三合

右十味切以水六升煑取一升七合去滓分温三服䟽數任情亦可分爲四服欲間食亦得禁生冷鯉魚蒜出第五卷中

古今録驗療肺客熱并肝心家氣人參湯方

桂心 甘草各三兩炙 人參 乾薑

防風各二兩 白术一兩

右六味切以水八升煑取三升分三服日三宜温忌桃李雀肉生葱海藻菘菜出第二十一卷中

肺熱兼欬方七首

删繁療肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方

橘皮　杏人四兩去尖皮　柴胡　麻黄去節各三兩

乾蘇葉二兩　母薑四兩去尖　石膏八兩研綿裹

右七味切以水九升先煑麻黄兩沸除沫下諸藥煑取三升去滓分三服不差頻以兩劑千金同出第五卷中母薑千金云宿薑

千金療肺熱悶不止胷中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胷中喘氣方

桃皮一斗　芫花一斗

右二味以水四斗煑取一斗去滓以故布手巾内汁中薄胷温四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汁出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名肺熱實也

又療肺熱實胷憑仰息泄氣除熱湯方

枸杞根皮二升　白前三兩　石膏八兩綿裹碎　杏人三兩去雙人尖皮研

橘皮　白朮各五分　赤蜜七合

右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黄切二升　石膏八兩　淡竹茹如雞子大一枚　杏人四兩去尖皮兩人研

羚羊角屑三兩　芒消三兩　赤蜜一升　麻黄五兩去節

升麻三兩

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服忌蕪荑　出第十七卷中

延年天門冬煎主肺熱兼欬聲不出方

生天門冬汁一升　生地黄汁五合　白蜜五合　牛酥二合

白糖五兩 杏人一升去尖皮研取汁 貝母 紫菀
通草各三兩 百部根 白前 甘草炙
人參 橘皮各二兩
右十四味切以水六升煮貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍強取如雞子黃大含嚥之日四五度忌鯉魚蕪荑海藻菘菜等張文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱兼欬方

生地黃汁三升 生麥門冬三升 生薑汁一合 酥二合
白蜜二合
右五味先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜煎如稀餳內貝母末八分紫菀末四分攪令調一服一匙日二服夜一服忌蕪荑

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方

天門冬（三兩去心） 麥門冬（二兩去心） 款冬花（一兩） 貝母（一兩）

紫菀（二兩） 茯苓（二兩） 升麻（二兩） 生薑（汁三升）

蜜（一升） 酥（一合） 地黄（汁三升）

右十一味切以水八升煮七物取一升去滓内生薑地黄汁煮取一升内蜜酥於銀器中加湯上煎令成煎一服如彈丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物蕪荑鯉魚等顏仁楚處

又羚羊角飲主肺熱𮗜背痛時時乾欬不能食方

羚羊角（二兩屑） 貝母 生薑 茯苓（各三兩）

橘皮 人參 芍藥（各二兩）

右七味切以水五升煮取一升八合去滓分温三服每服如人行八九里久更服禁生冷蒜麪醋並出第五巻中

肺虚寒方三首

删繁療肺虚寒癘風所傷聲音嘶塞氣息喘憊欬唾酥蜜膏酒止氣欬通聲方

酥 崖蜜 飴糖 生薑汁 生百部汁 大棗肉研為脂 杏人熬去皮尖研為脂各一升 甘皮五具末

右八味合和微火煎常攪三上三下納一炊久薑汁并百部汁各減半停下温清酒一升服方寸匕細細嚥之日夜三千金同出第六卷中

千金療肺虚寒癘風傷語音嘶塞氣息喘憊嗽唾方

猪脂三具 大棗一百枚去核 好酒五升

右三味以酒漬二味秋冬七日春夏三日生布絞去滓二七日服盡二七日忌鹽餘如藥法暖將息無猪脂以羊脂代肘後張文仲備急同出第十八卷中

又凡右手寸口氣口以前脉陰虚者手太陰經也病苦少氣不

足以息嗌乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉絞弱虛瘠風入肺防風散方

防風　獨活　芎藭　秦椒汗

黃耆各七分　附子炮七分　乾薑七分　石膏研

天雄炮　甘草炙　山茱萸　麻黃去節

五味子各六分　秦艽　桂心　署預

杜仲　人參　防已各五分　貫衆二枚

紫菀　菊花各四分　細辛五分　當歸五分

右二十四味擣篩爲散酒服方寸匕日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜出第十七卷中一方無石膏當歸

肺氣不足口如含霜雪方四首

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者吐血

苦寒五味子湯方

五味子三兩 大棗五十枚擘 桑根白皮一升 藁本二兩

鍾乳三兩綿裹 款冬花二兩 雞蘇二兩

右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如人行八里進一服不利忌豬魚炙肉熱麪陳臭等物此方甚良

又療肺氣不足逆氣胷滿上迫喉咽閉塞短氣連唾相屬寒從背起口如含霜雪語無音聲劇者唾血腥臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫菀湯方

紫菀 五味子 生薑合皮切 白石英碎綿裹

款冬花 桂心 人參各二兩 鍾乳碎綿裹

麥門冬去心 桑根白皮各三兩 大棗二十枚擘 粳米一合

右十二味切水一斗五升先煮桑根白皮粳米取九升去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去如人行七八里久

裹

喫之不利忌生葱熱麪炙肉並出第二卷中（深師千金無紫菀人參）

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子（三兩） 乾薑（二兩） 款冬花（二兩） 桂心（一尺）

麥門冬（一升去心） 大棗（一百枚擘） 粳米（二合） 桑根白皮（一斤）

右八味切以水一斗二升先煮棗并桑白皮粳米五沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱千金同出第十八卷中

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方

五味子 白石英（末綿裹） 鍾乳（末同上） 桂心

橘皮 桑根白皮（各三兩） 粳米（二合） 茯苓

竹葉 款冬花 紫菀（各二兩） 大棗（五十枚）

杏人（五十枚去兩人尖皮） 蘇子（一升） 生薑（五兩） 麥門冬（四兩去心）

煑 每

右十六味切以水一斗三升先煑桑白皮棗粳米熟去滓內諸藥煑取四升八分三服日再夜一服忌大酢生葱千金同出第四卷中

肺脹上氣方四首五法

廣濟療患肺脹氣急欬嗽喘麤眠臥不得極重恐氣欲絕紫菀湯方

紫菀六分 甘草八分炙 檳榔七枚 茯苓八分

葶藶子二合熬末湯成下

右五味切以水六升煑取二升半絞去滓分溫三服每服如人行四五里久進之以快利為度忌生葱菜熱麪海藻菘菜大醋蒜粘食出第二卷中

仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脉浮者以心下有水宜服小青龍湯加石膏主之方

麻黄三兩去節 五味子半升 石膏碎綿裹 乾薑
芍藥 細辛各三兩 桂心 甘草各三兩炙
半夏半升洗

右九味切以水一斗先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升半去滓温服強人一升瘦人及老小以意減之日三夜一忌生葱生菜海藻菘菜羊肉餳等

又肺脹者病人喘目如脱狀脉浮大也肺脹而欬者越婢加半夏湯主之方

大棗十五枚擘 半夏半升洗 生薑三兩 麻黄六兩去節
甘草二兩炙 石膏半斤碎綿裹

右六味切以水六升先煮麻黄三二沸去沫内諸藥煮取二升去滓温服八合日三不知更作之忌海藻菘菜羊肉餳並出第十八卷中

深師療欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣小青龍湯加石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍湯方（用前仲景方）

千金療肺脹欬嗽上氣咽燥脉浮心下有水麻黃湯方

麻黃（去節） 芍藥 生薑（一法五兩） 細辛

桂心（各三兩） 半夏（半升洗） 石膏（四兩碎綿裹） 五味子（半升）

右八味切以水一斗煑取三升分三服忌生葱羊肉餳生菜

集驗同出第十七卷中

肺氣積聚方二首

救急療肺氣積聚心肋下滿急發即欬逆上氣方

麻黃（三兩去節） 杏人（去雙人尖皮） 柴胡 生薑

半夏（洗十遍） 葶藶子（熬研如脂湯成各四兩） 乾棗（十二枚擘）

檳榔（十枚并子碎）

右八味切以水一斗煑取二升八合去滓分溫三服每服相

去如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑
訖將息滿七日則服後方忌羊肉餳

又方

茯苓　乾蘇莖葉　橘皮　麻黄各三兩
杏人去尖皮兩人者　柴胡　生薑各四兩

右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分溫三服每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麪猪肉五日服一劑並出第六卷中

肺癰方九首

千金論曰病欬唾其脉數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此爲浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胷中隱隱痛脉反滑數此爲肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死後終吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數

熱

則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數趺陽脉緊寒熱相摶故振寒而欬趺陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰趺陽脉浮緩少陰微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病屬肺也問曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胷中者為肺癰其脉數欬唾設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也出第十七卷中

仲景傷寒論欬胷中滿而振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散主之方

桔梗三分　貝母三分　巴豆一分去皮心熬研作脂

右三味擣篩強人飲服半錢匕羸人減之若病在膈上者必吐膈下者必利若利不止者飲冷水一柸則定忌猪肉蘆笋

出第十八卷中

集驗療胷中滿而振寒脉數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是爲肺癰桔梗湯方

桔梗二兩千金古今方云用一枚　甘草二兩炙

右二味切以水三升煑取一升分再服朝暮吐膿血則差張文仲千金備急古今錄驗范汪同忌海藻菘菜猪肉冷水出第四卷中此本仲景傷寒論方

千金療欬有微熱煩滿胷心甲錯是爲肺癰黄昬湯方

黄昬手掌大一枚是合昬木皮

右一味切以水三升煑得一升分再服范汪同

又肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之兼療胷脇脹滿一身

面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞方

葶藶三熬令色

右一味擣令可丸以水三升煮擘大棗二十枚得汁二升內藥如彈丸一枚煎取一升頓服古今錄驗删繁仲景傷寒論范汪同並出第十七卷中

備急療腸癰肺癰方

升麻 白斂 漏蘆 芒消各一兩

黃芩 枳實炙 連翹 蛇銜各三兩

梔子二十枚擘 蒴藋根四兩

右十味擣令細以水三升漬經半日以猪脂五升煎令水竭去滓傅之日三若交急合水煎出第四卷中

古今錄驗療肺癰方

薏苡人一升 醇苦酒三升

右二味煑取一升温冷頓服有膿血當吐范汪經心録同

又療肺癰葦湯方

剉葦一升　薏苡人半升　桃人五十枚去尖皮兩人者　瓜瓣半升

右四味㕮咀以水一斗先煑葦令得五升去滓悉内諸藥煑取二升分再服當吐如膿仲景傷寒論云葦葉切二升千金范汪同千金云葦莖二枚以水二斗煑五升

又療肺癰經時不差桔梗湯方

桔梗三升　白朮二兩　當歸一兩　地黄二兩

甘草炙　敗醤　薏苡人各二兩　桑白皮切一升

右八味切以水一斗五升煑大豆四升取七升汁去豆内清酒三升合諸藥煑之取三升去滓服七合日三夜再服忌猪肉蕪荑桃李雀肉海藻菘菜等

又療肺癰生地黄汁湯方

生地黃汁一升 當歸 甘草炙 白石英綿裹

人參各一兩 附子二分炮 白小豆二十顆 白雞一頭男用雌女用雄療如食法一作雉

右八味切以水一斗五升煮雞取七升汁去滓內地黃汁諸藥等煮取三升去滓分服六合日三夜二忌蕪荑海藻菘菜冷水豬肉等並出第二十一卷中

大腸論二首

千金論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以為候也肺所以合氣於大腸者大腸為行道傳寫之腑也號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸臍右迴疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神又曰肺前受病移於大腸肺欬不已則大腸受之大腸欬則遺失便利肺應皮皮厚即大腸厚皮薄即大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結删繁同

又扁鵲云大腸絶不療何以知之洩痢無度痢絶則死實即腸熱熱則脹滿不通口爲生瘡食下入腸則腸實而胃虚下胃則胃實而腸虚所以實而不滿乍實乍虚乍來乍去虚則腸寒寒則腸中雷鳴洩青白之痢而發於氣水根在大腸大腸有寒鶩溏有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬曰重感於寒則洩當臍而痛不能久立與胃同候腸中雷鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸也大腸脹鳴而痛腸寒即洩食不化出第十八卷中

大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

又療大腸實熱腹脹不通口爲生瘡生薑洩腸湯方

生薑　橘皮　青竹茹　白朮

黃芩　梔子各三兩擘　桂心一兩　生地黃十兩

茯苓　芒消各二兩　大棗十四枚擘

右十一味切以水七升煑取三升去滓下芒消分三服忌生葱蕪荑海藻菘菜醋物桃李雀肉等出第十八卷中

删繁療肺豚厥逆大於寸口主大腸熱欬上氣喘鳴心煩麻黃湯方

麻黃六兩去節　芍藥　生薑　半夏十遍洗

細辛　五味子各三兩　桂心二兩　石膏八兩碎綿裹

右八味切以水九升先煑麻黃七八沸去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服忌羊肉餳生葱生菜等

又療大腸熱甚脅滿掌中熱淡竹葉飲泄熱氣方

淡竹葉切三升　橘皮三兩　乾蘇葉三兩　白朮四兩

甘草一兩炙　葱白切一升　桂心一兩　石膏六兩碎綿裹

杏人六十枚去皮尖熬

右九味切以水一斗二升先煑竹葉取一斗去滓澄清取九升下諸藥煑取三升絞去滓分三服若須利下内芒消三兩忌海藻菘菜桃李雀肉生葱並出第二卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胷中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛寒也

又療大腸虛寒痢下青白腸雷鳴相逐黃連補湯方

黃連四兩 茯苓四兩 芎藭三兩 醋石榴皮四枚

地榆五兩 伏龍肝如雞子大一枚是竈心内土研

右六味切以水七升煑五味取二升五合去滓下伏龍肝屑攪調分三服忌猪肉冷水大醋出第十八卷中

删繁療大腸虛寒欠呿欬氣短少腹中痛款冬花丸方

取

款冬花七分 桂心 五味子各六分 乾薑

芎藭 甘草炙各五分 附子四分炮 桔梗四分

蘇子五合熬 蜀椒一升 百部汁七合 白蜜一升

乾棗五十枚擘去皮研爲脂 薑汁一升

右十四味細擣爲末將蘇蜜汁和微火上煎取爲丸如梧子

每服温酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷

水生葱出第二卷中

皮虛實方二首

删繁論曰夫五藏六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外

生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓疼痛然陰陽表

裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮

虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱即應藏寒即應腑千

金同出第三卷中

千金療皮虛主大腸病寒氣關格蒴藋蒸湯方

蒴藋根葉切三升　桃皮葉剉三升　菖蒲葉剉三升

細糠一斗　秫米五升

右五味以水一石五斗煑取米熟爲度大盆器貯於上作小竹歷牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席薦障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對中洩氣取通身接汗可作兩食久許如此三日蒸還溫藥足汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火也非惟療寒但是皮膚一切勞冷並皆療之忌羊肉餳刪繁同

又療皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子　枳實炙　大青　杏人去尖皮兩人

柴胡　芒消各三兩　生地黃切一升　石膏八兩碎綿裹

淡竹葉切一升　生玄參五兩

右十味切以水九升煑取三升下芒消分三服忌蕪荑刪繁

同並出第十八卷中

上氣方九首

廣濟療上氣方

葶藶子五合熬紫色別擣如泥　桑根白皮切　大棗二十枚擘

右三味以水四升煑取一升絞去滓內葶藶子泥如棗大煑之三分減一頓服以決利爲度忌如藥法出第二卷中

肘後主上氣方

灸從大推數下行第五節下第六節上空間即灸一處隨年壯祕方深師千金翼文仲同出第三卷中

千金療上氣方

上酥一升　獨頭蒜五顆去皮先以酥煎蒜蒜黃出之　生薑汁一合

右三味同煎使熟空腹服一寸匕溫服之忌熱麪

又方

芥子三升

右一味末之蜜和爲丸寅時井華水服如梧子七九日二服散亦佳禁如藥法尤忌油麪等並出第十七卷中

必効療上氣方

半夏洗 茯苓各四兩 橘皮 白朮各三兩

生薑五兩 檳榔十顆

右六味切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加甘甘三兩人參二兩前胡三兩紫蘇一兩忌羊肉餳桃李雀肉醋物出第一卷中

古今錄驗溫中湯療上氣方

甘草三兩炙 桂心四兩 生薑一斤

右三味切以水七升半煎取三升分五服忌生葱海藻菘

又昆布丸療胸滿上氣方

大黃　消石　海藻洗　水銀各一兩

昆布三兩洗　苦瓠瓣四十枚　葶藶半升熬　通草二分

桃人五十枚去皮尖兩人者熬

右九味擣篩以蜜和爲丸如梧子許先食服三丸日再服

又巳試鯉魚湯療上氣方

杏人去兩人尖皮熬　貝母　桂心各三兩　橘皮

人參　甘草炙　厚朴炙　麻黃去節

茯苓　胡麻　白前各二兩　鯉魚五斤

生薑六兩　半夏五兩洗

右十四味切先以水二斗煑魚得一斗二升去魚內藥煎取三升二合分四服日三夜一服忌海藻菘菜醋物羊肉餳生葱等物

又上氣二物散太司馬大將軍方

麻黃一斤去節　杏人一百枚去尖皮雙人熬

右藥各別擣合和下篩爲散上氣發時服方寸匕可至三方寸匕以氣下爲候不必常服范汪同並出第十九卷中深師療上氣兼欬

卒上氣方六首

深師療卒上氣匈心滿塞半夏蘇子湯方

半夏五兩洗　蘇子一升　生薑五兩　大棗四十枚擘

橘皮　桂心各三兩　甘草二兩炙

右七味切以水七升煮取二升七合分三服氣即下忌海藻菘菜羊肉餳生葱

又療卒急上氣匈心滿竹篠下氣湯方

生甘竹篠一虎口　石膏一兩綿　生薑　橘皮各三兩

甘草二兩炙

右五味切以水七升煑竹篠取四升半去滓內諸藥煑取二升分二服此方療忽上氣不止者服兩三劑差忌海藻菘菜

並出第十八卷中

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絶方

桑根白皮切三升 生薑切半升 吴茱萸半升

右三味切以酒五升煑三沸去滓盡令服之入口則愈千金秘方

又方

麻黄去節 甘草炙各三兩

右二味切以水三升煑取一升半分三服古今錄驗用水八升煑取三升八合忌海藻菘菜差後欲令不發者更取二味并熬杏人五十枚擣篩蜜和丸服四五丸日三文仲肘後范汪同

又療卒上氣氣不復報肩息方

乾薑三兩㕮咀

隔

右一味以酒一斗漬服一升日三服

又方

麻黃（三兩去節） 桂心 甘草（各一兩炙） 杏人（四十顆去尖皮兩人者）

右四味切以水六升煑取二升分三服此二方名小投杯湯有氣疾者亦可爲散將服之冷多加乾薑三兩淡唾者加半夏三兩洗之忌海藻菘菜生葱並出第三卷中

久上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方

莨菪子（熬令色變） 熟羊肺（薄切暴乾爲末）

右二味各別擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食空肚服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白粥二口止之隔日一服永差三十日內得煑飲汁作蕪菁羹食之以外一切禁斷文仲肘後同

又療上氣三十年不差方

大棗一百枚去核皮　豉一百二十顆熬　杏人一百顆去兩人尖皮熬　椒三百粒汗末

右四味先擣杏人令極熟後內棗椒豉更擣作丸如棗核大含稍稍嚥之日三夜一並出第十七卷中

近効療久上氣氣急臥不得方

紫蘇葉二兩　生薑　麻黃去節　杏人去皮尖兩人者碎各三兩

赤茯苓　桑根白皮　葶藶子各二兩熬　橘皮一兩半

右八味切以水八升先煑麻黃去沫下諸藥和煑取二升七合絞去滓分三服每服如人行七八里久溫服之畢服後丸

又丸方

葶藶子六兩熬令紫色

右一味擣如泥丸如梧子大每食後以棗飲下十丸日二服

乾棗十顆擘碎以水一升煑取五合去滓用下丸甚効

上氣胷滿方二首

古今錄驗胡椒丸療欬上氣胷滿時復嘔沫方

胡椒　蓽撥　乾薑各三兩　白朮二兩

桂心　高良薑　人參　款冬花

紫菀　甘草炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知爲度忌生冷醋滑猪魚肉蒜桃李雀肉生葱海藻菘菜

出第十九卷中

救急茯苓人參散療上氣胷脅滿悶益心力除謬忘永不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有人年四十時因患積痢羸憊不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑平復如舊久服延年益壽方

茯苓二斤去黑皮擘破如棗大清水漬經一日一夜再易水出於日中暴乾逐手並爲散

人參（七兩擣篩） 甘草（一兩炙切） 牛乳（七升） 白沙蜜（一升五合）

右五味以水五升內甘草煑取二升除甘草澄濾內茯苓緩火煎令汁欲盡次內白牛乳次內人參緩火煎令汁盡仍攪藥令調勿許焦成日中暴乾擣篩爲散以紙盛之溫乳及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當㷊忌海藻菘菜大醋並是大斗大升大秤兩也此方極驗合數劑立効出第六卷中

上氣欬身面腫滿方四首

崔氏療肺熱而欬上氣喘急不得坐卧身面腫不下食銷腫下氣止欬立驗方

葶藶子（二十分熬別擣令熟） 貝母（六分） 杏人（十二分去尖皮熬別擣）

紫菀（六分） 茯苓 五味子（各六分）

人參 桑白皮（各八兩）

右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸日二服甚者夜一服

漸漸加至二三十丸煑棗汁送之若腫氣盛者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶藶子（二十分熬令變色別擣極熱） 杏人（十二分去尖皮熬別擣） 茯苓（六分）

牽牛子（八分熬）

右四味擣篩蜜和爲丸如梧子許每服八丸日再夜一服漸漸加至二十丸煑棗汁送之大忌醋物

又療上氣欬嗽長引氣不得臥或水腫或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之方

葶藶子（三升微熬）

右一味擣篩爲散以清酒五升漬之春夏三日秋冬七日初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利爲度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單

葉

莖向上葉端而角角麤且短又有一種苟芥草葉近根下作
歧生角細長採時必須分別前件六種病狀發動各不同始
終至困並歸於水但人腹內有塊及兩邊皆有者或當心有
塊稍肚大者並是少病即此藥必須得好新熟無灰酒清者始
可用經日多者惡不堪用前件病皆是熱服藥唯須慎酒麪
生冷雞豬魚肉大困及不得卧入口則定老少任意量力必
須好差平復始可停藥此方神驗服藥如傷多悶亂者作土
漿飲即定並出第六卷中
必効療上氣欬嗽腹滿體腫方
取楸葉升三
右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒內下部立
愈出第一卷中
上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胷滿喉中如水雞鳴小投杯湯方

小麥一升　麻黃四兩去節　厚朴五兩　石膏如雞子大一枚碎綿裹

杏人五合去皮尖兩人者切

右五味以水一斗煑取小麥熟去麥內藥煑取三升分三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累經用甚良

又療上氣脉浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死麻黃湯方

麻黃八兩去節　射干二兩　甘草四兩炙　大棗三十顆擘

右四味切以水一斗先煑麻黃三沸去上沫內諸藥煑取三升分三服已用甚良忌海藻菘菜等

又療欬逆上氣胷中塞不得息卧不安席牽繩而起咽中如水雞聲投杯湯方

款冬花二十分　杏人四十顆去兩人者及尖皮　甘草一兩炙　大棗二十顆擘

桂心二兩 麻黃四兩去節 生薑 半夏洗各三兩
紫菀 細辛各一兩
右十味切以水八升煮取二升頓服之一方分再服卧令汗出食粥數口勿飽食神良忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜

又療欬逆上氣鰥嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸方

鍾乳 人參 桂心 乾薑各八分
附子炮 款冬花 細辛各六兩 紫菀十分
杏人四分去皮炙兩人者熬
右九味擣篩蜜和酒服如小豆二丸日三不知稍稍加之忌猪肉冷水生葱生菜等物

又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方

麻黃六兩去節 桂心一兩 甘草炙 杏人去尖皮各二兩
生薑八兩一方用乾薑三兩

右五味切以水七升煮取三升半分五服已用療欬唾膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱

又療久欬上氣喉中鳴晝夜不得卧貝母散方

貝母三兩 麻黃去節 乾薑各二兩 桂心 甘草炙各一兩

右五味擣篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二匕大劇可至再服酒隨能多少忌海藻菘菜生葱等

又療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常作水雞鳴白前湯方

白前二兩 紫菀 半夏洗各三兩 大戟切七合

右四味切先以水一斗漬之一宿明旦煮取三升分三服忌羊肉餳千金古今錄驗同並出第十八卷中此方十四味全方見水腫欬上氣中

小品療欬逆喉中如水雞聲貝母湯方

貝母 甘草各二兩炙 麻黃去節 桂心各四兩
半夏洗 乾薑各三兩 杏人七十枚去尖皮兩人者熬
右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸内藥煮取三升溫服七合日三忌海藻菘菜生葱羊肉餳古今錄驗同
又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方
射干十二枚 麻黃去節 生薑各四兩 紫菀三兩
款冬花三兩 細辛三兩 五味子半升 半夏如
大棗七枚擘
右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌羊肉餳生菜千金古今錄驗同並出第一卷中此本仲景傷寒論方
必効療痒病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近方
肥皂莢兩挺 好酥一兩用大秤
右二味於火上炙去火高一尺許以酥細細塗之數翻覆令得

慱

所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮筋脉擣篩蜜和爲丸每日食後服一丸如熟豆日一服訖取一行微利如不利明旦細細量加以微利爲度日止一服忌如藥法出第一卷中

古今錄驗沃雪湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲絶方

麻黄四兩去節 細辛二兩 五味子半升 桂心

乾薑各一兩 半夏如慱碁子八枚洗去滑一方四兩

右六味切以水一斗煑取三升絞去滓適寒溫服一升投杯則卧一名投杯麻黄湯令人汗出不得卧勿怪亦可從五合不知稍增日再凡煑麻黄先煎二沸去上沫又內餘藥忌生葱生菜羊肉餳集驗經心錄范汪同

又投杯湯療久欬嗽上氣胷中寒冷不得息食卧不安席毎牽繩而起咽中如水雞聲方

款冬花四十顆 細辛一兩 紫菀三兩 甘草炙

桂心 麻黄去節 乾薑各二兩 五味子半升

杏人四十枚去皮尖兩人者 半夏半升洗

右十味切以水八升煮取二升分再服卧汗出即愈忌海藻菘菜生葱生菜羊肉餳並出第九卷中

因食飲水上氣方四首

古今録驗宮泰説李將軍兒得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死是後乃有婢得之行極而渴飲水多此爲所發起同與五味湯亦不差然後小差泰因此與三物備急藥半錢吐下得差由此思惟病之所由以冷水入肺及入腸寒熱不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸乏氣息不得下過謂喘而上氣息數也宜吐下之亦可與三物瓜蔕散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差後已爲常用方

巴豆　乾薑　大黃

右藥等分巴豆小熬去心皮合擣下篩服半錢匕得吐下則愈忌野猪肉蘆笋范汪同

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方

瓜蔕三分　杜蘅三分　人參一分

右藥擣篩爲散以温湯服一錢匕老小半之范汪同並出第十九卷中

肘後療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱方

竹葉三斤　橘皮三兩切

右二味以水一斗半煮取三升去滓分爲三服三日服一劑良

集驗用竹葉三兩文仲備急范汪等同

又方

葶藶子一兩熬擣　乾棗四十顆擘

右二味以水三升先煑棗取一升內葶藶子煎取五合大人分一二服小兒分三四服並出第一卷中

卒短氣方四首

擣韭取汁服一升立愈文仲備急千金同出第一卷中

肘後卒短氣方

千金療卒短氣方

枸杞葉二兩　生薑二兩切

右二味以水三升煑取一升頓服之

又方

生薑五兩切　小麥一升

右二味以水七升煑取一升頓服之

又方

紫蘇莖葉（切一升） 大棗（二七枚擘）

右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方加橘皮半兩並出第十七卷中

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣淡上氣氣急及欬方

柴胡（五兩） 五味子 橘皮 紫菀

貝母 杏人（去尖皮兩人者熬各三兩） 麻黃（四兩去節） 甘草（炙）

黃芩（各二兩）

右九味細切擣令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑半兩切竹葉一兩半以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉有一升五合內散二兩煎取一升二 去滓分二服平旦空肚服之一服日晚食消後服之每日作一劑不利忌油麪猪犬肉小

豆粘滑酸鹹海藻菘菜出第三卷中

肘後療欬上氣喘息便欲絕方

末人參服之方寸匕日五六出第一卷中

深師療上氣及諸逆氣神驗白前湯方

白前五兩　紫菀　杏人去尖皮并兩人者　厚朴炙各三兩

半夏洗　麻黃去節各四兩　生薑一斤一方用八兩　人參

桂心各二兩　甘草一兩炙　大棗十四枚擘

右十一味切以水八升煮取二升半分三服良忌海藻菘菜羊肉生葱餳

又療肺氣不足欬嗽上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食飲補肺溢湯方

蘇子一升　桑白皮五兩　半夏六兩洗

人參　甘草炙　麻黃去節

乾薑　杏人去尖皮兩人者各二兩　細辛一兩半　桂心三兩
款冬花一兩　射干一兩

右十四味切以水一斗二升煑取三升分五服日三夜再忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜千金同

又療諸欬病上氣胷滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方

鍾乳八分　乾薑六分　款冬花　細辛
桑白皮　半夏洗各四分　貝母　附子炮各五分
蜀椒三分汗　芎藭四分　紫菀八分　杏人三分

右十二味擣篩蜜和服如大豆二丸日三忌冷食豬羊肉餳生菜並出第十八卷中

千金療上氣不得卧神祕方

橘皮　生薑　紫蘇　人參
五味子各五兩

右五味切以水七升煮取三升分三服出第十七卷中一方有桔梗無五味子

古今録驗療積病後暴上氣困篤投柸湯方

石膏四兩碎　甘草二兩炙　五味子三兩　大棗二十枚擘

人參　桂心　半夏洗　杏人去各

右十味切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊肉

麻黃三兩去節　生薑四兩

餳海藻菘菜生葱等

又療上氣呼吸牽繩肩息欲死覆柸湯方

麻黃四兩去節　甘草炙　乾薑　桂心

貝母各二兩

右五味切以水八升煮取二升分再服則愈有人先有風患

兼有石熱取冷當風飲酒房室體虛未春因天行病至夏中

差尚虛有風熱未除兼藥石勢取過傷於胃氣因腹脹堅如石氣息不利因自下後變四肢腫遊走無定小便不通積服利藥忽吐逆不下食變嗽至掣動百脉狀如噓唏積日乃變上氣服此方加杏人二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菘菜范汪經心録同出第十九卷中

欬嗽上氣方七首

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此爲邪搏於氣氣擁滯不得宣發是爲有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多涕唾面目浮腫則氣逆也出第十四卷中

深師療上氣欬嗽蘇子煎方

蘇子二升　生薑汁二升　白蜜二升　生地黃汁二升

杏人二升去尖皮兩人者熬

右五味擣蘇子以地黃薑汁澆之絹絞取汁更擣以汁澆復絞如此六七過令味盡去滓熬杏人令黃黑擣令如脂又以向汁澆之絹絞取汁往來六七過令味盡去滓內蜜和置銅器中於重湯中煎之令如飴煎成一服方寸匕日三夜一忌蕪荑千金同

又療欬嗽上氣射干煎方

射干八兩 紫菀半兩 膠飴五兩 細辛半兩
乾薑五兩末 生竹瀝一升 芫花根半兩 桑根白皮八兩
附子半兩炮 甘草半兩炙 白蜜一升半 欵冬花八兩

右十二味先切射干合蜜竹瀝汁煎五六沸絞去滓㕮咀諸藥以水一升四合漬一宿煎之七上七下去滓乃合飴薑末煎令如餔服酸棗一丸許日三夜一不知稍增之忌海藻菘菜猪肉冷水生菜千金同

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏人煎方

杏人五兩去兩人者及皮尖 五味子三合 甘草四兩炙 麻黃一斤去節

款冬花三合 紫菀 乾薑各二兩 桂心四兩

右八味切以水一斗煑麻黃減二升掠去沫乃內諸藥煑取四升絞去滓又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得湯中煎如飴成先食服如半棗日三不知稍加之忌海藻菘菜生葱千金同出第十八卷中

崔氏療上氣暴欬方

紫蘇莖葉剉二升 大豆一升

右二味以水四升煑大豆次下紫蘇煑取一升五合分爲三服晝二夜一忌醋鮓鹹酸油膩等出第六卷中

必効主上氣腹脹心胷滿并欬不能食方段明府云極効

枇杷葉一握去毛炙 檳榔三七顆大并皮子碎 生薑二分 高良薑二兩

蜜(二合) 酥(二合)

右六味切以水二大升煑取一大升湯成後内酥蜜更煑三五沸分温三服每服如人行八九里久甚重者三兩劑任意食之出第一卷中

救急療上氣欬肺氣胷痛方

杏人(三大升去尖皮兩人者) 白蜜(一大升) 牛酥(二大升)

右三味杏人擣碎於瓷盆中研取汁五升淨磨銅鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾二升汁以緩火煎減至於所記處即内白蜜及酥還至木記處藥乃成貯不津瓷器中每日三度以煖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服一七日唾色變白二七日唾稀三七日欬斷此方非但療欬兼補虛損去風冷兼悅肌虛白如瓠婦人服之更佳延年秘録同出第六卷中

古今錄驗療上氣兼欬蘇子湯方

蘇子一升　五味子五合　麻黃去節　細辛

紫菀　黃芩　甘草炙各二兩　人參

桂心　當歸各一兩　半夏洗三兩　生薑五兩

右十二味切以水九升煮取三升分二服上氣病亦特單煮蘇子及生蘇葉冬夏煮乾枝莖葉亦佳忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜出第十九卷中

欬逆上氣嘔吐方四首

病源五藏皆禀氣於肺肺感微寒則成欬嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五藏傷動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺欬連滯氣動於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣虛不能王有寒氣傷之而欬嗽者謂之脾欬其狀欬則右脅下痛陰陰引膊背甚則不可動

動則欬發脾與胃合脾欬不已則胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽甚則嘔吐各隨證候知其腑藏也出第十四卷中

深師療欬嗽上氣喉咽中腥臭虛氣攪心頭痛眼疼耳中嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胷中隔塞嘔逆多唾惡心心下堅滿飲多食少療疰并淋通氣丸方

膠飴五斤　蜀椒二升汗　烏頭七分炮　桂心六分

大附子五枚炮　乾薑　人參各四分　杏人一升

天門冬十分　蜈蚣五節去頭炙

右十味末之擣杏人作膏稍稍內藥末擣千過烊膠飴乃內藥中攪令調和合如半棗一枚日六七夜二三服令胷中溫爲度若夢與鬼神交通及飲食者全用蜈蚣食不消者加杏人五合有虛氣少腹急腰痛加天門冬杜仲有風加烏頭二

枚附子一枚立夏後勿加也有留飲加葶藶子一兩熬末之

忌豬肉冷水生葱鯉魚等物千金同

又療上氣欬逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆若墜瘀血

上氣胷脅脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人乳飲滯下有飛

濕陰不足大小便不利股節皆痛消石丸方

消石一升　乾薑　前胡　大黃各一斤

杏人一升去尖皮熬

右五味擣篩蜜和飲服如梧子三丸日再五日後心腹諸疾

隨大小便去月經絶則通下長蟲數十亦利血及冷熱赤白

汁瘕瘕毒惡主之藥利以意消息

又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方

厚朴三兩炙　人參一兩　半夏四兩洗　生薑八兩

茯苓　甘草炙　橘皮　桂心各二兩

枳實（二兩炙）

右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱醋物並出第十八卷中

必效療上氣欬嗽嘔逆不下食氣上方

橘皮　紫菀（各三兩）　人參　茯苓

柴胡　杏人（去尖皮兩人者各二兩）

右六味切以水六升煮取二升分爲三服患冷加生薑二兩患熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚朴二兩炙忌醋物桃李雀肉等出第一卷中

上氣欬嗽多唾方三首

廣濟療上氣肺熱欬嗽多涕唾方

白前（四分）　生麥門冬（十分去心）　貝母

石膏　甘草（炙）　五味子　生薑（各四分）

黃芩五分 杏人四十顆 淡竹葉切一升 白蜜一匙

右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白蜜更上火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須利三兩行湯成後宜加芒消八分忌熱麪炙肉油膩醋食海藻菘菜出第二卷中

古今錄驗小紫菀丸療上氣夜欬逆多唾濁方

乾薑 甘皮一作甘草 細辛 款冬花各三分

紫菀三分 附子二枚炮

右六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日再以知爲度忌冷水猪肉生菜等物

又療欬氣上多涕唾杏人煎方出徐王

杏人一大升不用去皮

右一味擣碎研取大升三升汁以水和研之煎取一大升酒服一匙頭日三忌猪雞魚肉胡荽等物並出第十九卷中

上氣欬方一首

古今錄驗療欬逆上氣胷滿多唾太醫令王叔和所撰巳更御服甚良効方

乾薑三分 礜石一分泥裹燒半日 蜀椒五分汗 細辛二分

烏頭一分炮去皮 杏人一分去皮尖兩人者熬 吴茱萸四分洗 昌蒲一分

紫菀二分 皂莢一分去皮子炙 欵冬花三分 麻黄四分去節

右十二味擣篩蜜和丸如梧子夜卧呑一丸日二不知加之療二十年欬不過二十丸便愈御藥也秘在石室不傳忌猪羊肉餳生菜冷水千金同出第十九卷中一方有桂心三分無麻黄

久欬嗽上氣方三首

肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方

猪胰三具 乾棗一百顆

右二味以酒三升漬數日服二三合至四五服愈服盡此則

差千金同出第三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方司馬大傅欬常將此服愈

麻黃一斤去節 杏人一百枚 甘草二兩炙 桂心一兩

右四味擣篩別擣杏人如脂內諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至三匕氣發便服即止忌海藻菘菜生葱千金古今錄驗同

又療久上氣欬亦療傷寒後欬嗽方

甘草二兩炙切 大棗二十枚擘

右二味以水七升煮取二升分再服數用驗忌海藻菘菜等並出第八卷中古今錄驗名溫脾湯

欬逆上氣方五首

病源肺虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是爲欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉咽之間邪伏則氣

靜邪動則氣奔上煩悶欲絶故謂之欬逆上氣出第廿四卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絶氣結於胷中心煩躁不安一合湯方

芫花熬二分 桂心 乾薑各五分 甘草炙

細辛各四分 蕘花二分

右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜一又云合湯亦得分六七服一日盡便愈一方有菖蒲四分無蕘花忌海藻菘菜生葱生菜

又療欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時下痢此腹中如絞在臍上下關疝氣上腸使然爲病有氣涌逆蜀椒散方

蜀椒五合去目并閉口者汗 桂心 甘草各一兩炙

通草 半夏洗各三兩

右五味擣篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十八卷中

古今録驗麥門冬丸主氣逆上氣方

乾薑六分 麥門冬十分去心 昆布洗 海藻洗各六分

細辛 海蛤 蜀椒熬 桂心各四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子以飲服十丸漸加至二十丸日三有人患風虛得冷輙胸中上氣喉中常如吹管聲欬嗽唾清沫將此丸服得差若散服方寸匕日三忌生葱生菜經心録同

又鯉魚湯療欬逆上氣喉中不利方

生鯉魚一枚重十三斤 熟艾二升 白蜜一升 紫菀

牡蠣各四兩熬 款冬花一升 杏人二十枚去皮尖兩人者 豉一升半

射干二兩 細辛三兩 飴八兩 昌蒲二兩

右十二味㕮咀藥和內魚腹中置銅器中蒸之五斗米飯下藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉餳等

又杏人煎療欬逆上氣方

杏人（一升去皮尖兩人者） 石斛 乾薑（各四兩） 桂心

甘草（炙） 麻黃（去節各五兩） 五味子 款冬花

紫菀（各三兩）

右九味擣八味下篩以水一斗先煑麻黃取八升去滓內藥末膠飴半斤蜜一升攪令相得未食服如棗大一枚日三忌生葱海藻菘菜等並出第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽兼水氣癖氣方

葶藶子（熬） 貝母 桔梗 鱉甲（炙）

防葵（各六分） 白朮 茯苓 大戟

枳實炙 紫菀 旋復花 杏人

橘皮各四分 芫花二分 大黃十分 皂莢一分炙去皮子

右十六味擣篩蜜和爲丸空服以飲服如梧子五丸日二服漸漸加至十丸以微利爲度忌桃李雀肉莧菜醋物猪肉陳臭等出第二卷中

深師療上氣搶心胷奄奄不得息服中脹滿食輙吐蘇子湯方

蘇子一升 大棗三十顆 半夏三兩洗 橘皮

生薑 桂心各一兩 蜀椒二分汗

右七味切以水七升煑取二升八分三服忌羊肉餳生葱出第十八卷中

古今錄驗半夏湯療上氣五藏閉塞不得飲食胷中脅下支脹乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管脣乾口燥肢體動摇手足疼冷夢寤若見人怖懼此五藏虛乏諸勞氣不足所致并療

婦人方

當歸　防風　黄耆各二兩　柴胡半斤

細辛　麻黄去節　人參各一兩　杏人五十顆去尖皮兩人者

桂心三兩　半夏一升洗　大棗二十枚擘　生薑五兩

黄芩一兩

右十三味切以水一斗先煑麻黄一沸去上沫更入水一升及諸藥煑取五升分爲五服日三夜二忌羊肉生葱生菜餳等出第十九卷中

近効療上氣腹内脹滿飲食不消欲作霍亂及欬嗽紫蘇子丸方

紫蘇子　橘皮各二兩　高良薑　桂心

人參各一兩

右五味擣篩蜜和爲丸每服十五丸酒飲任下若食瓜膾等

物有生熟氣凝似霍亂者即含棗栗許大細細𡁻取汁令
消盡應時立愈常有此藥永不患霍亂甚神效也忌生葱
猪肉陳臭等物

外臺秘要方卷第十

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟　校勘

外臺祕要方

十一

消渴 消中

外臺秘要方卷第十一 消渴消中十八門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林　億等上進

消渴不宜鍼灸方一十首
卒消渴小便多太數方八首
近効祠部李郎中消渴方二首
將息禁忌論一首
敘魚肉等一十五件
敘菜等二十二件
敘米豆等九件 茶酒附

消渴方一十七首

病源夫消渴者渴而不小便是也由少服五石諸丸散積久經年石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不能制于石石勢獨盛則腎爲之燥故引水而不小便也其病變者多發癰疽此坐熱氣留於經絡經絡不利血氣壅澀故成癰膿也診其脉數大者生細小浮者死又沈小者生實牢大者死有病

口甘者名爲何何以得之此五氣之溢也名曰脾癉夫五味入於口藏於胃脾爲之行其精氣溢在於脾令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢爲消渴也厥陰之爲病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食甚者則欲吐下之不肯止養生法云人睡卧勿張口久成消渴及失血色赤松子云卧閉目不息十二通治飲食不消其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後法云解衣惔卧伸腰瞋少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無罣礙惔卧者無外想使氣易行伸腰者使腎無逼蹙瞋者大努使氣滿少腹者攝腹牽氣使止息即爲之引腎者引水來咽喉潤上部去消渴枯槁病利陰陽者饒氣力也出第五卷中

千金論曰夫消渴者凡積久興酒無有不成消渴病者然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加脯炙鹽鹹此味酒客躭

嗜不離其口三觴之後制不由己飲噉無度咀嚼鮓醬不擇酸鹹積年長夜酣興不懈遂使三焦猛熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴療之愈不屬在病者若能如方節慎旬月而瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥寔多有効其如不慎者何其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之深思慎之

凡消渴之人愈與未愈常須慮患大癰何者消渴之人必於大骨節間忽發癰疽而卒所以戒在大癰也當預備癰藥以防之宜服麥門冬丸除腸胃熱實兼消渴方

麥門冬八分去心 茯苓八分堅白者 黃連八分 石膏八分碎

萎蕤八分 人參六分 龍膽六分 黃芩六分

升麻四分 栝樓十分 枳實五分炙 生薑屑十分

地骨白皮六分 茅根一切外 粟米三合白粱米

右十五味以水六升煮茅根及粟米令爛餘十三味擣末蜜和丸如梧子以前茅根粟米汁作飲服十丸日二若渴則與此飲至足大麻亦得忌猪肉酢物

又栝樓湯方

栝樓五兩切　麥門冬汁二升　生薑五兩切　茅根切三升

蘆根切二升

右五味以水一斗煮取三升分爲三服忌如藥法

又胃腑實熱引飲常渴茯苓湯洩熱止渴方

茯苓五兩一作茯神　栝樓五兩　知母四兩　小麥二升

麥門冬五兩去心　大棗二十枚去核　生地黃六兩　萎蕤四兩

淡竹葉切三升洗

右九味切以水三升先煮小麥竹葉取九升去滓內諸藥煮取四升分四服不問早晚隨渴即進非但正治胃渴通治渴

病熱即服之忌蕪荑酢物

又猪肚丸療消渴方

猪肚一枚治如食法　黃連五兩去毛　栝樓四兩　麥門冬四兩去心

知母四兩　茯神四兩　粱米五兩

右七味擣爲散內肚中線縫安置甑中蒸之極爛熟接熱及藥木臼中擣可堪丸若硬加少蜜和丸如梧子飲汁下三十丸日再服漸加至四五十丸渴即服之翼同忌猪肉酢物

又栝樓散方

栝樓八分　麥門冬六分去心　甘草六分炙　鈆丹八分

右四味擣爲散以漿水服方寸匕日三服忌海藻菘菜一方有茯苓六分

又黃耆湯方

黃耆三兩　茯神三兩　栝樓三兩　甘草三兩炙

麥門冬三兩去心　乾地黃五兩

右六味切以水八升煑取二升半分三服忌蕪荑酢物海藻菘菜日進一劑服十劑訖服丸藥後腎消門中宣補丸是

又方

取七家井索近桶口結處燒作灰

右一味以井華水服之不過三服

又方

飲豉汁任性多少差止

又方

濃煑竹根汁飲之取差止肘後同

又方

煑青粱米汁飲之差止肘後同

又消渴陰脉絶胃反吐食方

茯苓八兩　澤瀉四兩　白朮三兩　生薑三兩

桂心三兩　甘草一兩炙

右六味切以水一斗煮小麥三升取五升去滓內茯苓等煮取二升半一服八合日再翼同忌海藻菘菜生葱酢物桃李雀肉等

又方

取屋上瓦三十年者破如雀頭三大升以東流水兩石煮取二斗

乾地黃八兩　生薑八兩　橘皮三兩　甘草三兩炙

人參三兩　黃耆三兩　桂心二兩　遠志三兩去心

當歸二兩　芍藥二兩　大棗二十枚擘　白朮八兩

右十二味切內瓦汁中煮取三升分溫四服單瓦汁亦佳一方無甘草

又療熱病後虛熱渴四肢煩疼方

葛根一斤　人參一兩　甘草一兩炙　竹葉一把

右四味切以水一斗五升煑取五升渴則飲一升日三夜二忌海藻菘菜

又虛熱渴無不効塡骨煎方

茯苓三兩　菟絲子三兩　山茱萸三兩　當歸三兩

大豆黃卷一升　石韋二兩去毛　牛膝三兩　巴戟天三兩

麥門冬三兩去心　天門冬五兩去心　五味子三兩　人參二兩

遠志三兩去心　桂心二兩　附子二兩炮　石斛三兩

右十六味先擣篩別取生地黃十斤生栝樓十斤舂絞取汁於火上煎之減半便作數分內藥并下白蜜二升牛髓一升微火煎之令如糜食如雞子黃大日三亦可飲服之佳忌酢物鯉魚生葱猪肉冷水一方有茯苓四兩

又方

桃膠如彈丸含之咽津甚佳本方療渴小便利復非林

又方

蠟如雞子大酢一升煑兩沸適寒溫頓服之本方療渴小便利復非淋

又方

水和栝樓散服方寸匕亦可蜜丸如梧子服三十丸日再服無所忌並出第二十一卷中

近効極要消渴方二首

近効極要論消渴舊來以爲難療古方有黃連湯牛膽丸爲勝亦不能好差自作此方以來服者皆差服多者即吐水豈有更渴之理

又療消渴麥門冬丸方

麥門冬五兩去心　乾地黃三兩　蜀升麻五兩　黃芩五兩

栝樓七兩　苦參八兩　上黨人參三兩　黃連五兩

黃蘗五兩

右九味末之以牛乳和衆手捻作丸子綦乾以飲服二十九日二加至五十六十丸忌蕪荑猪肉冷水

又方

宣州黄連五兩 苦參粉一斤 知母五兩 栝樓五兩

麥門冬五兩去心 牡蠣粉五兩熬 上黨人參五兩 黄耆五兩

乾地黄五兩

右九味末之以牛乳丸清漿服二十九日二服加至五十丸忌猪肉冷水蕪荑

近效極要熱中小便多漸瘦方四首

近効極要論熱中雖能食多小便多漸消瘦方

生枸杞根切一升 生麥門冬三兩去心 黄連二兩

小麥八合 人參一兩

右五味切以水九升煮取三升八合去滓分爲三服間食服

之如不能多服分作四五服亦得忌猪肉

又方

人參五分　麥門冬八分去心　牡蠣粉八分熬　乾地黃十分

知母八分　苦參二十分　黃連八分　栝樓八分

右八味末之以生牛乳爲丸如梧子清漿服十五丸日再加至四十丸食後服忌蕪荑猪肉冷水

又療小便多或不禁方

菟絲子二兩　蒲黃三兩　黃連三兩　消石二兩

肉蓯蓉二兩

右五味兼雞膍胵中黃皮三兩爲散服服方寸匕日三服如行五里久又一服未有不差者忌猪肉千金名九房散

又療小便數多不定日便一二斗或如血色祕方

麥門冬八兩去心　蒺藜子三兩　甘草一兩炙　乾薑四兩炮

桂心二兩　乾地黃八兩　續斷二兩

右七味切以水一斗煮取二升五合分爲三服忌海藻菘菜生葱蕪荑古今錄驗療腎消脚瘦細小便數赤色似血虛冷者

渴利虛經脉濇成癰膿方一十一首

病源夫渴利者隨飲小便是也由少服乳石石熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛又不能傳制水液故隨飲小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便利故也小便利則津液竭津液竭則經絡濇經絡濇則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰膿也出第五卷中

千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方

小麥一升　竹葉切三升洗　麥門冬四兩去心　茯苓四兩

甘草三兩炙　大棗三十枚去核　生薑五兩　栝樓五兩

地骨皮一升

右九味切先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八升去上
沫取七升煮藥取三升分三服忌海藻菘菜酢物
又療渴利虛熱引飲不止消熱止渴茯神湯方
茯神四兩 石膏八兩碎 地骨皮一升 竹葉三升切洗
栝樓五兩 萎蕤四兩 生麥門冬二升去心 知母四兩
生地黃一升切 宿薑四兩
右十味切以水一斗二升下大棗三十枚擘并藥煮取四升
分爲四服忌蕪荑
又消渴利方
生栝樓根三十斤
右一味切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水
盡以煖酒先食後服如雞子大日三服
又方

葵根五升盆大兩束切

右一味以水五升煮取三升宿不食平旦一服三升

又療渴小便利復非淋方

榆白皮二斤去黑皮切

右一味以水一斗煮取五升一服三合日三服

又方

小豆藿一把擣取汁頓服日三肘後文仲同

又渴利方

栝樓粉和雞子白暴乾更擣水服方寸匕日三丸服亦得

又療虛熱四體羸瘦渴熱不止茯神消渴補虛煮散方

茯神四兩　生石斛八兩　栝樓五兩　甘草三兩炙

五味子三兩　蓯蓉四兩　知母三兩　黃連八兩

丹參五兩 人參三兩 當歸三兩 小麥三升
萎蕤四兩
右十三味擣篩爲散取三寸匕以水三升煑取一升絹袋貯煑之日再一煑爲一服忌猪肉醋物海藻菘菜出第二十一卷中

崔氏療消渴瘦中焦熱渴方

苦參粉一大斤 黃連六分 栝樓五兩 知母五兩
牡蠣粉五兩熬 麥門冬五兩去心
右六味並大兩各別擣篩爲散如須少合任量減之擣篩攪使匀以牛乳和併手捻爲丸如梧子大暴乾日再服飽食訖以漿水下之服二十丸如微利減十丸如食熱麪酒等即加服五丸忌猪肉出第三卷中

廣濟療脾胃中虛熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方

麥門冬十二分去心　苦參粉八分　栝樓八分　知母八分

茯神八分　土瓜根八分　甘草六分炙　人參六分

右八味擣篩蜜和丸每食少時煮蘆根大麥飲服如梧子二十丸日再漸加至三十丸不利忌海藻菘菜猪肉大酢出第一卷中一方有黄連十二分

肘後療消渴肌膚羸瘦或虛熱轉筋不能自止小便數方

栝樓六分　黄連六分　漢防已六分　鉛丹六分研

右四味擣篩爲散每食後取酢一合水二合和服方寸匕日三服當強飲水須臾惡水不復飲矣出第十卷中陶氏廣濟文仲同忌猪肉熱食千金翼同分兩小別

消渴口乾燥方三首

廣濟療口乾數飲水腰脚弱膝冷小便數用心力即煩悶健忘方

麥門冬十二分去心　牛膝六分　龍骨八分　土瓜根八分

狗脊六分 茯神六分 人參六分 黃連十分

牡蠣六分熬研 山茱萸八分 菟絲子十二分酒漬一宿 鹿茸八分炙

右十二味擣篩爲末蜜和丸每服食後煮麥飲服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸不利忌生菜熱麪猪牛肉蒜粘食陳臭酢物等

又療消渴苦口舌乾方

生麥門冬五兩去心 茅根一升切 栝樓三兩切 烏梅十顆去核

小麥三合 竹茹一升切

右六味以水九升煮取三升去滓細細含咽分爲四五服忌熱麪炙肉並出第一卷中

千金口含酸棗丸療口乾方

酸棗一升五合去核 醋石榴子五合乾之 葛根三兩 烏梅五十顆去核

麥門冬四兩去心 茯苓三兩半 覆盆子三兩 桂心三兩六銖

石蜜四兩半　栝樓三兩半

右十味擣篩蜜和爲丸含如酸棗許大不限晝夜常令口中有津液出爲佳忌大酢生葱蕪荑同出第二十一卷中

消中消渴腎消方八首

病源内消病者不渴而小便多是也由少服五石熱結於腎内熱之所作也所以服石之人小便利者石性歸腎腎得石則實實則消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病焉由腎盛之時不惜真氣恣意快情數使虛耗石熱孤盛則作消中故不渴而小便多也出第五卷中

千金論曰尋夫内消之爲病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣又内消者食物皆消作小便而又不渴正觀十年梓州刺史李文愽先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利日夜百行以來百方療之漸以增劇四

體羸惙不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也利時脉沈細微弱服枸杞湯即効若恐不能長愈服鈆丹散立効其間將服除熱宣補丸

枸杞湯方

枸杞枝葉一斤 栝樓根三兩 石膏三兩碎 黃連三兩去毛

甘草二兩炙

右五味切以水一斗煑取三升去滓分溫五服日三夜二服困重者多合渴即飲之忌海藻菘菜猪肉

又鈆丹散主消渴止小便數兼消中悉主之方

鈆丹二分熬別研入 栝樓根十分 甘草十分炙 澤瀉五分

胡粉二分熬研入 石膏五分研 白石脂五分研入 赤石脂五分研

右八味擣研爲散水服方寸匕日三服少壯人一匕半患一年者服之一日差二年者二日差渴甚者夜二服若腹中痛

者減之丸服亦佳一服十丸以差爲度不要傷多令人腹痛
此方用之如神已用經今三十餘載矣忌海藻菘菜文仲云
腹中痛者宜漿水飲汁下之亦得又備急云不宜酒下用麥
汁下之亦得丸服者服十丸日再服合一劑救數人得愈古
今錄驗云服此藥了經三兩日宜爛煑羊肝肚空腹喫之或
作羹亦得宜傷淡食之候小便得鹹苦即宜服後花蓯蓉
丸兼煑散將息

又療腎消渴小便數宜補丸方

黃耆三兩　栝樓三兩　麥門冬三兩去心　茯神三兩
人參三兩　甘草三兩炙　黃連三兩　知母三兩
乾地黃六兩　石膏六兩研　菟絲三兩　蓯蓉四兩

右十二味末之以牛膽汁三合共蜜和丸梧子大以茅根飲汁
服三十丸日漸加至五十丸一名茯神丸集驗同忌酢物海藻

菘菜猪肉蕪荑

又療腎氣不足虛損消渴小便數腰痛宜服腎瀝湯方

羊腎一具去脂膜切　遠志二兩去心　人參二兩　澤瀉二兩

乾地黃二兩　桂心二兩　當歸二兩　龍骨二兩

甘草二兩炙　麥門冬一升去心　五味子五合　茯苓一兩

芎藭二兩　黃芩一兩　生薑六兩　大棗二十枚去核

右十六味切以水一斗五升煮羊腎取一斗二升內藥取三升分三服忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑集驗同

又阿膠湯療久虛熱小便利而多或服石散人虛熱多由汗出當風取冷患脚氣喜發動兼消渴腎消脉細弱服此即立減方

阿膠三兩　乾薑二兩　麻子一升熬　遠志四兩去心

附子一兩炮　人參一兩　甘草三兩炙

右七味切以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服說云

小便利多白日夜數十行至一石令五日服之甚良忌海藻

菘菜猪肉冷水

又腎消夜尿七八升方

鹿角一具炙令焦

右一味擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又黄耆湯主消中虛勞少氣小便數方

黄耆二兩　芍藥二兩　生薑二兩　當歸二兩

桂心二兩　甘草二兩　大棗三十枚擘破　麥門冬一兩去心

乾地黄一兩　黄芩一兩

右十味切以水一斗煮取三升去滓空腹温分三服忌海藻

菘菜生葱蕪荑

古今録驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數無脂似麩片甜者皆是消渴病也二喫食多不甚渴小便少似有油而數者

此是消中病也三渴飲水不能多但腿腫脚先瘦小陰痿弱數
小便者此是腎消病也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍
栝樓腎消者加芒消六分服前件鈆丹丸得小便鹹苦如常後
恐虛憊者並宜服此花蓯蓉丸方

花蓯蓉八分 澤瀉四分 五味子四分 紫巴戟天四分去心
地骨白皮四分 磁石六分研水淘去赤汁乾之研入 人參六分
赤石脂六分研入 韭子五分熬 龍骨五分研入 甘草五分炙
牡丹皮五分 乾地黃十分 禹餘粮三分研入 桑螵蛸二十枚炙
栝樓四分

右十六味擣篩蜜和丸如梧子以牛乳空腹下二十丸日再服
忌海藻菘菜胡荽蕪荑等物

又服前丸渴多者不問食前後服煑散方

桑根白皮六分 薏苡人六分 通草四分 紫蘇莖葉四分

五味子六分 覆盆子八分 枸杞子八分 乾地黄九分
茯苓十二分 菝葜十二分 黄耆二分

右十一味擣以馬尾羅篩之分爲五貼每貼用水一升八合煎取七合去滓温服忌酢物蕪荑出第二十六卷中

睡中尿牀不自覺方六首

病源夫人有於眠睡中不覺尿出者是其禀質陰氣偏盛陽氣偏虚則膀胱腎氣俱冷不能温制於水則小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也爲腎之腑腎者足少陰也爲藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞爲小便夜卧則陽氣裏伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於睡眠而不覺尿牀也出第十四卷中

肘後療少小睡中遺尿不自覺方

取鵲巢中蓐燒水服一錢匕即差文仲方千金同

又方

雄雞肝 桂心

右二物等分擣丸服如小豆一枚日三服

又方

雄雞屎白熬 桂心

右二味等分末酒服方寸匕日二亦可除桂心

又方

礬石燒令汁盡 牡蠣熬

右二味等分末之以粟米粥飲服方寸匕日三

又方

雄雞喉嚨及矢白膍胵裏黃皮燒末麥粥清盡服之

亦可以赤雞翅燒末酒服三指撮日三

又方

薔薇根隨多少剉擣以酒飲之並出第二卷中

渴後小便多恐生諸瘡方二首

病源渴利之病隨飲小便也此謂服石之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡也出第五卷中

近効恐腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便去皮膚瘡

調中方

升麻四分　玄參五分　甘草四分炙　知母五分

茯苓三分　牡蠣六分熬　漏蘆五分　枳實六分炙

菝葜四分　黃連六分

右十味擣篩飲汁服方寸匕日再服以差爲度忌猪肉海藻

菘菜酢物

又方

栝樓八分　茯苓八分　玄參四分　枳實六分炙

苦參粉三分　甘草三分炙　橘皮三分

右七味擣篩每空腹以漿水服方寸匕日再服忌海藻大酢

菘菜

渴後恐成水病方三首

病源五藏六腑皆有津液若腑藏因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩背寒而嘔者因利虛故也診其脉心脉滑甚為善渴其久病變或發癰疽或為水病

出第五卷中

近効渴後數飲嘔逆虛羸恐成癰疽水病方

茯苓五分　栝樓六分　升麻四分　麥門冬六分去心

桑根白皮（八分）　橘皮（三分）

右六味擣爲散清水服一方寸匕日再服忌酢物

又方

人參（三分）　猪苓（三分）　通草（五分）　黃連（六分）

乾麥門冬（八分去心）　栝樓（八分）

右六味擣爲散漿水送方寸匕日再服以差爲度忌猪肉冷水生冷等物

又若已覺津液竭身浮氣如水病者方

漢防已（六分）　猪苓（六分）　栝樓（八分）　茯苓（四分）

桑根白皮（十二分）　白朮（三分）　杏人（六分去皮尖熬）　郁李人（六分）

葶藶子（十二分熬紫色）

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹漿水服三十丸日一服腫消小便快下爲度忌酢物桃李雀肉等

虛勞小便白濁如脂方四首

病源此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而關竅在陰陰爲尿便之道胞冷腎損故小便白而如脂或如麩片也出第四卷中

崔氏飲水不知休小便中如脂舌乾渴方

黃連五大兩 栝樓五大兩

右二味擣末以生地黃汁和丸併手丸每食後牛乳下五十丸日再服之忌猪肉

近効消渴肝肺熱焦枯消瘦或寒熱口乾日夜飲水小便如脂不止欲死方

水飛鐵粉三大兩絶礫者別研入 雞膍胵五枚陰乾末入

牡蠣二大兩熬別研如粉入 黃連三大兩去毛

右四味擣篩三五度鍊蜜和丸飲汁下如梧子大五十丸重者不過食時輕者手下差勿傳忌猪肉

又主消渴口乾方

取黃連爲末 好豉微暴令乾

右二味一處擣令成丸食後飲服四十丸日再丸稍大於常藥丸常服有効忌猪肉

又消渴能飲水小便甜有如脂麩片日夜六七十起方

冬瓜一枚 蜀黃連十兩擣爲末

右截瓜頭去穰入黃連末火中煨之候黃熟布絞取汁服一大盞日再服但服兩三枚瓜以差爲度一方云以瓜汁和黃連末丸如梧子大以瓜汁空肚下三十丸日再服不差增丸數忌猪肉冷水

強中生諸病方六首

病源夫強中病者莖長興盛不婬精液自出是也由少服五石石熱住於腎中下焦虛熱少壯之時血氣尚豐能制於石及至

年衰血氣减少腎虚不能制精液也若精液竭則諸病生矣出第五卷中

千金論曰夫人生放恣者衆盛壯之時不自愼惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虚竭百病滋生又年少慮不能房多服石散真氣既盡石氣孤立唯有虚耗脣口乾焦精液自洩或小便赤黄大便乾實或渴而且利日夜一石以來或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也又強中之病者莖長興盛不痿精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺苨湯制腎中石熱又將服白鴨通丸便差

猪腎薺苨湯方

猪腎一具去脂膜 大豆一升 薺苨三兩 人參二兩

茯神二兩 磁石二兩碎綿裹 知母二兩 葛根二兩

黃芩二兩　栝樓二兩　甘草二兩炙　石膏三兩碎綿裹

右十二味切以水一斗五升先煑猪腎大豆取一斗以下去滓内諸藥煎取三升去滓分溫三服渴乃飲之下膲熱者輙合一劑病勢漸歇即停忌海藻菘菜酢物

又平人夏月喜渴者由心王也心王便汗出汗出則腎中虛燥故令渴而小便少也冬月不汗出故小便多而數也此皆是平人之候名曰腎渴但小便利而不飲水者名腎實也經曰腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人其於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病也張仲景曰若熱結中焦則爲堅熱也熱結下焦則爲溺血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣内有熱氣者則喜渴也除其熱則止渴兼虛者須除熱而兼宜補虛則病愈

又療嶺南山瘴氣兼風熱毒氣入腎中變成寒熱脚弱虛滿而渴方

黃連末不限多少　生栝樓汁　生地黃汁　羊乳無即用牛乳及人乳亦得

右四味取三般汁乳和黃連末任多少衆手捻爲丸如梧子大麥飲服三十丸漸加至四十丸五十丸日三服輕者三日愈重者五日愈若藥苦難服即煮麥飲汁下亦得文仲云黃連丸一名羊乳丸肘後同忌猪肉蕪荑

又療消渇浮萍丸方

浮萍　栝樓根等分

右二味擣篩以人乳汁和爲丸如梧子麥飲服二十丸日三服三年病三日差肘後文仲同主虛熱甚佳

又療面黃咽中乾燥手足俱黃短氣脉如連珠除熱止渇利補養地黃丸方

生地黃汁二升 生栝樓汁二升 生羊脂三升牛脂亦得

好蜜四升 黃連末一斤

右五味擣合銀鍋中熬成煎可丸如梧子飲汁送五丸日三服加至十丸若苦冷而渴差即令別服温藥忌猪肉蕪荑肘後同

又療渴小便數散方

知母六分 栝樓一斤 茯苓四分 鉛丹一分

雞肶胵中黃皮十四枚

右五味爲散飲服方寸匕日三禁酒生菜肉差後去鉛丹以蜜和之以麥飲長服勿絕忌酢物肘後同

消渴不宜鍼灸方一十首

千金論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷皮肉若作鍼

孔許大瘡者所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死愼之愼之初得消渴者可依後方灸刺之爲佳孫氏云消渴病百日外旣不許鍼刺所飲之水皆化爲膿水不止者皆死特須愼之又云仍不得誤傷皮肉若有小瘡亦云致死旣令亦得消渴且未免飲水水入瘡即損人令初得旦豈得令其灸刺致此誤傷之禍輒將未順其理且取百日以上爲能未悟初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外脫其氣消渴皆是宜疾灸刺特不相宜唯脚氣宜即灸之是以不取灸穴者耳又有人患消渴小便多而數發在於春經一夏專服栝樓及豉汁得其力渴漸差然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極差不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦脣口乾燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍於常故不爲氣力者然此病皆由虛熱所爲耳療法栝樓汁可長服以除熱牛乳杏酪善於補此

法最有益出第二十一卷中

文仲療消渴熱中加減六物丸方

栝樓根八分 麥門冬六分去心 知母五分 人參四分

苦參粉四分 土瓜根四分

右藥擣篩以牛膽和爲丸如小豆服二十丸日三服麥粥汁下未知稍加至三十丸咽乾者加麥門冬舌乾加知母脅下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根隨患加之一分肘後同

又黃連丸主消渴方

黃連一斤去毛 生地黃十斤

右二味擣絞地黃取汁漬黃連出暴之燥復內之令汁盡乾擣之下篩蜜和丸如梧子服二十丸日三服食前後無在亦可散以酒服方寸匕日三服盡更令作即差止忌猪肉蕪荑

肘後集驗千金廣濟同並出第八卷中

千金栝樓粉散療消渴祕方

深掘大栝樓根厚削皮至白處

右一味寸切以水浸一日一易經五日出取爛擣破之以絹袋盛擺之一如出粉法水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取差止出第二十一卷中

肘後主消渴方

秋麻子一升以水三升煮三四沸取汁飲之無限不過五升差文仲同出第二卷中

廣濟療消渴兼氣散方

栝樓三兩　石膏三兩研　甘草三兩炙　甘皮二兩

右四味擣篩爲散食後煮大麥飲服方寸匕日二夜一服漸加至二匕不利忌熱麪海藻菘菜

又療消渇麥門冬湯方

生麥門冬二升去心 苧根切二升 栝樓五兩 生薑五兩

蘆根切二升 石膏六分碎 小麥二升

右七味切以水二斗煮取六升去滓一服一升渇即任意飲未差更作不利並出第一卷中

崔氏療患熱消渇常服有驗方

豉心三兩以釅醋拌蒸乾曬如此者三熬令微黃 吴黃連三兩

右二味擣篩訖以蜜和爲丸每日空腹服二十五丸食後又服二十丸又取烏梅十顆以水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏梅以小麥子二升煮取汁替亦得

又方

黃連一升吴者去毛 麥門冬五兩去心

右二味擣篩以生地黃汁栝樓根汁牛乳各三合和頓爲丸

如梧子一服二十五丸飲下日再服漸漸加至三十丸若不頓爲丸經宿即不相著也消渴及小便多並是虛熱但冷將息即差前件三方（崔氏本方中此處更有一方用栝樓黃連者故云前件三方）並是冷補空腹服恐少腹下冷常喫少許食服之大好忌猪肉蕪荑

又療消渴無比方

土瓜根（六兩） 苦參粉（三兩） 黃連（五兩去毛） 鹿茸（三兩炙）

栝樓（三兩） 雞膍胵黃皮（三十具熬） 雄雞腸（三具）

牡蠣（五兩熬） 白石脂（三兩研） 甘草（三兩炙） 黃耆（三兩）

桑螵蛸（三七枚炙） 白龍骨（五兩研）

右一十三味擣篩爲散一服六方寸匕日再服夜一服以後藥下之

竹根（十兩） 麥門冬（四兩去心） 石膏（四兩碎之綿裹） 甘李根白皮（三兩）

右四味以水一斗二升煮取三升五合以下前件散藥如難服

可取此藥汁和丸一服六十丸仍還用此藥汁下之忌猪肉

海藻菘菜並出第四卷中

千金加減巴郡太守奏三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩四兩 大黃三兩炒 黃連四兩

夏三月黃芩六兩 大黃一兩炒 黃連七兩炒

秋三月黃芩六兩 大黃二兩 黃連三兩

冬三月黃芩三兩 大黃五兩 黃連二兩炒

右三味隨時合擣下篩以蜜和爲丸如大豆服五丸日三不知稍增七丸食上飲下服一月病愈久服走及奔馬近常試驗忌猪肉出第二十一卷中

卒消渴小便多太數方八首

肘後卒消渴小便多方

多作竹瀝飲之恣口數日差忌麪炙肉

又方

酒煎黃蘗汁取性飲之

又方

熬胡麻令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五升即差

又療日飲水一斛者方

桑根白皮新掘入地三尺者佳炙令黃黑色切以水煮之無多少但令濃隨意飲之無多少亦可內少粟米勿與鹽集驗云宜熱飲之

又小便卒大數復非淋一日數十過令人瘦方

未中水猪脂如雞子一枚炙承取肥汁盡服之不過三劑差

又方

羊肺一具作羹內少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具差千金同

又方

豉一升內於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令蒸之三斗米許時即下白礬得消入豉中出暴乾擣末服方寸匕

又小便數猪肚黃連丸方

猪肚一枚洗去脂膜黃連末三斤內猪肚中蒸之一石米熟即出之暴乾擣丸如梧子服三十丸日再服漸漸加之以差爲度忌猪肉出第二卷中

近効祠部李郎中消渴方二首

論曰消渴者原其發動此則腎虛所致每發即小便至甜醫者

多不知其疾所以古方論亦闕而不言今略陳其要按洪範稼穡作甘以物理推之淋餳醋酒作脯法須臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣氣則下入骨髓其次以爲脂膏其次爲血肉也上餘别爲小便故小便色黄血之餘也臊氣者五藏之氣鹹潤者則下味也腰腎既虚冷則不能蒸於上穀氣則盡下爲小便者也故甘味不變其色清冷則肌膚枯槁也由如乳母穀氣上泄皆爲乳汁消渴疾者下泄爲小便此皆精氣不實於内則便羸瘦也又肺爲五藏之華蓋若下有暖氣蒸即肺潤若下冷極即陽氣不能昇故肺乾則熱故周易有否卦乾上坤下陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板蓋之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不上此板終不可得潤也火力者則爲腰腎強盛也常須暖將息其水氣即

爲食氣食氣若得煖氣即潤上而易消下亦免乾渴也是故張仲景云宜服此八味腎氣丸並不食冷物及飲冷水今亦不復渴比頻得効故録正方於後耳凡此疾與脚氣雖同爲腎虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十一月十二月衰於二月三月其故何也夫脚氣者擁疾也消渴者宣疾也春夏陽氣上故擁疾發即宣疾愈也秋冬陽氣下故宣疾發即擁疾愈也審此二者疾可理也又宜食者每間五六日空腹一食餅以精羊肉及黃雌雞爲臛此可溫也若取下氣不食肉菜食者宜煑牛膝韭蔓菁又宜食雞子馬肉此物微擁亦可療宣疾也擁之過度便發脚氣猶如善爲政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度使寬猛得所定之於心口不能言也又庸醫或令喫栝樓粉往往經服之都無一効又每至椹熟之時取爛美者水淘去浮者飡食之候心肖間

氣爲度此亦甚佳生牛乳煖如人體渴即細細呷之亦佳張仲景云足太陽者是膀胱之經也膀胱者是腎之腑也而小便數此爲氣盛氣盛則消穀大便硬衰則爲消渴也男子消渴飲一斗水小便亦得一斗宜八味腎氣丸主之

神方消渴人宜常服之

乾地黄八兩　署預四兩　茯苓三兩　山茱萸五兩

澤瀉四兩　牡丹皮三兩　附子三兩炮　桂心三兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子大酒下十丸少少加以知爲度忌猪肉冷水蕪荑胡荽酢物生葱與范汪小品深師古今錄驗必効文仲方等並同

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之方

黄連二十分蜀者　苦參粉十八分　乾地黄十分　知母十分

牡蠣八分熬　麥門冬十二分去心　栝樓七分一方無餘及數分並同

右七味擣篩牛乳和爲丸如梧子大併手作丸暴乾油袋盛用漿水或牛乳下日再服二十丸一方服十五丸患重者渴差後更服一年以來此病特慎麞鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫索餅五日一頓細切精羊肉勿著脂飽食喫羊肉須著桑根白皮食一方云差後須服此丸一載以上即永絕根源此病特忌房室熱麪并乾脯一切熱肉粳米飯李子等若覺熱渴加至二十五丸亦得定後還依前減其方神効無比餘並準前方忌猪肉蕪荑

將息禁忌論一首

夫人雖當服餌而不知養性之術亦難以長生養性之道不欲飽食便卧亦不宜終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫久勞疲極也亦不可強所不能堪耳人不得每夜食食畢即須行步令稍暢而坐卧若食氣未消而傷風或醉卧當成積聚百疾或多

霍亂令人暴吐又食欲得少而數不欲頓而多多即難消也能善養性者皆先候腹空積飢乃食先渴後飲不欲觸熱而飲飲酒傷多即速吐之爲佳亦不可當風卧及得扇之皆令人病也逮而思之傷也悲哀憔悴傷也力所不勝而凡人冬不欲極溫夏不欲窮凉亦不欲露星月下卧大寒大熱大風皆不用觸冐之五味入口不欲偏多偏多則損人腑藏故曰酸多即傷脾苦多即傷肺辛多即傷肝鹹多即傷心甘多即傷腎此是五行自然之理又傷初即不覺久乃損壽耳夫喫生肉鱠必須日午前即良二味之中其鱠尤腥而冷也午後陰陽交錯人腹中亦順天時不成癖積亦能霍亂矣

夫人至酉戌時後不要喫飯若冬冬月夜長性熱者須少食仍須溫軟喫訖事須摇動令食消散即不能成脚氣凡衝熱有汗不用洗手面及漱口令人五藏乾枯少津液又冬冬夏月不用枕冷

物石鐵尤損人水枕亦損人縱不損人及少年之時即眼暗也

敘魚肉等一十五件

羊肉甚補虛患風及脚氣不用喫嘔食即生薑和煮又猪肉兔肉鵝肉牛肉驢馬肉大鯉鮎魚河豚等並禁不可食之鹿肉微冷少喫麞肉溫不可多喫令人消渴久喫多肉令人血不行野雞春月以後不堪喫鯽魚長六七寸以上者並益人仍不要生喫生乾脯不可喫不消化爲蟲

敘菜等二十二件

凡冬瓜食之下氣唯脚氣相宜令人寒中不可多喫能下積年藥力甚損人久服令人虛壞筋骨茼苣令人寒中久食節骨頭生冷水令人髮鬢白蘭香胡荽芸臺三物不益人也甘菊枸杞菜發丹石少喫即溫多即冷紫蘇薄荷荏菜水蘇溫中益人苜蓿白蒿牛蒡地黃苗甚益人長喫苜蓿雖微冷益人堪久服

凡菜皆取熟喫不可生喫損人葅雖葷不同五辛溫中補筋骨可食葱調諸候但少喫無妨多食令人虛冷韭從二月以後青稍長煑喫甚補至四月上旬止不可食從七月二十日後即漸堪喫至九月後冷兼有土氣蘿蔔消食下淡澼甚宜人生熟喫俱善斜蒿不甚益人亦無損蔓菁作虀令黃堪喫芥發熱動風傷筋骨蒜傷血損藥不可食葵性滑夏不堪食冬冬暴乾熱時煑用蘿蔔作虀下之利大小腸醋鹹並傷筋骨尤須節之不可縱性

敘米豆等九件附茶酒

白米甚益人小豆菉豆白豆並動氣仍下津液少喫任意大豆甚下氣益人久服令人身重蕎麥不可食小麥麪喫之令人動熱不可頻飡之大麥麪甚益人性小冷發澼氣粳米性寒南中温茶不可多喫熱溫煑桑代之酒有熱毒漬地黃丹參大豆即

得飲之法以上並是祠部方亦一家秘寶也

外臺秘要方卷第十一

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張寔校勘

外臺秘要方

十二

癖 痃氣

積聚 癥瘕

胷痺 奔㹠

外臺祕要方卷第十二 癖及痃氣積聚癥瘕胷痺奔㹠三十八門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林　億等上進

灸奔豘法六首

療癖方五首

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流雖復多飲水漿亦不能爲病若攝養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻側在於兩脅之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生云卧覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水忽急咽久成水癖又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久行之愈伏梁伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癰者宿水宿氣癖數生癰久行腸化爲筋骨變爲實出第二十卷中

廣濟療腹中癖氣方

牛膝八分 桔梗六分 芍藥六分 枳實八分炙

白朮六分 鼈甲八分炙 茯苓八分 人參六分

厚朴六分炙 大黃六分 桂心六分 檳榔人六分

右十二味擣篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸老小微利忌生冷油膩小豆粘食莧菜桃李雀肉大醋生葱猪肉出第二卷中

千金翼江寧衍法師破癖方

白朮三兩 枳實三兩炙 柴胡三兩

右三味切以水五升煑取二升分溫三服服三十劑永差忌桃李雀肉出第十九卷中

必効療癖方

取車下李人微湯退去皮及並人與乾麪相半擣之爲餅如猶乾和淡水如常溲麪大小一如病人手掌爲二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如

不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利爲度至午後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不効但病重者李人與藥相半輕者以意減病減之後服者亦任量力頻試差神効

又方

大黃十兩

右一味擣篩醋三升和煎調内白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利爲度小者減之

又方

牛黃三大豆許 麝香一當門子大 朱砂準麝香 生犀角小棗許別擣末

以上四味並研令極細湯成後内之

大黃一兩 弔藤一兩 升麻一兩 甘草半兩炙

鼈甲半兩炙　丁香五十枚

右十味切以水三升先煑大黄等六味取强半升絞去滓內牛黄等四味和絞分爲三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特忌牛馬肉其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟量病減之忌莧菜海藻菘菜生血物等並出第三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脅下有時弦亘起或脹痛或喘息短氣故云癖結脉緊實者癖結也出第二十卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆三枚去心皮熬　杏人七枚去尖皮熬　大黄如雞子大

右三味擣篩大黄取巴豆杏人別擣如膏和大黄入蜜和丸

空肚以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下病爲度忌生冷油膩小豆野猪魚蘆笋等出第二卷中

千金狼毒丸主堅癖方

狼毒（五兩塗薑汁炙） 半夏（三兩洗） 杏人（三兩去尖皮兩人者熬） 桂心（四兩） 附子（二兩炮） 細辛（二兩） 椒（二兩汗）

右七味擣篩別擣杏人蜜和飲服如大豆二丸忌猪肉冷水生葱生菜羊肉餳出第十一卷中

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方

桔梗（四分） 桂心（四分） 巴豆（八分去心皮熬） 芫花（十二分熬） 杏人（五分去皮尖兩人者熬）

右五味先擣三㸃藥成末別擣巴豆杏人如膏合和又擣一千杵下蜜又擣二千杵丸如胡豆漿服一丸取利可至二三丸兒生十日欲癎發可與一二丸如黍米諸腹不快體中覺

患便服之得一兩行利即好肘後千金同服四神丸下之亦佳忌豬肉生葱蘆笋出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之爲病是飲水停積脅下痃強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脉弦而大者寒癖也出第二十卷中

肘後療腹中冷癖水穀癊結心下停淡兩脅痞滿按之鳴轉逆害飲食方

大蟾蜍一頭去皮及腹中物支解之　芒消大人用一升中人七合羸小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頓服一升若未下更服一升中人七合羸小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方

大黃三兩　甘草二兩炙　蜜一升二合　棗二十七枚擘

右四味切以水三升先煑三物取一升七合去滓內蜜再上火煎令烊分再服忌海藻菘菜

又方

巴豆三十枚去皮心熬 杏人二十枚去兩人及尖皮熬 桔梗六分 藜蘆四分炙

皂莢三分炙去皮子

右五味擣蜜和丸如胡豆未食服一丸日三欲下病者服二丸長將服百日都好差忌猪肉蘆笋狸肉古今錄驗同並出第三卷中

深師主久寒澼胷滿短氣心腹堅歐吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即爲患心冷引腰背強急吳茱萸丸方

吳茱萸八分 附子三分炮 厚朴五分炙 半夏五分洗

桂心五分 人參五分 礬石五分熬 枳實五分炙

乾薑五分

右九味下篩蜜和酒服如梧子二十丸日三不知增之忌豬羊肉餳生葱冷水出第十六卷中

延年白朮丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱不能食飲頻頭風旋喜歐吐方

白朮六分 厚朴四分炙 人參五分 白芷三分

橘皮四分 防風五分 吳茱萸四分 芎藭四分

署預四分 茯神五分 桂心四分 大麥蘗四分熬

乾薑四分 防葵四分炙 甘草五分炙

右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子酒服十五丸日再加至二十丸忌桃李雀肉海藻菘菜醋物生葱出第十六卷中

久癖方二首

病源久癖謂因飲水過多水氣擁滯遇寒熱氣相搏便成癖在於兩脅下經久不差乃結聚成形段而起按之乃水鳴積有歲

年故云久癖出第十十卷中

集驗療冷熱久癖實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡四兩　生薑四兩　枳實三兩炙　半夏四兩洗

白朮三兩　茯苓四兩　甘草二兩炙　桂心二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服忌羊肉餳桃李雀肉生葱醋物海藻菘菜千金同出第六卷中

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒者服之二十日愈久服令人延年益壽浩仲堪云扁鵲曾青丸療久癖積聚留飲宿食天行傷寒欬逆消渴隨病所在久病羸瘦老小宜服藥或吐或下或汗出方

曾青二分　寒水石三分　朴消二分　茯苓三分

大黃三分　附子三分炮　巴豆二分去心皮熬

右七味各異擣下篩巴豆消石合擣六千杵次內附子擣相

得次内茯苓擣相得次内大黄擣相得次内曽青擣相得次内寒水石擣相得次内蜜和擣千杵大人服大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸二三歲兒如黍米一丸如服藥以薄粉粥清下當覆卧令汗出吐下氣發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至二丸一方用曽青三分忌猪肉冷水蘆笋大酢

崔氏同出第十卷中

癖羸瘠方二首

删繁療癖羸瘠膏髓酒方

猪肪膏三升 牛髓二升 油五升 薑汁三升

生地黄汁五升 當歸四分 蜀椒汁四分 吴茱萸五合

桂心五分 人參五分 五味子六分 芎藭五分

乾地黄七分 遠志皮五分

右十四味切擣九味三篩爲散取膏髓等五種汁加水一斗同

汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散攪令調火上
煎三上三下燥器貯凝冷爲餅方寸以清酒一升煖下膏取服
之晝兩服夜一服非但療癖亦主百病忌生葱蕪荑

又枸杞子散方

枸杞子（不限多少夏採五升赤者）　乾薑（五兩）　白朮（五兩）
吳茱萸（一升）　蜀椒（三合汗）　橘皮（五兩）

右六味切擣五味三篩下爲散取枸杞子燥瓷器貯研暴如
作米粉法七日暴之一暴一研取前藥散和之又研隨飲酒
食等即便服一方寸匕和酒食進之如此能三年服非但療
百病亦長陽氣忌桃李雀肉青魚鮓等並出第五卷中

痃癖方四首

廣濟療痃癖氣兩脅妨滿方

牛膝（十分）　桔梗（八分）　芍藥（八分）　枳實（八分）

人參六分　白朮八分　鼈甲六分　茯苓八分

訶棃勒皮八分　柴胡六分　大黃十分　桂心六分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十丸日二服漸加至三十丸利多即以意減之常取微通洩爲度忌生硬難消油膩等物及莧菜桃李雀肉猪肉冷水生葱出第二卷中一方用五加皮無人參

千金翼療十年痃癖方

桃人六分去皮尖兩人者熬　豉六外乾暴去皮熬擣篩　蜀椒三兩去目閉口者生擣下篩

乾薑三兩生擣下篩

右四味先擣桃人如脂合擣千杵如乾可下少許蜜和擣令可丸空肚酒服三丸如酸棗人日三出第十九卷中本方下有熨法此不載

崔氏療痃癖積冷發如錐刀所刺鬼疰往來者方

烏頭八分炮　人參八分　桂心八分　附子八分炮

乾薑八分 赤石脂八分 朱砂三分研

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子以煖酒服七丸稍稍加之至十丸愼生冷醋滑猪魚雞蒜小豆油膩牛馬肉生血物生葱等

又療痃癖方

鼠屎一大合熬令黃燋者熬乾者不須熬即用

右一味以水二升煮五六沸及熱濾取汁置椀中急内硇砂一小兩乃蓋頭經宿明日平旦温爲兩服稍晚食無所忌並出第七卷中一方硇砂作朱砂

痃氣方三首

廣濟療痃氣方

牛膝六分 芍藥六分 桔梗六分 枳實五分炙

厚朴六分炙 橘皮四分 茯苓八分 人參五分

蒺蔾子五分熬 訶梨勒六分熬 柴胡六分 檳榔四分

大黃六分

右十三味擣篩蜜和丸空肚煑大棗飲服如梧子二十丸日再漸漸加至三十丸如利多以意減之忌生硬難消物及油膩猪肉醋物出第二卷中

延年療兩痃脹急肋滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方

枳實三兩炙　桔梗二兩　鼈甲二兩炙　人參二兩

前胡二兩　生薑四兩　檳榔七枚并子破　桂心二兩

右八味切以水九升煑取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久禁生冷魚蒜麪食生葱莧菜出第十六卷中

救急療腹中痃氣連心以來相引痛緊急方

白术三兩　枳實三兩炙　柴胡四兩　鼈甲二兩炙

右四味切以水七升煑取二升五合去滓空肚分三服相去七八里久能連服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒魚犬須愼之

頻服有効忌莧菜桃李雀肉生葱出第七卷中

癖及痃癖不能食方一十四首

廣濟療癖痃氣不能食兼虛羸瘦四時常服方

牛膝六兩 生地黃九兩 當歸三兩 桂心四兩

蓯蓉六兩 遠志三兩去心 五味子五兩 麴末五合熬令黃

大麥糵末一升五合熬黃 白朮三兩 人參三兩 茯苓六兩一方三兩

右十二味擣篩爲散空腹温酒服方寸匕日二服漸加至一匕半夏中煑生薑及檳榔飲下加麥門冬六兩不利此方甚宜久服令人輕健忌桃李雀肉生葱蕪荑醋物牛犬肉出第二卷中

崔氏療宿癖時腹微滿不能食調中五參丸方

人參 沙參 玄參 丹參

苦參各一兩 大黃四兩 附子一兩炮 巴豆四十枚去心皮熬

蜀椒一合去目汗 乾薑半兩 防風一兩 䗪蟲十五枚熬
葶藶一合熬
右十三味擣下篩蜜和爲丸如梧子先食服一丸日三忌野猪肉蘆笋生血物等

又療癖飲并醋咽吐水及沫食飲不消氣逆脹滿方

大腹檳榔十兩其子熬實者末之 高良薑三兩 桃人一升去皮兩人者熬別擣如泥
右三味和擣絹篩以白蜜和丸酒服如彈丸二枚日再服漸加至四五丸加減任意自量並出第七卷中

延年人參丸主痃癖氣不能食方

人參八分 白朮六分 枳實六分炙 橘皮四分
桂心六分 甘草五分炙 桔梗五分
右七味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十五丸酒下日二服加至二三十丸禁生冷猪肉生葱雀肉桃李海藻菘菜

又療冷氣兩肋脹滿痃氣不能食方

白朮三兩 人參二兩 茯苓三兩 枳實三兩炙

生薑五兩 桔梗二兩 桂心一兩半

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行七八里久忌生冷猪肉魚桃李雀肉醋物生葱

又桃人丸主痃癖氣浸心脹滿不下食發即更脹連乳滿頭面悶欬氣急者方

桃人八分去尖皮熬 鱉甲六分炙 枳實六分炙 白朮六分

桔梗五分 吳茱萸五分 烏頭七分炮 檳榔人五分

防葵五分 芍藥四分 乾薑五分 紫菀四分

細辛四分 皁莢三分去皮子 人參四分 橘皮四分

甘草四分炙

右十七味擣篩蜜和丸如梧子服十丸日再服加至二十丸忌

一海藻菘菜猪肉冷水生菜桃李雀肉等

又浸藥酒用下前藥方

紫蘇三兩 牛膝三兩 丹參三兩 生薑六兩

生地黄三升切 香豉三升熬 紫菀三兩 防風四兩

橘皮三兩 大麻人一升五合熬

右十味細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後温一盞用下桃人丸酒盡更添忌蕪荑

又檳榔子丸主腹内痃癖氣滿肖背痛不能食日漸羸瘦四肢無力時時心驚方

檳榔子六分 桔梗四分 當歸四分 人參五分

桂心四分 前胡四分 橘皮三分 厚朴三分炙

白朮四分 甘草五分炙 烏頭四分炮 乾薑四分

茯神四分 鼈甲五分炙 大黄四分 龍齒六分炙

右十六味擣篩蜜和爲丸如梧子大服十丸飲汁下日二服加至十五二十丸酒下亦得忌海藻菘菜猪肉桃李雀肉大醋莧菜生葱等

又療痃癖背脊痛時時欬嗽不能食方

桂心四分 細辛四分 白朮六分 厚朴三分炙

附子五分炮 乾薑五分 橘皮三分 鱉甲四分炙

防葵三分炙 吴茱萸三分

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三十丸忌猪肉冷水桃李雀肉莧菜醋物生菜生葱等

又療痃癖發即兩弦急滿不能食方

檳榔子六分 枳實六分炙 桔梗四分 鱉甲四分炙

人參六分 白朮六分 桂心三分 龍膽五分

前胡四分 萎蕤五分 大黄五分 甘草六分炙

右十二味擣篩蜜和爲丸如梧子大服十丸酒下日二服加至十五二十丸忌海藻菘菜桃李雀肉莧菜生葱猪肉等

又半夏湯主腹内左肋痃癖硬急氣滿不能食胷背痛者方

半夏三兩洗 生薑四兩 桔梗二兩 吴茱萸二兩
前胡三兩 鼈甲三兩炙 枳實二兩炙 人參一兩
檳榔子十四枚打破

右九味切以水九升煮取二升七合去滓分温三服如人行八九里乆忌猪羊肉餳莧菜等

又療冷痃癖氣發即痃氣急引膀胱痛氣滿不消食桔梗丸方

桔梗四分 枳實四分炙 鼈甲四分炙 人參四分
當歸四分 桂心三分 白术四分 吴茱萸三分
大麥蘖六分熬 乾薑四分 甘草五分炙

右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十丸酒下日再服稍加

至二十丸禁生葱猪肉莧菜海藻菘菜桃李雀肉等

又黄耆丸療風虚盗汗不能食腹内有痃癖氣滿者方

黄耆五分　白朮六分　鼈甲三分炙　白薇三分

牡蠣四分熬　茯苓六分　桂心三分　乾薑四分

枳實四分炙　橘皮三分　當歸四分　檳榔子六分

人參六分　前胡四分　附子四分炮

右十五味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十五丸酒下日再服加至二十丸忌桃李雀肉醋物猪肉冷水莧菜生葱並出第十六卷中

必効練中丸主癖虚熱兩脅下癖痛惡不能食四肢酸弱口乾唾涕稠粘眼澀頭時時痛并氣衝背膊虚腫大小便澀小腹痛熱衝頭髮落耳鳴彌至健忘服十日許記事如少時無禁忌方

大黄一斤　朴消十兩練　芍藥八兩　桂心四兩

右四味擣篩蜜和爲丸如梧子平旦酒服二十丸日再稍加
至三十丸以利爲度能積服彌佳縱利不虛人神良忌生葱
又鼈甲丸主癖氣發動不能食心腹脹滿或時發熱方
鼈甲八分炙 白朮十分 枳實八分炙 芍藥六分
麥門冬八分去心 人參八分 前胡六分 厚朴六分炙
右八味擣篩蜜和爲丸如梧子飲服二十丸漸漸加至三十
丸冷即酒服極効禁生物粉酪油膩等亦忌莧菜桃李雀
肉並出第二卷中

痃癖等一切病方四首

千金翼療痃癖乃至鼓脹滿方
烏牛尿一升
右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病出隔日
更服愼口味等

又三稜草煎主癥癖方

三稜草 切一石

右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內密器中旦以酒一盞服一匕日二服每服常令酒氣相續並出第十九卷中

崔氏療腹中癥癖兼虛熱者不可用純冷專瀉藥宜羈縻攻之方

鼈甲 八分炙 龜甲 八分炙 桑耳 八分金色者炙 大黃 八分

吴茱萸 八分 防葵 八分 附子 四分炮

右七味下篩蜜和爲丸如梧子飲若酒服十九日再服漸漸加一丸以微洩爲度無所忌日晚服馬莧汁三四合以差爲期亦是單省煖此汁服前藥更佳馬齒菜即馬莧也忌猪肉冷水出第七卷中 今詳前方用鼈甲不宜服莧菜去日晚服馬莧汁并服藥此必悞也

又溫白丸療癥癖塊等一切病方

紫菀三分　吴茱萸三分　昌蒲二分　柴胡二分
厚朴二分炙　桔梗二分　皁莢三分去皮子炙　烏頭十分熬
茯苓二分　桂心二分　乾薑二分　黃連二分去毛
蜀椒二分汗　巴豆二分去心皮熬　人參二分

右十五味合擣下篩和以白蜜更擣二千杵丸如梧子一服二丸不知稍增至五丸以知爲度心腹積聚久癥癖塊大如盃椀黃疸宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脅徹背連胸痛無常處繞臍絞痛狀如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飲食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化或婦人不産或斷緒多年帶下淋瀝或痃瘧連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛痒或半身疼痛或眉髮墮落又療七十二種風亦療三十六種遁注或癲或癇或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能飲

食昬昬默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或啼飲食無味月水不調真似懷孕連年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈㠯知方驗便合藥與婦人服之十日下出癥癖蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃汁五升所苦悉除當月有子㠯兄墮馬被傷腹中有積血天陰即發羸瘦異常久著在牀命在旦夕㠯與藥服之下如雞肝黑血手大一百片白膿二升赤黃水一升許其病即差㠯知方驗謹上禁生冷餳醋猪羊魚雞犬牛馬鵝肉五辛葱蒜油膩豆及糯米粘滑鬱臭之屬出第二卷中

癖硬如石腹滿方二首

廣濟療腹中痃氣癖硬兩脅臍下硬如石按之痛腹滿不下食心悶欬逆積年不差鼈甲丸方

鼈甲八分炙 牛膝五分 芎藭四分 防葵四分襄州者

大黃六分 當歸四分 乾薑四分 桂心四分

細辛四分 附子四分炮 甘草四分炙 巴豆二七枚去心皮熬

右十二味擣篩蜜和丸平旦空腹溫酒下如梧子四丸日三服漸加以微利一兩行爲度忌海藻菘菜猪魚牛犬肉生菜生葱蘆笋莧菜出第二卷中

必効療腹滿癖堅如石積年不損方

取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日二出第三卷中

食不消成癥積方四首

集驗療凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差張

文仲備急同陸光禄說有人食桃不消化作病時無桃就林間得槁桃子燒服之登時吐病即差千金同出第六卷中

備急食魚鱠及生肉住胷膈中不消化吐之不出多成癥病方

朴消（如半雞子一枚）　大黃（二兩切）

右二味以酒二升煑取一升去滓盡服之立消無朴消用芒消消石亦佳肘後同

又宿食不消大便難練中丸方

大黃（八兩）　葶藶（熬）　杏人（去皮尖熬）　芒消（各四兩）

右四味擣篩蜜和丸如梧子服七丸日三不知稍加至十丸姚方並出第三卷中

古今錄驗療卒食不消欲成癥積艾煎丸方

白艾（五尺圍一束）　薏苡根（一大把）

右二味合煑汁成如飴取半升一服之便刺吐去宿食神驗
出第十卷中
心下大如杯結癥方二首
病源積聚痼結者是五藏六腑之氣已積聚於內重因飲食不
節寒温不調邪氣重沓牢痼盤結者也久即成癥出第十九卷中
肘後療心下有物大如杯不得食者方
葶藶二兩熬　大黃二兩　澤漆四兩洗
右三味擣篩蜜和擣千杵服如梧子二丸日三不知稍加千金
文仲集驗古今錄驗同云療癥堅心下大如杯食則腹滿心
腹絞痛
又熨癥方
竈中黃土一斤　生葫一升
右二味先擣葫熟內土復擣以好苦酒澆令浥浥先以塗布

一面仍搶病上又塗布上藥復易之取令消上並出第一卷中

瘰癧痃氣灸法四首

崔氏療瘰癧閃癖方

令患人平坐取麻線一條繞項向前垂線頭至鳩尾橫截斷即迴線向後當脊取線窮頭即點記乃別橫度口吻吻外截却即取度吻線中摺於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭通前合灸三處其所灸處日別灸七壯以上十壯以下滿十日即停看患人食稍得味即取線還度口吻於脊中點處橫分灸之其數一准前法仍看脊節穴去線一二分亦可就節穴下火如相去遠者不須就節穴若患人未損可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋早晚與灸脊上同時下火也

又灸閃癖法

其癖有根其根有著背者有著膊上者遣所患人平坐熟看癖頭仍將手從癖頭向上尋之當有脉築築然向上細細尋至膊上至築築頭當膊即下火還與前壯數無别王丞去背上恐不得過多下火只可細細日别七炷以來

又療癖左右相隨病灸法

第一屈肋頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第三肋下亦是灸處左右各灸五十壯一時使了千金翼灸癖方患左灸左患右灸右脊屈肋數第二肋上第三肋下向內翅前初日灸三次日五周而復始至五十止忌大蒜餘不忌

又灸痃氣法

從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近內接腰骨外取穴孔即是灸處兩相俱灸初下火各灸

三壯明日四壯每日加一壯至七壯還從三壯起至
三十日即罷

右前兩種灸法若㸃時拳脚枕枕即拳脚枕枕灸若舒脚㸃時還舒脚灸並出第七卷中

積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和腑藏虛弱受於風邪搏於腑藏之氣所爲也腑者陽也藏者陰也陽浮而動陰沉而伏積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸藏受邪初未能爲積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足久不愈令人發痎瘧連歲月不已以季夏戊巳日得之何以言之肺病當傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故留

結爲積故知肝之積以季夏戊己日得之也

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結爲積故知伏梁以秋庚辛日得之也

脾之積名曰痞氣在胃管覆覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結爲積故知痞氣以冬壬癸日得之也

肺之積名曰息賁在右脅下覆覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結爲積故知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚賁走之狀上下無

時久不愈令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪腎欲復還脾脾不肯受故留結爲積故知賁豚以夏丙丁日得之也此爲五積

沉

診其脉駃而緊積聚脉浮而牢積聚脉橫者脅下有積聚脉來小沉實者胃中有積聚不下食食即吐出脉來細而附骨者積也脉出在左積在左脉出在右積在右脉兩出積在中央以部處之診得肺積脉浮而毛按之辟易時下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蝨緣狀其甚如鍼刺之狀時痒白色也診得心積脉沉而芤時上下無常處病悸腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚即唾血主身瘈瘲主血厥夏差冬劇色赤也診得脾積脉浮大而長飢則減飽則見䐜起與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重手足脛腫厥不能卧是主肌肉損色黃也診得肝積脉弦而細兩脅

下痛邪走心下足脛寒脅痛引少腹男子積疝也女子病淋也
身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也診得腎積脉沉
而急苦脊與腰相引飢則見飽則減病腰痛少腹裏急口乾咽腫
傷爛目茫茫骨中寒生髓厥喜忘色黑也診得心腹積聚其脉牢
強急者生脉虛弱急者死又積聚之脉實強者生沉者死其湯
熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左
足踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐生腰向日仰頭徐以
口內氣因而咽之三十過而止開目又云左脅側卧伸臂直脚
以口內氣鼻吐之通而復始除積聚心下不便又云以左手按
右脅舉右手極形除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張
鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息
十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐生
腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之自極七息名曰蜀王

橋除脅下積聚又云向晨去枕正偃卧伸臂腹瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微定復爲春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者張吸其腹熱乃止癥瘕散破即愈矣出第十九卷中

范汪破積丸療積聚堅癥方

大黃一斤　牡蠣三兩熬　凝水石一兩　石膏一兩

石鍾乳一兩　理石一兩

右六味擣合下篩和以蜜丸如梧子先食服酒飲任下三丸日三不知稍增以知爲度

又順逆丸主久寒積聚氣逆不能食方

大黃十分　黃芩四分　厚朴四分炙　乾地黃四分

桂心四分　滑石四分熬　杏子四分去尖皮熬　黃連四分

麥門冬四分去心

右九味擣合下篩和以蜜丸如梧子服十丸日再服後食不知稍增以知爲度忌蕪荑生葱猪肉

又捶鑿丸療腹中積聚邪氣寒熱消穀方

甘遂一分 蕘花一分 芫花一分 桂心一分

巴豆一分 杏人一分 桔梗一分

右七味蕘花芫花熬令香巴豆杏人去皮熬令變色已各異擣下細篩擣合丸以白蜜擣萬杵服如小豆一丸日三行長將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人兼身亦服名曰捶鑿以消息之忌猪肉蘆笋生葱並出第十三卷中

延年療腹內積聚癖氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方

鼈甲六分炙 防葵四分 人參四分 前胡四分

桔梗四分 檳榔子八分 白朮八分 大黃八分

枳實四分炙 厚朴三分炙 當歸四分 附子四分炮

乾薑四分 甘草五分炙 吴茱萸三分

右十五味擣篩蜜和爲丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十丸忌桃李雀肉莧菜猪肉海藻菘菜生冷魚蒜

又白术丸主積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絶方

白术六分 黄耆六分 牡蠣四分熬 人參六分

茯苓六分 烏頭六分炮 乾薑六分 芍藥四分

當歸六分 細辛四分 麥門冬四分去心 桂心五分

前胡四分 甘草六分炙 防葵三分 鼈甲四分炙

紫菀三分炙 檳榔子六分 桔梗三分

右十九味擣篩蜜和爲丸空肚酒下二十丸日再加至三十丸忌莧菜桃李雀肉大醋猪肉生葱海藻菘菜生菜並出第十六卷中

積聚心腹痛方三首

病源積者陰氣五藏所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處此皆由寒氣搏於藏腑與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脉沉而横脅下有積腹中有横積聚痛又寸口脉細沉滑者有積聚在脅下左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢者脅下腹中有横積結痛而泄痢脉微細者生浮者死出第十九卷中

范汪通命丸療心腹積聚寒中㽲痛又心迫滿脅下急繞臍痛方

大黄四分　遠志四分去心　黄耆四分　麻黄四分去節

甘遂四分　鹿茸四分炙　杏人六十枚去皮尖兩人者熬　豉一合熬

巴豆五十枚去心皮熬　芒消三分

右十味擣合下篩和以蜜丸如小豆先食服三丸日再忌蘆

笋野猪肉出第十四卷中（一方無鹿茸黄耆用黄芩）

又療心腹積聚食苦不消脅滿除去五藏邪氣四物丸方

大戟（五分㕮咀熬令色變） 芫花（四分熬） 杏人（二分去皮尖兩人者熬別擣）

巴豆（一百枚去皮心湯中練九沸三易水暴令燥研）

右藥擣合下細篩以雞子中黄亦可以蜜和丸如小豆日三日增一丸覺勿復益欲下頓服七丸下如清漆陳宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲洽水長將者服五丸先食忌野猪肉蘆笋出第十三卷中

古今録驗匈奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲神方出僧深

甘草（三分炙） 大黄（二分） 甘遂（二分） 芫花（二分熬）

大戟（二分炙） 葶藶子（二分熬） 苦參（一分） 消石（一分）

巴豆（半分去心皮熬）

右九味細擣合蜜和丸如小豆服三丸當吐下不吐下稍益至五六丸以知爲度先少起忌海藻蘆笋菘菜野猪肉葅

汪同出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在內則氣行不宣通還搏於腑藏故心腹脹滿則煩悶而短氣也出第十九卷中

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厭繞臍痛按之排手寒中有水上氣女人產後餘疾大人風癲少小風驚癇百病之者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四枚中皆有飯食病即愈方

烏頭七枚炮　乾薑五分　皂莢五分炙去皮子　昌蒲三分

桂心四分　柴胡三分　附子三分炮　人參三分

厚朴三分炙　黃連三分　茯苓三分　蜀椒五分汗

吳茱萸四分 桔梗三分

右十四味擣篩蜜和爲丸服如梧子二丸日三稍加至十五丸忌猪肉冷水醋物生葱羊肉餳出第二十三卷中

積聚宿食寒熱方四首

病源積聚而宿食不消者由腑藏爲寒氣所乘脾胃虛冷故不能消化留爲宿食也診其脉來實心腹積聚飲食不消胃中冷故也出第十九卷中

千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不作肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉方

大黃二兩熬 熟消石一升 葶藶一升熬 前胡二兩

厚朴一兩炙 附子一兩炮 茯苓半兩 半夏一兩洗

杏人一升去尖皮熬 細辛一兩

右十味擣篩蜜和擣五千杵酒服如梧子五丸稍加以知爲度忌猪羊肉餳生菜酢物深師同出第二十卷中

古今録驗氣痞丸療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿胷逼滿風入藏憂恚所積用力不節筋脉傷羸瘦不能食飲此藥令人強嗜食益氣力方

烏頭炮二分 甘草炙二分 葶藶子熬二分 大黃二分

芎藭二分 芍藥二分 甘皮炙二分

右七味下篩蜜和丸如梧子一服三丸日再不知漸至五丸七丸一方桂心二分去甘皮忌海藻菘菜猪肉冷水等一方有通草無甘皮

又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方

烏頭炮三兩 甘草炙三兩 茱萸半兩 細辛二兩

半夏二兩洗三十遍 附子炮二兩 藁本二兩

右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五丸日再不知稍增

之忌羊猪肉冷水生菜海藻菘菜餳

又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目一兩　附子一兩炮　厚朴一兩炙　杏人三兩去皮尖兩人者熬

半夏一兩洗　葶藶三兩熬　芒消五兩　大黄九兩

右八味擣葶藶子杏人使熟和諸藥末和以蜜擣五千杵吞如梧子二丸忌猪羊肉餳冷水出第十卷中

療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚結在内漸染生長塊段盤牢不移動者是癥也言其形狀可徵驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脉弦而伏其癥不轉動者必死出第十九卷中

范汪療癥病丸方

射罔二兩熬　蜀椒三百枚去目汗

右二味擣末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆先服如麻子漸服如赤小豆二丸不知稍增之以知爲度出第十三卷中

集驗療心腹宿癥及卒得癥方

取雄雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤朱溲飯極令朱多以飼雞安雞著板上取糞曝燥末溫清酒服五分匕可至方寸匕日三若病困急者晝夜可五六服一雞少更飼餘雞取足出第六卷中

備急熨癥方

吴茱萸三升碎之

右一味以酒和煑熱布裹以熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨都消乃止也肘後方云亦可用射罔五兩茱萸末以雞子白和塗癥上出第三卷中

暴癥方六首

病源暴癥者由藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癥也本田藏弱其癥暴生至於成病斃人則速出第十九卷中

肘後療卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療之百日死方

取牛膝根二斤㕮咀暴令極乾

右一味酒一斗浸之密器中封口舉著熱灰中温之令味出先食服五六合至一升以意量多少又用蒴藋根亦準此大良千金集驗經心録張文仲同

又凡癥堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷冰玉壺八毒諸大藥令上取小小易得者方

取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之擣作末以秫米五斗炊飯內攪之好酒五斗漬封藥消飯浮可飲一升半勿食他鮭鹽癥當出亦可但取其根一升乾擣千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒療癥乃勝諸大藥張文仲同

又方

大黃半斤 朴消三兩 蜜一斤

右三味合於湯上煎可丸如梧子服十丸日三備急文仲崔氏同惟崔氏用朴消半斤蜜一升半服二十丸日再服餘依肘後並出第一卷中

千金翼療卒暴癥方

蒜十片去皮五月五日戶上者 桂心一尺二寸 伏龍肝鴨卵大一枚

右三味合擣以淳苦酒和之如泥塗著布上掩病處三日消肘

後千金同凡蒜或無桂心亦得用也忌生葱

又方

商陸根擣蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易取差止數日之中晨夕勿息千金集驗肘後同並出第十九卷中

古今錄驗療暴得癥方

取蒴藋根一小束淨洗瀝去水細切以醇酒浸之取淹根三宿服五合至一升日三若欲速得可於熱灰中温令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之出第十卷中

鼈癥方四首

病源鼈癥者謂腹內癥結如鼈之形狀也有食鼈觸冷不消而生癥者也有食雜物得冷不消變化而作者此皆脾胃氣弱而

遇冷不能剋消故也癖者其病結成推之不動移是也出第十九卷中

廣濟療鼈癖服白馬尿方

白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方

白馬尿一升 雞子三枚破取白

右二味於鐺中煎取三合空腹服之不移時當吐出病無所忌

千金同

又療鼈癖蟹爪丸方

蟹爪三分 附子六分炮 麝香三分研 半夏六分湯洗十遍

生薑四分屑 鼈甲六分炙 防葵六分 郁李人八分

右八味擣篩蜜和爲丸如梧子空肚以酒下二十丸日再服以知爲度忌生冷油膩熱麪蕎麥陳臭粘膩羊肉餳猪肉莧菜並出第二卷中

集驗療鼈瘕伏在心下手揣見頭足時時轉者并心腹宿瘕及卒得瘕方

白雌雞一雙絶食一宿明旦以膏熬飯飼之取其屎無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥擣篩服方寸匕日四五服消盡乃止常飼雞取屎差畢殺雞單食之肘後同出第六卷中

米瘕方二首

病源人有好啞米啞謹按說文於革切笑也集韻無此字俱有飢乙革切飢也今詳啞者飢而喜食之義也下同轉久彌嗜啞之若不得米則胷中清水出得米便止米不消化遂生瘕結其人常思米而不能飲食久則斃人出第十九卷中

廣濟療米瘕其疾常欲食米若不得米則胷中清水出方

雞屎一升　白米五合

右二味合炒取米焦擣篩爲散用水一升頓服取盡少時即

吐吐出癥如研米汁碎若無癥即吐白沫淡水乃憎米不復食之無所忌禁千金同

又療米癥久不療羸瘦以至死方

葱白（兩虎口切） 烏梅（三十枚碎）

右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨啜葱白隨飲烏梅汁令盡須臾之心腹煩欲吐即令出之三晨療之當吐去米癥差無所忌並出第三卷中

食癥及食魚肉成癥方二首

病源有人卒大能食乖其常分因飢值生葱便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食癥待由不幸致此妬異成癥非飲食生冷過度之病也出第十九卷中

廣濟療食癥病及食葱差方

有一人食飯七升并羊脂餅番不論數因於道中過飢

急食生葱須臾吐出一物薄而圓繞畔有口無數即以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食癥無忌出第二卷中

千金療食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方

狗糞五升

右一味燒灰末之綿裹以酒一斗漬再宿濾取清分十服日三服日令盡隨所食癥結即便出矣出第十一卷中

髮癥方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成癥胷喉間如有蟲下上來去者是也出第十九卷中

廣濟療髮癥乃由人因食而入久即胷間如有蟲上下去來唯欲得飲油方

油一升

右一味以香澤煎之大鐺鐺貯之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傅之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與之必疲極眠睡其髮瘕當從口出飲油人專守視之并石灰一裹見瘕出以灰粉手捉瘕抽出須臾抽盡即是髮也初從腹出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌千金同

又療胷喉間覺有瘕蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故也方

油煎葱豉令香二日不食張口而臥將油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌出第二卷中

蝨瘕方一首

病源人有多蝨性好齧之所齧既多而腑臟虛弱不能消之不幸變化生瘕而患之者亦少俗云患蝨瘕人見蝨必齧之不能禁止蝨生長在腹內時有從下部出亦斃人出第十九卷中

千金療蝨瘕由齧蝨在腹生長爲蝨瘕方

故箆子枚一　故梳子枚一

右二味各破爲兩分各取一分燒作灰末之又取一分以水五升煑取一升用頓服前末盡少時當病出無所忌出第二卷中

廣濟同

鼈瘕方一首

病源鼈瘕者謂腹内瘕結如鼈狀是也有食鼈觸冷不消而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾胃氣弱而遇冷即不能剋消所致瘕言假也謂其形假而推移也昔曽有人共奴俱患鼈瘕奴在前死遂破其腹得一白鼈仍故活有人乘白馬來看此鼈白馬忽尿墮落鼈上即縮頭及脚尋以馬尿灌之即化爲水其主曰吾將愈矣即服之果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成鼈瘕出第十九卷中

崔氏療鼈瘕方

大黄六銖 乾薑半兩 附子九銖炮 人參九銖
䗪蟲大一寸者七枚熬 側子半兩炮 桂心六銖 貝母半兩
白朮一兩 細辛十八銖
右十味擣下篩以酒服半方寸匕日三忌生菜生葱桃李雀肉猪肉冷水出第九卷中

蛇瘕方一首

病源人有食蛇不消因腹內生蛇瘕也亦有蛇之津液誤入飲食內亦令人病瘕其狀常苦飢而食則不下喉噎塞食至胷內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也出第十九卷中

崔氏療蛇瘕大黄湯方

大黄半兩 芒消如雞子一枚 烏魚骨三枚 黄芩半兩
皂莢六枚如猪牙者炙去皮子 甘草如大指一尺炙
右六味㕮咀以水六升煑之三沸下絞去滓內芒消適寒溫

盡服之十日一劑煑作如上法欲服之宿無食平旦服當下
病也千金同忌海藻菘菜出第九卷中
蛟龍病方一首
病源蛟龍病者云三月八月蛟龍子生芹菜上人食芹菜不幸隨
入人腹變成蛟龍其病之狀發則如癲出第十九卷中
廣濟療蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜爲蛟龍子
生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之其病發似癲面色青
黄少腹脹狀如懷姙宜食寒食餳方
寒食強餳三升日三服之吐出蛟龍有兩頭及尾開
皇六年又賈橋有人喫餳吐出蛟龍大驗無所忌千
金方同出第二卷中
胷痺方二首
病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胷間則胷痺胷痺之

候胷中愊愊如滿噎塞不利習習如痒喉裏澀唾燥甚者心裏強痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胷前皮皆痛手不能犯胷滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹背膂其脉浮而微者是也不治數日殺人其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方云以右足踐地左足上除胷痺食熱嘔出第三十卷中

仲景傷寒論療胷痺理中湯方

人參三兩 甘草三兩炙 白朮三兩 乾薑三兩

右四味切以水八升煑取三升去滓溫服一升日三夜一頻服三劑忌海藻菘菜桃李雀肉等千金同出第十六卷中張仲景云胷痺心中痞堅留氣結於胷胷滿脅下逆氣搶心理中湯亦主之

深師療胷痺麝香散方

麝香四分 牛黃二分 生犀角一分屑末

右三味研服五分匕日三忌生冷物魚蒜出第十六卷中

胷痺短氣方三首

千金論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胷痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以胷痺心痛者以其脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胷痺之病喘息欬唾胷背痛短氣其脉沉而遲關上小緊數者栝樓湯主之方

栝樓一枚 薤白一斤 半夏半升洗 生薑四兩 枳實二兩炙

右五味切以白截漿一斗煑取四升服一升日三肘後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同小品云用水一斗忌羊肉餳

又胷中氣塞短氣茯苓湯主之方

茯苓三兩 甘草一兩炙 杏人五十枚去兩人尖皮

右三味㕮咀以水一斗煑取五升溫服一升日三服不差更合仲景傷寒論同忌大醋海藻菘菜並出第十三卷中

深師療胷痺逹背痛短氣細辛散方

細辛　乾地黃　甘草各二兩炙　桂心

茯苓各五兩　枳實炙　白朮　生薑

栝樓實各三兩

右九味擣篩酒服方寸匕日三忌海藻菘菜大醋蕪荑生葱桃李雀肉等古今録驗千金同出第十三卷中

胷痺心下堅痞緩急方四首

千金論胷痺之病令人心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胷前皮皆痛手不得犯胷中愊愊如滿咽塞習習痒喉中乾燥時欲嘔吐胷滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹引背膂痛不即療之數日殺人出第十三卷中

范汪療胷痺心中痞堅留氣結於胷中胷滿脅下逆氣搶心枳實湯方

陳枳實四枚炙 厚朴四兩炙 薤白八兩 桂心一兩

栝樓實一枚

右五味先以水五升煑枳實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分温三服除心氣良忌生葱古今録驗千金同此本仲景傷寒論方

古今録驗療胷中隱然而痛脊膂肩痛方

桂心一分 乾薑一分 人參三分 細辛三分

烏頭一分炮 山茱萸三分 貝母三分

右七味擣下篩和以蜜丸如小豆大酒若粥汁吞二丸稍稍益以胷中痛心温温爲度忌生葱生菜猪肉冷水

又療胷痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人（五百枚） 附子（十枚大者炮） 甘草（三兩炙）

右三味擣下篩服方寸匕日三忌海藻菘菜猪肉冷水

又療胷痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人（一千五百枚） 附子（大者十枚炮）

右二味擣下篩服方寸匕日三不知稍增之忌猪肉冰水並出第八卷中此方出僧深范汪同（仲景方用薏苡人十五兩）

胷痺噎塞方二首

仲景傷寒論胷痺之病胷中愊愊如滿噎塞習習如癢喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方

橘皮（半斤） 枳實（四枚炙） 生薑（半斤）

右三味切以水五升煮取二升分再服肘後小品文仲深師范汪古今錄驗經心錄千金同出第十五卷中

千金通氣湯療胷滿短氣噎塞方

半夏洗八兩　生薑六兩　桂心三兩　吴茱萸四十枚

右四味切以水八升煮取三升去滓分温三服忌羊肉餳生葱出第十三卷中一方無桂心用橘皮

肾痺欬唾短氣方四首

仲景傷寒論肾痺之病喘息欬唾肾背痛短氣寸脉沉而遲關脉小緊數者栝樓薤白白酒湯主之方

栝樓實一枚　薤白半斤切

右二味以白截酒七升煮取二升去滓温分再服深師范汪同出第十五卷中

肘後論肾痺之病令人心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其肾前及背皆痛手不得犯肾滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹引背膂不即療數日殺人療卒患肾痺方

雄黄　巴豆去皮心熬

右二味先擣雄黄細篩內巴豆務熟擣之相和丸如小豆服

一丸不覺稍益忌野猪肉蘆笋

又方

枳實炙

右一味擣篩以米汁先食服方寸匕日三夜一

又或已差復更發方

取薤根五斤

右一味擣絞取汁飲之立愈並出第一卷中

胷痺心痛方四首

仲景傷寒論胷痺不得卧心痛徹背者栝樓薤白半夏白胾漿

湯主之方

大栝樓一枚　薤白三兩切　半夏半升洗

右三味以白胾漿一斗煑取四升去滓温服一升日三忌羊肉

錫古今錄驗同出第十五卷中范汪同

千金療胷痺心痛方

灸膻中百壯穴在鳩尾上一寸一云膺胷腧中行直兩乳內間是忌鍼

又療胷脅滿心痛方

灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容傍一寸半是並出第十三卷中

古今錄驗小草丸療胷痺心痛逆氣膈中飲不下方

小草三分 桂心三分 蜀椒三分汗 乾薑三分

細辛三分 附子二分炮二分

右六味擣合下篩和以蜜丸如梧子大先食米汁服三丸日三不知稍增以知爲度忌猪肉冷水生葱生菜出第八卷中范汪同

胷痛方二首

范汪療胷痛枳實散方

枳實八分炙　桂心五分

右二味擣下篩酒服方寸匕日三忌生葱深師同

深師療胷痛枳實散方

枳實四枚炙　神麴一兩熬　白朮一兩

右三味擣篩酒服方寸匕日三忌桃李雀肉等出第十六卷中

賁㹠氣方四首

病源夫賁㹠者腎之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷動氣積於腎而氣下上遊走如㹠之賁故曰賁㹠其氣乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒嘔氣滿胷中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔㹠之狀也若氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此

憂思賁㹠之狀也診其脉來祝祝（一云觸祝）者病賁㹠也腎脉微急沉厥賁㹠也其足不收不得前後出第十三卷中

小品黃帝問金洽子曰驚為病如奔㹠其病奈何金洽子對曰驚為奔㹠心中踊踊如車蓋驚人所常恐五藏不定食飲輙嘔氣滿胷中狂癡欲走閉眼譫言開眼妄語或張面目不相取與衆師不知呼有所負賁㹠湯主之黃帝曰善（所負者如禍祟罪負鬼神信之）黃帝問金洽子曰憂思賁㹠何以別之金洽子對曰憂思賁㹠者氣滿支心心下煩亂不欲聞人入聲發作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔衆師不知呼有觸忤奔㹠湯主之黃帝曰善

師曰病如奔㹠者氣從少腹起上衝喉咽發作欲死復還生皆從驚恐得之腎間有膿故也范汪同

師曰病有奔㹠有吐膿有驚怖有火邪此四部病者皆從驚發

得之火邪者桂枝加龍骨牡蠣湯主之若新亡財爲縣官所捕迫從驚恐者療用鵄頭鉛韇千金習有飛鵄鉛丹九主癲癇瘈瘲此意相近鉛韇一云角爲馬排末即羚羊角解復餘物未定未定者上作方未成所言奔㹠者病人氣息逆喘迫上如㹠奔走之狀奔㹠湯之主

又療卒傷損食下則覺胷中偏痛慄慄然水漿下亦爾悶病與相應急作此方

生李根一斤細剉之　麥門冬一升去心　人參二兩

桂心二兩　甘草二兩炙

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜生葱

范汪同

又奔㹠湯療虛勞五藏氣之損遊氣歸上上走時若群㹠相逐憧憧時氣來便自如坐驚夢精光竭不澤陰痿上引少腹急痛面乍熱上色喜怒無常耳聾目視無精光方

葛根八兩乾者 生李根切一升 人參三兩 半夏一升洗

芍藥三兩 當歸二兩 桂心五兩 生薑二斤

甘草二兩炙

右九味切以水二斗煮得五升溫服八合日三不知稍增至一升日三忌羊肉餳生葱海藻菘菜等出第十一卷中

肘後療卒厥逆上氣氣又兩脅心下痛滿淹淹欲絶此謂奔豚病從卒驚怖憂迫得之氣從下上上衝心胸臍間築築發動有時不療殺人方

甘草二兩炙 人參二兩 吳茱萸一升 生薑一斤

半夏一升洗 桂心三兩

右六味切以水一斗煮取三升分三服此藥須預畜得病便急合服之張文仲同忌海藻菘菜生葱羊肉餳出第一卷中千金方桂五兩甘草三兩

賁㹠氣衝心胷方四首

廣濟賁㹠氣在心吸吸短氣不欲聞人語聲心下煩亂不安發作有時四肢煩疼手足逆冷方

李根白皮八兩　半夏七兩洗　乾薑四兩　茯苓三兩

人參二兩　甘草二兩炙　附子一兩炮　桂心四兩

右八味切以水一斗煑取三升絞去滓分三服別相去如人行六七里忌生冷羊肉餳海藻菘菜油膩醋物生葱粘食

范汪同

又療賁豚氣在胷心迫滿支脅方

生薑一斤　半夏四兩湯洗　桂心三兩　人參二兩

甘草二兩炙　吳茱萸一兩

右六味切以水一斗煑取三升絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里不利忌生葱熱麪羊肉餳粘食海藻菘菜並

出第四卷中范汪同

集驗賁豘茯苓湯療虛氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣賁走衝胸膈發作氣欲絕不識人氣力羸瘦少腹起騰踊如豘子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方

茯苓四兩　生葛八兩　甘草二兩炙　李根白皮切一升

生薑五兩　半夏一升湯洗　人參三兩　當歸二兩

芎藭二兩

右九味切以水一斗二升煮取五升服一升日三夜二服忌羊肉餳海藻菘菜酢物等

又療賁豘氣上衝胸腹痛往來寒熱賁豘湯方

甘草二兩炙　芎藭二兩　當歸二兩　半夏四兩湯洗

黃芩二兩　生葛五兩　芍藥三兩　生薑四兩

甘李根白皮切一升

右九味切以水二斗煮取五升去滓溫服一升日三夜二服忌海藻菘菜羊肉餳等並出第四卷中

雜療奔㹠氣及結氣方六首

深師療憂勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不能還下心中悸動不安七氣湯方

桔梗二兩 人參三兩一方二兩 芍藥三兩 茱萸七合
黃芩二兩一方三兩 乾地黃三兩一方二兩 枳實五枚炙 桂心二兩一方三兩
乾薑三兩一方二兩 甘草三兩一方二兩炙 橘皮三兩 半夏三兩洗一方一升

右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱豬肉蕪荑等 千金無桂心橘皮桔梗有厚朴栝樓蜀椒

集驗療賁㹠氣從下上者湯方

生葛五兩 甘李根白皮五兩切 半夏五兩洗
黃芩二兩 桂心二兩 芍藥三兩 人參二兩

生薑五兩

右八味切以水一斗二升煑取五升去滓溫分爲五服日三夜二服忌羊肉餳生葱出第四卷中

小品牡蠣賁豘湯療賁豚氣從少腹起憧胸手足逆冷方

牡蠣三兩熬 桂心八兩 李根白皮一斤切 甘草三兩炙

右四味切以水一斗七升煑取李根皮得七升去滓內餘藥再煑取三升分服五合日三夜再忌生葱海藻菘菜范汪同

又療手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱冒者奔豘湯方

甘草四兩炙 李根白皮一斤切 葛根一斤 黃芩三兩

桂心二兩 栝樓二兩 人參二兩 芎藭一兩

右八味切以水一斗五升煑取五升去滓溫服一升日三夜再忌海藻菘菜生葱范汪同

又方桐君說

伏出雞卵殼中白皮 梨木灰 麻黃去節

紫菀各等分

右四味擣下篩作丸散隨宜酒服十丸如梧子散者方寸匕療三十年咳中結氣欬逆立差也亦可水煑爲湯以意分之並出第一卷中經心錄同

千金奔氣湯主大氣上奔胷膈中諸病每發時迫滿短氣不得卧劇者便悄欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

桂心五兩 生薑一斤 人參三兩 半夏一升洗

吴茱萸一升 甘草三兩炙

右六味切以水一斗煑取三升去滓分爲四服忌羊肉餳生葱海藻菘菜出第十七卷中

灸奔㹠法六首

千金療奔㹠腹腫法

灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯

又主奔㹠衝心不得息法

灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯

又主奔㹠上下腹中與腰相引痛者法

灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間動脉是百壯一云百五十壯

又主奔㹠上下者法

灸四滿夾丹田傍相去三寸七壯

又主奔㹠法

灸氣海在臍下一寸半百壯

又法

灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯並出第十七卷中

外臺秘要方卷第十二　右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

外臺祕要方

十三

骨蒸 傳屍

鬼疰 鬼魅

外臺秘要方卷第十三 骨蒸傳屍鬼疰鬼魅二十六門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

除骨熱方四首

盜汗方七首

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一曰骨蒸其根在腎旦起體涼日晚即熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變爲疳食人五藏二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫卧即浪言或驚恐不定脉數蒸盛之時或變爲疳臍下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胷滿或自稱得疰熱兩脅下脹大欬徹背連胛疼眠寐不安或蒸毒傷藏口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便秘澁蒸盛之時或體腫目赤寢卧不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必

外寒而內熱把手附骨而熱甚其根在五藏六腑其人必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脉蒸脉不調或急或緩九肝蒸眼黑十心蒸舌乾十一脾蒸脣焦十二肺蒸鼻乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下脣焦十八大腸蒸鼻右孔乾痛十九三膲蒸亦雜病乍熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成疳必須先防下部不得輕妄療之出第四卷中

崔氏療五蒸夫蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸庸醫

及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神祟以相疑惑蒸盛總變爲疳而致死者不可勝記其蒸有五請略陳之一曰骨蒸早起體涼日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力或時腰痛兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內乃變成疳食人五藏若大便澁方

可服芒消一服一方寸匕日再服亦可擣苦參蜜和爲丸如梧子大一服七丸日再以飲送之無忌以體輕涼爲度

二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫卧便浪語或驚恐不安其脉又數此蒸若盛亦變爲疳傍臍時悶或痢不止方

苦參　青葙各二兩　艾葉　甘草各一兩炙

右四味切以水四升煑取一升半分爲三分用羊胞盛之以

葦灌下部中若不瘥取芒消一方寸匕和冷水合和服之日再服忌海藻菘菜

三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時背中滿悶或自稱得注手掩兩脅不得大欬徹背連胛疼眠寐不安此蒸毒傷五藏口便唾血方

急與芒消一兩以水一升半和分爲三服三日服止訖以冷水浸手以熨脅間及腋下并背上及痛處亦可舉髀指灸側腋下第三肋間腋下空中七壯立止

四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無味食訖便嘔小便如血大便秘澁蒸盛之時或體腫目赤不得安寐方

大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞取汁一服五合許微利即止若熱不定亦可服芒消一方

寸匕日三以體涼爲度

五日內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起方

石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以體涼爲度出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方

甘草一兩炙　茯苓三兩　人參二兩　竹葉二把

葛根　乾地黃各三兩　知母　黃芩各二兩

石膏五兩碎　粳米一合

右十味切以水九升煮取二升半分爲三服亦可以水三升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑大醋范汪同一方無甘草茯苓人參竹葉止六味

又五蒸丸方

烏梅　雞骨　紫菀　芍藥

大黃　黃芩　細辛各五分　知母四分

礬石鍊　栝樓各一分　桂心二分

右十一味末之蜜和丸如梧子飲服十丸日二忌生葱生菜

並出第五卷中一方無桂心

骨蒸方一十七首

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱顏色微赤不能下食日漸羸瘦方

生地黃三兩細切　葱白細切　香豉　甘草炙各二兩

童子小便二升

右五味切以地黃等於小便中浸一宿平晨煎兩沸絞去滓澄取一升二合分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差

止不利忌海藻菘菜蕪荑熱麪猪肉油膩黏食等出第四

卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方

取枯朽骨碎（五大升一切骨皆堪用唯洗刷刮不得遣微有土氣但似有土氣即不差病）

柳枝（三大斗剉） 枯棘針（三大斗） 柳枝（三大斗剉）

右四味以清水五大石煑之減半乃接出汁別取清漿兩大石投釜中和骨重煑三兩沸然後摠濾出淨拭釜取此前後湯相和更報煖隨次取用使患者解髮令散以此湯澆頂淋之其湯令熱但不破肉為準一舉淋湯遣盡若覺心悶即喫三兩口冷飯如不能坐即臥淋淋湯之時自當大汗汗出少處仍偏淋之務取汗勻以祛惡氣淋訖可食一大椀熱葱豉粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身運手足使周遍患重者不過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳出第七卷中

文仲療骨蒸方

生地黃一大升擣絞取汁三度擣絞然始汁盡分再服若痢即減之以身輕涼爲度忌蕪荑

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晩便劇不能飲食若服生地黃汁即更服此方

龍膽　黃連　栝樓　苦參

青葙　芍藥各一兩　梔子人十枚　芒消

大黃各二分　黃芩三分

右十味擣篩爲散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須愼生食若不禁生食不須服之忌猪肉冷水千金經心錄並作丸服之藥味同

又療骨蒸脣乾口燥欲得飲水止渴竹葉飲方

竹葉一握　麥門冬一升去心　大棗二十顆擘　甘草三兩炙

半夏一升湯洗令滑盡　粳米五合　生薑三兩

右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉餳海藻菘菜

又方

麥門冬一升去心　小麥二升　枸杞根切三升

右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方

大烏梅二十枚　石膏六兩碎綿裹

右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方

患殗殜上於劫切下余攝切下同等病必瘦脊骨自出以壯丈夫屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下盡骨極楷復向上來去十二三迴然以中指於兩畔處極彈之若是

此病應彈處起作頭多可三十餘頭即以墨點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留節無節頭削令薄似劍煑此筒子數沸及熱出筒籠墨點處按之良久以刀彈破所角處又煑筒子重角之當出黃白赤水次有膿出亦有蟲出者數數如此角之令惡物出盡乃即除當目明身輕也

又療骨蒸消渴消中熱中渴痢心熱心忪風虛熱傳屍等方

苦參一大斤　黃連去毛　知母　栝樓

麥門冬去心　牡蠣各五大兩熬

右六味擣篩以生牛乳和併手捻爲丸如梧子大暴乾一服二十丸稍稍加至三十丸日再服飽食訖以漿水下如食熱麪酒加至五十丸忌猪肉冷水救急同

又療骨蒸蒼梧道士方

紫菀　桔梗　續斷　青竹茹

五味子各三兩碎　桑根白皮五兩　甘草二兩炙　乾地黄五兩熱多者用

赤小豆一升

右九味切以水九升煑取三升五合分溫三服服五六劑十年者亦差每隔五日一劑初發即服大驗勿輕之可頻服立驗蘇遊玄感論云主肺氣欬者相當餘同忌海藻菘菜猪肉蕪荑

又療骨蒸欬出膿病重者方

皂莢一兩炙去皮綿裹　白餳一兩　乾棗七枚擘　生薑二分切

右四味以酒一大升煑取半升去滓先食飯然後服二合如人行三四里不吐更服二合又如人行二三里不吐揔服盡方便令吐即膿出並出第一卷中

救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺壅之後或爲瘴瘧之

後宿患痃癖婦人因産後虚勞漏汗寒熱或爲月閉不通無問男夫婦人因天行已後餘熱不除或爲頻頻勞復小兒閃癖其病並緣此十候所致因茲漸漸瘦損初著盜汗盜汗以後即寒熱往來寒熱往來以後即漸加欬欬後面色白兩頰見赤如燕脂色團團如錢許大左卧即右出脣口非常鮮赤若至鮮赤即極重十則七死三活若此以後加吐吐後痢百無一生不過一月死服此丸仍得不著後人此病人急多兒是鬼病治之方

青葙苗（六月六日採）　知母　黄連（去毛）　大黄

梔子人　栝樓　常山　萎蕤（各八分）

苦參皮（十二分）　甘草（炙）　蜀漆（各五分洗）

右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服五丸漸加至十五丸日再以知爲度因至利忌猪肉熱麪葱蒜生菜海藻菘菜

又療骨蒸方

毛桃人一百二十枚去皮及雙人留尖

右一味擣令可丸平旦以井華水頓服使盡服訖量性飲酒使醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方非其人莫浪傳

取乾人糞燒令外黒内水中澄清每旦服一小升薄晩後服小便一小升以差爲限旣常服不可朝朝新作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便勿用自身者小兒者佳

又方

用雄黃一大兩和小便一大升研令爲粉乃取黃理石一枚方圓可一尺左側以炭火燒之三食頃極熱灌雄黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片薄氈置石上令患人脫衣坐上石冷停以衣被圍遶身勿令

藥氣洩出莫辭衣物臭也凡經三五度如此必差

又療骨蒸傳屍方

皂莢（長一尺者無相續取炙令微焦云黑皮碎之綿裹）　黑餳（大如雞子）

羊肉（大如拳煑如常法）

右三味取一升無灰清酒貯銅鐺內即著綿裹煎三五沸即漉去綿裹即內黑餳使融液盡煎取三合令病者先啜肉汁即服一合如變吐因不須起次以銅盆貯水令病人坐上有蟲𧐐如馬尾赤色頭黑即効如無以服三合盡爲度一服相去如人行十里必是得驗其禁食一如藥法並出第二卷中

必効主骨蒸病小便方

取三歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和爲兩服中間如人行二十里服此以後每自小便即取服之仍去前後取中央者病輕者二十日病重者五

十日二十日以後當有蟲蚰蜒兒其蟲在身當處出俱令去人五步十步聞病人小便臭者無不差台州丹仙觀張道士自服非常神驗出第二卷中

灸骨蒸法圖四首 崔氏別錄灸骨蒸方圖并序中書侍郎崔知悌撰

夫含靈受氣禀之於五常攝生乖理降之以六疾至若歧黄廣記抑有舊經攻救單行罕取今術骨蒸病者亦名傳屍亦謂殗殜亦稱復連亦曰無辜丈夫以癖氣為根婦人以血氣為本無問少長多染此疾嬰孺之流傳注更苦其為狀也髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或腦後近下兩邊有小結多者乃至五六或夜臥盜汗夢與鬼交通雖目視分明而四肢無力或上氣食少漸就沈羸縱延時日終於溘盡余昔忝洛州司馬當三十日灸活一十三人前後差者數過二百至如狸骨獺肝徒聞曩說金牙銅鼻罕見其能未若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又别

療氣療風或瘴或勞或邪或癖患狀既廣救愈亦多不可具錄略陳梗槩又恐傳授謬訛以誤將來今故具圖形狀庶令覽者易悉使所在流布頗用家藏未暇外請名醫傍求上藥還魂反魄何難之有遇斯疾者可不務乎

灸骨蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法

使患人平身正立取一細繩令於脚下緊踏(男左女右)其繩前頭使與大拇指端齊後頭令當脚根後即引向上至曲脷中大橫文便截繩使斷又使患人解髮分兩邊使見分頭路仍平身正坐乃取向所截繩一頭與鼻端齊引向上絡頭通過逐脊骨引繩向下盡繩頭即點著又別取小繩一頭與脣端齊合口處一頭向上至鼻底便截斷將此短小繩於前所點處中摺橫分兩邊兩頭各點記使與中央初點處正橫相當此小繩兩頭是灸處當脊初點者非灸處只借為度其點拭却

又法

使患人平身正坐稍縮髆取一繩繞其項向前雙垂共鳩尾齊即截斷鳩尾是心歧骨人有無心歧骨者可從胷前兩歧骨下量取一寸即當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈處恰當喉骨其繩兩頭還雙垂當脊骨向下盡繩頭點著又別取一小繩令患人合口橫度兩吻便割斷還於脊上所點處橫分點如前其小繩兩頭是灸處長繩頭非灸處拭却以前揔通灸四處日別各灸七壯以上二七以下其四處並須滿二十壯未覺効可至百壯乃停候瘡欲差又取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處逐脊骨上下中分點兩頭如橫點法謂之四花此後點兩頭亦各灸百壯此灸法欲得取离日量度度訖即下火唯須三月三日艾爲佳療差百日以來不用雜食灸後一月許日患者若未好差便須報灸一如前法當即永差出第七卷中

張文仲說荊州人王元禮嘗家患骨蒸傳尸死盡有一道士忽教灸即斷兼更教人無有不差者欲識此病其病先乍寒乍熱有時脣赤或頰赤弁有時痢血多唾有時欲得食有時不欲食兩脊脉常急患兒多欬盜汗以指按捻脊膂四邊肉有時心胷氣滿急黃瘦脊膂中肉盡遂即著床如著床胷前自動脊膂兩邊肉盡灸療即難如灸候胷前肉動非事灸法如看病兒是病更不須選离日即預將艾去即將病兒於王道頭日午時灸灸七壯若先知其病又緩即取离日午時大吉欲灸覆病兒面向下著地取撅肋頭以病兒大拇指自捻著展中指直向脊骨指頭脊膂中肉少肋上點記從點記處向上至耳下尖頭即中央屈繩從初點處向上還當脊膂點繩所到記之又更再屈繩從元點記處向上還進前點記又以杖量取患兒中指頭兩節折斷還從元點記向下當夾脊膂點記一邊點四處兩邊俱點揔八

舊說今據程本補

處各須去脊骨遠近一種並須上下相當下從擻肋上至耳根取直其八處一時下火艾炷如棗核大堅實作灸了即以灰三匝圍坐處便歸家不須迴顧禁肉麪生冷特忌色及雜食平復後任依常未平復有犯重發即不可復療

神素師灸骨蒸欬法

當頭耳孔横量相離三寸許相當灸有穴日灸三壯至第八日灸二七了第三椎上第二椎下男取左手女取右手頭指依兩指頭東西灸日一七壯至第八日各灸五十壯復五日日各灸十五壯脛取繫鞋横文量至膝膕（啞切）下中分當脛骨外日灸一七壯滿第八日日灸滿三十五日了當髀上皆男左女右取頭指從腕文當指當頭灸日七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月節不通取右手頭指當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯鬲上午後灸鬲下午前灸並

痃氣骨蒸方三首

廣濟療痃氣心忪骨蒸熱闇風鼈甲丸方

鼈甲炙 芍藥 蝮蛇脯炙 大黃各八分

人參 訶梨勒皮熬 枳實炙 防風各六分

右八味擣篩爲末蜜和丸如梧子以酒飲下二十丸漸漸加至三十丸日再服不利忌莧菜生菜熱麪蕎麥蒜粘食出第二卷中

備急療痃癖鬼氣疰忤骨蒸祕驗方

大黃別漬湯飲成下方四兩 鼈甲炙 弔藤

升麻 甘草炙各二兩 丁香二七枚湯欲成下

右六味切以水七升煑取二升八合去滓分作三服又用牛黃犀角生末朱砂麝香各一分細研分爲三分每服以一分內湯中服經用多効特忌猪肉粘食生冷莧菜海藻菘菜蘇遊

同出第三卷中一方有黄芩二兩

必効療痃癖氣壯熱兼欬久爲骨蒸驗方

柴胡四兩　茯苓　白朮　枳實炙各三兩

右四味切以水七升煮取二升半分爲三服積熱不歇即加芒消六分取利熱除之後每三日服一劑差後每月一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大醋出第二卷中

虚損慘額作骨蒸方四首

張文仲療虚損慘額不食四體勞強時翕翕熱無氣力作骨蒸候方

童子小便一大升去前後者　豉一合　葱白一合切　杏人四十枚去尖皮碎

右四味合煎取三分中分之二服使盡日別一劑服之至十劑愈若服經三四劑覺四體益熱即服後方

又方

小便一大升淡者去前後 葱白一合切 豉一抄 生薑一大兩切

生地黃一握碎

右五味合煎六七沸絞取汁半升許分爲兩服或三服每服空腹服至二七日必差差後停三四日將息更服二七日神驗每服五六劑覺內少冷即服前方二方以意斟酌間服常夜合浸項久便即煎服至五更半令服了至欲明更服後丸服訖至日出時不妨食至晚間未食更一服忌蕪荑

又方

人頭骨三大兩炙 麝香一十兩

右二味擣篩和蜜擣一千杵丸如梧子一服七丸日再服以粥飲送藥若胸前有青脉出者以針刺看血色未變黑者服藥七日必差每日午時能更服後丸一服亦好藥既無毒於事不妨

蘇遊療骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方

蘆根切訖秤　麥門冬去心　地骨白皮各十兩　生薑十兩合皮切

橘皮　茯苓各五兩

右六味切以水二斗煮取八升絞去滓分温五服服別相去八九里晝三服夜二服覆取汗忌酢物未好差更作若兼服其人或背中寒或直惡寒及虛脹并痛者加吳茱萸八兩

瘦病方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口吞之輙琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人强

壯出第三卷中

廣濟療瘦病每日西即弄色脚手酸疼口乾壯熱獺肝丸方

獺肝六分炙　天靈蓋四分燒　生犀角四分屑　前胡四分

升麻四分　松脂五分　枳實四分炙　甘草五分炙

右八味擣篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸豉汁下二十丸日再不利忌海藻菘菜生葱熱麪炙肉魚蒜粘食陳臭等物

又療瘦病方

天靈蓋大一兩炙　麝香半臍　桃人一大抄去皮　朱砂一兩半光明者

好豉一大升熬之

右五味各別擣篩訖然後揔和令調每晨空腹以小便半升和散方寸一匕服差止不利忌生血物

又療腹脹瘦病不下食方

柴胡　茯苓各十二分　枳實炙　白朮
人參　麥門冬去心　生薑合皮切各六分
右七味切以水六升煮取一升八合絞去滓分温三服服别相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食桃李醋物雀肉等
又知母丸主瘦病及久瘧黃等方
知母　常山各三兩　甘草炙　大黃
麻黃去節　黃芩　杏人各二兩去尖皮熬　蜀漆洗
牡蠣各一兩熬
右九味擣篩蜜和丸如梧子空心服飲下七丸忌猪肉及葱酒麪服後心悶即吐是此病出候不唾更漸加兩丸此方云是張文仲去英公處傳曰與諸人服神驗非一忌海藻菘菜生葱生菜等

救急療瘦疾方

甘草三兩炙

右每旦以小便煑甘草三數沸頓服甚良忌海藻菘菜並出第二卷中

傳屍方四首

蘇遊論曰大都男女傳屍之候心胷滿悶背髆煩疼兩目精明四肢無力雖知欲卧睡常不著脊膂急痛膝脛酸疼多卧少起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日午以後即四體微熱面好顏色憘見人過常懷忿怒纔不稱意即欲嗔恚行立脚弱夜卧盜汗夢與鬼交通或見先亡或多驚悸有時氣急有時欬嗽雖思想飲食而不能多飡死在須臾而精神尚好或兩肋虛脹或時微痢鼻乾口燥常多粘唾有時脣赤有時欲睡漸就沈羸猶如水涸不覺其死矣

又論曰傳屍之疾本起於無端莫問老少男女皆有斯疾大都此病相剋而生先内傳毒氣周遍五藏漸就羸瘦以至於死死訖復易家親一人故曰傳屍亦名轉注以其初得半卧半起號爲殗殜氣急欬者名曰肺痿骨髓中熱稱爲骨蒸内傳五藏名之伏連不解療者乃至滅門假如男子因虚損得之名爲勞極吴楚云淋瀝巴蜀云極勞其源先從腎起初受之氣兩脛酸疼腰脊拘急行立脚弱食飲減少兩耳颼颼欲似風聲夜卧夢洩陰汗痿弱腎既受已次傳於心心初受氣夜卧心驚或多忪悸心懸乏氣吸吸欲盡夢見先亡有時盜汗食無滋味口内生瘡心常煩熱唯欲眠卧朝輕夕重兩頰口脣悉紅赤如傅烟脂又時手足五心皆熱心既受已次傳於肺肺初受氣時時欬嗽氣力微弱有時喘氣卧即更甚鼻口乾燥不聞香臭假令得聞唯覺朽腐物氣有時惡心憒憒欲吐肌膚枯燥或時刺痛或似蟲

行乾皮細起狀若麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目𥇒𥇒
面無血色常欲顰眉視不及遠目常乾澁又時赤痛或復睛黃
朝暮瞢瞪常欲合眼及至於卧睡還不著肝既受已次傳於脾
脾初受氣兩肋虛脹食不消化又時渴痢熟食乍出有時肚痛
腹脹雷鳴脣口焦乾或生瘡腫毛髮乾聳無有光潤或復上氣
擡肩喘息痢赤黑汁至此候者將死之證也

又論曰毒氣傳五藏候終不越此例但好候之百不失一

又論曰凡患癥癖之人多成骨蒸不者即作水病仍須依癖法灸
之兼服下水藥差

又論曰此病若脊膂肉消及兩臂飽肉消盡胷前骨出入即難
療也若痢赤黑汁兼上氣擡肩喘息皆爲欲死之證也此是藏
壞故爾

又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女日就

消瘦面色痿黃不悟之者將爲骨蒸因錯療之屢有死者有

此輩者慎勿療之待月事通自當差矣

又論曰或有人偶得一方云療骨蒸不解尋究根本遂即輕用

之主療既不相當病愈未知何曰了不求諸鑒者唯知獨任已功

若此之人寓目皆是至如以主肺瘻骨蒸方將療痃癖傳屍者斯

乃更增其病豈有得痊之理何者主肺瘻方中多是冷藥冷藥

非痃癖之所宜若用以療痃癖此乃欲益反損非直病仍未差

兼復更損其脾脾唯宜溫不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰

之證兩肋虛滿食既不消兼之下痢如斯穿鑿欲益反損終莫

能悟良可悲哉夫略舉一隅他皆倣此

又論曰凡患骨蒸之人坐卧居處不宜傷冷亦不得過熱冷甚

則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則血脉擁

塞頭眩目疼脣乾口燥心胷煩悶渴欲飲水此等並是將息過

度之狀深可誠也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若背傷冷即令欬嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節寧可少食保無宿疰數數進之助藥勢也必須傷軟易消故也不宜傷硬恐損胃氣致不消也此皆以意消息之爲佳

又論曰主療之法先須究其根本考其患狀診其三部決其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服即望痊除未及得瘳便復罷藥乃言藥病乖越似不相當如此懷疑余所不取亦有因瘧後作亦有因痢後爲此病根其源非一略舉綱紀比類而取療之方法如後所言

又論曰骨蒸之病無問男女特忌房室舉動勞作尤所不宜陳臭酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆猪魚油膩酒麪瓜果野

鷰之屬葵笋蒜蕨及生冷等並不得飡食自非平復一月以後乃漸開也大略如此觸類而長之此病宜食煑飯鹽豉豆醬燒薑葱韭枸杞苜蓿苦菜地黃牛膝葉並須煑爛食之候病稍退恐肌膚虛弱者可時食乾鹿脯爲味中間所有得食之者按其條下具言之

廣濟療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方（張文仲方）

麴末（二升）　大麥蘗末（二升）　生地黃（肥大者切三升）　白朮（八兩）

牛膝（切三升）　桑耳（金色者剉三升）　薑黃（八兩）　當歸（十四分）

生薑（合皮切三升）　桃人　杏人（各二升去皮尖及雙人者熬）　近用加橘皮（八兩）

右十二味並細切於臼中以木杵擣之如泥內瓶中以物蓋口封之勿令洩氣蒸於一大石米中飯熟出之停屋下三日開出暴乾擣爲散酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半不

利初服十日内忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百
無所忌任意恣口食之唯忌桃李若須桃李宜去朮若不能
散蜜丸服之亦得一服三十九日二服去病令人能食肥健
好顔色忌桃李雀肉蕪荑出第四卷中
文仲論傳屍病亦名痎瘧遁疰骨蒸伏連殗殜此病多因臨
屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食不作肌膚或三日
五日若微勞即發大都頭額頸骨間尋常微熱翕翕然死復
家中更染一人如此乃至滅門療之方
獺肝一具破乾炙 鼈甲一枚炙 野狸頭一枚炙 紫菀四分
漢防已一兩半 蜀漆洗 麥門冬去心 甘草炙各一兩
右八味擣篩以成錬羖羊腎脂二分合蜜一分烊冷和丸藥
如梧子大服十丸加至十五丸日再以飲下之其藥合和訖分
一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上先服頭邊次服臂

上次服門上者大驗忌海藻菘菜莧菜

又灸法

立脚於繫鞋處横文以手四指於文上量脛骨外逼脛當四指中節按之有小穴取一縷麻刮令薄以此麻緩繫上灸令麻縷斷男左女右患多損

又方

青羚羊肺（一具破於布上乾之）莨菪子（一升絹袋盛）醋（一升）同漬經三日出各於布上暴之令至乾微火熬莨菪子各擣篩和以蜜丸如梧子服三丸加至四丸

地骨皮　白薇　芍藥　甘草

犀角　升麻　茯神　麥門冬

黃芩　桔梗　枳實　大黃

前胡　茯苓　天門冬　生薑

桑根白皮　羚羊角　當歸　柴胡
朱砂　芎藭　鼈甲　蜀漆
知母　石膏　常山　烏梅
香豉　黄耆　地黄　橘皮
以上並可詳度病狀用之並出第一卷中
伏連方五首
廣濟療瘦病伏連傳屍鬼氣疰忤惡氣方
斑猫赤頭足熬　射干根各四分　石膽七八分別研　桂心
牛黄各二分別研　犀角三八分生者屑　人參二分　石蜥蜴一枚炙
紫石七分別研　蜈蚣四寸炙　麝香少許別研
右十一味擣篩爲散研相和每日空腹服一寸匕日三服用井
華水二合温即頓服勿臨哭與白米粥喫好覺小便澁好如
合藥勿使婦人小兒雞狗見忌熱麪果子五辛酒肉生血生葱

又療瘦病伏連辟諸鬼氣惡疰朱砂丸方

光明朱砂一大兩　桃人十枚去皮尖雙人者熬　麝香三分研

右三味研朱砂麝香令細末別擣桃人如脂合和為丸如梧子其和不斂以蜜少許合成訖清飲服一七丸日二服不利忌生血物並出第十四卷中

崔氏斷伏連解法

先覓一不開口胡蘆埋入地取上离日開之煑取三匙脂粥内其中又翦紙錢財將向新塚上使病兒面向還道背塚坐以紙錢及新綜圍塚及病人使匝別將少許紙錢圍外與五道將軍使人一手捉胡蘆一手於坐傍以一刀穿地即以胡蘆坐所穿地及坐胡蘆了使一不病人捉兩箇鏁拍病人背呪曰伏連伏連解伏連伏連不解刀鑠解又呪曰生人持地上死鬼持地下生人死鬼即各異路呪訖令不病人即擲兩

鏁於病人後必取二鏁相背不背更取擲取相背止乃並還勿反顧又取离日令病人騎城外車轍面向城門以水三升灰三重圍病人又作七箇不翻餅與五道將軍呪曰天門開地戶閉生人死鬼各異路今五离之日放捨即歸呪訖乃還莫迴頭此法大良出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦名骨蒸傳屍比用此方甚驗

人屎五大升濕者　人小便一升　新炊粟飯五大升　六月六日麴半餅熬碎

右四味取一瓷瓶盛密封置一室中二七日並消一無惡氣每且服一大合晝三服無不差者合藥時潔淨燒香勿令婦人小兒女子雞犬孝子見之出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣發即四肢無力日漸黃瘦乍好乍惡不能食方

桃奴　茯苓各三兩　鬼箭羽　芍藥
人參　橘皮各二兩　生薑四兩　檳榔七枚
麝香一分別研
右九味切以水九升煑取二升七合去滓内麝香温分爲三服如行八九里久忌大醋生冷五辛出第十七卷中
飛尸方三首
病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胷出第二十三卷中
集驗療飛尸瓜蔕散方
瓜蔕　赤小豆各一分　雄黃二分研
右三味擣下細篩一服五分匕稍增至半錢匕以酪服藥廣濟同出第七卷中廣濟療卒中惡心腹絞刺氣急脹奄奄欲絶
備急張仲景療飛尸走馬湯方

巴豆二枚去心皮　杏人二枚去尖皮

右二物綿纏搥令極碎投熱湯二合指捻取白汁便飲之食頃當下老小量服之通療鬼擊病忌野猪肉蘆笋文仲同出第一卷中此方已見卒疰中正療飛尸故不刪也

古今錄驗附著散療飛尸在人皮中又名惡脉又名賊風發時急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半日乃微差須臾復發皆療之方

細辛　天雄炮　莽草各一分　桂心三分

附子四分炮　雄黃二分研　烏頭四分炮　乾薑四分

眞珠二分研

右九味擣下篩服五分匕不知稍增當以好酒服之忌猪肉冷水生葱生菜出第六卷中

遁尸方三首

病源遁尸者言其停遁在人肌肉血脉之間若卒有犯觸則發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻兩脅上衝心胷差後復發停遁不消故謂之遁尸也出第二十三卷中

廣濟療初得遁尸及五尸經年不差心腹短氣方

鸛骨三寸炙 羚羊鼻二枚炙令焦 乾薑一兩 麝香二分研

蜥蜴一枚炙 斑猫十四枚去翅足熬 雞屎白三兩熬 巴豆五枚去心皮熬令黑

芫青二十枚去翅足熬 藜蘆一兩去蘆頭熬令黃

右十味擣篩蜜和丸空腹以飲服如小豆三丸日二服稍加至六七丸以知爲度至吐利忌生冷油膩猪肉蒜粘食陳臭蘆笋一方無斑猫雞屎白巴豆芫青藜蘆

又初得遁尸鬼疰心腹中刺痛不可忍方

青木香六分 丁香六分 鬼箭羽 桔梗

紫蘇 橘皮 當歸各八分 生薑十二分

檳榔十四分合子碎　桃梟十四枚

右十味切以水九升煮取三升絞去滓分爲三服日晚再以快利爲度忌如藥法並出第四卷中一方無橘皮桃梟

集驗療遁尸心腹刺痛不可忍方

桂心一尺準一兩　乾薑三分　巴豆二枚去皮心熬

右三味合擣下篩以好苦酒和之如泥以塗痛處燥即易之忌野猪肉蘆筍千金同用乾薑一兩出第一卷中

五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疰也其狀皆腹痛脹急不得氣息上衝心胷傍攻兩脅或磥塊踊起或攣引腰脊今取一方而兼療之

擣蒺藜子蜜丸如胡豆服二丸日三

又方

擣商陸根熬以囊盛之更番熨之冷復易

又方　粳米二升水六升煎三沸服之

又方　掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之並出第一卷中

删繁療五尸蠱疰中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方

丹砂研　乾薑　芎藭　芫花熬

烏頭炮各四分　芍藥　桂心各八分　野葛皮三分炙

吴茱萸一合

右九味擣篩蜜和爲丸如大豆服三丸日三清飲進之忌生血物猪肉生葱出第十卷中一方無巴豆梔子

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸疰沈尸其狀皆腹痛脹急衝心攻脅或磥塊踊起或牽腰脊方

破雞子一枚取白生吞之困者摇頭令下文仲肘後同

又方葛氏法

雄黃　大蒜各一兩

右二味擣和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服有尸疹者常畜此藥用之驗文仲肘後同

又方

乾薑　附子各二兩　桂心二分　巴豆三十枚去皮心生用

右四味擣篩蜜和又內臼中擣萬杵服如小豆二丸此藥無所不療忌野猪肉蘆笋生葱肘後同並出第一卷中

文仲療卒中五尸方

取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐蹠下痒便差若瓦屋削四角柱燒用之神驗肘後同出第一卷中

古今錄驗八毒赤丸療五尸癥積及惡心痛蠱疰鬼氣無所不療即是李子豫赤丸方出胡錄

雄黃研　真珠研　礜石泥裹燒半日　牡丹皮

巴豆去皮心熬　附子炮　藜蘆炙各一兩　蜈蚣一枚炙去足

右八味擣篩蜜和丸服如小豆二丸日一極得吐下欲長將服者可減一丸忌猪肉狸肉蘆笋生血物等

又五尸丸療諸尸疰方

芍藥　桂心各八分　吴茱萸一合　丹砂研

芎藭　烏頭炮　乾薑各四分　蜀椒一兩去目汗

梔子人五分　巴豆四十枚去心皮熬

右十味擣下篩蜜和丸如大豆一服三丸日三忌猪肉生葱蘆笋生血物等並出第七卷中胡洽有芫花四分野葛皮二分為十二味

尸疰方四首

病源尸疰者即是五尸内之尸疰而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沈沈默默不的知所苦而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心胷傍攻兩脅或螺塊踊起或攣引腰

脊或舉身沉重精神雜錯常覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就頓滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸病疰易傍人故曰尸疰出第二十三卷中

刪繁療尸疰損皐或聞哭聲或見尸常發死人席湯方

取死人眠席斬棺内餘棄路者一虎口長三寸止一物以水三升煑取一升爲一服立効出第十卷中

文仲療尸疰方

取新布裹椒薄疰上以熨斗火熨焦令汗出立驗

又姚氏方

燒髮灰　杏人熬令紫色分等

右二味擣如脂以猪膏和酒服如梧子三丸日三神良千金同

又鸛骨丸療尸疰惡氣兼療百病方

鸛骨三寸炙　桂心三寸　䖟蟲十四枚去翅足熬　巴豆三十枚去心皮熬

斑猫十四枚去翅足熬

右五味擣篩蜜和爲丸如小豆一服二丸日三服清飲進之

忌野猪肉蘆笋生葱並出第一卷中

五疰方四首

病源注者住也言其連滯停住死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或忽腹脹刺痛或支節沈重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五注病皆不顯出其名大體與諸注皆同出第二十四卷中

删繁華他録秩五疰丸療中惡五疰五尸入腹胷脅急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已噤將物強發開若不可發扣齒折以灌下藥湯酒隨進之即効方

丹砂研　雄黃研　附子炮各一兩　甘遂半兩熬

豉六十枚熬　巴豆六十枚去心皮熬令變色

右六味擣下篩巴豆別研令如脂乃更合擣取調白蜜和之藏以密器若有急疾服胡豆二丸不覺更益以飲投之此藥多有所療殺鬼解毒破積去水良驗忌生血物猪肉蘆笋古今錄驗同出第九卷中

小品五疰湯主卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黃三兩別漬　甘草二兩炙　烏頭十枚炮削皮　生薑一斤半

桂心四兩　芍藥　當歸各二兩　蜜一斤

右八味切以水九升煑取三升烏頭別內蜜中煎令得一升投著湯中去滓分服三合如人行三十里又一服日三不知可至四合王尹威數用之忌海藻菘菜猪肉生葱千金同出第四卷中

古今錄驗五疰丸一名神仙丸一名千金丸一名轉疰丸一名司命丸一名殺鬼丸療萬病邪鬼疰忤心痛上氣厥夢蠱毒傷

寒時疾疫癘方

丹砂研 礜石泥裹燒半日 雄黃研 巴豆去心皮熬

藜蘆熬 附子炮各二分 蜈蚣一枚炙去足

右七味擣篩蜜和丸如小豆服一丸日一即差不解夜半更服一丸定止帶一丸辟惡忌猪肉冷水生血物狸肉出第七卷中

又五野九療五疰尸疰哭疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短氣兩脅下痛引背腰脊吸吸少氣不能行飲食少面目痿黃小便難項強不得俛仰腹堅癖臍左右下雷鳴脹手足煩疼目不明喜志乆風濕痺腰脊不隨喜夢寤百病皆療之方

牛黃研 麝香研 蜀椒去目汗 雄黃研

大黃 當歸 蜀烏頭炮 蜀天雄炮

消石熬一方用芒消各一分 人參 桂心 朱砂研

細辛　乾薑各二分　石蜥蜴一枚炙　巴豆五十枚去心皮熬

鬼臼二分

右十七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日再不知稍增以知爲度忌猪肉蘆笋生葱生菜生血物出第六卷中

江南九十九疰方二首

集驗療江南疰病凡有九十九種寒熱尸疰此病隨月盛衰人有三百六十脉走入皮中或左或右或裏或表如刀錐所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胷中痛繞臍苦痛食不知味腰中難以俛仰兩膝屈伸面或黄或青或白或黒至死更相注易方

取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升如此取汁盡蒸豆熟作羊鹿肉羮噉此豆出第一卷中

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同

金牙別研　雄黃研　丹砂研　礜石泥裹燒半日

寒水石　芫青熬　巴豆去心皮熬　朴消

桔梗　茯苓　人參　貫衆

附子炮　蜀椒去汗目　露蜂房炙　龍骨

乾薑　牡桂　烏頭炮　石膏研

莽草炙　蓯蓉　大戟　芫花熬

防風　狸骨炙　商陸根　大黃

細辛　蛇蛻炙　玉支　貝母一作牙子

右三十二味分等下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水生菜

生血肉大醋蘆笋集驗同出第七卷中

江南三十六疰方三首

崔氏金牙散療江南三十六疰人病經年羸瘦垂死服之皆差

并帶之能殺鬼氣逐尸疰諸惡癘不祥悉主之方出胡洽

金牙研　曾青研　消石研　礜石泥裹燒半日

石膏研　莽草　玉支　雄黃研

朱砂研　寒水石　龍骨　蛇蛻皮炙

芫青熬　當歸　龍膽　大黃

細辛　防風　大戟　芫花熬

冶葛炙　蓯蓉　天雄炮　茯苓

附子炮　烏喙炮　乾薑　人參

桔梗　桂心　椒去目汗　貫衆

巴豆去心皮熬　狸骨炙　蜂房炙　鸛骨炙各一兩

右三十六味擣篩爲散以酒服一錢匕漸增五分匕日三并以三角絳囊貯散方寸匕以繫頭及心上大良一方加蜈蚣蜥蜴雌黃鹽皁麝香毒公合四十二味忌猪肉生血物生菜冷

水大醋蘆笋出第七卷中

備急療尸疰鬼疰者葛氏云即是五尸之中尸疰又挾諸鬼邪爲害也其病變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱沈沈嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸沈頓滯以至於死後復注易傍人乃至滅門覺如此候者宜急療之方

獺肝一具

右一味陰乾擣末水服一方寸匕日三如一具不差更作姚氏云神良肘後崔氏千金同

又方

桑根白皮灰二升蒸令氣出下以釜湯三四升三遍重淋取二升漬赤小豆二升一宿出風乾復漬汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉若鹿肉作羹進此豆飯食一升漸至二三升重者七八升乃愈病去時體中覺疼痒淫淫或若根本不除重爲之肘後同並出第一卷中

疰病相染易方三首

深師療鬼物前亡轉相染夢寤紛紜羸瘦往來寒熱嘿嘿煩悶欲寢復不能手足熱不能食或欲向壁悲涕或喜笑無常牛黃散方

牛黃研　鬼箭羽　王不留行　徐長卿一名鬼督郵

遠志去心　乾薑　附子炮　五味子

石葦刮去黃皮　黃芩　茯苓各二分　桂心一分

代赭三分　昌蒲四分　麥門冬六分去心

右十五味擣下篩以蜜生地黃汁相拌合復令相得以酒服方寸匕日三忌猪肉冷水生葱羊肉餳醋物出第九卷中

崔氏療江南三十六疰丸療轉疰滅門絕族族盡轉逐中外滅盡復易親友方

雄黃研二分　麥門冬去心三分一方用天門冬　皂莢去皮子炙　莽草炙各二分

鬼臼(三分) 巴豆(去心皮熬二分)

右六味擣篩蜜和爲丸如小豆服二丸日一服忌鯉魚野猪肉蘆笋

又赤丸療人久疰室家相傳乃至滅族方

雄黃(二兩研) 馬目毒公(鬼臼也) 丹砂(研) 莽草(炙)

藜蘆(熬各二兩) 巴豆(八十枚去心皮熬) 皂莢(一兩去皮子炙) 真珠(一兩研)

右八味擣篩蜜和丸如小豆一服二丸吐下惡蟲數十枚忌野猪肉蘆笋生血物並出第七卷中

鬼疰方二首

病源注之言住也言其連滯停住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絶倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯停住乃至於死死後注易傍人故謂之鬼疰也出第二十四卷中

古今錄驗神秘丸療鬼疰邪忤飛尸疰擊犬馬嚙蜂蛇毒蠱盡皆消除方

大黃四兩 消石三兩熬 巴豆去心皮熬 雄黃研各二兩

右四味擣篩蜜和丸如小豆先食服二丸日一服忌野猪肉蘆筍出第七卷中

崔氏蜀金牙散療鬼疰風邪鬼語尸疰或在脊脅流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張脣焦爪甲黃方

金牙一分研 蜈蚣炙 蜥蜴石上者炙 附子炮各一枚

人參四分 蜣蜋七枚炙 徐長卿 芫青炙

斑猫去翅足熬各十四枚 雄黃一分研 桂心四分 鬼臼二分

野葛一分炙 毒公三分 芎藭二分 石長生

椒去汗目 大黃 甘草炙 蛇蛻皮炙

露蜂房炙 曾青無藍青代別研 真珠別研 砂丹各二分

鬼督郵 烏頭炮 狼毒各二分 石膏五分研
䕡茹一分 蕪荑 鬼箭 藜蘆炙
鸛骨炙 雷丸 乾漆熬 龜甲各二分炙
狼牙四分 亭長七枚炙 貝母二枚 凝水石五分
牛黄別研 胡鷰屎各四分 桔梗三分 鐵精一分研
消石二分研

右四十五味擣篩爲散先食酒服一刀圭日再不知稍增之有蠱隨大小便出也忌猪肉冷水生葱海藻菘菜生血物狸肉深師千金同出第七卷中

鬼疰心腹痛方一首

古今録驗還命千金丸療萬病心腹積聚堅結胷脅逆滿欬吐宿食不消中風鬼疰入腹面目青黒不知人方

雄黄研 鬼臼 徐長卿 礜石泥裹燒半日

瓜丁 雌黃研 乾薑各四分 野葛七分炙
斑猫二十枚去足翅熬 蜀椒四分去目汗 地膽十五枚去翅熬 射罔二分
丹參四分

右十三味擣篩蜜和擣三千杵丸如小豆先食服一丸日三不知漸增以知爲度若百毒所螫牛觝踐馬所踢齧癰腫瘰癧以一丸於掌中唾和塗痛上立愈正月旦以椒酒率家中大小各服一丸終歲無病神良有驗秘不傳出第十六卷中

鬼疰羸瘦方二首

古今録驗黃帝護命千金丸療羸瘦歷年胷滿結疹飲食變吐宿食不下中風鬼疰疾瘦方

野葛七寸炙 斑猫二十枚去足翅熬 雄黃研 雌黃
鬼臼 瓜丁 丹砂研 礜石泥裹燒半日
沙參 莽草炙 椒各一兩去目汗 地膽十五枚去足翅熬

右十二味擣下篩蜜和擣三千杵丸如梧子服五丸日二卒中惡氣絕不知人服如小豆二丸老小半之牛馬所鮀踐癰腫若蟲毒所齧取一丸著掌中唾和塗瘡中毒上立愈正月旦以酒率家中大小各一丸一歲不病若傷寒身熱服一丸若欲視病服一丸病者共臥不恐忌生血物

又犀角丸療百病鬼疰惡風入人皮膚淫淫液液流無常處四肢不仁牽引腰背腹脹滿心痛逆氣填胷不得飲食唅翕唅翕短氣寒熱羸瘦喜惡夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆療之方

犀角屑　桂心各三分　羚羊角屑　牛黃

鬼臼　附子炮　獺肝炙各二分　巴豆三十枚去心皮熬

蜈蚣四枚去足炙　麝香研　真珠　雄黃研

丹砂研各四分　射罔一分　貝齒十箇燒

右十五味擣篩蜜和擣五千杵平旦服如胡豆二丸日三慎

生葱猪肉冷水蘆笋生血物等並出第六卷中

鬼氣方三首

崔氏療鬼氣辟邪惡阿魏藥安息香方

阿魏藥即涅盤經云央匱是也服法旦取東許大研之爲末又取牛乳一大升煎之五六沸停令熱定取鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盞飲之取盡至暮又取安息香亦如棗許大分如梧子還以熟牛乳服之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煑肉汁服之患久者不過十日近者不過五日如過三十日不愈便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口特忌特忌禮部孫侍郎家中有此病所在訪問有人從梁漢來云官人百姓服此得効者十餘家孫侍郎即令依方進服七八日即効便以此法傳授親知得

驗者非一余時任度支郎中欲廣其効故錄之出第
七卷中
延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方
獺肝十六分炙 人參 沙參 丹參各三分
鬼臼 苦參各二分
右六味擣篩蜜和丸如梧子大一服十丸飲汁下日三服加
至十丸禁生冷猪魚肉生血物等
又五香丸主天行瘟疫惡氣熱毒心肋氣滿脹急及疰鬼氣等方
青木香 犀角屑 升麻 羚羊角屑
黃芩 梔子人各六分 沈香 丁香
薰陸香各四分 麝香 鬼臼各二分 大黃
芒消各八分
右十三味擣篩蜜和丸如梧子一服三丸飲下日三服加至

七丸以差止禁蒜䴵猪魚並出第十一卷中

鬼魅精魅方八首

病源凡人有爲鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜魘或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也出第二卷中

廣濟療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人吐乳狐狸吃力迦丸方

吃力迦即白朮是也　光明砂研　麝香當門子　訶黎勒皮

香附子中白　沉香重者　青木香　丁子香

安悉香　白檀香　畢撥舶上者　犀角各一兩

薰陸香　蘇合香　龍腦香各半兩

右十五味擣篩極細白蜜煎去沫和爲丸每朝取井華水

服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裹緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量忌生血肉臘月合之有神藏於密器中勿令洩氣出祕之忌生血物桃李雀肉青魚酢等

又療精魅病方

水銀一兩

右取水銀内漿水一升炭火上煎三分減二即去火取水銀如熟豆大取當日神符裹水銀空腹吞之晚又吞一服三日止無所忌並出第四卷中

肘後療卒中邪魅恍惚振噤之方

灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止至十四壯便愈集驗同出第三卷中

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此爲鬼𤺋當得殺鬼丸方

丹砂研　雄黃研　龍骨　馬目毒公

鬼箭各五兩　鬼臼二兩　赤小豆三兩　芫青一枚

桃人百枚去皮尖熬別研

右九味擣下篩別研雄黃丹砂細絹篩合諸藥拌令和調後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫辟男左女右小兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之所服蜜和丸如梧子一服三丸日三忌五辛生血物出第九卷中

小品療鬼魅四物鳶頭散方

東海鳶頭是由跋　黃牙又名金牙　莨菪　防葵各一分

右藥擣下篩以酒服方寸匕欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨菪並令人迷惑恍惚

如狂不可多服備急千金同出第五卷中

集驗療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪氣所爲不能自絶九物牛黄丸方

荆實人精也 曾青蒼龍精也研 玉屑白虎精也研 牛黄土精也研

雄黄地精也研 空青天精也研 赤石脂朱雀精也 玄參真武精也

龍骨水精也各一兩

凡九物名曰九精上通九天下通九地

右擣下篩蜜和丸如小豆先食吞一丸日三稍加以知爲度文仲千金并翼同忌羊血出第三卷中

必効辟鬼魅方

虎爪 赤朱 雄黄 蟹爪

右四味擣令碎以松脂融及煖和爲丸不然硬正朝旦及有狐鬼處焚之甚効以重巫人即神去王三師云奇効忌生血

物出第四卷中

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癥癖氣承心兩肋下有塊温瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等所螫並療之方

麝香　牛黄　藜蘆炙　朱砂

蜀當歸　茯苓　桔梗　鬼箭羽

金牙　烏頭炮　桂心　吴茱萸

貫衆　丹參各一分　蜈蚣去足炙　乾薑

人參　虎骨各二分　鬼臼半分　芍藥

雄黄各一分半　巴豆二十枚去心皮熬　蜥蜴半枚炙

右二十三味擣篩蜜和丸如梧子以飲下三丸至辰時下利若不利熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即定然後煑葱食之勿食冷水明日依前服之永差忌熱麪生菜柿子梨等蛇蠍蜂螫取一丸研破和醋塗之便差精鬼狐狸之屬抛

塼瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晩毎日服前藥兩丸只三兩日服即差仍毎日燒一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸緋絹袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌狸肉生血物豬肉生葱蘆笋

鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方

野狐鼻炙 豹鼻炙各七枚 狐頭骨一具炙 雄黃

膃肭臍 鬼箭羽 露蜂房炙 白朮

虎頭骨炙各一兩 阿魏藥二兩炙 驢馬狗駞牛等毛各四分燒作灰若骨蒸加

死人腦骨一兩炙

右十五味並大秤兩擣篩爲散攪使調勻又先以水煑松脂候烊接取以和散和散之時勿以手攪將虎爪攪和爲丸如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥煙洩外別擣

雄黃爲末以藉藥燒藥節度一如熏香法其藥欲分於牀下燒熏彌善忌桃李雀肉等出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚方

松脂（三兩烊）　内雄黃末（一兩）

右二味用虎爪攪令調丸如彈丸夜内籠中燒之令女裸坐籠上被急自蒙唯出頭耳過三熏即斷深師同

又方

雄黃　人參　防風（各一兩）　五味子（一升）

右四味爲散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女喜夢鬼通致恍惚者方

鹿角屑酒服三撮日三並出第二卷中

白虎方五首

近效論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝失理

受此風邪經脉結滯血氣不行畜於骨節之間或在四肢肉色
不變其疾晝靜而夜發發即徹髓酸疼乍歇其病如虎之嚙故
名曰白虎之病也廣濟療白虎方

犀角屑　當歸　芍藥各六分　牛膝

沈香　青木香　虎頭骨炙各八分　槲葉脉炙一握

麝香一分研

右九味切以水六升煑取二升六合去滓分温三服如人行
四五里進一服别加麝香末服之不利忌生菜熱麪蕎麥蒜
出第四卷中

蘇孝澄療白虎病𤸪云婦人丈夫皆有此病婦人因産犯之丈夫
眠卧犯之爲犯白虎爾其病口噤手拳氣不出方

灸臍中七壯

近効療白虎方

炭灰五升無炭灰桑灰亦得紗羅羅之一遍　蚯蚓糞一升擣之　紅藍花

右三味一處攪和熬令熱取好釅醋煖之拌令浥浥以故布三四重裹分作四分更互當所患痛處熨之數數轉勿住手挼之冷熱得所寧令小熱不得作冷冷即報熬令熱又熨之並用後呪法曰青僊皮青毛出黃僊皮黃毛出赤僊皮赤毛出白僊皮白毛出黑僊皮黑毛出急出吾口神吾口聖唾山山崩唾石石裂得汝字汝不去斫頭斫頭急急如律令其呪法先令人唾痛處以手挼之不住手便即誦此呪不限遍數以差即停當誦呪不得令病人及傍人聞呪須先淨漱口潔淨良効無比千金勿傳

又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方

取三年釅醋五升熱煎三五沸切葱白三二升煑一沸許即爪籬漉出布帛熱裹當病上熨之以差為度

又療白虎方

猪肉三串 大麻子一合 酒半盞

右三味和麻子口含噀上將猪肉三串手擘向痛處來去呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出呪訖將肉安牀下差送路頭神驗

无辜方二首

崔氏无辜閃癖或頭乾瘰癧頭髮黃聳分去或乍痢乍差諸狀既多不可備說大黃煎丸方

大黃九兩錦文新實者若微朽即不堪用削去蒼皮乃秤

右一味擣篩爲散以上好米醋三升和之置銅椀內於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥候堪丸乃停於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿爲度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若

多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒不等以意量之此藥唯下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同此忌

又療无辜腦後兩畔有小結者方

无辜之病此結爲根欲療者先看結之大小然後取細竹斟酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹籠結自然不得轉動以火針針結子中央作兩下去針訖乃塗少許膏藥無者雜油亦得須待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若不出復如前針候膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割无辜比來參詳殊不如針之以絕根本恐患者不悉故復重說之並出第七卷中

除骨熱方四首

范汪療骨熱狸骨丸方

狸骨 連翹各五分 土瓜 山茱萸

玄參 胡燕屎 黄芩 丹砂

馬目毒公 鳶尾各二分 黄連 芍藥

雄黄 青葙子 龍膽 栝樓各三分

右十六味擣篩蜜和丸如梧子先食服三丸日三不知稍

稍增之以知爲度禁食生魚菜猪肉黄黍米生血物古今

録驗同

古今録驗除熱三黄丸療骨熱身多瘡瘰癧癰腫者方

大黄 黄芩 黄連 當歸

茯苓 桂心 乾薑 芍藥各二分

梔子一十四枚擘 柴胡三分

右十味擣篩蜜和丸先食服如小豆三丸不知增至十丸欲

取微利以意增之久服益良忌生葱醋物猪肉冷水

又方

大黄　黄連　黄芩各一兩　芒消二兩

右四味擣篩蜜和爲丸一服五丸漸加以知爲度忌猪肉冷水並出第四卷中

盜汗方七首

病源盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其脉男子平人脉虛弱細微皆爲盜汗脉也出第三卷中

崔氏療盜汗夜睡中即汗汗不休必得風方

麻黄根細切　小麥各二升

右二味以水一斗二升煑小麥得九升内麻黄根煑之得三升去滓分爲三服常夜服之不過兩劑即止

又方

甘皮　薑各一兩　杏人三兩去尖皮熬　當歸四兩

右四味擣合蜜和丸服如梧子五丸漸漸增之

又方　取死人席縁燒作灰淋汁熱洗從頭至足愈

又止汗粉方送朱規

麻黃根　牡蠣粉　敗扇灰　栝樓各三兩

白朮二兩　米粉三升

右六味擣諸藥下篩爲散和粉攪令調以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任意不能日別灸亦得汗即漸止並出第三卷中

延年主盜汗夜卧床席衣被並濕方

麻黃根　牡蠣碎之綿裹各三兩　黃耆　人參各二兩

枸杞根白皮　龍骨打碎各四兩　大棗七枚擘

右七味切以水六升煑取二升五合去滓分温六服如人行八九里久中間任食一日令盡禁蒜熱麪等物

又療夜卧盜汗方

左顧牡蠣 黄耆各三兩 麻黄根五兩 杜仲二兩

右四味擣篩爲散一服方寸匕日三夜一服用敗蒲扇煑取汁下藥禁蒜麪並出第一卷中

古今録驗療盜汗麻黄散方

麻黄根三分 故扇燒屑一分

右二味擣下篩以乳服三分仍日三大人方寸匕日三不知益之又以乾薑三分粉三分擣合以粉粉之大善出第十卷中

外臺祕要方卷第十三

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔 校勘

外臺祕要方　十四

中風上

外臺秘要方卷第十四 中風上二十一門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

中風及諸風方一十四首 附灸法

病源中風者風氣中於人也風是四時之氣分布八方主長養萬物從其鄉來者人中少死病不從鄉來者人中多死病其

肩

爲病也藏於皮膚之間內不得通外不得泄其入經脉行於五藏者各隨藏腑而生病焉心中風但得偃卧不得傾側若脣赤流汗者可療急灸心俞百壯若脣或青或黑或白或黃此是心壞爲水面目亭亭時悚動者不可復療五六日而死肝中風但踞坐不得低頭若遶兩目連額色微有青脣青面黃者可療急灸肝俞百壯若大青黑面一黃一白是肝已傷不可復療數日而死脾中風踞而腹滿通身黃吐鹹汁出者可療急灸脾俞百壯若手足青者不可復療腎中風踞而腰痛視脅左右未有黃色如餅粢大者可療急灸腎俞百壯若齒黃赤鬚髮直面土色者不可復療肺中風偃卧而胷滿短氣冒悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白者可療急灸肺俞百壯若色黃爲肺已傷化爲血不可復療其人當妄掇空指地或自拈衣尋衣縫如此數日而死診其脉虛弱者亦風也緩大者亦風也浮虛

皮碎

者亦風也滑散者亦風也出第一卷中

深師療中風汗出乾嘔桂枝湯方

桂心 甘草炙各三兩 大棗十二枚擘

右三味切以水五升煑取二升半分三服一方用生薑五兩

忌生葱海藻菘菜

又桂枝湯療中風身體煩疼惡寒而自汗出頭彊痛急方

桂心五兩 生薑八兩 甘草二兩炙 葛根八兩

芍藥三兩 大棗十二枚擘

右六味切以水七升煑取二升半服八合日三溫覆取汗陸

伯庸用良忌生葱海藻菘菜

又麻黃湯療中風氣逆滿悶短氣方

麻黃三兩去節 甘草二兩炙 石膏四兩碎綿裹 杏人五十枚去兩人及尖皮碎

人參三兩 乾薑五兩 茯苓 防風各四兩

桂心三兩　半夏一升洗

右十味以水九升煑取三升先食服一升日三服甚良忌海藻生葱羊肉餳菘菜

又茯苓湯療中風人腹心下如刺不得卧或在脅下轉動無常腹滿短氣惙惙欲死此病或中虛冷或素有宿食食飲不消或素風氣在內今得他邪往于五藏故成此病方

茯苓二兩　芎藭　乾薑　芍藥

白朮　當歸　人參各一兩　枳實三分炙

甘草一兩炙

右九味細切以水九升煑取三升日三若病劇者可相去如人行五里頃一服胷中有氣可加人參二兩服一劑不差不過兩劑神良忌海藻菘菜桃李雀肉大酢並出第九卷中

千金翼中風論聖人以爲風是百病之長深爲可憂故避風如

避矢是以禦風邪以湯藥鍼灸蒸熨隨用一法皆能愈疾至於火艾特有奇能雖曰鍼湯散皆所不及灸爲其最要昔者華佗爲魏武帝鍼頭風但鍼即差華佗死後數年魏武帝頭風再發佗當時鍼訖即灸頭風豈可再發只由不灸其本不除所以學者不得專恃於鍼及湯藥等望病畢差既不苦灸安能拔本塞源是以雖豐藥餌諸療之要在火艾爲良初得風之時當急下火火下即定比煑湯熟已覺眼明豈非大要其灸法先灸百會次灸風池次灸大椎次灸肩井次灸曲池次灸間使各三壯次灸三里五壯其炷如蒼耳子大必須大實作之其艾又須大熟從此以後日別灸之至隨年壯止凡人稍覺心神不快即須灸此諸穴各三壯不得輕之苟度朝夕以致殞斃誡之哉誡之哉

又論曰學者凡將欲療病先須灸前諸穴莫問風與不風皆先

灸之此之一法醫之大術宜深體之要中之要無過此術是以常預收三月三日艾擬救急危其五月五日亦好仍不及三月三日者又有卒死之人及中風不得語者皆急灸之夫卒死者風入五藏爲生平風發彊忍怕痛不灸忽然卒死謂是何病所以皆必灸之是大要也

又論曰夫得風之時則依此次第療之不可違越若不依此當失機要性命必危

又凡初得風四肢不收心神惛憒眼不識人言不出口凡中風多由熱起服藥當須慎酒麪羊肉生菜冷食猪魚雞牛馬蒜乃可差得患即服此竹瀝湯方

竹瀝二升　生葛汁一升　生薑汁三合

右三味相和温煖分三服平旦日晡夜各一服訖覺四體有異似好以進後方

又方

麻黃去節 防風各一兩半 芎藭 防已

附子炮 人參 芍藥 黃芩

桂心 甘草炙各一兩 生薑四兩 杏仁四十枚去尖皮兩人者

羚羊角二兩屑 竹瀝一升 生葛汁五合一云地黃汁 石膏六兩碎綿裹

右十六味切以水七升煮取一半乃下瀝汁煮取二升七合分溫三服五日更服一劑頻與三劑愼如上法漸覺稍損次進後方忌猪肉冷水海藻菘菜生葱

又方

竹瀝二升 防已一兩 麻黃三兩去節 防風

升麻 桂心 芎藭 獨活

羚羊角各二兩屑

右九味切以水四升幷瀝煮取三升分爲三服兩日進一劑

進三劑若手足冷加生薑五兩白朮二兩若未除次進後方忌生葱等如前

又方

防風　麻黄去節　芍藥各一兩半　防巳

桂心　黄芩各一兩　附子三分炮　甘草炙

白朮　人參　芎藭　獨活各二兩

竹瀝一升　羚羊角二兩屑　升麻一兩　石膏二兩碎綿裹

生薑二兩

右十七味以水八升煑減半下瀝煑取二升半分三服相去如人行十里再服有氣如橘皮牛膝五加皮各一兩若除退訖可常將服後煑散忌猪肉冷水海藻菘菜桃李生葱雀肉等

又煑散方

耆
朮

有

防風 獨活 芍藥 黄耆
人參 芎藭 白朮 丹參
署預 茯神 桂心 麥門冬去心
山茱萸 厚朴 牛膝 五加皮
天門冬去心 升麻 羚羊角屑 地骨皮
秦艽 石斛 防巳 甘草各四分
麻黄三兩去節 甘菊花 薏苡人各一升 石膏六兩
橘皮三兩 生薑二兩切 乾地黄六兩 附子三兩炮
遠志三兩去心
右三十三味擣篩爲散每煑以水三升内藥三兩煑取一升綿濾去滓頓服之日别一服覺心中煩熱以竹瀝代水煑之
千金有黄芩檳榔藁本杜仲犀角無山茱萸署預甘草麥門冬附子
又凡患風人多熱宜服荆瀝方

荆瀝　竹瀝　生薑汁各五合

右三味相和温爲一服每日旦服煑散午後當服此荆瀝常作此將息

防風湯主偏風甄權處治安平公方

防風　白朮　芎藭　白芷

牛膝　狗脊　萆解各一兩　薏苡人

杏人去尖皮兩人者　人參　葛根　羌活各三兩

麻黄四兩去節　石膏碎綿裹　桂心各二兩　生薑五兩切

右十六味切以水一斗二升煑取三升分爲三服服一劑覺好更服一劑一劑一度灸之服九劑湯九度灸之灸風池一穴肩髃一穴曲池一穴支溝一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨墟下廉一穴合七穴即差仁壽宫備身患脚奉勑灸鐶銚陽陵泉巨墟下廉陽輔即起行大理趙卿患風腰脚不隨不得跪

起灸上窌二穴鐶銚二穴陽陵泉二穴巨墟下廉二穴即得
跪起庳狄欲偏風不得挽弓灸肩髃一穴即差前方忌桃李
生葱千金翼本方並云鍼此云灸者蓋王道不取鍼也

又一切風虛方常患頭痛欲破者

杏人九升去尖皮兩人者暴乾

右一味擣作末以水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻浮上匙取和羹粥酒內一匙服之每食即服不限多少服十日後大汗出二十日後汗止慎風冷猪魚雞蒜大酢一劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月後煎之此法神妙可深祕之並出第十六卷中千金同

備急療若卒覺體中恍恍皮肉習習此中欲中風方

急取獨活桂心各五兩二味切以酒三升漬於火邊灸之使煖一服五合日三加至一升良忌生葱千金

同出第二卷中

近効薏苡人湯療諸風方

薏苡人五合 萎蕤 生薑 茯神各三兩

生犀角末二兩 烏梅七枚 麥門冬去心 竹瀝各三合

白蜜一合

右九味切以水八升緩煮取二升七合汁絞去滓內竹瀝白蜜攪調細細飲之不須限以迴數多少亦不限食前食後亦不限晝夜冷暖盡又合服亦不限劑數多少此飲但合服勿輕尤佳以防風候忌食米醋油脂陳敗難消等物以前方療暴風手足攤廢言語蹇澀神情恍惚遊風散走或出諸四肢痹痺有所不穩似縁風候即合服之十日服一劑甚佳吴昇處

卒中風方七首

千金芎藭湯主卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭六分　杏人二十枚去兩尖皮碎　黄芩　當歸炙
石膏碎綿裹　麻黄去節　桂心　秦艽炙
甘草炙　乾薑各四分
右十味切以水九升煮取三升分爲三服忌海藻菘菜生葱
又主卒中風四肢不仁善笑不息方
芎藭六分　黄芩　當歸　桂心
秦艽　乾薑　甘草炙　麻黄去節
黄連各四分　杏人二十枚去皮尖兩人碎
右十味切以水九升煮取三升温服一升日三大汗忌生葱
海藻菘菜猪肉並出第八卷中
崔氏小續命湯療卒中風欲死身體緩急口目不正舌彊不
能語奄奄惚惚神情悶亂諸風服之皆驗不令人虚方出小
品余昔任户部員外忽嬰風疹便服此湯三年之中凡得四

十六劑風疾迄今不發余曽任殿中少監以此狀説向名醫咸
云此方爲諸湯之最要

麻黃去節　人參　黃芩　芍藥

芎藭　甘草炙　杏人去兩人尖皮碎　桂心各一兩

防風一兩半　附子一枚大者炮　生薑五兩

右十一味切以水九升煑取三升分爲三服甚良不差合三
四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人脚弱服此方至六
七劑得差有風疹家天陰節變輒合之可以防瘖也忌猪肉
冷水海藻菘菜生葱千金有防巳一兩如恍惚者加茯神遠志若骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥服之

又續命湯方太府梁御得効

麻黃去節　茯神　生薑各三兩　附子炮

防巳　甘草炙各一兩半　芎藭　細辛

白鮮皮　杏人去皮尖兩人碎　人參　羌活

桂心各二兩

右十三味切以水八升煑取二升八合去滓分三服服別相去八九里許覆取汗可服三劑間五日一進愼如藥法本方云間五日一進若老弱虛羸非間十日以上不可頻服忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜大酢並出第六卷中

備急療卒得中風急悶亂欲死方

灸足大指下橫文隨年壯

又不能語者方

灸第三或第五椎上百五十壯並出第六卷中

古今錄驗小續命湯療卒中風欲死身體緩急目不停舌強不能語諸中風服之皆驗不令人虛方

大附子一枚炮　芍藥一兩　生薑五兩　芎藭一兩

甘草一兩炙　麻黃三兩去節　白术一兩　木防巳一兩

防風六分 黃芩一兩 桂心一兩 人參一兩

右十二味㕮咀以水一斗三升煮取三升分三服甚良大善可作三四劑必佳忌豬肉海藻桃李生葱菘菜出第十四卷中

四時中風方四首

古今録驗療中風發三春脉浮短者多凶大而長可療青龍湯方

甘草一兩炙 麻黃二兩去節 桂心七寸 大棗二十枚擘

生薑 芍藥各二兩

右六味切以水六升煮取二升半分爲再服初服覆取汗後即止忌海藻菘菜生葱等物

又療中風發三夏脉沈緊惡寒不汗煩三陽湯方

當歸一兩 生薑二兩 甘草五分炙 麻黃五兩去節

杏人四十枚去尖皮兩人碎 石膏二兩碎綿裹

右六味切以水六升煮取半分再服忌海藻菘菜等物

又療中風發三秋脉浮大而洪長扶金湯方

葛根三兩 獨活二兩 附子一兩炮四破 石膏二兩碎綿裹

右五味切以水八升煮取三升服九合三夜一忌猪肉冷水等物

又療中風發三冬脉浮大者温脾湯方

芎藭二兩 石膏四分碎綿裹 甘草四分炙 黄芩三兩

杏人十四枚去尖皮兩人碎 麻黄六分去節 蜀椒二分去汗 防風四分

桂心各五分

右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜生葱等物

中風發熱方三首

深師十一物防風湯療中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風 當歸 麻黄去節 甘草炙各三分

茯苓　天門冬去心　附子炮　乾地黄
白朮　山茱萸二兩　黄芩五分
右十一味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分服七合日三
大小便不利内大黄人參各二分大棗三十枚擘生薑三兩忌
海藻菘菜猪肉蕪荑大酢桃李雀肉等
又防風湯療中風發熱頭痛面赤吸吸苦熱惡風煩悶身中悁
悁而疼其脉浮而數者方
防風　白朮　桂心　椒汗
黄芩　細辛　芍藥　人參
甘草炙一兩　麻黄去節三兩　石膏二兩碎綿裹　大棗三十枚擘
右十二味切以水九升煮取三升分三服忌海藻菘菜桃李
生葱菜出第三卷中
范汪療中風發熱大戟洗湯方

疽

大戟　　苦參

右二味等分擣篩藥半升白酢漿一斗煑之三沸適寒溫洗之從上下寒乃止小兒三指撮之醋漿四升煑如上法肘後同出第一卷中

賊風方一十二首

病源賊風者謂冬至之日有疾風從南方來名曰虛風此風至能傷害於人故言賊風也其傷人也但痛不可抑按不得動轉痛處體平無熱傷風冷則骨解深痛按之乃應骨痛但覺身體內凛凛冷欲得熱物熨痛處即小寛時有汗久而不去重遇冷風相搏乃結成瘰癧及偏枯遇風熱氣相搏乃變作附骨疽也出第一卷中

深師療賊風入腹五藏四肢心胷急痛背反寒咽乾口噤戴眼方此故是大續命湯藥分兩不同

麻黃三兩去節 石膏碎綿裹 當歸 芎藭

甘草炙 乾薑 桂心各二兩 黃芩一兩

杏人三十枚去兩人尖皮

右九味㕮咀以水酒各五升合煮取四升分爲四服忌海藻菘

菜生葱

又秦艽湯療賊風入腹槍心拘急四肢不隨腹滿欲死者方

桂心 防風 黃芩 乾薑

茱萸 秦艽 甘草各一兩炙

右七味切以水五升煮取一升半分再服湯令熱不差更作

忌海藻菘菜生葱

又竹瀝湯療大虛挾風及賊風入腹腹中拘痛煩亂恍惚忘悟迷

惑不知人口噤不開手足緩縱飲食不作肉卧驚見屋中光口乾

惡風時時失精夢寤沉重及婦人產後餘病體虛受風躁憒欲

死方

秦艽　甘草炙　防風　當歸各二兩

茵芋　烏頭炮　乾薑　細辛

人參　黃芩　桂心　天雄炮

木防巳　茯苓　白朮各一兩

右十五味切以竹瀝一斗半煑取五升隨病加後藥皆逆滿加前胡二兩半半夏二兩洗朮附子炮各一兩腹中痛加芍藥二兩椒一兩汗煩加知毋一兩口乾加麥門冬一兩去心體痺加麻黃二兩去節有方不用朮附子用半夏二兩忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜桃李雀肉酢物等

又大續命湯療毒風賊風身體不能自收不知痛處咽中卒不得語若拘急腰痛引頸目眩不得見風坐欲却倒覺即反張脊不著席脉動不安恍惚恐懼欲啼上氣嘔逆面腫方

杏人三十枚去雙人皮尖碎 芎藭 石膏碎綿裹 甘草炙

桂心 當歸 麻黄去節 乾薑

黄芩各一兩

右九味切以水六升酒三升合煑取三升分爲四服取微汗汗出粉之勿見風忌海藻菘菜生葱

又茵芋酒療賊風濕痺身體不能自動四肢偏枯火灸不熱骨節皆疼手足不仁皮中淫淫如有蟲行搔之生瘡癮瘮起手不得上頭頭眩瞋甚者狂走歷節腫及諸惡風悪主之方

茵芋 烏頭炮 天雄炮 石南

女葳 附子炮 躑躅花熬 秦艽

木防巳 防風各二兩

右十物㕮咀以絹囊盛之清酒三斗漬之夏三日春秋五日冬七日平旦服一合不知稍增之可至二合以意消息忌如

常法

又甘草湯療心腹絞痛賊風入腹脹滿拘急不得氣息并轉筋寒中下重温中止痛利大小便方

甘草炙　防風各一兩半　吴茱萸　乾地黄

芍藥　當歸　細辛　乾薑各一兩

右八味㕮咀以水五升煮取三升分再服忌海藻菘菜生葱菜蕪荑

又烏頭膏療賊風身體不隨偏枯口喎僻及傷風寒身彊直方

烏頭炮　冶葛各五兩去心　莽草一斤

右三味㕮咀以好酒漬令淹漸再宿三日漬之以不中水猪肪五斤煎成膏合藥作東向露竈以葦薪煎之三上三下藥成去滓有病者向火摩三千過汗出即愈若觸露鼻中塞對火摩頭頂鼻中即通藥不可令入口眼也並出第九卷中

千金療賊風所中腹内攣急方

麻黄四兩去節 甘草一兩炙切 石膏如雞子大碎之綿裹 鬼箭羽削團如雞子大

右四味以東流水二柸煑取一柸頓服之忌海藻菘菜

又大巖蜜湯主賊風腹中絞痛并飛尸遁疰發作無時發則搶心脹滿脅下如刀錐刺并主少陰傷寒方

甘草炙 乾地黄 細辛 乾薑

當歸 羊脂青羊脂更勝 桂心 茯苓

吴茱萸 芍藥各一兩 梔子十五枚擘

右十一味切以水八升煑取三升去滓内脂温分三服忌海藻菘菜生葱生菜蕪荑酢物深師同小品治中惡一方無桂心有防風

又烏頭湯主寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五藏拘急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方

烏頭十五枚炮 芍藥四兩 甘草二兩炙 大棗十枚擘

右六味切以水七升煑五物取三升去滓別取烏頭去皮四破

生薑一斤 桂心六兩

蜜二升微火煎令減五六合內湯中兩三沸去滓服一合日三

間食强人三合以如醉狀爲知不知漸增忌海藻菘菜猪肉冷

水生葱深師同

又倉公當歸湯主賊風口噤角弓反張身體强直方

當歸 細辛 防風各六分 獨活三分

麻黃十分去節 附子四分炮去皮

右六味切以清酒八升水四升合煑取四升分爲四服口不

開者挍口下湯一服當蘇再服小汗三服大汗忌猪肉生菜

廣濟同並出第八卷中

古今錄驗續命湯療中風賊風入腹角弓反張口噤舌不停目

視不見不能語舉身不仁或心腹絞痛方

甘草炙　黃芩各二兩　防風一兩半　生薑五兩

人參　芎藭　芍藥　麻黃去節

木防巳各一兩　大附子一枚炮

右十味切以水一斗二升煑取三升分爲三服一日令汗可

服三劑不令人虚本方有十三味見藥止有十物忌海藻豬

肉菘菜冷水魚出第十卷中

歷節風方一十首

病源歷節風之狀短氣白汗出歷節疼痛不可忍屈伸不得是

也由飲酒腠理開汗出當風所致亦有血氣虚受風邪而得之

者風歷關節與血氣相搏交擊故疼痛血氣虚則汗出風冷搏於

筋則不可屈伸爲歷節風也出第二卷中

深師大風引湯療男女歷節風大虚手脚曲戾或變狂走或悲笑

言語錯亂無所不療方

茯苓　防風　當歸　白前

乾薑　甘草炙各二兩　大豆一升　生薑

獨活各三兩　遠志去心　附子炮　人參各一兩

大棗三十枚

右十三味切先以水一斗五升煮豆棗取一斗去滓內諸藥煮取三升分爲五服忌海藻菘菜猪肉醋物蕪荑生菜等

出第九卷中

千金論曰夫歷節風著人久不療者令人骨節蹉跌變成癲病不可不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也療之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不療但於痛處灸三七壯佳又防己湯療風歷節四肢疼痛如搥鍜不可忍者方

防己　茯苓　白朮　桂心

生薑各四分　人參二兩　烏頭七枚炮　甘草三兩炙

右八味切以苦酒一升水一斗合煑取三升半一服八合日三夜一當覺熱痺忽忽然愼勿怪也若不覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黒乃堪用不然至毒人宜愼之忌醋物桃李雀肉生葱猪肉冷水海藻菘菜古今錄驗同

又大棗湯療歷節疼痛方

大棗十五枚擘　黄耆四兩　附子一枚炮　生薑二兩

麻黄五兩去節　甘草一尺炙

右六味切以水七升煑取三升服一升日三忌猪肉冷水海藻菘菜古今錄驗同

又療歷節諸風百節酸疼不可忍方

松脂三十斤鍊五十遍不能五十遍二十遍亦可用

右一味以鍊蘇三升温和松脂三升熟攪令極調旦空腹以

酒服方寸匕日三數數食麪粥爲佳愼血腥生冷酢物果子一
百日差
又松節酒主歷節風四肢疼痛猶如解落方
松節 四十斤細剉以水四石煑取一石　猪椒葉 四十斤細剉以水四石煑取一石
右二味澄清合漬乾麴五斗候發以糯米四石五斗釀之依
家醞法四酘勿令傷冷熱第一酘時下後諸藥
栢子人 五兩　磁石 十二兩末　獨活 十五兩　天雄 五兩炮
茵芋 四兩炙　防風 十兩　秦艽 六兩　芎藭 五兩
人參 四兩　萆薢 五兩
右十味細切内飯中炊之下酘爲地酘足訖封頭四七日押
取清適性服之勿令至醉吐忌猪肉冷水
又方
松膏一升擣酒三升浸七日服一合日再數劑即愈

又方

松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六並出第八卷中

延年療歷節風四肢頭面腫方

黃耆十二分 獨活八分 生地黃切三升暴乾 豆豉一升熬

鼠粘子三升暴乾

右五味擣篩爲散一服方寸匕飲汁下日二服加至二三匕忌蕪荑蒜麪猪肉一方無鼠粘子

又療歷節風流入腰脚方

獨活六兩 玄參四兩 犀角屑 升麻各三兩

生地黃切三升暴乾 豉三合熬 鼠粘根切三升暴乾

右七味擣篩爲散服方寸匕飲汁下日二服加至二三匕忌蕪荑蒜麪並出第十卷中

古今錄驗防風湯主身體四肢節解疼痛如墮脫腫按之皮急一作陷頭眩短氣溫溫悶亂如欲吐方

防風 桂心 知母各四兩 白朮

生薑各五兩 芍藥 甘草各三兩炙 附子二枚炮

右八味切以水一斗煮取三升分爲三服忌生葱猪肉海藻菘菜桃李雀肉等出第四卷中千金有半夏杏人芎藭爲十味無附子

中風角弓反張方七首

病源風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也出第一卷中

肘後療中風無問男子婦人中風脊急身痓如弓紫湯方

雞屎二升 大豆一升 防風三兩切

右三味以水三升先煮防風取三合汁豆雞屎二物鎗中熬之令黃赤色用酒二升淋之去滓然用防風汁和分爲再服

相去如人行六七里衣覆取汗忌風出第二卷中

小品大巖蜜湯療中風身如角弓反張并主卒心腹絞痛方

茯苓　芎藭　當歸　甘草各一兩炙

桂心二兩半　梔子十四枚擘　吴茱萸三兩　細辛

乾薑　乾地黄各二兩

右十味切以水八升煮取三升分爲三服相去如行十里頃若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黄三兩忌酢生葱生菜海藻菘菜蕪荑等出第四卷中

千金小巖蜜湯主惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絶往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

大黄二兩　雄黄一兩　青羊脂　乾薑

桂心　芍藥　甘草炙　細辛

活

乾地黃（各四分） 吳茱萸（三兩） 當歸（四兩）

右十一味切以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水三斗煮取九升分十服忌海藻菘菜生葱生菜深師同

又療半身不隨手足拘急不得屈伸體冷或智或癡身彊直不語或生或死狂言不可名字角弓反張或欲得食或不用食大小便不利方

人參 桂心 當歸 獨活

黃芩 乾薑（各三分） 甘草（二分炙） 石膏（六分碎綿裹）

杏人（四十枚去皮兩人尖碎）

右九味切以井華水九升煮取三升分二服日二覆取汗不汗更合服之忌海藻菘菜生葱等

又療賊風口噤角弓反張痓者方

當歸 防風（各三分） 獨活（六分） 麻黃（去節五分）

附子一枚炮 細辛二分

右六味切以酒五升水二升煮取三升服一升口不開尺校口下湯一服當開二服小汗三服大汗又單服荆瀝忌猪肉冷水生菜並出第八卷中

備急療若身體角弓反張四肢不隨煩亂欲死者方

清酒五升 雞屎白一升熬

右二味擣篩合和楊之千遍乃飲之大人服一升小兒服五合更小者服三合良肘後同出第二卷中

必效療風入耳角弓反張及婦人風方

烏豆二升熬令聲絶酒三升內鐺中急攪以絹濾頓服取汗不過三劑極重者和雞糞合熬若口不開者灌之良備急文仲同出第三卷中

古今録驗療卒中風身體直角弓反張口噤西州續命湯方

麻黄去節　乾薑各三兩　附子炮一兩　防風
桂心　白术　人參　芎藭
當歸　甘草炙各一兩　杏人四十枚去皮尖及兩人碎
右十一味切以水九升煑取三升未食分再服覆令汗出文
仲同出第一卷中

風口噤方一十首

病源諸陽經筋皆在於頭三陽之筋並絡入於頷頰夾於口諸
陽爲風寒所客則筋急故口噤不開診其脉遲者生出第一卷中
深師竹瀝湯療卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥方
淡竹瀝一升　防風　葛根各二兩　菊花
細辛　芍藥　白术　當歸
桂心　通草　防巳　人參各一兩
甘草炙　附子炮　茯苓　玄參各一兩

秦艽　生薑各二兩　楓寄生三兩

右十九味切以淡竹瀝一斗煑藥取四升分爲四服忌海藻菘菜猪肉生菜生葱醋桃李雀肉等

又甘竹瀝湯療卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥尸蹷死不識人閉目灸鍼不知痛風狂宜服此湯方

甘竹瀝一斗　生薑三兩　防風　甘草炙各三兩

防巳　麻黄去節　人參　黄芩

白术　細辛　茵芋　秦艽

桂心各一兩　附子一枚大者炮

右十四味㕮咀以湯漬藥令赤合竹瀝煑取四升分爲四服忌海藻菘菜桃李雀肉生葱生菜猪肉冷水並出第十九卷中

千金排風湯主諸毒風氣邪風所中口噤悶絶不識人身體疼煩

面目暴腫手足腫方

犀角末　羚羊角　貝齒末　升麻末

右四味各一兩和勻以方寸匕爲一分水二升半內四匕煑取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子傅上日三老小以意亦可多合用之深師同

又療中風口噤不能言者方

防巳三兩　葛根三兩　桂心　麻黃去節各二兩

甘草炙　防風　芍藥各一兩　生薑四兩

右八味切以水六升煑取二升八分爲三服瘖不能言皆療忌海藻菘菜生葱

又方

服淡竹瀝一升

又方

白朮四兩切　酒二升

右二味合煮取一升頓服之忌桃李雀肉

又方

服荊瀝一升

又方

豉五升綿裹 吴茱萸一升

右二味以水七升同煮取三升漸漸飲之並出第八卷中

備急陶隱居効驗方療人卒中風口不開身不著席大豆散方

大豆二升熬令焦 乾薑 椒汗各三兩

右三味爲散酒服一錢匕日一汗出即差大良文仲同

又方

若口噤不開大豆五升熬令黄黑以五升酒漬開口灌之取汗肘後同並出第二卷中

風口喎方九首

病源風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則筋急引頰故使口喎
僻言語不正而目不能平視診其脉浮而遲者可療養生方云
夜卧當耳勿得有孔風入耳中喜口喎出第一卷中

廣濟療風著口面喎語不多轉方

生地黃汁一升　竹瀝一升　獨活三兩切

右三味相和煎取一升頓服之未正更進藥一劑無所忌出
第一卷中

深師續命湯療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參　木防已　麻黃去節　芍藥

芎藭　甘草炙　黃芩　白术各一兩

桂心　防風各二兩　大附子一枚炮　生薑五兩

右十二味切以水一斗二升煑取三升分爲三服不差復作忌
海藻菘菜猪肉生葱桃李雀肉

又療中風面目相引偏僻牙車疼急舌不得轉方

牡蠣熬　礬石燒令汁盡　附子炮　竈中黃土

右四味分等擣篩以三歲雄雞冠血和藥傅其急上須時鑒及水著邊照繞故欲復故便洗去血不速去便過不復還也肘後范汪同出第九卷中

千金附子散主中風手臂不仁口面喎僻方

附子炮　桂心各五兩　細辛　防風

人參　乾薑各六兩

右六味擣下篩酒服方寸匕日三稍稍增之忌猪肉冷水生葱生菜

又口喎不正方

取空青如豆一枚含之即愈范汪同

又療卒中風口喎方

又方

以葦筩長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪蜜塞之勿令泄氣一頭内大豆一顆并艾燒之令然灸七壯即差患右灸左患左灸右千金不傳

又方

灸手交脉三壯左灸右右灸左其煙如鼠矢形横安之兩頭放火也

又方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服之

又方

大皂莢五兩去皮子下篩以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更塗並出第八卷中

風失音不語方八首

病源喉嚨者氣之所以上下也會厭者聲之户舌者聲之機脣

者聲之扇也風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂風失音不語養生方云醉臥當風使人發瘖出第一卷中

廣濟療風失音不得語方

羌活十分　甘草炙　人參二分　大附子一枚炮八破

荆瀝　竹瀝　生地黄汁各二升

右七味切諸藥內三汁中煎取一升六合去滓分温二服未差四五日更進一劑取微利忌熱麪海藻菘菜猪肉冷水蕪荑魚蒜粘食出第一卷中

深師防風湯療中風兩目不開不能言短氣欲死方

防風　甘草炙　黄芩　茯苓

當歸各一兩　杏人五十枚去兩人尖皮　秦艽半兩　生薑五兩

乾棗三十枚擘　麻黄二兩去節

右十味㕮咀以清酒水共四升煮取三升分三服發汗忌海藻

菘菜大酢
又四逆湯療卒中風不能言厥逆無脉手足拘急者方
山茱萸 細辛 乾薑一兩炙 甘草三兩炙
麥門冬一升去心
右五味切以水七升煑取二升分爲四服忌海藻菘菜生葱
菜出第九卷中
肘後療卒不得語方
以苦酒煑芥子薄頸一周以衣苞之一日一夕乃解即
差范汪千金同
又方
煑大豆煎其汁令如粭含之亦但濃煑飲之并出第
一卷中范汪同
千金厥失音論曰風寒之氣客於中滞不能發故瘖不言及喉

痺失聲皆風邪所爲也入藏皆能殺人凡尸蹷如死脉動如故陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也療之方

取竈突墨彈丸大漿和飲之

又方

濃煑桂汁服之一升覆取汗亦可末桂著舌下漸嚥汁

忌生葱范汪同

又方

濃煑豉汁含之亦佳並出第八卷中

風不得語方二首

病源脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二藏受風邪故舌彊不得語也出第一卷中

救急療中風身體緩急口目不正舌彊不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛湯方

麻黃去節 防已 黃芩 桂心

芍藥 甘草各一兩炙 防風 人參各六分

附子一枚炮 生薑二兩

右十味切以水九升先煑麻黃三沸去沫內諸藥煑取二升五合去滓空服分爲三服服別相去十里能年別服十劑諸風悉愈禁生冷及風勞酒出第六卷中千金有芎藭杏人爲十二味

古今錄驗療卒不得語方

取人乳汁半合以著美酒半升中合攪分爲再服肘後范汪同出第十卷中

風身體手足不隨方二首

病源風身體手足不隨者由體虛腠理開風氣傷於脾胃之經絡也足太陰爲脾之經脾與胃合足陽明爲胃之經爲水穀之海也脾候身之肌肉主爲胃消行水穀之氣以養身體四肢脾氣弱則肌肉

竅正

虚受風邪所侵故不能爲胃通行水穀之氣致四肢肌肉無所稟受而風邪在經絡搏於陽經氣行則遲關機緩縱故令身體手足不隨也診其脉脾脉緩者爲風痿四肢不用又心脉腎脉俱至即難以言九竅不通四肢不舉腎脉來多即死也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云極力左右振兩臂不息九通愈臂痛勞倦風氣不隨振兩臂者更互踶蹀猶言蹷九通中間偃伏皆爲之名蝦蟇行氣不已愈臂痛勞倦風氣不隨患久行不覺痛癢作種種形狀又云偃卧合兩膝布兩足生腰口內氣振腹七息除壯熱疼痛兩脛不隨又云療四肢疼悶及四肢不隨腹內積氣牀席必須平而且穩正身仰卧緩解衣帶枕高三寸握固握固者必兩手各自以四指把手拇指舒臂令去身各五寸兩脚立指相去五寸安心定意調和氣息莫思餘事意專念氣徐徐漱醴泉漱醴泉者以舌舐略脣口牙齒然後咽唾

徐徐以口吐氣鼻引氣入喉須微微緩作不可卒急彊作待好調和引氣吐氣勿令自聞出入之聲每引氣心心念送之從脚指頭使氣出引氣五息六息一出之爲一息數至十息漸漸增益能至百息二百息病即除愈不用食生菜及魚肥肉大飽食後喜怒憂恚不得輙行氣唯須向曉清靜時行氣佳能愈萬病出第一卷中

千金療心虛寒性氣反常心手不隨語聲冒昧其所疾源厲風損心白朮釀酒補心志定氣方

白朮切 地骨根皮 荆實各五升 菊花三升

右四味切以水三石煑取一石五斗去滓澄清取汁釀米兩石用麴如常法以酒熟隨多少能飲常取小小半醉忌桃李雀

第八卷中

古今錄驗小續命湯療中風入藏身緩急不隨不能語方

麻黃去節 桂心各三兩 甘草炙 人參
芍藥 芎藭 黃芩 防風
當歸 石膏各二兩碎綿裹 白朮一兩 生薑五兩
附子二枚炮 杏人三十枚去皮尖兩人

右十四味切以水一斗煮取三升分三服若不差可服三四劑一方石膏三兩忌海藻菘菜生葱桃李猪肉出第四卷中

風半身不隨方八首

病源風半身不隨者脾胃氣弱血氣偏虛爲風邪所乘故也脾胃爲水穀之海水穀之精化爲血氣潤養身體脾既弱水穀之精潤養不周致血氣偏虛而爲風邪所侵故半身不隨也診其脉寸口沈細名陽中之陰苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出臂偏不舉又寸口偏絕者則不隨其兩手盡絕者不可療出第一卷中

深師療風半身不隨口不能言十物獨活湯方

獨活四兩 桂心五兩 生葛根八兩 甘草炙

防風 當歸各二兩 生薑十兩 芍藥

附子一兩炮 半夏一升洗

右藥切以水一斗煮取三升分為三服日三大驗忌海藻菘菜

生葱猪肉羊肉餳出第九卷中

千金療卒暴風口面僻半身不隨不轉竹瀝湯方

竹瀝三升 防風 防已 升麻

桂心 芎藭 羚羊角各二兩屑 麻黃四兩去節

右八味切以水四升合竹瀝煮取二升半分為三服三日服

一劑常用廣濟同集驗無羚羊角餘同忌生葱

又療心虛寒風半身不隨骨節離解緩弱不用便利無度口面喎

斜薑附湯方

乾薑 附子各八兩炮 麻黃去節 芎藭

蠶

桂心各四兩

右五味切以水九升煮取三升分三日一劑崔氏同忌猪肉生葱冷水

又療大風半身不隨方

蠶沙兩石

右一味熟蒸作直袋三枚各受七斗即熱盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數數换百不禁差止須羊肚釀粳米葱白薑豉椒等爛煮熟噉日食一枚十日止千金不傳並出第八卷中

古今録驗療大痺一身不隨或半身一手一臂口不能言習習不知人不覺痛癢續命湯方

麻黄三兩去節　防風二兩　石膏碎綿裹　黄芩

乾地黄　芎藭　當歸　甘草炙各一兩

杏人四十枚去皮尖雙人　桂心二兩

右十味㕮咀以水一斗煑取四升服一升日再服之當汗出氣下自覆當慎護風寒不可見風幷療上氣欬逆面目大腫但得伏不得卧更善忌海藻菘菜生葱蕪荑

又獨活湯療風半身不隨口不能語方

獨活四兩　生葛根半斤　芍藥三兩　防風二兩

半夏一斤洗　桂心五兩　當歸　附子炮

甘草炙各二兩　生薑十兩

右十味切以水一斗五升煑取三升服一升日三一方去半夏用麻黃三兩去節忌羊肉餳生葱海藻菘菜猪肉冷水等

又八風續命湯療半身不隨手脚拘急不得屈伸體冷或癡或智身彊直不語或生或死狂言不可名狀或角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利皆療之方

麻黃八分去節　人參　桂心　當歸

獨活　甘草炙各三兩　石膏六分碎綿裹　黄芩
乾薑各三分　杏人四十枚去尖兩人
右十味切以井花水九升煑取三升分爲三服日二覆令汗汗解食白糜愼風不汗復更服唯汗得差忌生葱海藻菘菜
又八風九州湯療男子婦人寒冷不自愛護當風解衣汗出卧冷濕地半身不隨手足苦冷或不隨或俛仰屈伸難周身淫淫痺四肢不收狀如風狂飲食損少方
麻黄四兩去節　甘草炙　乾薑　附子炮
防風　獨活各三兩　石膏綿裹　茯苓
白朮　芎藭　柴胡　當歸
人參各二兩　杏人四十枚去皮尖兩人　細辛二兩
右十五味切以水一斗清酒五升漬三夜煑取四升分爲三服一日令盡若病人羸瘦者用水煎服藥訖厚覆當汗出微微去

上衣汗解以粉粉之忌生菜海藻菘菜酢桃李豬肉雀肉並出第四卷中

癱瘓風方四首

廣濟療癱瘓風及諸風手足不隨腰脚無力方

驢皮膠五兩炙令微起

右一味先煑葱豉粥一升别貯又香淡豉二合以水一升煑豉去滓内膠更煑六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如喫令人嘔逆頓服三四劑即止風並差忌熱麪炙肉豬魚蒜

又療熱風癱瘓常發者方

羌活二斤　穀子一升五合水中取沈者

右二味擣篩爲散酒服方寸匕日三服稍加之無忌並出第一卷中

文仲療癱瘓風方

生地黄汁　淡竹瀝　荆瀝各一升　防風四分

獨活八分　附子一枚中形正者炮

右六味切三味以和地黄等汁煮取半升去滓空腹分再服取煖隔日一劑若虛三日一劑服可絶根大神驗備急同忌猪肉蕪荑出第八卷中

元侍郎希聲集療癱瘓風神驗方

側子一兩去皮　五加白皮四兩　磁石一斤碎綿裹　甘菊花一升

漢防已　羚羊角屑　杏人去皮尖各三兩　乾薑一方作乾葛

芍藥　麻黄去節各四兩　薏苡人一升　防風

芎藭　秦艽　甘草炙各一兩

右十五味切以水一斗二升煮麻黄去上沫内諸藥煎取三升分温三服相去十里久將息取汗訖傅粉勿當風慎熱物及

猪魚蒜酒出第一卷中

風痱方三首扶非切又步罪切

病源風痱之狀身體無痛四肢不收神智不亂一臂不隨者風痱也時能言者可治不能言者不可治也出第一卷中

千金療風痱方風痱者卒不能語口噤手足不隨而不彊直是也方

伏龍肝五升末　冷水八升和攪取其汁飲之能盡佳范汪同兼主中惡出第八卷中

古今錄驗西州續命湯療中風痱身體不自收口不能語冒昧不識人不知痛處但拘急中外皆痛不得轉側悉主之方

麻黃六兩去節　石膏四兩碎綿裹　桂心　當歸

甘草炙各二兩　芎藭　乾薑　黃芩各一兩

杏人四十枚去皮尖兩人

并

右九味切以水一斗九升先煑麻黃再沸吹去沫後下諸藥煑取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠也可卧厚覆小小汗出已漸漸減衣勿復大覆不可復服矣前服不汗者更服一升汗出即愈汗後稍稍五合一服飲食如常深師胡洽集驗文仲肘後千金同唯忌生葱海藻菘菜

又續命湯治中風痱身體不能自收口不能言冒昧不知人不知痛處或拘急不得轉側姚云與大續命同兼療產婦大去血者及老人小兒方

甘草炙　桂心　當歸　人參

石膏碎綿裹　乾薑各二兩　麻黃三兩去節　芎藭一兩

杏人四十枚去皮尖兩人

右九味㕮咀以水一斗煑取四升服一升當小汗薄覆脊憑机坐汗出則愈不更服無所禁勿當風并療但伏不得卧逆

上氣面目洪腫忌海藻菘菜生葱范汪方主病及用水升數
煮取多少並同汪云是仲景方本欠兩味出第八卷中

偏風方九首

病源偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏虛者風邪乘虛而傷之故爲偏風也其狀或不知痛癢或緩縱或痺痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云一手長舒合掌一手捉頦挽之向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側勢急挽之二七去頭骨急彊風腦旋喉痺膊內冷注偏風又云一足蹹地一手向後長舒努之一手捉湧泉急挽足努手挽一時極勢左右換易二七去上下偏風陰氣不和出第一卷中

廣濟療偏風麻子湯方

大麻子一升淨擇水漬一宿 麻黃去節 防風 生薑

橘皮　荆芥　芎藭各三兩　桂心二兩

石膏五兩碎綿裹　竹葉洗　葱白各一握　豉心一合

蜀椒三十枚汗去目　杜仲五兩　獨活四兩

右十五味切以水二斗煮麻子令牙出去滓取一斗先煮麻黄三沸去沫內諸藥煎取三升去滓空腹頓服之令盡覆取汗以粉粉身勿衝風此藥補必不虛人亦不利有患風疢及大風者不過三四劑忌生葱生菜熱麪蕎麦猪魚笋一切陳臭物

又療偏風不隨服補麻子湯後次服枳實丸方

枳實炙　防風　羌活　人參

羚羊角各六分屑　甘菊花　乾葛　薏苡人

桂心各四分　茯苓　升麻　黄連

乾地黄各八分

右十三味擣下篩蜜和爲丸以酒空腹服如梧子二十丸加

各五六

至三十九日再忌生葱酢物猪肉冷水蕪荑生菜熱麪蒿麥雞魚蒜笋陳臭物並出第一卷中

千金甘草湯療偏風積年不差手脚枯細口面喎僻精神不足言語到錯方

甘草炙　桂心　芎藭　麻黄去節

人參　當歸　芍藥各兩　獨活三兩

秦艽一兩半　茯神　生薑各四兩　防風一兩半

附子炮　側子炮各二枚　白朮　黄芩

細辛各一兩　甘菊花一升　淡竹瀝四升

右十九味切以水一斗煮麻黄去沫取汁七升内諸藥并瀝和煮取三升分爲四服前三服訖間一盃粥更後服待藥勢自汗忌海藻菘菜桃李雀肉猪肉冷水生葱大酢物等

又方

青松葉一斤擣令汁出清酒一斗漬二宿近火一宿
初服半升漸至一升頭面汗即止並出第八卷中

備急徐王療偏風半身不遂兼失音不語方

取杏人生吞不去皮尖日別從一七漸加至七七周而
復始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取盡文
仲同出第二卷中

延年療偏風半身不遂冷痺疰等方

桃人一千七百枚去兩人尖皮以好酒一斗三升並大
升斗浸經二十一日出桃人暴乾擣令極細堪作丸即
止日別再服服別三十丸還將浸桃人酒服之禁食猪
肉蒼耳餘並不禁

又小續命湯療偏風半身不遂口眼喎不能言語拘急不得轉側方

麻黃去節　防已　附子炮去皮　芎藭

桂心　黃芩　芍藥　人參

甘草炙各一兩　杏人四十枚去皮尖兩人　生薑四兩切　防風一兩半

右十二味切以水八升煑取二升六合分爲三服隔五日更服頻進十劑病不愈乃至二十劑忌海藻菘菜生葱猪肉冷水並出第十二卷中

又急療偏風膈上風熱經心藏恍惚神情天陰心中惛惛如醉不醉方

淡竹瀝三升若熱多用竹瀝冷多用荆瀝　羚羊角二分屑　石膏十分碎綿裹

茯神六分切

右四味以水一升合竹瀝煑取一升五合去滓食後欲消分爲三服常能服之永不畏風發忌酢物經心錄文仲同

又方

生附子一兩　無灰酒一升

右二味㕮咀附子内酒中經一七日隔日飲之一小合有病出無所恠特忌猪肉生冷醋滑並出第一卷中

風猥退方三首

病源風猥退者四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰脚緩弱不自覺知是也皮肉薄弱不勝四時之虛風故令風邪侵於分肉之間流於血脉之内使之然也經久不差則變成風水之病出第一卷中

千金療猥退半身不隨失音不語方

杏人三升去兩人者及尖皮洗曰擣二升令碎研如寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香滑即熟乃止爲不熟唯熟爲佳停極冷然後内好麴一升炊時以前所留一升杏人内取四升擣下水一斗六升煎取八升第一遍醱也次一炊復取杏人三升研取一斗二

升汁煎取六升第二酘也次一炊準第二酘取杏人汁多少爲第三酘也疑米不足別更取二升杏人研取八升煎取四升更斟酌炊米酘若猶不足研杏人二升取八升汁煎取四升更酘之以熟爲限一石米杏人三斗所以節次研杏人者恐併煎汁酘故也若冬日任意併煎準計三斗杏人取一石六斗煎取八斗四升漬麴以外分之酘醸酒熟封四七日開澄取清然後押糟糟可乾末和酒服之大驗

又方

萆麻子脂一升　酒一升

右二味銅鉢盛著酒中一日煑之令熟服之並出第八卷中

千金翼療猥退風方

蒼耳子五升苗亦得　羊桃二升切　蒴藋切　赤小豆各二升半

鹽廾一

右五味以水兩石五斗煑取五斗適寒温内所患之脚漬深至絶骨勿過之一度炊二斗米頃出之慎風冷汗從頭出出第八卷中

風嚲曳及攣躄方二首

病源風嚲曳者肢體弛緩不收攝也人以胃氣養於肌肉經脉也胃若衰損□實氣不實則經脉虚經脉虚則筋肉懈惰故風邪搏於筋而使嚲曳也出第一卷中

范汪療中風躄不能起逐水消食平胃下氣方

百部四分　烏頭炮　牛膝　白朮各一分

右四味擣下篩以酒服方寸匕日三稍增可至三匕良忌猪肉冷水桃李出第二十卷中

古今録驗療風懿不能言四肢不收手足嚲攣獨活湯方

獨活（四兩） 生薑（六兩） 甘草（炙） 桂心

生葛根 芍藥 栝樓（各二兩）

右七味㕮咀以水五升煮取三升服一升日三忌海藻菘菜生葱出第四卷中

柔風方二首

病源血氣俱虚風邪並入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀皮外緩腹裏急四肢不能自收裏急不得仰息者柔風候也出第一卷中

深師療柔風體疼白汗出石膏散方

石膏（二兩研） 甘草（一兩炙）

右二味擣篩爲散以酒服方寸匕可以七服武家黄素方出第九卷中

古今録驗療中柔風身體疼痛四肢緩弱欲不隨獨活葛根

湯產後中柔風亦用此方

羌活　桂心　乾地黃　葛根

芍藥各三兩　生薑六兩　麻黃去節　甘草炙各二兩

右八味切以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日三范

汪同忌生葱蕪荑海藻菘菜出第八卷中

許仁則療諸風方七首

許仁則療諸風病方此病多途有失音不得語精神如醉人手足俱不得運用者有能言語手足不廢精神昏恍不能對人者有不能言語手足廢精神昏亂者有言語手足精神俱不異平常而發作有時每發即狂言浪語高聲大叫得定之後都不自醒者有諸事不異尋常發作有時每發即狂走叫喚者有時每發即作牛羊禽獸聲醒後不自覺者有諸事不異尋常發作有時發即頭旋目眩頭痛眼花心悶輒吐經久方定者有諸事不異平

常發作有時毎發即熱頭痛流汗不能自勝舉者此等諸風形候雖别尋其源也俱失於養生本氣既羸偏有所損或以男女或以飲食或以思慮或以勞役既極於事能無敗乎當量巳所歸而捨割之静思息事兼助以藥物亦有可復之理風有因飲酒過節不能言語手足不隨精神昏恍得病經一兩日宜合生葛根等三味湯服之方

生葛根一挺長一尺徑三寸　生薑汁一合　竹瀝二大升如不可得宜用筋竹根一大斤切以水一大斗緩火煎取二大升以代竹瀝如竹根不可得以筋竹葉細切一大升以水一大斗如上法煎取二大升以代竹瀝如無竹葉宜細切桑條一大升以水一大斗煎取二大升代之

右藥先取生葛根淨洗刷便擣極碎且空搾取汁令盡訖又擣即以竹瀝汲灑極搾取汁汁盡又擣汲灑不限遍數以葛根粉汁盡爲度用生薑汁綿濾之細細緩服之不限遍數及食前食後如覺服内轉作聲又似痛即以食後温服之如此經七

日以後服附子等十味湯

又附子湯方

附子二枚共秤重一兩半者炮　生薑　乾薑各三兩　桂心一兩

石膏六兩碎綿裹　生犀角屑　地骨白皮　白朮

獨活　芎藭各二兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓分温三服服相去如人行十里久服服湯後如覺欲汗少覆之令汗出須臾歇汗後以藥末粉身其湯須服五六劑間三四日服一劑其方一劑後量患進退臨時加減藥物熱多加生麥門冬一兩去心冷多加桂心一兩有氣加當歸二兩不能食加人參三兩大便澁加檳榔七枚合皮子用之忌猪肉生葱桃李雀肉等

又療風熱未退服湯日數未滿病後未堪服丸宜合薏苡人等十二味飲服之方

薏苡人一升　葳蕤五兩　生麥門冬二兩去心　石膏八兩碎綿裹
杏人六兩去尖皮兩人碎　烏梅四十枚擘　生薑八兩　生犀角屑
地骨皮各三兩　人參二兩　竹瀝一升　白蜜二合
右藥切以水一斗煮十味取三升去滓內竹瀝白蜜攪調細細飲之不限冷煖及食前後若熱多即食前冷飲冷多即食後煖飲如服丸藥以飲送彌佳

又療風熱未退頻服湯飲力不能攻宜合苦參十二味丸服之方
苦參　乾薑　芎藭各六兩　玄參
丹參　人參　沙參　白朮各五兩
地骨白皮　獨活各四兩　薏苡人二升　蜀升麻二升
右藥擣篩蜜和爲丸用薏苡人飲下之初服十五丸日再服稍稍加至三十丸如梧子大若覺冷即去玄參沙參加桂心四兩細辛三兩若覺熱別加十兩生地黃若覺有痛處去

沙參加當歸六兩若覺有氣去玄參加橘皮四兩若大便澁
加大檳榔人二十枚忌桃李生葱生菜蕪荑
又至九月以後二月以前宜合五加皮等八味藥酒細細用下前
丸飲之方
五加皮　薏苡人　大麻人熬各五升　丹參五兩
生薑　生地黃各四斤　桂心五兩　大豆一斗熬
右藥切以絹袋盛用無灰清酒六斗浸六七日細細取下前
丸初服一二合再服稍稍加至五六合能至一升亦佳忌生
葱蕪荑
又預防熱病急黃賊風乾葛散方
乾葛　乾地黃各三斤　新香豉心一升
右三味暴令乾擣篩爲散每食後服一方寸匕日再服稍稍
加至三匕牛乳蜜湯竹瀝粥飲梅漿任意下之

又依前乾葛等三味散服之雖覺熱氣少退終未能頓除宜合黄連等八味散服之方

黄連　黄芩　乾薑　蜀升麻

知母　乾地黄各一兩　梔子人　大青各半兩

右藥擣篩爲散每食後飲服一方寸匕日再服稍加至二匕若能食飲適寒温男女節勞逸候體氣服前方乃至終身無熱病急黄暴風之慮忌猪肉冷水蕪荑並出上卷中吴昇同

張文仲療諸風方九首

元侍郎希聲集張文仲方九首奉勑語張文仲等諸患風氣醫人處方多不同可共諸名醫修一本進來仍令殿中監王方慶專勾當且文仲言曰准勑諸名醫集諸方爲一卷風有一百二十種氣有八十種風則大體共同其中有人性各異或冷或熱庸醫不識藥之行使或冬藥夏用或秋藥冬用多殺人唯脚氣頭

風大風上氣此四色常須服藥不絶自餘諸患看發即依方喫
藥夫患者但春夏三四月秋八九月取利一行甚妙臣所進此方
不問四時皆得服輕者服小方重者服大方藥味雖同行使殊
別謹上如後

桑枝煎療偏風及一切風方

桑枝（剉一大升不用全新嫩枝）

右一味以水一大斗煎取二大升夏月井中沉恐酢壞每日
服一盞空腹服盡又煎服若豫防風能服一大升終身不患
偏風無忌

又療風飲子方

羌活（三兩） 桂心（二兩半） 人參（一兩） 蜀升麻
茯神 防風 生薑（合皮切） 生犀角（屑各二兩）

右八味切以水一大升煮取二大合八分溫三服如熱下竹瀝一盞

一無禁忌唯忌生葱酢

又文仲云四時俱服神方十九味丸

防風　羌活　五加皮　芍藥

人參　丹參　薏苡人　玄參

麥門冬去心　乾地黃　大黃　青木香各六分

松子人　磁石各八分研　檳榔子十分　枳實炙八分

牛膝八分　茯神八分　桂心八分

右十九味擣篩蜜和爲丸如梧子以酒服十五丸日再服稍稍加至三十丸爲度忌猪肉魚蒜生葱酢蕪荑

又療一切風及偏風發四肢口目喎戾言語謇澀其湯不虛人勝於續命湯故錄傳之特宜老人用之方

生地黃汁　竹瀝　荊瀝以上三味汁各取一升五合

羌活　防風各二兩　蜀附子大者一枚生用去皮八九破重一兩者有神

右六味切內前三瀝汁中寬火煎取一升五合去滓溫分二服服別相去八九里風甚頻服五六劑驗不可論特宜老小等無問冬夏並同服之無忌隔三日服一劑至益佳忌豬肉蕪荑

又煮散方

茯神六兩 防風 牛膝 枳實炙

防已 秦艽 玄參 芍藥

黃耆 白鮮皮 澤瀉 獨活各四兩

桂心三兩 五味子一升碎 人參四兩 薏苡人一升碎

麥門冬一兩去心 羚羊角二枚屑 石膏一斤碎綿裹 甘草三兩炙

磁石二十四兩綿裹

右二十一味切如麻豆分作二十四貼每日取一貼著杏人十四枚去尖皮兩人者碎以水三升煮取一升去滓空腹頓服每

春中夏初服禁生冷忌醋生葱海藻生菜

又療一切風乃至十年二十年不差者方

牛蒡根（細切一升）　生地黃（細切）　牛膝（細切）　枸杞子（微碎各三升）

右四味取無灰酒三升漬藥以踈絹袋盛之春夏一七日秋冬二七日每服皆須空腹仍須稍稍令有酒色

又寒水石煑散方

寒水石　石膏　滑石　白石脂

龍骨（各八兩）　桂心　甘草（炙）　牡蠣（各三兩熬）

赤石脂　乾薑　大黃（各四兩）　犀角（一兩屑）

右十二味擣以馬尾羅篩之將皮囊盛之急繫頭挂著高涼處欲服以水一升煑五六沸內方寸匕藥煑七八沸下火澄清瀉出頓服服之每日服亦得百無所忌小兒服之即以意斟酌多少忌生葱海藻菘菜

又五粒松酒方以冬十月以去服

五粒松葉七斤並大片　麻黃七兩去節　防風　黃耆

獨活　秦艽各二兩　牛膝四兩　生地黃一斤

芎藭二兩

右九味切以無灰清酒四大斗漬春七日冬二十日夏五日日別二三度服服別大合四合以來忌如藥法

又釀酒法

糯米一斗　麴一升半　防風半斤切　蒼耳子三升

右四味以水八升煎取六升米麴一時拌於瓷器中盛煖著一周時即熟若須重釀任情覺冷加五味子一升並出上卷中

外臺秘要方卷第十四

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺秘要方　十五

風狂及諸風下

外臺秘要方卷第十五 風狂及諸風下二十四門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

風狂方九首

病源風狂者由風邪入并於陽所爲也風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并氣并於陽則爲狂發則欲走或自高賢稱神聖是也又肝藏䰟悲哀動中則傷䰟䰟傷則狂妄不精不敢正當人而筋攣兩脅骨不舉毛悴色夭死于秋皆由血氣虛受風邪致令陰陽氣相并成此病故名風狂也出第二卷中

肘後療卒狂言鬼語方

灸其足大拇指爪甲下三壯即止范汪必効同

又方

以甑帶急合縛兩手大指灸左右脅下對搵肋頭骨盡處兩火俱起各七壯須臾鬼語自道姓名乞去詰問得知徐徐乃解手千金同

又凡狂發則欲走或自高賢稱神聖皆應備諸火灸乃得永差若或悲泣呻吟者此爲邪魅非狂自依邪方療之並出第一卷中

集驗療卒狂言鬼語方

卧其人著地以新水旋旋淋其面終日淋之肘後千金同

又方

燒蝦蟇擣末服方寸匕日三服肘後文仲同並出第三卷中

千金療狂罵詈撾斫人名爲熱陽風灸口兩邊鷰口處赤白際各一壯即止

又方

灸陰囊縫上一穴三十壯令人立以筆正注當下已卧卻核卵令上乃灸之勿令近前中卵核恐害陽氣

又主狂走瘨癇方

灸玉枕上三寸一法項後一寸灸一百壯

又主狂言恍惚方

灸天樞百壯並出第十四卷中（銅人經天樞俠臍二寸）

風驚恐失志喜忘及妄言方六首

深師人參湯療忽忽善忘小便赤黃喜夢見死人或夢居水中驚恐惕惕如怖目視䀮䀮不欲聞人聲飲食不得味神情恍惚不安定志養魂方

人參　甘草（各二兩炙）　半夏（一兩洗）　龍骨（六兩）

遠志（八兩）　麥門冬（一升去心洗）　乾地黃（四兩）　大棗（五十枚擘）

小麥（一升）　阿膠（三兩炙）　膠飴（八兩）　石膏（四兩碎綿裹）

右十二味切以水三斗煑小麥令熟去麥內藥煑取七升去滓內膠飴令烊一服一升日三夜一安卧當小汗彌佳忌海藻菘菜羊肉蕪荑

又龍骨湯療宿驚失志忽忽喜忘悲傷不樂陽氣不起方

龍骨　茯苓　桂心　遠志(去心各一兩)

麥門冬(去心二兩)　牡蠣(熬)　甘草(炙各三兩)　生薑(四兩)

右八味㕮咀以水七升煮取二升分爲二服忌海藻菘菜酢物生葱

又鐵精散療驚恐妄言或見邪魅恍惚不自覺發作有時或如中風方

鐵精　茯苓　芎藭　桂心

蝟皮(炙各三兩)

右五味擣下篩以酒服錢五匕日三不知稍增至一錢以上知之爲度忌酢物生葱並出第九卷中

古今錄驗道士陳明進茯神丸一名定志小丸主心氣不定五藏不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發發則狂眩加茯神爲茯神丸不加茯神爲定志丸二八分合少可兩度合方

昌蒲　遠志去心　茯苓各二分　人參三分

右四味擣下篩服方寸匕後食日三蜜和丸如梧桐子服六七丸日三亦得一方加茯神一兩半牛黃五銖爲六物茯苓遠志昌蒲各一兩忌酢物羊肉餳千金同

又定志紫葳丸療五驚喜怒不安方

紫葳六分　遠志十五分去心　白龍骨七分　牛黃一兩

甘草十分炙　虎頭皮十二分炙令焦　人參　桂心

白朮各八分　防風七分　麥門冬去心熬　雷矢各三分

柴胡六分

右十三味各別擣下篩蜜和丸如梧桐子大先食服十九日三甚良忌海藻菘菜桃李生葱並出第五卷中

千金療驚勞失志方

茯神五兩　甘草炙　桂心各一兩　龍骨

麥門冬去心 防風 牡蠣熬 遠志去心各二兩

棗二十枚擘

右九味切以水八升煮取二升分爲二服日再忌海藻菘菜生葱酢物出第十四卷中一云主驚悸心神錯亂或是或非言語無度茯神湯

風邪方八首

病源風邪者謂風氣傷於人也人以身內血氣爲正外風氣爲邪若其居處失宜飲食不節致腑藏內損血氣外虛則爲風邪所傷故病有五邪一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰中濕其爲病不同風邪者發則不自覺知狂惑妄言悲喜無度是也出第二卷中

廣濟療風邪狂亂失心安神定志方

金銀薄各一百番和合 石膏研 龍齒研 鐵精研

地骨白皮 茯神 黃芩 生乾地黃

升麻　茯苓　玄參　人參各八分

虎睛一具微炙　牛黃　生薑屑各四分　麥門冬十分去心

枳實炙　甘草炙　葳蕤　芍藥各六分

遠志去心　柏子人　白鮮皮各五分

右二十四味擣篩以蜜和爲丸食訖少時煮生枸杞根汁服如梧桐子二十丸日二服漸加至三十丸不利忌熱麪海藻菘菜蕪荑炙肉醋蒜粘食陳臭油膩出第一卷中

深師鎭心丸療老小心氣不足虛弱時苦小語勞則劇風邪百病並主之方

銀屑一分半研　牛黃九銖　丹砂研　甘草炙

麥門冬去心　遠志去心各五分　防葵　人參

防風　細辛　茯神　椒汗

附子炮　紫石研各四分　桂心　乾薑各六分

昌蒲　紫菀各三分

右十八味擣下篩以白蜜和丸如梧子先食服三丸日三不知稍增之忌海藻菘菜生菜猪肉生葱生血物餳丹砂一作丹參

又五石鎮心丸療男女風虚心氣不足風邪入藏夢寤驚恐悸諸病悉主之方

紫石研　白朮各一兩　茯苓　海蛤

昌蒲　白石英　杏人去皮尖熬一兩　硫黄研

遠志去心　細辛　牛黄　鐵精研

卷柏　阿膠炙各四分　麥門冬去心　蓯蓉

鍾乳研　銀屑研　大豆卷　當歸

乾薑各五分　大棗五十枚　人參　防風

署預　甘草炙各七分　澤瀉六分　白斂

前胡各二分　石膏研　乾地黄　芍藥

桔梗 柏子人 桂心 烏頭炮各三分

秦艽六分 半夏洗八分 大黃五分三斗下蒸 黃耆六分

右四十味擣下篩棗膏蜜和爲丸如梧子一服十丸不知增之忌海藻菘菜猪羊肉餳生葱桃李羊血蕪荑酢餳並出第十卷中

肘後麻子湯療風邪感結衆殃恍惚不安氣欲絶水漿不入口方

麻子五合熬 橘皮 芍藥 生薑

桂心 甘草炙各三兩 半夏洗五兩 人參一兩

當歸二兩

右九味切以水九升煑取三升分爲三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱古今録驗同出第二卷中

千金翼續命湯療大風風邪入心心痛達背背痛達心前後心痛去來上下或水腹脹滿微痛一寒一熱心中煩悶進退無常

面或青或黃皆是房內太過虛損勞交通會後汗出汗出未除或因把扇或出當風因而成勞五俞大傷風因外入下有水因變成邪雖病如此然於飲食無退坐起無異至卒不知是五內受風故也名曰行尸宜預備此方

麻黃六分去節　大棗十枚擘　桂心　防風

細辛　芎藭　甘草炙　芍藥

人參　秦艽　獨活　黃芩

防巳各一兩　附子炮　白朮各三分　乾薑五分

右十六味切以水一斗十三升先煑麻黃令一沸下之去沫內諸藥煑取五升去滓內棗煎取三升分爲三服老小久病服五合強人可取微汗忌生葱海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等

又鎮心丸療胃氣厥實風邪入藏喜怒愁憂心意不定恍惚喜

志夜不得寐諸邪氣病悉主之方

秦艽一兩　柏實　當歸　乾漆熬

白歛　杏人去皮尖熬　芎藭各三分　澤瀉一兩

乾地黃六分　防風　人參各四兩　甘草一兩炙

白朮　署預　茯苓　乾薑各二分

麥門冬去心二兩　前胡四分

右十八味擣下篩以蜜和爲丸如梧子先食飲服十丸日三不知稍增之忌桃李雀肉海藻菘菜蕪荑酢物並出第十六卷中

崔氏療風邪虛悸恍惚悲傷或夢寐不安鎮心湯方

茯神　半夏洗　生薑各四兩　羚羊角屑

當歸　人參　防風　芎藭

杏人去皮尖　桔梗各二兩　龍齒碎綿裹　石膏碎綿裹各三兩

防已　桂心各一兩半　竹瀝一升

右十五味切以水一斗煮減半內竹瀝煎取二升八合去滓分温三服相去如行十里久忌酢物羊肉猪肉餳生葱

又别離散療男子女人風邪男夢見女女夢見男交歡日久成勞愁悲憂恚怒喜無常日漸羸瘦連年歲月深久難療或半月或數月日復發者方

楊上寄生三兩炙　昌蒲　細辛　附子炮

乾薑　薊根一兩去苧根　天雄炮　桂心各一兩

白术二兩　茵芋二兩炙

右十味合擣下篩以酒服半方寸匕日三不飲酒用童子小便調服合藥勿令婦人雞犬見之勿令病人見合藥見者令邪氣不去禁之爲驗小品同忌生葱生菜羊猪肉桃李雀肉餳等

並出第七卷中

五邪方五首

深師五邪丸療心驚恐夢寤愁夏煩躁不樂心神錯亂邪氣經入五藏往來煩悶悲哀啼泣常如苦怖吸吸短氣當發之時恍惚喜卧心中踊踊忽然欲怒顛倒手足冷青氣乏鬼邪氣所中涉於藏腑食即嘔逆除氣定心神方

芎藭　龍角無角用齒　茯苓　紫石研

防風　厚朴炙　鐵精研　甘草炙各四分

遠志六分去心　丹參　大黃　梔子人

桂心　細辛　昌蒲　椒汗去目

人參　乾薑　附子炮　吴茱萸各五分

芥子三分　禹餘粮七分研

右二十二味擣下篩和以蜜丸如梧子未食服二十丸夜服十丸棗湯下不知增之忌海藻菘菜生葱生菜猪羊肉餳

又五邪湯療風邪恍惚悲涕泣狂走如有神之狀身體強直或疼痛口噤倏痺水漿不通面目變色甚者不識人方

昌蒲　秦艽　桂心　當歸

禹餘根　人參　附子炮　黃芩

甘草炙　遠志去心　附風各一兩　龍骨

赤石脂　茯苓　芍藥　芎藭

防巳各二兩

右十七味擣下篩作麤散調和取水二升一方取東流水煮小沸內散二兩煮取一升五合未食服五合日再夜一分作十二裹重裹令密勿令泄氣忌羊肉餳海藻菘菜酢物並出第八卷中

范汪五邪湯療五邪氣入人體中鬼語諸妄有所語悶亂恍惚不足意志不定發作來往有時方

人參　白朮　茯苓　昌蒲

茯神各三兩

右五味切以水一斗煑取三升先食服八合日三忌桃李雀肉羊肉餳酢物出第四十二卷中

古今録驗五邪湯主邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘粮研　防風　桂心　芍藥

遠志去心　獨活　甘草炙　人參

石膏碎綿裹　牡蠣熬　秦艽各二兩　白朮

防已　昌蒲　雄黄研　茯神

蛇蜕皮炙各一兩

右十七味擣麤篩以水一升半内三方寸匕煑二沸去滓服之日四服深師用黄丹不用雄黄餘同忌生葱海藻菘菜桃李雀肉餳醋

又茯神湯主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸動搖恍惚不定方

茯神二兩　人參　茯苓各三兩　赤小豆四十枚

昌蒲三兩

右五物以水一斗煑取二升半分爲三服忌酢羊肉餳深師千金翼同並出第四卷中

風驚悸方九首

病源風驚悸者由體虛心氣不足心之經爲風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣虛亦受風邪風邪搏於心則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則爲驚弱則爲悸出第一卷中

廣濟療熱風驚悸安心久服長年鎮心丸方

茯神　人參　龍齒研　升麻

石膏研　黄芩　茯苓　麥門冬八分去心
銀薄二百番研　虎睛一具炙　枳實炙　白斂
玄參　芍藥　葳蕤　甘草炙各六分
生薑二分
右十七味擣篩蜜和丸每食訖少時以飲服如梧子十五丸日二服漸漸加至三十丸不利忌海藻菘菜醋蒜麪粘食陳臭物等出第一卷中
深師大定心丸療恍惚驚悸心神不安或風邪因虛加藏語言喜忘肯脅滿不得飲食方
人參　桂心各二兩　白朮　防巳
茯苓　乾薑　防風　大黃
茯神　桔梗　白斂各一兩　牛膝十銖
遠志二兩去心　銀屑六銖

右十四味擣合下篩以蜜丸如梧子先食服五丸日三不知稍稍增之一方無牛膝而有茱萸一兩銀屑十銖餘悉同忌生葱酢豬肉桃李雀肉等

又補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶善恐獨苦多夢不自覺者咽喉痛時時吐血舌本強水漿不通手掌熱心驚悸吐下血方

麥門冬三兩去心 紫石五分 紫菀二兩 桂心一尺一方二兩

茯苓四兩一方一兩 小豆二十四枚一方六合 人參半兩 大棗二十五枚擘

甘草五寸炙一方一兩

右九味切以水八升煮取二升四合羸人分作三服強人再服心王之時有血證可服耳一方說用藥兩數不盡同注之在下煮取多少服亦同忌海藻菘菜生葱酢物並出第十卷中

千金療心虛寒陰傷寒損心驚掣悸語聲寬急混濁口喎冒

昧好自笑厲風傷心荆瀝湯方

荆瀝三升 麻黄去節 白术 芎藭各四兩

防風 桂心 升麻 茯苓

遠志去心 人參 羌活 當歸各三兩

防已 甘草炙各二兩 母薑切一升取汁

右十五味切以水一斗先煑麻黄兩沸去沫次下諸藥煑取三升絞去滓下荆瀝薑汁煎取四升分爲四服日三夜一忌海藻菘菜酢生葱桃李雀肉等

又大鎮心丸療心虚驚悸夢寤恐畏方

紫石英 茯苓 防風 人參

甘草炙 澤瀉各八分 秦艽 黄耆

白术 署預 白歛各六分 麥門冬

當歸各五分 桂心 遠志去心 柏子人

石膏　桔梗　大黃　大豆卷各四分熬
椒汗去目　芎藭　乾薑　細辛各三分

右二十四味酒服如梧子十五丸日再一方用棗膏丸忌海藻菘菜生葱猪肉生菜桃李雀肉等

又小鎮心散療心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定惕惕而驚方

人參　遠志去心　赤小豆　附子炮
桂心　細辛　乾薑　防風
龍齒炙　昌蒲　乾地黃各二兩　茯苓
白术　黃耆各四兩

右十四味擣篩為散以酒服兩方寸匕日三忌羊肉餳桃李雀肉生葱生菜猪肉並出第十四卷中

崔氏療熱風驚掣心忪恐悸風邪狂叫妄走者服此湯亦差朱

四熕用之極効方

茯神三兩 杏人三兩去皮尖兩人切 升麻 白鮮皮

沙參各二兩 龍齒六兩炙 寒水石一斤碎綿裹 石膏二十兩碎綿裹

生麥門冬四兩去心

右九味切以水一斗二升煎取三升去滓温分爲三服相去十里若甚者減水三升內竹瀝三升先用水煑九沸然後內竹瀝煑取三升服如上法忌酢物出第六卷中

古今録驗茯神湯療風經五藏虚驚悸安神定志方

龍骨二兩 乾薑一兩半 細辛一兩半 白术一兩

茯神三兩 人參 遠志去心 甘草炙

桂心 獨活各二兩 酸棗人一兩 防風二兩

右十二味切以水九升煑取三升分爲三服忌海藻菘菜桃李雀肉生葱生菜醋物

又大竹瀝湯療大虛風氣入腹拘急心痛煩寃恍惚迷惑不知人或驚悸時怖吸吸口乾嗇嗇惡寒時失精明歷節疼痛或緩或不攝產婦體虛受風惡寒慘慘憒憒悶心欲絕者并療風痓口噤不開目視如故耳亦聞人語心亦解人語但口不得開劇者皆強反折百脉掣動悉主之方

秦艽　防風　茯苓　人參各二兩

茵芋　烏頭炮　黃芩　乾薑

當歸　細辛　白朮各一兩　天雄一枚炮

甘草三兩炙　防已二兩

右十四味切以竹瀝一斗水五升煮取四升分服一升羸人服五合佳此湯令人痺寧少服也茵芋有毒令人悶亂目花虛人可半兩良風輕者用竹瀝三升水七升小重者竹瀝五升水五升風大劇傳水用竹瀝一斗忌酢生菜海藻菘菜桃李雀肉

等並出第一卷中

風驚恐三首

病源風驚恐者由體虛受風入乘腑藏其狀如人將捕之心虛則驚肝虛則恐足厥陰為肝之經與膽合足少陽為膽之經主決斷衆事心肝既虛而受風邪膽氣又弱而為風所乘故驚恐如人將捕之出第一卷中

廣濟療心虛熱風上衝頭面心係急時時驚四肢煩腰膝冷邪氣發神不定犀角丸方

犀角屑　防風　人參　升麻

防葵　檳榔人各五分　青木香　光明砂研

牛膝各八分　龍齒炙　鐵精各六兩　露蜂房炙

銀箔研各三分

右十三味擣篩蜜和為丸如梧子酒下二十丸至二十五丸日再

服不利忌生血物熱麪蒿麥炙肉葵蒜粘食等出第一卷中
深師續命湯療大風風邪入心或心痛徹背背痛徹心去來上
下驚恐水腹脹滿微痛乍寒乍熱心中悶狀如微溫進退無常面
青或白或黃虛勞邪氣入百脉百病皆療之方
人參　甘草炙　乾薑　麻黃去節
獨活　當歸　芎藭　石膏碎綿裹各二兩
附子一枚炮　桂心　白朮　細辛各三分
防風五分　芍藥二分　秦艽一兩　杏人四十枚去皮尖兩人
黃芩一兩
右十七味以水一斗煮麻黃十餘沸內諸藥煮取四升半去
滓內棗十枚煎取三升分五服老小者五合此以下以意消
息調和六腑安五藏無不損除無芎藭防已代之無獨活天
雄代之無附子烏頭代之湯成之後服湯以椒十枚置湯中

温冷煖服之此與十二物西州續命湯療同俱療癲邪大風西中有十二物者中有大棗三十枚忌海藻生葱猪肉桃李生菜雀肉等

又療五藏六腑血氣少亡魂失魄五藏晝夜不安惚惚善悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高墮落所致療之十黃散方

雄黃五分熬　人參五分　蜀椒五分汗　大黃四分

朱砂二分研　乾薑四分　黃蘗二分　山茱萸二分

細辛二分　黃耆三分　澤瀉三分　黃連一分

蒲黃一分　桂心三分　麻黃一分去節　黃孫一分牡蒙也一方云黃昏

黃環三分　黃芩三分

右十八味擣篩爲散未食温酒服一方寸匕日三稍增至二匕服此散體中筋力强者不須增人參氣力羸虛可增人參五分

合十分忌猪肉冷水生菜生葱生血物等並出第八卷中崔氏同千金無椒朱砂乾薑

風癲方七首

病源風癲者由血氣虛風邪入於陰經故也人有血氣少則心虛而精神離散魂魄妄行因爲風邪所傷故邪入於陰則爲癲疾又人在胎時其母卒大驚精氣并居令子發癲其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癲病皆由風邪故也養生方云夫人見十步直牆勿順牆而卧風利吹人必發癲癇及體重人卧春夏向東秋冬向西此是常法其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云還向反望不息七通治欬逆胷中病寒熱癲疾喉不利咽乾咽塞又云以兩手承鹿盧倒懸令脚反在其上元愈頭眩風癲坐地舒兩脚以繩絆之以大繩絆訖拖鹿盧上來下去以兩手挽繩使脚上頭下不使離地自極十

一通愈頭眩風癲久行身卧空中而不墜落出第二卷中

集驗風癲論曰凡癲病發則仆地吐涎沫無知若强掠如狂及遺糞者難療無方出第三卷中千金同

千金療風癲方

葶藶子熬研 鈆丹 栝樓 虎掌各三分

烏頭三分炮 白朮一分 鴟頭一枚炙 鐵精

藺茹各一兩 椒汗 大戟炙 甘遂

天雄各二分炮

右十三味末之以蜜和如梧子服二丸日二經心録同名鴟頭丸忌桃李雀肉猪肉冷水

又芎藭湯主風癲引脅牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭 藁本 藺茹各五兩

右三味切内酒一斗煮取三升頓服酒一升羸者二服取大

汗深師同

又方

生天門冬十斤　生地黄三十斤

右二味取汁作煎服之忌鯉魚蕪荑

又天門冬酒通治五藏六腑大風洞虚五勞七傷癥結滯氣冷熱諸風癲癎惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歴節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白再黒方

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利門冬汁一斗漬麹二升令發以米二斗準家法醖之春夏極冷下飯秋冬溫如人肌酒熟取清服一盞常令酒相接勿至醉吐愼生冷酢滑雞猪魚蒜特忌鯉魚亦忌油脂此是一斗汁法餘一石二石亦準此以爲大率服藥十日覺身體大痒二十

日更大痒三十日乃漸止此是風氣出去故也四十日即覺心豁然大快似有所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中諸風悉盡用米法先淨𤁾米暴炕令乾臨欲用時更别取天門冬汁漬米𤁾炊之餘汁拌飯取天門冬汁法淨洗天門冬乾漉去水切之擣押取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之久停即香美餘酒不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月合擬到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒時若得散服更得力倍速散方如左

天門冬去心皮暴乾擣篩以上件酒服方寸匕日三加至三匕久服長生凡酒亦得服之

又療風癲方

茯神 白龍骨研 龍齒研 龍角研

蔓菁子 龍膽 鐵精研 乾薑各十分

人參 遠志去心 黃連 大黃各八分

芎藭 白芷 黃芩 當歸各六分

桂心五分去皮

右十七味末之蜜和丸湯服十五丸如梧子日二稍稍加之以知爲度忌酢物猪肉冷水生葱並出第十四卷中

古今錄驗療風癲六生散方

昌蒲 葪藋一作藋蘆 防風 茵芋

商陸根 蜀附子炮各二兩

右六味擣下篩酒服錢五匕日再服不知稍增以知爲度忌猪肉冷水羊肉餳牛犬肉蒜

又侯氏黑散療風癲方

菊花四十分 防風 白朮各十分 茯苓

細辛 牡蠣熬 鍾乳研 礜石泥裹燒半日研

人參 乾薑 桂心 芎藭

當歸 礬石如馬齒者燒令汁盡研各三分 黃芩五分

右十五味擣合下篩以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉胡荽青魚鮓酢物生葱生菜並出第十卷中張仲景此方更有桔梗八分無鍾乳礜石以溫酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

五癲方三首

病源五癲者一曰陽癲發時如死人遺尿有頃乃解二曰陰癲坐小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發則眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心意逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭身重坐

熱沐頭濕髮腦沸未止得之五曰馬癲發作時反目口噤手足相引身體坐小時膏氣腦熱不和得之皆然診其脉心脉微澀爲癲疾并脾脉緊而疾者癲脉也腎脉急甚爲骨癲疾脉洪大而長者癲疾脉浮大附陰者癲疾脉來牢疾者癲疾三部脉緊急者癲可療發則仆地吐涎沫無所知若強掠起如狂及遺糞者難療脉虛勞可療實則死脉緊弦實牢者生脉沈細小者死脉搏大滑久久自已其脉沈小急疾不可療小牢急亦不可療出第二卷中

古今錄驗莨菪子散療五癲反側羊鳴目翻吐沫不知痛處方

猪卵一具陰乾百日　莨菪子三升　牛黄八分研　鯉魚膽五分

桂心十分研

右五味切以清酒一升漬莨菪子暴令乾盡酒止乃擣合下篩酒服五分匕日再當如醉不知稱增以知爲度忌生葱

又鐵精散療五癲方

鐵精一合研 芎藭 防風各一兩 蛇牀子五合

右四味合擣篩酒服一錢匕日三有効文仲范汪同

又療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗吠羊癲則羊鳴雞癲則雞鳴五癲病者腑藏相引盈氣起寒厥不識人氣爭瘈瘲吐沫久而得蘇雄黃丸方

鈆丹二兩熬成屑 眞珠 雄黃研 水銀熬

雌黃各一兩一方無 丹砂半兩研

右六味擣和以蜜又擣三萬杵乃丸先食服胡豆大三丸日再驚癇亦愈良千金范汪同云各五兩小兒二丸如小豆忌生血物並出第六卷中

癇方三首

廣濟療癇疾積年不差得熱即發水銀丸方

水銀紙裹鍊 麥門冬去心 烏蛇脯炙 鐵精研
乾地黃各八分 龍角研 人參 防風
子芩 升麻各六分 熊膽四分研

右十一味擣篩蜜和丸如梧子食後以生驢乳汁下二十丸漸漸加至三十丸日再不利忌蕪荑生菜熱麪蒿麥炙肉蒜粘食出第一卷中

千金大鎮心丸主諸癎醫所不救方

虎睛一具酒漬一宿炙 防風 秦艽 防葵
龍齒研 黃芩 雄黃研 防巳
山茱萸 茯苓 鐵精研 鬼臼
人參 大黃 銀屑研 乾薑
牛黃研各四分 寒水石六分研 羗活 升麻
遠志 白鮮皮 細辛 白薇

貫衆 麝香 鬼箭各三分 茯神
石膏研 天雄炮各二分 蛇蛻皮炙一尺 蜂房炙二分
右三十二味擣篩蜜和酒服十五丸日二服加至三十丸忌醋物生菜猪肉冷水出第十四卷中崔氏云療風癇及風邪有鴟頭三枚炙無茯苓餘並同
救急療癇少老增減之方
竹茹一握 衣中白魚七頭
右二味以酒一升煎取二合頓服之出第八卷中
風癇及驚癇方五首
廣濟療風癇卒倒嘔沫無省覺方
麻黃去節 大黃 牡蠣熬 黃芩各四兩
寒水石 白石脂 石膏研 赤石脂
紫石英 滑石研各八兩 人參 桂心各二兩
蛇蛻皮炙一兩 龍齒研六兩 甘草炙三兩

右十五味擣篩爲散八兩一薄以絹袋盛散藥用水一升五合煑取一薄取七合絞去滓頓服之日一服一方水二升煑散方寸匕取一升去滓服之少小百日服一合熱多者日二服三五日一服亦得本方無麻黃龍齒蛇蛻皮忌海藻菘菜生葱熱麪蕎麥猪肉蒜膩粘食

又方

吊藤皮　麻黃去節各二分　龍齒六分研綿裹　銀一斤
寒水石　梔子擘　知母　石膏碎綿裹
杏人去兩人皮尖研各十二分　升麻十分　子芩十四分　蛇蛻皮七寸炙
蚱蟬四枚去足翅炙　柴胡十分　芍藥　沙參各八分
生葛汁五分　蜜七合　牡牛黃如大豆粒十枚煎成研下之

右十九味切以水六升淡竹瀝二升合煑取二升四合絞去滓內杏人脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令餘二升三合成三

四歲一服二合五六歲一服二合半日再服稍增兒若大便澁者加大黃十分愼熱麪炙肉魚蒜粘食油膩冷水並出第一卷中

深師療大人風及少小驚癇瘈瘲日數十發醫所不能療除熱方

龍骨　大黃　乾薑各四兩　牡蠣三兩熬

滑石　赤石脂　白石脂　桂心

甘草炙各三兩

右九味擣下篩韋囊盛大人三指撮以井華水二升煑三沸藥成適寒温大人服一升未滿百日服一合未能飲者綿裹筯頭内湯中著小兒口中以當乳汁熱多者日四服無毒以意消息之忌海藻菘菜生葱出第九卷中一方無大黃赤石脂桂心甘草

崔氏療暴得驚癇立驗方朱四云極効

吊藤皮　茯神　黃芩　升麻

白鮮皮　沙參各二兩　龍齒三兩　石膏八兩
蚱蟬七枚去翅炙研湯成內　寒水石六兩碎研裹　甘竹瀝二升湯熱內之
右十一味切以水九升煮取三升温分三服相去六七里久若
小孩子患藥各減量取多少細細飲之立差忌醋物
又療大人風引少小驚癇瘈瘲日數十發醫所不能療除熱鎮心

紫石湯方

紫石英　滑石　白石脂　石膏
寒水石　赤石脂各八兩　大黃　龍骨
乾薑各四兩　甘草炙　桂心　牡蠣熬各三兩
右十二味擣篩盛以韋囊置於高涼處大人欲服乃取水二
升先煮兩沸便內藥方寸匕又煮取一升二合濾去滓頓服
之少小未滿百日服一合熱多者日二三服每以意消息之
紫石湯本無紫石英紫石英貴者可除之永嘉二年大人

小兒頻行風癇之病得發例不能言或發熱半身掣縮或五六日或七八日死張思惟合此散所療皆愈忌海藻菘菜生葱古今錄驗范汪同並出第六卷中（此本仲景傷寒論方）

風毒方五首

廣濟療風毒發即眼睛疼脚從中指疼連肘邊牽心裏悶兩肋脹少氣力喘氣急欲絕不能食黃耆丸方

黃耆　黃連（各七分）　防風　甘草（炙五分）

五加皮　白鮮皮　枳實（炙各四分）　升麻

車前子　苦參（炙）　麥門冬（去心）　葶藶子（熬）

巨勝（各六分）

右十三味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒浸大豆下二十丸漸加至三十丸日二服不知增之忌海藻菘菜猪肉冷水熱麪炙肉蕎麥出第一卷中

深師芍藥湯療中毒風腫心腹痛達背迫氣前後如疰痛方

芍藥 細辛 桂心 甘草炙

當歸 吴茱萸 獨活各二兩 乾地黃二兩

生薑五兩 桃人四十枚去皮兩人尖碎

右十味切以水九升煑取三升八分爲四服宜利者加大黃二兩忌海藻菘菜生葱蕪荑生菜出第九卷中

備急虎骨酒療男子女人骨體疼痛風毒流灌藏腑及至骨肉方

虎骨一具炭火炙令黃色刮削去脂血搥碎取盡擣篩得數升絹袋盛清酒六升浸五宿隨多少稍稍飲之日二三盃酒盡更添文仲同

又續命湯療毒風其病喉咽塞氣噎或口不能言或身體緩縱不能自勝不知痛處拘急腰背强引頭恍恍惚惚不得卧轉側綿絶欲死此毒風所作方

麻黃三兩去節　石膏碎綿裹　乾薑各二兩　防風一兩

當歸　芎藭　甘草炙　黃芩

桂心各二分　杏人二十枚去兩人尖皮碎

右十味切以水九升煑取三升分服小取汗若口噤不能飲絞口與湯不過二三劑忌海藻菘菜生葱並出第九卷中

千金逐風毒石膏湯方

石膏如雞子大三枚碎綿裹　麻黃三兩去節　杏人三十枚去皮尖兩人碎

雞子二枚　甘草一尺指許大炙

右五味切以水三升破雞子內水中洋令相得內藥煑取一升服之覆取汗汗不出燒石熨令汗出忌海藻菘菜出第八卷中

風多汗及虛汗方五首

深師療風多汗惡風四物防風散方

防風五分　澤瀉　牡蠣熬　桂心各三分

右藥擣下篩爲散先食酒服方寸匕日再忌生葱

又療風汗出少氣方趙子高法

防風十分 白朮九分 牡蠣三分熬

右三味擣篩爲散以酒服方寸匕日三增至二三匕惡風倍防風少氣倍朮汗出面腫倍牡蠣忌桃李雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物並出第九卷中

延年療風虛止汗石膏散方

石膏研 甘草炙各四分

右二味合擣下篩爲散先食以漿水服方寸匕日三夜再忌海藻菘菜

又療風虛汗出不止方

秦艽 附子炮 石斛 昌蒲

白朮 桂心各三分 麻黃根 防風各五分

右八味擣爲散以酒服方寸匕日三忌羊肉餳猪肉冷水桃李

雀肉生葱並出第五卷中

刪繁療大虛汗出欲死若白汗出不止方

麻黃去節　附子炮各一兩　牡蠣熬二兩

右三味擣下篩以一合藥白粉一升合和令調以粉汗上一方粉二升忌猪肉冷水出第九卷中

風熱方六首

病源風熱者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺爲五藏上蓋候身之皮毛若膚腠虛則風熱之氣先傷皮毛乃入肺也其狀令人惡風寒戰目欲脫涕唾出候之三日內及五日內目不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻內出爲善也若不出則傷肺變欬唾膿血也出第二卷中

延年黃連丸主風熱氣發即頭面煖悶不能食兼欠呿眠睡不安方

黃連十二分　人參　茯神六分炙　葳蕤四分

豉一合熬　生薑屑三分

右六味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十丸食上飲汁下日二服加至十五二十丸忌猪肉冷水酢物

又葳蕤飲主風熱項强急痛四肢骨肉煩熱方

葳蕤三兩　羚羊角屑　人參各二兩　葱白切一升

豉一升綿裹

右五味切以水五升煮取二升去滓內豉煎取一升五合去豉分溫三服如人行八九里取微汗即差忌蒜麪脂魚文仲處

又葳蕤丸主虛風熱發即頭熱悶不能食方

葳蕤六分　人參　白朮各五分　甘草四分炙

右四味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十丸食上飲汁下日三服加至十五二十丸文仲處忌桃李海藻菘菜雀肉等

並出第十卷中

千金翼防風丸主肺間風熱旦朝好噴嚏方

防風　茯神各三分　天門冬四分去心　芎藭

白芷　人參各二分

右六味擣篩蜜和丸如梧子酒服十丸日三服加至十五丸

忌鯉魚鮓物蔣孝璋處

又葳蕤丸主熱風衝頭面妨悶方

葳蕤　黃連各八分　防風　人參各六分

茯神五分　豆豉三合熬

右六味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十五丸飲汁下日二服

加至二十丸若冷用酒下之忌猪肉冷水酢物蒜熱麪出第

十八卷中

熱悶方

訶梨勒一枚取大者 芒消三合 醋一升

右三味擣訶梨勒為細末并芒消於醋中攪令消摩塗熱處日一二度張文仲處必效范汪同

頭風及頭痛方一十首

病源頭面風者是體虛陽經脈為風所乘也諸陽經脈上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風則為首風又新沐未乾不可以卧使頭重身熱反得風則煩悶診其脉寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不差則風入腦則變為頭眩養生云飽食仰卧久成氣病頭風又云飽食沐髮作頭風又云夏不用露面卧露𩂯面上令面皮厚喜成癬一云作面風其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云一手拓頤向上極勢一手向後長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手

皆然拓頣手兩向共頭欹側轉身二七去臂髆頭風眠睡又云解髮東向坐握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋五通脉也又云熱食枕手卧久成頭風目澀又云端坐生腰左右傾頭閉目以鼻内氣除頭風自極七息止又云頭痛以鼻内徐吐出氣三十過休又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止又云叉兩手頭後極勢振摇二七手掌龖覆安之二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欹斜四角急挽之三七去頭掖髆肘風出第二卷中

千金療頭風方

附子（一枚中形者炮裂）　鹽（附子大）

右二味作散沐頭畢以方寸匕摩頂上日三忌猪肉冷水等

又方

服荆瀝不限多少取差

又方

又擣蒴藋根二升酒二升漬服汁

又方

蔓荊子二升酒一斗絹袋盛浸七宿温服三合日三

又方

臘月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋盛酒三升漬
温服之多少任性常令醺酣

又方

七月七日麻勃三升麥子一碩末相和蒸之沸湯一
碩五斗三遍淋之煮取一石神麴二十斤漬之令發
以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清一升百日
中身澀皮八風五藏骨髓伏風百病悉去

又方

生油一升鹽一升末油煎一宿令消盡塗頭石鹽尤良

又方

大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛九升清酒乘

豆熱即傾著酒中蜜泥頭七日温服之並出第十三卷中

延年療風熱頭痛掣動方

防風　黄芩　升麻　芍藥各二兩

龍骨　石膏碎各四兩　乾葛三兩　竹瀝二升

右八味切以水六升和瀝煮取二升六合去滓分温三服日

晩再忌蒜麪猪肉油膩

又療風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方

茯苓三兩　枳實炙　橘皮　人參

芍藥各二兩　生薑四兩

右六味切以水五升煮取二升去滓分温三服日晩再忌麪蒜

醋物並出第十卷中

風頭眩方九首

病源風頭眩者由血氣虛風邪入於腦而引目系故也五藏六腑之精氣皆上注於目血氣與脉并上爲系上屬於腦後出於項中逢身之虛則爲風邪所傷入腦則腦轉而目系急目系急故成眩也診其脉洪大而長者風眩又得陽維浮者暫起目眩也風眩久不差則變爲癲其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩手抱右膝著膺除風眩又云凡人常覺脊背偃強不問時節縮咽髆內仰面努髆并向上頭左右兩向挼之左右三七一住待血行氣動住然始更用初緩後急不得先急後緩若無病人常欲得且起午時日没三辰別二七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口内生瘡牙齒風頸頭眩衆病盡除又云大寒不覺暖熱久頑冷患耳聾目眩病久

行即成法法身五六不能變也又云低頭不息六通治耳聾目
癲眩咽喉不利又云大前側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右
聾伏並兩膝耳著地牢强意多用力至大極愈耳聾目眩病天
行不已耳聞十方亦能倒頭則不眩也出第二卷中
千金療風頭眩口喎目痛耳聾大三五七散方
天雄 細辛各三兩 山茱萸 乾薑各五兩
署預 防風各七兩
右六味擣篩爲散清酒服五分匕日再不知稍稍加之忌
猪肉生菜
又療頭風目眩耳聾小三五七散方
天雄炮三兩 山茱萸五兩 署預七兩
右三味擣篩爲散以清酒服五分匕日再不知稍增以知爲
度忌猪肉冷水並出第十三卷中

崔氏療忽頭眩運經久不差四體漸羸食無味好食黃土方

白朮三斤 麴三斤

右二味擣篩酒和併手捻丸如梧子暴乾飲服二十枚日三

忌桃李雀肉等

又療風眩翻倒無定方

獨活六兩 枳實三兩炙 石膏碎綿裹 蒴藋各四兩

右四味切清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨覆取汗

覺冷又內鐺中温冷熱熱又熨之即差文仲肘後千金同

又療頭痛眼眩心悶陰雨彌甚方

當歸 山茱萸各一兩 防風 柴胡

署預各二兩 雞子二枚熟去皮打黃碎

右六味擣下篩用前雞黃和散令調酒服方寸匕日三並

出第六卷中

延年署預酒主頭風眩不能食補益氣力方

署預　白朮　五味子碎　丹參各八兩

防風十兩　山茱萸二升碎　人參三兩　生薑六兩屑

右八味切以絹袋盛酒二斗五升浸五日温服七合日二稍加忌桃李雀肉等出第十卷中

古今録驗九江太守獨活散療風眩厥逆身體疼痛百節不隨目眩心亂反側若癲發作無常方

獨活四分　白朮十二分　防風八分　細辛

人參　乾薑各四分　蜀天雄炮　桂心各一分

栝樓六分

右九味擣合細篩旦以清酒服半方寸匕日再忌桃李雀肉猪肉冷水生菜生葱等物

又防風湯療風眩嘔逆水漿不下食輙嘔起即眩倒發作有時

手足厥方

防風　白朮　防巳　乾薑　甘草炙各一兩　附子炮　桂心各半兩　蜀椒汗一百枚

右八味切以水四升煑取一升半分爲三服忌猪肉冷水生葱海藻菘菜桃李雀肉等出第四卷中

近效白朮附子湯療風虚頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣身體微腫者方

白朮三兩　附子二枚炮　甘草二兩炙　桂心四兩

右四味切以水六升煑取三升分爲三服日三初服得微汗即解能食復煩者將服五合以上愈忌海藻菘菜猪肉生葱桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

頭風旋方七首

廣濟療熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方

麥門冬去心 山茱萸 茯神 苦參各八分

地骨皮 署預 人參 蔓荊子

沙參 防風 芍藥 枳實

大黃各六分 甘菊花 龍膽各四分

右十五味擣篩蜜丸每食訖少時以蜜水服如梧子大二十丸日二漸加至三十丸不利忌酢物熱麪炙肉蒜猪肉魚粘食

又療頭面熱風頭旋眼澀項筋急強心悶腰脚疼痛上熱下冷健忘方

肉豆蔲十顆去皮 人參 犀角屑 枳實炙各六分

黃連 白朮 大黃各八分 甘草炙

苦參 旋復花各四分 檳榔人十顆

擣篩蜜和丸如梧子以酒飲服二十丸漸加至三十服無問食前後服之不利忌生菜熱麪蕎麥酒蒜猪菘菜桃李雀肉等

感風頭旋心忪痰飲築心悶惛惛惚惚不能言語宜微極重秦艽飲子吐方

秦艽　常山　人參　羚羊角各二兩

甘草三兩生用

切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服日再如人五里久進一服取快吐不利忌生菜生葱熱麪蕎麥猪海藻菘菜並出第一卷中

頂膏療頭風悶亂鼻塞及頭旋眼闇皆主之方

草麻去皮　杏人去皮尖兩人　石鹽　芎藭

松脂　防風

右六味等分先擣石鹽以下四種爲末別擣蓖麻杏人相次入訖即臘紙裹之有病者先炙百會三壯訖刮去黑毛使淨作一帛貼子裁大於炙處塗膏以貼上兩日三日一易之其瘡於後即爛破膿血出及帛貼之似爛柿蒂出者良一方用膿兼前七物相和出第三卷中

延年療頭風旋不食食即吐方

前胡三兩　白朮　防風　枳實炙

茯神各三兩　生薑四兩

右六味切以水六升煮取二升去滓分溫三服忌桃李雀肉酢

又療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒方

芎藭　獨活　防風　白朮

杏人去尖皮　枳實炙各二兩　茯神三兩　生薑四兩

羚羊角屑　黃芩各一兩

右十味切以水九升煑取三升分爲三服日三忌桃李雀肉
大酢蒜麪等

又療風痰氣發即頭旋嘔吐不食防風飲方

防風 人參 橘皮各二兩 白术
茯神各三兩 生薑四兩

右六味切以水六升煑取三升去滓分溫四服中間任食一
日令盡忌大醋桃李雀肉蒜麪等物並出第十卷中

癮㾕風㾕一十三首 俗呼爲風矢者是也

黃帝素問曰風邪客於肌中肌虛眞氣致散又被寒搏皮膚外
發腠理淫氣行之則痒也所以癮㾕瘙疾皆由於此有赤㾕
忽起如蚊蚋啄煩痒重沓壟起搔之逐手起也刪繁同

深師療十種㾕㾕散方

鬼箭 甘草炙 白斂 白术

礬石各一兩熬　防風二兩

右六味擣篩以粟米粉五合極拭身以粉內藥中擣合一服五分匕日三中間進食不知增之忌海藻菘菜桃李雀肉等出第十卷中

千金癧瘍百療不差方

景天一斤一名護火草

右一味擣絞取汁塗上熱炙摸之再三即差

又方

黃連　芒消各五兩

右二味以水六升煮取四升去滓洗之日四五度良范汪同

忌猪肉冷水

又療風痺癧瘍方

以酒六升煮大豆三升四五沸服一杯日三

又方

蛇牀子二升　防風三兩　生蒺藜二斤

右三味切以水一斗煮取五升漬綿拭之日四五范汪同

又方

白朮三兩　戎鹽半兩　黃連　黃芩

芎藭　細辛　莽草　茵芋各一兩

礬石半兩

右九味切以水一斗煮取三升洗之日三

又方

馬藺子　蒴藋　茺蔚子　礬石

蒺藜　茵芋　羊桃　萹蓄各二兩

右八味切以酢漿水二斗煮取一斗二升礬石洗之日三范汪無馬藺並出第二十三卷中

崔氏療風瘮遍身方

麻黃（去節） 生薑（各三兩） 防風（二兩） 芎藭
芍藥 當歸 蒺藜子 甘草（炙）
獨活 烏喙 人參（各一兩）

右十一味切以水九升煑取二升八合絞去滓分溫三服訖進粥食三日慎生冷酢滑豬肉冷水海藻菘菜出第四卷中

延年塗風瘮蒴藋湯方

蒴藋根（切） 蒺藜子 羊桃（切） 楮枝（切）
茺蔚子 石鹽（各半斤） 辛夷人 礬石（各三兩）

右八味切以水一斗煑取三升去滓內鹽攪令消用塗風瘮上下塗之（一方有茺藿）

又方

取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消
文仲處并出第十卷中

古今錄驗療三十歲癮㾓耳目皆合春秋輙發方
於南屋東頭第一梁壁外以細灰厚布地大小足容兩脚躡灰上訖使病人徑去勿反顧灸脚十指間灸灰上隨病人年爲壯數車瑗道方已試神良范汪同出第十卷中
元侍郎希聲集療卒風㾓祕驗方
石灰隨多少和醋漿水塗㾓上隨手即滅出第一卷中
近効療風㾓方
生葱一大束三尺以上圍者并根鬚鹽三大廾以香漿水三石煑取兩石並大斗於浴斛中適冷熱浸雖積年患者不過三兩度浸必差
風搔身體癮㾓方五首
病源邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風搔癮㾓若赤胗者

由涼濕搏於肌中之熱熱結成赤胗也得天熱則劇取冷則滅也白胗者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏爲白胗也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則滅厚衣身暖亦差也脉浮而大浮爲風虛大爲氣强風氣相搏即成癮癣身體爲癢養生方云汗出不可露卧及浴使人身振寒熱風癣也出第二卷中

深師療風搔癮癣如漆瘡連心中悶方

天雄炮 蝭毋知毋也 牛膝各四分 防風六分

桂心 乾薑 細辛 人參各三分

栝樓五分 白朮八分

右十味擣篩先食服半錢匕日再不知稍增之忌猪肉生葱生菜桃李雀肉等

又療風搔身體癮癣粉散方

烏頭炮　桔梗　細辛　白朮各一兩

右四味擣篩以鉛朱爲色粉四升和令調以粉身范汪同

並出第十卷中

千金療風搔癮瘮方

牛膝末酒服方寸匕日三并主骨肉疽癩病及瘖㿔

出第二十三卷中

延年蒴藋膏主身癢風搔癮瘮方

蒴藋根切　蒺藜子各一升　附子　獨活

犀角屑　薔薇根　白芷　防風

苦參　及已　升麻　白斂

防巳各三兩　川椒　莽草　青木香

蛇牀子　蛇銜草各二兩　茺蔚子一升切　枳實五枚炙

茵芋二兩半切

右二十一味切以苦酒漬令淹匝一宿明旦銅器中炭火上

用猪膏五升煎令三上三下以候白芷色黄膏成絞去滓内

不津器中用摩風瘾胗張文仲同

又莽蔚浴湯主身痒風搔或生瘾瘮方

莽蔚　蒺蔾　羊桃　蒴藋根（亦得苗）

漏蘆蒿（各一斤）　鹽（三斤）

右六味切以水三石煮取二石五斗去滓内鹽令消適寒

温先飽食即入浴能良久浸最好每至夜即浴浴訖即卧

慎風如法並出第十三卷中

風熱頭面瘮痒方四首

千金療風搔腫痒在頭面大黄搨洗方

大黄　芒消（各四分）　莽草（二分）　黄連（六分）

黄芩（八分）　蒺蔾（五合）

右六味切以水七升煮取三升半去滓內芒消訖帛搨上

日一過勿令近眼出第二十三卷中

延年牡丹膏主項強痛頭風搔瘮癢風腫方

牡丹皮　當歸　芎藭　防風

升麻　防巳　芒消各六分　芍藥

細辛　乾藍　犀角屑　漏蘆

蒴藋　零陵香各四分　杏人去兩人皮尖碎　梔子人

黃芩　大黃　青木香各三分　竹瀝二升

右二十味切以竹瀝漬一宿醍醐三升半煎於火上三上三

上候芍藥黃膏成絞去滓以摩病上

又犀角竹瀝膏主風熱發即頭項脉掣動急強及熱毒瘮癢方

犀角十二分屑　升麻八分　蒴藋根　秦艽

獨活　白芨　菊花　白朮

防巳　白芷　當歸　防風
芎藭　青木香　寒水石碎　苦參
漏蘆根各四分　蒺藜子二合　莽草二分　枳實二枚四破
梔子人七枚　竹瀝三升　吴藍一兩
右二十三味切以竹瀝漬一宿明旦於炭火上和猪脂五升煎令九上九下以候白芷色黄膏成絞去滓内於不津器中用摩風處日三張文仲同並出第七卷中
肘後枳實丸療熱風頭面痒風癩如癩方
枳實六分炙　天門冬去心　獨活　蒺藜人
防風　桔梗各五分　黄連　薏苡人各四分
菌桂一分半
右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服十五丸日再如能以酒和飲之益佳不限食之前後以意加減忌鯉魚生葱猪肉冷

水出第四卷中（一方有人參五分）

風搔癮㾁生瘡方六首

病源人皮膚虛爲風邪所折則起癮㾁寒多則色赤風多則色白甚者癢痛搔之成瘡出第二卷中

深師療風癮㾁或發瘡甚則胷急滿短氣欲吐方

茵芋（七分秦山者炙）　芎藭　烏頭（炮）　防風

白斂　乾薑（各三分）　桂心（二分）

右七味擣下篩爲散服半錢匕日再忌猪肉生葱

又療癮㾁煩滿及血不止方

取新濕馬矢絞取汁服二升微者一升立愈若乾者水濕取汁並出第十卷中

延年療風㾁癢悶搔之汁出生瘡洗湯方

苦參（一小斤）　漏蘆根（一小斤）　枳實（五小兩）　蒺藜（一小斤）

楮莖葉一小斤者

右五味切以清漿水二升煑取一大升以綿沾拭癢處日八九度訖以粉粉拭處差

又枳實丸主風熱氣發衝頭面熱皮膚生風瘮瘙痒盛生瘡不能多食方

枳實炙　蒺藜子　苦參各六分　人參四分

獨活　天門冬去心　菌桂各三分　白朮四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸用薄酒下日二加至十五丸忌蒜熱麪鯉魚桃李雀肉生葱並出第十卷中

又升麻犀角膏療諸熱風毒氣癢衝出皮膚搔即癮瘮赤起兼有黃水出後結爲膿窠痛悉主之方

升麻　犀角屑　白斂　漏蘆

枳實炙　連翹　生蛇銜草　乾薑

芒消研湯成下各二兩　黄芩三兩　梔子二十枚擘　葫藋根四兩

玄參三兩

右十三味切以竹瀝二升漬一宿以成錬猪脂五升煎令竹瀝水氣盡絞去滓内芒消攪令凝膏成用摩患處日五六度益佳文仲同

近効療風熱結𤺋瘙之汁出痒不可忍方

麻黄根五兩　蛇牀子四兩　蒺蔾子　礬石各二兩熬

白粉二小升

右五味擣篩生絹袋盛痒即粉之此方甚良

風身體如蟲行方四首

病源夫人虚風邪中於榮衛溢於皮膚之間與虚熱并故遊弈遍體狀如蟲行出第二卷中

千金石南湯療六十四種風淫淫液液走入皮膚中如蟲行腰脊

強直五緩六急手足拘攣癮㽲搔之作瘡風尸身痒卒面目腫起手不止頭口噤不能言方

石南炙　乾薑　黃芩　細辛

人參各一兩　桂心　麻黃去節　當歸

芎藭各六分　甘草八分炙　乾地黃三分　食茱萸五分

右十二味切以水六升酒三升煮取三升去滓分爲三服取大汗勿觸風但是癮㽲服之皆差忌蕪荑生葱生菜海藻菘菜等

又療舉體痛痒如蟲齧皮上痒時瘙則皮脫作瘡方

蒺藜子三升碎　蛇牀子二升　茺蔚子一升　防風五兩

大戟一斤　大黃二兩　礬石三兩熬

右七味切以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石三上火燒用帛拭身上差止

又方

灸曲池隨年壯發即灸之神良並出第二十三卷中

延年蒺蔾子丸療熱風衝頭面痒如蟲行身上時有風瘮出除風熱消瘮兼補益堅筋骨倍氣力充實方

蒺蔾子六分　黃耆　獨活　白芷

防風　署預各三分　枳實炙　人參

黃連各四分　蕨蕤　地骨白皮各二分　桂心一分

右十二味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十丸酒下日二服加至十五丸中間欲服水煎及黃連丸並無妨忌豬肉生葱張文仲處出第三卷中

瀝瘍風方一十五首

廣濟療瀝瘍風方

石硫黃三兩研　雄黃一兩研　硇砂　附子生用各二兩

右四味擣篩爲散以苦酒和如泥塗瘍處乾即更塗以差爲

度出第五卷中

集驗療瘰癧瘍方

苦酒於瓦甌底磨硫黃令如泥又取附子截一頭又磨硫黃上使熟將臥先以布拭瘍上數過乃以藥傅之即愈深師處文仲范汪延年同

又方

硫黃研 礬石研 水銀別研入 竈墨

右四味等分擣下篩內椀子中以葱葉中涕和研之臨臥以傅病上肘後同並出第九卷中

删繁療瘰癧瘍方

取五月五日車轍中水并牛蹄中水浴甚良出第九卷中

千金療瘰癧瘍方

取三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之良

又方

取塗中先死蜣蜋擣爛之當揩令熱封之一宿差止

又方

酢磨硫黃塗之最上

又方

雌黃研　蛇蜕一具燒灰研　槲皮燒灰研　硫黃研

右四味分等下篩以清漆和之塗白處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後付之不過兩三度即差並出第二十四卷中

崔氏療癧瘍方

取茵蔯蒿兩握以水一斗五升煮取七升以皂莢湯先洗癧瘍令傷然以湯洗之湯冷更溫洗可作三四度洗隔日作佳不然恐痛難忍出第四卷中

救急療癧瘍方

取青胡桃皮擣之并少許醬清和硇砂令相入如煎餅

麫先以泔清洗之然後傅藥

又方

以醬汁研石硫黃作泥以生布揩破以傅瘍上

又方

以石硫黃薰之令汗出佳並出第五卷中

古今録驗療身體瀝瘍斑駮女葳膏方

女葳一分　附子一枚炮　雞舌香　青木香各二分

麝香方寸匕　白芷一分

右六味㕮咀以臘月猪膏七合煎內五物微火煎令小沸急下

去滓內麝香攪調復三上三下膏成以浮石摩令小傷以傅之

又方

三淋蒴藋淋灰取汁重之洗瘻瘍訖醋研木防巳塗之即愈神驗達奚送

又蜀水花膏療瘻瘍方

蜀水花　白附子　麝香　白歛

商陸　鷹屎白各二兩

右六味切以猪膏二升合煎之沸三上三下膏成以傅上並出第十卷中

白癜風方九首

廣濟療白癜風方

苦參三斤　露蜂房炙　松脂　附子炮

防風各三兩　梔子人五兩　烏蛇脯六兩炙　木蘭皮二兩

右八味擣篩爲散一服一匕以酒下冝常喫蘿蔔菜勿食雞肉猪肉冷水熱麪生菜文仲同

又方

黑油麻一大升 生地黃五大兩 桃人去兩人皮尖三十枚熬

右三味先退去油麻皮蒸之日暴乾又蒸之如此九度訖又暴取乾擣令極碎然後擣地黃桃人羅之即惣相和加少蜜令相著一服一匙日再服和酒喫空喫亦精兼食諸肺尤妙忌蕪荑熱麪猪蒜油膩等

又方

礬石研 硫黃研

右二味等分酢和傅之並出第五卷中

千金療白癜風方

酒服生胡麻油一合日三稍加至五合愼生冷猪魚蒜百日服五升差

又方

揩上令破摘蘿摩白汁塗之日日爲之取差爲度

崔氏療白癜風神効方劉秘監錄送

雌黃七分細研　木蘭皮　白朮各八分　苦參

芎藭　麻黃去節　山茱萸　甘草炙

狗脊　枳實炙各四分　秦艽　沙參

細辛　牛膝　白斂　人參

當歸　署預　白芷各五分　防風

附子炮　枲耳子各六分

右二十二味擣篩爲散酒服方寸匕日再漸漸加至二匕忌生葱菜海藻菘菜猪肉桃李雀肉等出第四卷中

古今錄驗療疱白癜風商陸散方

生商陸根切一升　白斂　天雄炮　黃芩各三兩

乾薑四兩　附子炮　躑躅花一升

右七味擣篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水千金同亦主瀝瘍

又療白癜風附子膏方

附子炮 天雄炮 烏頭炮各三兩 防風二兩

右四味切以猪膏三升合煎之先服散白癜上以膏傅之一方無防風

又方

蘿摩草煑以拭之取差並出第八卷中

集驗療頸項及頭面上白駮侵淫漸長有似癬但無瘡可療之方

白駮方七首

乾鰻鱺魚脂以塗之先洗拭駮上外把刮之使磣痛拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三塗之深師千金同

又方

取蛇蛻皮熟摩之數百過棄皮置草中深師千金同

又療身體白駮方

取木空中水洗之擣桂屑唾和傅駮上日三千金文

仲同並出第七卷中

古今錄驗療面白駮方出徐王

弊帛 蟬頸 箒 甑帶

脯腊 履底 蛇皮

右七物等分以月蝕之夕盛蝕時合燒之擣篩以酒服方寸匕日二三服止以淳苦酒和塗白上一折除之

又方

荷葉裹鮓合葉相和更裹令大臭爛先拭令熱傅之即差二公主方

又療舉體苦白駮經年不差此風虛生昌蒲酒方

陸地昌蒲細切一石別煮 天門冬一斤去心 天雄三兩去皮生用

麻子人一升　茵芋　乾漆　乾地黃
遠志去心各三兩　露蜂房五兩　苦參一斤　黃耆半斤
獨活　石斛各五兩　柏子人二升　蛇皮長三尺
天蓼子一升
右十六味㕮咀之以絹囊盛著先以水二斛五斗煑昌蒲根取八斗以釀一斛五斗米許用七月七日造冬月酒成漉糟停藥著器中下消減令人延年益壽耳目聰明氣力兼倍一劑不覺更作尤妙當以差爲期更重煑昌蒲去滓取汁以漬洗悉益佳禁食羊肉餳鯉魚猪肉蕪荑雞犬生冷十日酒定熟須去滓佳並出第八卷中

外臺秘要方卷第十五

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校正

外臺秘要方　十六

虛勞上

外臺秘要方卷第十六 虛勞上四十九門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

刪繁論曰夫五藏勞者其源從藏腑起也鼓生死之浮沉動百

病之虛實厥隂陽逆䏚理皆因勞瘠而生故曰五藏勞也出第七卷中

肝勞論一首

删繁論曰凡肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣内變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣所以肝恐不止則傷精精傷則面離色目青盲而無所見毛悴色夭死於秋出第七卷中

肝實熱方二首

删繁療肝勞實熱悶怒精神不守恐畏不能獨卧目視無明氣逆上不下胷中滿塞半夏下氣消悶明目吐熱湯方

半夏洗破 生薑各八兩 麻黃去節 芍藥

杜蘅 枳實炙 細辛 杏人去皮尖碎

烏梅擘各三兩 松蘿二兩 淡竹葉切一升

右十一味切以水一斗先煑麻黄去沫下諸藥煑取三升分爲三服忌羊肉餳生菜出第七卷中

深師療肝氣實目赤若黄脅下急小便難瀉肝湯方

人參　甘草各三兩炙　生薑五兩　黄芩二兩

半夏一升洗　大棗十四枚擘

右六味切以水五升煑半夏三四沸内藥最後内薑煎取二升去滓分爲二服羸人三服忌海藻菘菜羊肉餳出第十三卷中

肝勞虚熱方四首

删繁療肝勞虚熱兩目爲赤閉塞不開煩悶宛轉熱氣胷裏炎炎前胡瀉肝除熱湯方

前胡　乾薑　大青　細辛

秦皮　決明子　梔子人　子芩各二兩

淡竹葉切一升 車前子切一升 石膏八兩碎綿裹

右十一味切以水一斗煑取三升去滓平旦分爲三服須利加芒消三兩忌生菜

又療肝勞熱悶關格不通精神不守氣逆上胷熱炎炎不止柴胡下熱湯方

柴胡 黄芩 澤瀉 升麻

芒消各三兩 玄參六兩 淡竹葉切 生地黄切各一升

乾薑二兩

右九味切以水九升煑取三升去滓下芒消平旦分三服忌蕪荑

又療肝勞熱恐畏不安精神不守悶怒不能獨卧感激惆悵志氣錯越不得安守茯苓安肝定精神丸方

茯苓 遠志去心 防風 人參

柏子人（熬各五分） 龍骨（七分） 牡蠣（熬） 大棗肉（各八分）

甘草（四分炙）

右九味擣篩白蜜和爲丸如梧子初服二十丸加至三十丸爲度煖清白飲進之日再服忌海藻菘菜大酢

又鶣鵲療勞邪氣熱眼赤方

灸當容百壯兩邊各爾當容在眼小眥近後在耳之前客主人三陽三陰之會處以手按之有上下行脉則是與耳相對並出第七卷中

肝勞虛寒方五首

刪繁療肝勞寒眩忘欬唾憂恚內傷面離色目青盲硫黃丸方

硫黃 乾薑 吳茱萸 人參

當歸 防風（各七分） 礜石（泥裏燒半日） 烏頭（各八分炮）

桂心 天雄（炮） 甘草（炙各六分） 蜀椒（汗）

皂莢炙去皮子　枳實炙各五分　細辛　甘菊花各四分

右十六味擣篩白蜜和爲丸如梧子初服二十丸加至三十丸日再温清酒進之忌猪肉冷水生葱生菜海藻菘菜

又肝勞虛寒關格勞濇閉塞不通毛悴色夭猪膏酒方

猪膏二升　生薑汁二升

右二味微火煎取三升下酒五升和分爲三服千金同

又療肝氣虛寒眼青盲䀮䀮不見物真珠煎方

真珠四分研　白蜜二合　鯉魚膽一枚

右三味和合微火上煎兩沸綿裹內眼中眼汁當自出藥歇更爲之本方又有鯉魚腦一枚

又療肝虛寒勞損口苦骨節疼痛筋攣縮煩悶虎骨酒補勞損骨節疼痛方

虎骨一升炙取黃焦碎如雀頭　乾薑　芎藭

地骨皮各四兩　白朮　豬椒根　五加皮
枳實熬各五兩　丹參八兩　乾地黃七兩

右十味㕮咀以絹袋貯清酒四升漬四宿初服六七合加至一升日再服忌蕪荑桃李雀肉等並出第七卷中

千金療肝勞虛寒脅下痛脹滿氣急眼昏濁視不明檳榔湯方

生薑　附子炮各七兩　檳榔七枚合皮碎　茯苓三兩
桔梗四兩　橘皮　桂心各三兩　白朮四兩
吳茱萸五兩

右九味切以水九升煮取三升去滓分為三服若氣喘加芎藭三兩半夏四兩洗甘草二兩炙忌酢物生葱豬肉冷水海藻菘菜桃李雀肉等出第十一卷中

膽實熱方二首

刪繁療膽腑實熱精神不守瀉熱梔子煎方

梔子二十一枚　甘竹茹一兩熬　香豉六合熬綿裹　大青

橘皮去脉各二兩　赤蜜三合

右六味細切以水六升煑取一升七合去滓下蜜更微火上

煎兩三沸分再服出第四卷中

千金療膽腑實熱精神不守瀉熱半夏千里水湯方

半夏洗　宿薑各三兩　酸棗五合　黄芩一兩

遠志去心　茯苓各一兩　生地黄五兩　秫米一升

右八味細切取流水五斗煑秫米令蟹目沸揚之三千下澄

清取五升煑藥取二升半分爲三服忌羊肉餳酢物蕪荑

出第十二卷中

髓虚實方二首

删繁論曰髓虚者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虚實之應主於

肝膽若其腑藏有病從髓生熱則應藏寒則應腑千金同出

第三卷中

千金療髓虛腦痛不安膽腑中寒羌活補髓丸方

羌活　芎藭　當歸各三兩　桂心二兩

人參四兩　酥一升　棗肉一斤研爲脂　大麻人二升熬研爲脂

羊髓一升　牛髓一升

右十味先擣五種乾藥爲散下棗膏麻人又擣相濡爲一家下二髓并酥内銅鉢中重湯煎之取好爲丸如梧子酒服三十丸日再加至四十丸忌生葱

又療髓實勇悍驚熱主肝熱柴胡發泄湯方

柴胡　升麻　黄芩　細辛

枳實炙　梔子人　芒消各三兩　澤瀉四兩

淡竹葉切一升　生地黄切一升

右十味切以水九升煮取三升去滓下芒消分爲三服忌生

菜蕪荑並出第十二卷中

咽門論并傷破聲嘶方二首

千金論曰夫咽門者應五藏六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽門者肝膽之候也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五藏六腑津液神氣應十二時若藏熱咽門則閇而氣塞若腑寒咽門則破而聲嘶毋薑酒主之熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣出第十二卷中删繁同

又療咽閇主膽腑咽門傷破聲嘶毋薑酒方

毋薑汁二升　牛髓　酥　油各一升別煎取熱

桂心　秦椒各四分　芎藭　獨活各五分

防風六分

右九味將五物合擣下篩爲散內薑汁中煎取相淹濡下髓

酥油等攪令調微火上三上三下平旦溫清酒一升下合膏細細呑之日三服忌生葱刪繁同此方出第六卷中今錄附此論後

六極論一首

刪繁論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀（素問作谷）氣感於脾雨氣潤於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水注之於氣所以竅應於五藏五藏邪傷則六腑生極故曰五藏六極也出第八卷中

筋極論一首

刪繁論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又曰以春遇病爲筋痺筋痺不已復感於邪內舍於肝陽氣入於內陰氣出於外凡陰氣外出出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於眼下而傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好

轉筋其源以春甲乙日得之於傷風風在筋爲肝虚風也若陽氣内發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則欬欬則脅下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以别柔剛陽病療陰陰病療陽善療病者病在皮毛肌膚筋脉而療之次療六腑若至五藏則半死半生矣鷂鵲曰筋絶不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼駡口不息筋應足厥陰足厥陰氣絶於筋則筋縮引卵與舌足厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉不營則筋急筋急則引卵與舌故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木醫之拱手也千金同出第八卷中

筋實極方四首

删繁療筋實極則好怒口乾燥好嗔身躁不定調筋止怒定氣

黄耆湯方

黄耆　芎藭　白柘皮無刺者各三兩　白术

通草　芍藥各四兩　甘草炙　桂心各二兩

大棗四十枚擘去核　石膏八兩碎綿裹　竹葉切一升

右十一味切以水九升煑取三升去滓分爲三服忌海藻菘菜生葱桃李雀肉等

又療筋實極則欬欬則兩脅下縮痛痛甚則不可動轉橘皮通氣湯方

橘皮四兩　白术　石膏碎綿裹各五兩　桂心

細辛　當歸　茯苓各三兩　香豉一升熬別裹

右八味切以水九升煑取三升去滓分爲三服忌桃李雀肉生葱生菜酢物千金同並出第八卷中

千金療筋實極則兩脚下滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折

痛不可忍丹參煑散方

丹參十二分 芎藭 杜仲 續斷

地骨皮各八分 通草 當歸 乾地黃

麥門冬去心 禹餘粮鍊 麻黃去節各七分 甘草炙

桂心各五分 牛膝九分 生薑薄切炒取焦燥 牡蠣各十分熬

升麻六分

右十七味擣下篩爲散以絹袋子盛散二方寸匕以井華水二升煑數動絹囊子煑取一升爲一服日再煑忌海藻菘菜生葱蕪荑刪繁同

又療筋實極則手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿地黃煎方

生地黃汁三升 生葛汁一升澄清 生玄參汁一升 大黃二兩

梔子人 升麻 麻黃去節 犀角屑各三兩

石膏五兩碎 芍藥四兩

右一十味切以水七升煮取二升去滓下地黃汁一兩沸次下葛汁等煎取三升分爲三服日再忌蕪荑删繁肘後同並出第十一卷中

筋虛極方二首

删繁療筋虛極則筋痺好悲思顏色蒼白四肢噓翕脚手拘攣伸動縮急腹中轉痛五加皮酒方

五加皮一斤 枳刺二升㕮咀炙 豬椒根皮 丹參各八兩

桂心 當歸 甘草炙各三兩 天雄炮

秦椒汗 白鮮皮 通草各四兩 芎藭

乾薑各五兩 薏苡人半升 大麻人三升研爲末

右十五味㕮咀以絹盛貯酒四斗漬春夏四宿秋冬六七宿初服六七合稍稍加之以知爲度忌生葱豬肉冷水海藻菘菜

又療筋虛極傷風爲風所傷入筋筋縮攣腰背不伸強直苦痛或爲脚氣牛膝湯方

牛膝　防風　甘李根皮　丹參

前胡各四兩　石斛五兩　杜仲　秦艽

續斷　鱉甲炙各三兩　陳橘皮二兩　大麻人二升熬研

右十二味切以水一斗四升煑取五升去滓下麻人更煎取二升分三服忌莧菜並出第八卷中

筋虛胞轉方二首

刪繁療筋虛實暴損絶極或因霍亂轉筋腹滿痛或因服藥吐利過度脚手虛轉腸胞轉痛人參湯方

人參　厚朴炙各二兩　葱白一虎口　白朮四兩

蓼一把長三寸

右五味切以水五升煑取二升去滓分再服忌桃李雀肉等

又療胞轉筋急方

白朮 通草各四兩 梔子人 子芩

茯苓各二兩 榆白皮三兩 香豉一升綿裹熬

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌酢物桃李雀肉等並出第八卷中一方無香豉

轉筋方七首

范汪療轉筋方

以鹽一升水一升半作湯洗漬良

又療轉筋在兩臂若胷脅者方

灸手掌白肉際七壯並出第八卷中

刪繁療轉筋十指筋攣急不得屈伸灸法

灸手踝骨上七壯良

又鶣鵲療轉筋脛骨痛不可忍方

灸屈膝下廉横筋上三壯

又治轉筋方

灸涌泉涌泉在脚心下當大毋指大筋灸七壯亦可

灸大都在足大毋指本節内側白肉際灸七壯

又腹腸轉筋方

灸臍上一寸十四壯並出第八卷中

近効療脚轉筋及渾身轉筋方

煖水稍熱於浴斛中坐浸須臾便差如湯沃雪

心勞論一首

删繁論曰凡心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長心氣内洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣心生竅竅主耳耳枯燥而鳴不能聽遠毛悴色夭死於冬出第七卷中

心勞實熱方五首

删繁療心勞實熱好笑無度自喜四肢煩熱麻黃止煩下氣湯方

麻黃節去 梔子人 茯苓 子芩

白朮各三兩 石膏八兩碎綿裹 桂心二兩 芒消三兩

生地黃切一升 大棗二十枚 雞子二枚 甘草一兩炙

赤小豆二合

右十三味切以水一斗煎和下雞子白攪調去沫下諸藥煮取二升五合去滓下竹瀝芒消煎一沸分爲三服忌生葱酢物桃李雀肉海藻菘菜等前無竹瀝後去下竹瀝恐有之

又療心勞熱口爲生瘡大便苦難閉澁不通心滿痛少腹熱大黃泄熱湯方

大黃 澤瀉 黃芩 梔子人

芒消各三兩 桂心二兩 大棗二十一枚擘 通草二兩

石膏八兩碎綿裹 甘草一兩炙

右九味切以水九升先取一升水別漬大黃一宿以餘八升煑諸藥取二升五合去滓下大黃更煑兩沸去大黃滓下芒消分爲三服忌海藻生葱菘菜

又療心勞熱傷心有長蟲名蠱蟲長一尺周心爲病雷丸丸方

雷丸熬 橘皮 石蠶炙 桃皮炙各五分

狼牙六分 貫衆二枚 蕪荑熬 青葙子

蜀漆各四分 殭蠶三七枚熬 茱萸根皮七分 亂髮如雞子大燒末

右十二味蒸切擣篩白蜜和爲丸如梧子清白飲一服七丸不覺更加至二七丸爲度日再

又療心勞熱心主竅竅主耳耳枯焦而鳴不能聽遠磁石湯方

磁石五兩碎綿裹 茯苓 大青 人參

白朮 昌蒲 芍藥各三兩 竹葉切一升

赤石脂 二兩綿裹

右九味切以水九升煮取二升五合去滓分爲三服忌羊肉餳酢物桃李雀肉等 本方無芍藥

又療心勞熱不止肉毛焦色無潤口赤乾燥心悶麥門冬飲方

生麥門冬 一升去心　陳粟米 一升　雞子 二七枚取白　淡竹葉 切三升

右四味先以水一斗八升煮粟米竹葉取九升去滓澄清接取七升冷下雞子白攪五百轉去上白沫下麥門冬煮取三升去滓分三服並出第七卷中

心實熱方三首

千金瀉心湯療心實熱或欲吐吐而不出悶喘急頭痛方

小麥 三升　香豉 一升綿裹　石膏 一斤碎綿裹　地骨皮 五兩

梔子人 二十一枚　茯苓 二兩　淡竹葉 切一升

右七味切以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清下諸藥

煑取三升去滓分溫三服忌酢物（本名有膏湯）

又療心實熱驚夢喜恐畏悸懼不安竹瀝湯方

淡竹瀝（一升） 石膏（八兩碎綿裹） 人參 知母（去毛）

赤石脂 梔子人 芍藥 白朮（各三兩）

茯神 紫苑（各二兩） 生地黃汁（一升）

右十一味切以水九升煑十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利下芒消二兩去芍藥分爲三服忌桃李雀肉酢物蕪荑

又茯神煑散主心實熱口乾煩渴眠卧不安方

茯神 麥門冬（去心各六分） 通草（六分） 升麻（五分）

淡竹茹（一丸如雞子大熬） 知母（四分去毛） 赤石脂（七分） 紫菀

桂心（各三分） 大棗（二十枚擘）

右十味擣麤篩爲散取方寸匕帛裹之以井華水二升半煑

取九合時動藥裹子平旦爲一服日再服忌生葱酢物並出

第十三卷中

脉極論一首

删繁論曰凡脉極者主心也心應脉脉與心合心有病從脉起又曰以夏遇病爲脉痺脉痺不已復感於邪内舍於心則食飲不爲肌膚顔脱面色白不澤其脉空虚口脣見赤色凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風風損脉爲心風心風狀汗多若脉氣實則熱熱則傷心使人好怒口爲色赤甚則言語不快血脱色乾燥不澤食飲不爲肌膚若脉氣虚則寒寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虚實候也若陽經脉病療陰絡陰絡脉病療陽經定其血氣各守其鄉脉實宜瀉氣虚宜補善療病者病在皮毛肌膚筋脉則全療之至六腑五藏則半死半生鶣鵲曰脉絶不療三日死何以知之脉氣空

虛則衰顏焦髮落脉應手少隂手少隂氣絶則脉不通手少隂者心脉也心者脉之合也脉不通則血不流血不流則髮色不澤故面黑如漆柴則血脉先死壬篤癸死水勝火故非治藥所効也

出第八卷中千金同

脉熱極方三首

刪繁療脉實熱極血氣傷心使心好生赫怒口爲色變赤言語不快消熱止血氣調脉理中茯苓湯方

茯苓　黄芩　梔子人　芒消各三兩

赤石脂　升麻　紫菀各二兩　生麥門冬五兩去心

竹葉切一升　香豉一升熬　石膏八兩碎綿裹　生地黄切一升

右十二味切以水九升煑取二升去滓下芒消分爲三服忌酢物蕪荑

又療脉極熱傷風損脉爲心風心風狀多汗無滋潤消虛熱極止

汗麻黃湯方

麻黃（去節）　杏人（各四兩去尖皮兩人碎）　梔子人　黃芩

防風　紫菀（各三兩）　升麻　桂心

茯神　人參（各三兩）　大棗（二十枚擘）　石膏（六兩碎綿裹）

桑根白皮（一升）

右十三味切以水一斗先煑麻黃三沸去沫下諸藥煑取三升去滓分爲三服忌生葱酢物

又療脉熱極遇風爲痺痺感心顏脫面色白不澤脉空虛口脣色赤乾燥升麻潤色消痺止熱極湯方

升麻　射干　芎藭　人參（各三兩）

赤小豆（五合）　生薑（四合）　麥門冬（去心四兩）　葳蕤（四兩）

生地黃（切一升）　甘草（二兩炙）　竹葉（切一升）

右十一味切以水一斗煑取二升去滓分爲三服忌海藻菘菜

無黄並出第八卷中

脉寒極方四首

刪繁療脉極虛寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺

半夏消痛止極益氣湯方

半夏一升十洗四破　宿薑八兩　芎藭　細辛

附子炮　玄參　當歸各三兩　桂心

甘草炙　茯苓各二兩　杏人六十枚去兩人皮尖碎

右十一味切以水一斗煑取三升去滓分温三服忌羊肉餳

生葱菜猪肉冷水菘菜海藻酢物等

又療脉極虛寒鬢髮墮落安髮潤生桑白皮沐頭方

桑白皮二升細切

右一味以水淹漬煑五六沸去滓洗沐鬢髮數數爲之自

不復落

又方

麻子三升研　白桐葉一把切

右二味以淘米甘汁二斗煑取五六沸去滓以洗沐頭則鬢髮不落而長

又療髮墮落方

生柏葉一升　附子四枚炮　猪膏三斤

右三味末以膏三斤和爲三十九用布裹一丸内煎沐頭汁中令髮長不復落也並出第八卷中

脾勞論一首

删繁論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺王則感脾是以聖人春夏養陽秋冬養陰以順其根矣肝心爲陽脾肺腎爲陰太陰陽明爲表裏一云太陰陽明爲根　逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之始終也千金同出第七卷中

脾勞實熱方四首

刪繁療脾勞熱身體眼目口脣悉痿黄舌本苦直不能得咽唾生地黄煎方

生地黄汁三升 赤蜜 石膏各一升碎綿裹 升麻

射干 子芩各三兩 生玄參八兩 梔子人

葳蕤各四兩 甘草二兩炙

右十味切以水七升先煑石膏等取二升去滓下生地黄汁更煎取四升綿挍分爲四服若湏利泄加芒消三兩分爲三服餘一服停下芒消留晚若熱不止更進服之得利泄止後一服也忌海藻菘菜蕪荑

又療脾勞熱有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔胷中塞嘔而不出前胡吐熱湯方

前胡 白朮 赤茯苓 枳實炙

細辛　旋復花　龍膽　杏人去尖皮雙人
常山　松蘿三兩　竹葉切一升
右十一味切以水一斗煑取三升去滓分爲三服若腹中熱滿加芒消山梔子人黄芩各三兩苦參二兩加水二升忌酢物桃李雀肉生葱生菜
又療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔茱萸根下蟲酒方
東行茱萸根大者一尺　大麻子八升　橘皮二兩切
右三味㕮茱萸根擣麻子並和以酒一斗漬一宿微火上薄煖之三上三下絞去滓平旦空腹爲一服取盡蟲便下出或死或半爛或下黄汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下
驗並出第七卷中
千金療脾勞實熱四肢不用五藏乖反脹滿肩息氣急不安承氣泄實熱半夏湯方

半夏洗　宿薑各八兩　橘皮　芍藥各八兩

茯苓　白朮　杏人各三兩去皮尖兩人研

大棗二十枚擘　竹葉切一升

右九味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服刪繁同忌羊肉餳大酢桃李雀肉等出第十五卷中

脾勞虛寒方三首

刪繁療脾勞虛損消瘦四肢不舉毛悴色夭牛髓補虛寒丸方

牛髓　鹿髓　羊髓　白蜜

酥　棗肉研爲脂各一升　人參四分　生地黃十斤切酒二升漬三宿出暴還內酒中取盡暴乾　桂心　茯苓各四分　乾薑

白朮　芎藭各五分　甘草六分

右十四味擣篩內五髓中微火煎攪可爲丸如梧子初服三十丸加至四十丸爲劑日再服溫清酒進之忌海藻菘菜生葱

蕪荑桃李雀肉酢髓字恐誤并酥蜜爲五物亦

又療脾虛勞寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不解人參消食八味等散方

人參 茯苓 陳麥麴熬 麥糵熬

白朮 吴茱萸 厚朴炙 檳榔人炙各八分合子用

右藥擣篩爲散食後服方寸匕日再服清酒進之千金同忌酢物桃李雀肉等並出第七卷中

千金療脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫消食膏酒方

猪膏三升 宿薑汁五升 吴茱萸一升 白朮一斤

右四味擣篩茱萸朮等二物爲細散內薑汁膏中煎取六升温清酒一升進方寸匕日再服刪繁同忌桃李雀肉等出第十五卷中

脾實熱方六首

千金療脾實熱舌本強直或夢歌樂而體重不能行瀉熱湯方

前胡 茯苓各三兩 龍膽 細辛各二兩

芒消三兩 玄參 大青各二兩 苦竹葉切一升

杏人四兩去尖皮兩人者

右九味切以水九升煮取三升分三服忌酢物生菜

又射干湯主療與前方同

射干八兩 大青三兩 石膏十兩碎綿裹 赤蜜一升

右四味切以水五升煮取一升五合去滓下蜜煎取二升分三服

又療脾熱脅痛熱滿不歇目赤不止口脣乾裂方

石膏一斤碎綿裹 生地黃汁一升 赤蜜一升 淡竹葉切五升

右四味以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石膏取一升五合去滓下地黃汁兩沸下蜜煎取三升細細服之忌蕪荑

又療脾熱偏一邊痛胷滿脅偏脹方

茯苓　橘皮　澤瀉各三兩　石膏八兩碎綿裹

桑根白皮一升　芍藥　白朮各四兩　桂心

人參各二兩　生薑一升切　半夏六兩洗

右十一味切以水一斗二升煑取三升分爲三服若須利加芒消二兩忌羊肉餳桃李雀肉生葱酢物並出第十五卷中

千金翼瀉脾湯主脾藏病氣實胷中滿不能食方

茯苓　厚朴炙各四兩　甘草炙　人參

黄芩各二兩　桂心五兩　生薑八兩　半夏一升洗

右八味切以水七升煑取三升分爲三服此方又主冷氣在脾藏走出四肢手足流腫亦逐水氣忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物等

又主脾氣實其人口中淡甘卧憒憒痛無常處嘔吐反胃方

大黄六兩

右一味以水六升煑取一升分再服又主食即吐并大便不通者加甘草二兩煑取二升半分爲三服忌海藻菘菜並出第十七卷中

深師調中利飲食除胃中積聚寒熱老人將服長肌肉令人光澤瀉脾丸方

瀉脾丸主脾氣不調及腹滿方三首

黄芩　杏人去尖皮兩人熬　澤瀉　通草

芎藭　桂心　白朮　乾薑各五分

茯苓　黄耆　乾地黄各分　附子二分炮

麦門冬四分去心

右十三味擣篩蜜和服如梧子二丸日三服忌猪肉冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑等出第十三卷中

千金翼瀉脾丸主脾氣不調有寒熱或下閉塞調五藏不利嘔

逆飲食者方

大黃六分 杏人去尖皮並人熬 附子炮 當歸

乾薑 桂心各四分 人參 細辛

芍藥 茯苓 半夏洗 黃芩

蜀椒各三分汗 玄參三分

右十四味擣篩蜜和丸如梧子飲服六丸日三增至十丸忌猪羊肉冷水餳生葱生菜酢物等深師無半夏附子

又瀉脾丸主毒風在脾中流腫腹滿短氣食輒響響不消時時微下方

當歸三分 吳茱萸二分 乾薑二分 大黃二分

狼毒一分炙 桂心三分 芎藭二分 蜀椒汗二分

白薇一分 甘遂熬二分 附子炮二分 葶藶熬令紫色三分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日三忌猪肉冷水

生葱並出第十七卷中

温脾湯主脾氣不足及不調下痢方六首

深師厚朴湯療冷實服温脾湯不差乃服此湯方

厚朴四兩炙 桂心二兩 枳實三兩炙 生薑五兩

右四味切以水五升煑取二升分爲三服相去五里久不過五劑忌生葱

又温脾湯療脾胃中冷結實頭痛壯熱但苦下痢或冷滯赤白如魚腦方

人參一兩半 乾薑 附子各二兩炮 大黄三兩

右四味切以水六升煑取一升半分爲三服忌猪肉冷水

又大温脾湯療脾胃中冷不得食又穀不消嚮嚮脹滿時苦下痢方

黄芩 人參 芍藥 附子各一兩炮

甘草炙 乾薑 大黄 厚朴各二兩炙

右八味切以水八升煑取二升八合分爲三服亦可四服得下佳不下須臾復服甚良忌猪肉海藻菘菜並出第二十一卷中

千金翼溫脾湯主脾氣不足虛弱下痢上入下出方

乾薑 大黃各三兩 人參 附子炮

甘草炙各二兩

右五味切以水八升煑取二升半去滓分爲三服忌海藻菘菜猪肉冷水深師文仲同

又溫脾湯主脾氣不足水穀下痢腹痛食不消方

半夏四兩洗 乾薑 赤石脂 白石脂

厚朴炙 桂心各三兩 當歸 芎藭

附子炮 甘草炙 人參各二兩

右十一味切以水九升煑取三升分爲三服忌海藻菘菜猪肉

冷水羊肉餳生葱

又建脾湯主脾氣不調使人身重如石欲食即嘔四肢酸削不收方

芍藥 甘草炙 黄耆各一兩 生薑二兩

生地黄一兩 白蜜一升

右六味切以水九升煑取三升去滓内蜜攪令調煎令微沸

服八合日三夜一忌海藻菘菜蕪荑深師同出第十七卷中

温脾丸主脾胃中冷及不足方四首

深師療宿寒脾胃中冷心腹脹滿食不消化温脾丸方

大黄二兩 麥麴熬 乾薑各三兩 厚朴炙

附子炮 當歸 甘草炙 桂心

人參 枳實炙各一兩

右十味擣下篩蜜和服如梧子十五丸日三增至二十丸亦得食

已服之無當歸者用芎藭一兩代之忌猪肉冷水海藻菘菜生

葱等

又療藏氣不足溫養五藏消水穀下氣令人能食溫脾丸方

法麴五兩熬 乾薑炮 枳實炙各五兩 附子三兩炮

人參 甘草炙各二兩 蜀椒一兩汗

右七味擣篩蜜和服如梧子十五丸酒飲皆得不知增之忌豬肉冷

水海藻菘菜並出第十三卷中

千金翼大溫脾丸主脾胃中冷水穀不化脹滿或時寒極方

法麴五合熬 甘草炙 桔梗 人參

乾薑各三兩 桂心五兩 附子炮 細辛各二兩

枳實三枚炙 吴茱萸 大麥蘖各五兩熬

右十一味擣篩蜜和丸如梧子酒服七丸日三加至十五丸忌

海藻菘菜豬肉生菜

又溫脾丸主脾胃氣弱大腹冷則下痢少腹熱則小便難房巒腹

滿喘氣虛乏乾嘔不得食溫中消穀療脾益氣方

法麴熬　吴茱萸　小麥蘖各五合熬　枳實三枚炙

甘草炙　桂心　厚朴炙　當歸

茯苓各三兩　細辛　乾薑　麥門冬去心

人參　桔梗　附子各一兩炮

右十五味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服七丸日三亦可加大黃二兩忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜酢物文仲肘後同

並出第十七卷中

肉極論一首

删繁論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病爲肌痺肌痺不已復感於邪内舍於脾體淫淫如鼠走其身上津液脱腠理開汗大泄鼻上色黄是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊巳日得之於傷風爲脾

風脾風之狀多汗陰動傷寒寒則虛虛則體重怠墮四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脅下痛陰陰引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱熱則實實則身上如鼠走脣口壞皮膚色變身體津液脫腠理開汗大泄名曰惡風而須決其剛紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實則寫之虛則補之善療病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之間即須決之若入六腑五藏則半生半死鶣鵲曰肉絕不療五日死何以知之皮膚不通外不得泄肉應足太陰足太陰氣絕則脉不營其口脣口脣者肌肉之本也脉不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反則肉先死甲篤乙死木勝土若使良醫妙藥終不可療千金同出第八卷中

肉極熱方四首

刪繁療肉極熱肌痺淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄爲

脾風風氣藏於皮膚肉色則敗鼻見黄色麻黄止汗通肉解風痺湯方

麻黄(去節) 枳實(炙) 防風 白朮

細辛(各三兩) 石膏(八兩碎綿裹) 生薑 附子(炮各四兩)

甘草(炙) 桂心(各二兩)

右十味切以水九升先煑麻黄去沫下諸藥煑取三升分三

服千金同忌猪肉海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉等

又療肉極熱則體上如鼠走或風痺脣口壞皮膚色變石南散方

石南(炙五分) 署預 天雄(炮) 桃花

菊花 甘草(炙各四分) 黄耆(三分) 山茱萸(七分)

真珠(二分) 石膏(八分碎) 升麻 葳蕤(各六分)

右十二味擣篩爲散服方寸匕食後服日再温清酒進之千金

同忌猪肉海藻菘菜並出第八卷中

千金療肉極熱則身體津液脱腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱

越婢湯方

麻黃（六兩去節） 石膏（八兩綿裹碎） 生薑（二兩） 甘草（二兩炙）

附子（一枚炮） 大棗（十五枚擘）

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分爲三服一名起脾湯忌猪肉海藻菘菜刪繁同出第七卷中（本方無附子）

又療肉極虛熱肌膚淫淫如鼠走津液脫腠理開汗大泄或痺不仁四肢急痛西州續命湯方

麻黃（去節） 生薑（各三兩） 當歸 石膏（碎綿裹各二兩）

芎藭 桂心 甘草（炙） 黃芩

防風 芍藥（各一兩） 杏人（四十枚熬去尖皮兩人）

右十一味切以水九升先煮麻黃去上沫下諸藥煮取二升去滓分爲四服日再忌海藻菘菜生葱刪繁同出第八卷中

肉極寒方五首

千金療肉極虛爲脾風隂動傷寒體重怠墮四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致大黃耆酒方

黃耆　巴戟天去心　桂心　石斛

蜀椒汗　澤瀉　茯苓　柏子人

乾薑各三兩　防風　人參　獨活各一兩

芍藥　山茱萸　天雄炮　附子炮

烏頭炮　茵芋　栝樓　半夏洗

細辛　白朮　黃芩各一兩

右二十三味㕮咀絹盛貯以清酒三斗漬之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加微痺爲度日再刪繁同忌豬羊肉桃李雀肉生菜生葱酢物出第十五卷中

刪繁療肉極虛寒則脾欬其狀右脅下痛隂隂引肩背痛不可以動動則欬腹脹滿留飲痰澼大小便不利少腹切痛膈上寒

大半夏湯方

半夏（一升洗） 白朮 茯苓 人參

甘草（炙） 附子（炮） 橘皮（各二兩） 生薑（八兩）

桂心（三兩）

右九味切以水一斗煑取三升去滓分爲四服忌羊肉餳桃李雀肉生葱海藻菘菜猪肉冷水

又療肉極虛寒則皮膚不通外不得泄名曰厲風内虛外實腰脚疼弱大風引湯方

獨活（四兩） 當歸 茯苓（各二兩） 乾薑

甘草（炙） 人參 黄耆 防風（各二兩）

桂心 附子（炮各一兩） 大豆（二升熬去皮）

右十一味切以水一斗酒三升煑取四升去滓分爲四服晝三夜一忌海藻菘菜猪肉生葱酢物等

又療肉極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰脚疼弱小風引湯方

獨活 防風 茯苓 甘草炙

人參各三兩 當歸 乾薑各二兩 附子一枚炮

大豆二升熬去皮

右九味切以水一斗酒三升煑取二升去滓分爲四服日三夜一忌猪肉冷水海藻菘菜酢物等

又療肉極虚寒四肢怠墮或欬脅下堅滿痛飲食不嗜欲舉不能手足厥冷憂恚思慮五膈丸方

人參十分 附子炮 乾薑各三分 遠志二分去心

桂心 椒汗 麥門冬去心 甘草炙各五分

細辛四分

右九味擣篩蜜和丸如彈子大取一丸著喉中稍稍咽之覺胷中熱藥勢盡又服日三夜一亦可丸如梧子十丸酒服忌

猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜並出第八卷中

肺勞論一首

刪繁論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣千金同出第七卷中

肺勞實熱方五首

刪繁療肺勞實氣喘息鼻張面目苦腫麻黃引氣湯方

麻黃去節 杏人去皮尖兩人 生薑 半夏洗各五兩

石膏八兩碎綿裹 白前 細辛 桂心各一兩

竹葉切一升 橘皮一升 乾紫蘇四兩

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌羊肉餳生葱生菜

又療肺勞熱損肺生蟲形如蠶在肺爲病令人欬逆氣喘或爲

憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏肓鍼灸不著

麥門冬五膈下氣丸方

麥門冬十分去心 椒四分汗 遠志皮 附子炮

細辛各六分 甘草十分炙 乾薑 桂心

人參 百部 白朮 黃耆各五分

杏人四十枚熬去尖皮兩人者

右十三味擣篩以白蜜和爲丸如彈子大將一丸內牙齒間含稍稍咽其汁忌猪肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等

又療肺勞熱生肺蟲在肺爲病桑根白皮煎方

桑根東引白皮切一升 狼牙三兩 東行茱萸根皮五兩

右三味切以酒三升煑取一升平旦服之良

又療肺熱不問冬夏老少頭生白屑搔之痒起者然肺爲五藏之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭皮白屑搔之而起人多患

此皆從肺來世呼爲頭風也沐頭湯方

大麻人三升 秦椒二兩 皂莢屑五兩

右三味熟研内米泔汁中一宿漬去滓木匕攪之三五百遍取勞乃用沐髮燥訖別用皂莢湯洗之通理然後傅膏

又療頭風頭中痒搔之白屑起五香膏方

藿香 甘松香 甲香炙 雞舌香

附子炮 續斷 烏喙炮各五分 澤蘭

防風 細辛 白朮各四分 白芷

松葉 莽草各七分 柏葉八分炙 大皂莢二寸炙

甘草三分炙 豬膏四升

右十八味㕮咀綿裹以苦酒二升漬一宿用膏煎之取附子黃爲度去滓準前沐頭了將膏傅用手揩頭皮令膏翕著皮非唯白屑差亦能長髮光黑滋潤並出第七卷中

肺勞虛寒方二首

刪繁療肺虛勞寒腹脹彭彭氣急小便數少厚朴湯方

厚朴四兩炙 枳實炙 桂心 橘皮

大黃各三兩 甘草二兩炙 五加皮 生薑各五兩

大棗二十枚擘

右九味切以水一斗二升煮取三升去滓分溫三服忌海藻菘菜生菜

又療肺虛勞寒損則腰背苦痛難以俛仰短氣唾如膿生薑溫中下氣湯方

生薑一斤 大棗三十枚 杜仲皮五兩 萆薢

桂心各四兩 白朮五兩 甘草炙 附子炮三兩

右八味切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌猪肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等並出第七卷中

肺虛勞損方三首

删繁療肺虛勞損腹中寒鳴切痛胷脅逆滿氣喘附子湯方

附子炮　甘草炙各二兩　宿薑　半夏洗破各四兩

大棗二十枚擘去皮核　白朮三兩　倉米半升

右七味切以水一斗煮取三升去滓分為三服忌猪羊肉餳海藻菘菜桃李雀肉等

又建中湯療肺虛損不足補氣方

黃耆　芍藥各三兩　甘草炙二兩　桂心三兩

生薑六兩　半夏五兩洗　大棗十二枚擘　飴糖十兩

右八味切以水八升煮取三升分為三服服忌羊肉餳海藻菘菜生葱

又療肺虛勞損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而生瘡猪懸蹄青龍五生膏方

猪後懸蹄三枚炙黃 生梧桐白皮四兩 生桑根白皮 龍膽

雄黃研各五分 蛇蛻皮五寸炙 生青竹皮六分 露蜂房炙

蜀椒各三分汗 猬皮燒 附子炮各四分 生柏皮七分炙

杏人三十枚去皮尖

右十三味細切綿裹以苦酒二升半淹漬一宿於火上炙燥擣篩以猪膏三升和微火上煎如薄糖傅瘡并酒服如棗大並出第七卷中

氣極論一首

千金論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病爲皮痺皮痺不已復感於邪内舍於肺則寒濕之氣客於六腑也凡肺有病先發氣氣上衝胷常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣爲肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣氣暮則甚陰氣至濕氣生故其陰畏陽氣晝日則差若

陽傷則熱熱則實實則氣喘息上脅膸甚則唾血也然陽病療陰陰是其裏陰病療陽陽是其表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決陰氣虛則引善療病者病初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五藏則半死半生矣鶣鵲曰氣絶不療喘而冷汗出二日死氣應手太陰手太陰氣絶則皮毛焦太陰者行氣溫皮毛者也氣不營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪枯毛折毛折則氣先死丙篤丁死火勝金非療所及也删繁同出第十七卷中

氣極熱方三首

删繁療氣極傷熱氣喘息衝脅常欲自恚心腹滿痛内外有熱煩嘔不安大前胡湯方

前胡八兩　半夏洗　麻黄去節　芍藥各四兩

枳實四枚炙　生薑五兩　黄芩三兩　乾棗十二枚擘

右八味切以水九升煑取三升去滓溫分三服如人行四五里進一服忌羊肉餳

又療氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾竹葉湯方

竹葉切一升 麥門冬去心 小麥 生地黃切各一升

生薑六兩 乾棗十枚擘去核 麻黃三兩去節 甘草一兩炙

石膏六兩碎綿裹

右九味切以水一斗煑取三升去滓分爲三服忌海藻菘菜蕪荑

又療氣極傷熱肺虛多汗欬唾上氣喘急麻黃湯方

麻黃四兩去節 甘草二兩炙 杏人四十枚去皮尖兩人 桂心二兩

生薑二兩 半夏五十枚洗四破 石膏六兩碎 紫菀一兩

右八味切以水九升煑麻黃兩沸去上沫下藥煑取三升去

滓分爲三服忌海藻生葱菘菜羊肉餳並出第八卷中

氣極寒方二首

刪繁療氣極寒傷風肺虛欬氣短不得息胷中迫急五味子湯方

五味子 甘草炙 紫菀 桂心

附子炮 麻黃去節 乾薑 芎藭各二兩

細辛一兩 乾棗二十枚擘

右十味切以水九升煮取三升去滓分爲三服忌海藻菘菜猪肉生葱生菜出第八卷中

千金療氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏黃耆湯方

黃耆四兩 人參 白朮 桂心各二兩

生薑八兩 乾棗十枚擘去核 附子五分炮

右七味切以水八升煮取三升去滓分爲四服刪繁同忌桃

李雀肉生葱出第十七卷中（本方無附子）

腎勞論一首

删繁論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沈濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣千金同出第七卷中

腎勞實熱方二首

删繁療腎勞實熱少腹脹滿小便黄赤末有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡梔子湯方

梔子（三兩）　子芩（四兩）　石膏（五兩碎綿裹）　淡竹葉（切）

生地黄（切）　榆白皮（各一升）　芍藥　通草

石韋（去毛各三兩）　滑石（八兩碎綿裹）

右十味切以水一斗煑取三升絞去滓分爲三服忌蕪荑

千金同出第七卷中

千金療腎實熱少腹脹滿四肢正黑耳聾夢腰脊離解及伏水等氣急瀉腎湯方

黄芩（三兩） 磁石（八兩碎如雀頭綿裹） 大黄（三兩切以水一升蜜器中漬一宿）

甘草（炙二兩） 茯苓（三兩） 芒消（三兩） 生地黄（取汁）

昌蒲（各五兩） 玄參（四兩） 細辛（二兩）

右十味切以水九升煮七物取二升五合去滓内大黄更煮取二升三合去大黄滓下地黄汁微火上煎一兩沸下芒消分爲三服忌海藻菘菜羊肉餳生菜酢物蕪荑出第十九卷中

腎勞虛寒方二首

删繁療腎勞虛寒關格塞腰背強直飲食減少日日氣力羸人參補腎湯方

人參 甘草（炙） 桂心 橘皮

茯苓各三兩　杜仲　白朮各四兩　生薑五兩
羊腎一具去膏四破　猪腎一具去膏四破　薤白切一升

右十一味切以水三斗煑取六升去滓分爲六服晝四夜二服覆頭眠忌海藻菘菜生葱酢物桃李雀肉等

又療腎虛寒損耳鳴好唾欠呿委頓羊腎補腎湯方

羊腎一具細切　磁石碎綿裹　白朮各八兩　黄耆
茯苓　乾薑各四兩　桂心三兩

右七味切以水三斗煑取七升絞去滓分服一升晝四服夜三服燥器貯之六月減水忌生葱桃李雀肉酢物等並出第八卷中

腎勞熱方二首

千金療腎勞熱陰囊生瘡麻黄根粉方

麻黄根三兩　石硫黄三兩研　米粉五合

右三味擣下篩合研安絮如常用粉法搨瘡上粉濕更搨
之刪繁肘後同出第十九卷中

刪繁療勞熱四肢腫急少腹滿痛顏色黑黃關格不通鼈甲湯方

鼈甲炙 麻黃去節 升麻 前胡
羚羊角屑各三兩 桑根白皮五兩 薤白切一升 香豉一升熬綿別裹
黃芩三兩

右九味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌莧菜出
第八卷中

腎熱方三首

刪繁療腎熱四肢腫急有蟯蟲如果中蟲生在腎爲病貫衆散方

貫衆大者三枚切熬 乾漆三兩熬 吴茱萸五十粒 蕪荑熬
胡粉熬 槐皮燒各四分 杏人四十枚去尖皮熬研

右七味擣篩和胡粉研平且以井花水調服方寸匕並出第

八卷中

千金療腎熱好忘耳聽無聞四肢滿急腰背動轉強直方

柴胡　茯苓本方云茯神　澤瀉　黄芩

磁石碎綿裹　升麻　杏人去尖皮兩人者　大青

芒消各三兩　生地黄切一升　羚羊角四兩屑　淡竹葉切一升

右十二味切以水一斗煑取三升去滓下芒消分爲三服日再忌酢物

又療腎熱小便黄赤不出出如梔子汁或如黄蘗汁每欲小便即莖頭痛方

榆白皮切三升　滑石八兩碎　子芩　瞿麥

通草各三兩　石韋四兩拭去毛　冬葵子一升　車前草切二升

右八味切以水二斗煑車前草取一斗去滓澄清取九升下諸藥煑取三升五合去滓温分四服並出第十九卷中

骨極論一首

刪繁論曰凡骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇病爲骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑色是其候也凡腎病則骨極牙齒苦痛手足痠疼不能久立屈伸不利身痺腦髓痠以冬壬癸日中邪傷風爲腎風風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則欬唾若氣陽陽則實實則熱熱則面色炲隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠痟耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善療病者病始於皮毛肌膚筋脉即須療之若入六腑五藏則半生半死矣鶣鵲曰骨絕不治痟而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰足少陰氣絕則骨枯足少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親則

肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤則骨先死戊篤巳死土勝水醫所不能療千金同並出第八卷中

骨極實方四首

删繁療骨極主腎實熱病則色炲隱曲膀胱不通大便壅塞四肢滿急乾棗湯方

乾棗十枚擘去核　大黃　大戟切炒令黃　甘草炙

甘遂熬　黃芩各一兩　芫花半兩炒　芒消二兩

荛花半兩炒

右九味切以水五升煮取一升六合後下芒消分爲四服忌海藻菘菜出第八卷中

千金療骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞面顏枯黑耳鳴虛熱三黃湯方

大黃切別漬水一斗　黃芩　芒消各三兩　梔子十四枚

甘草一兩炙

右五味切以水四升先煑三物取一升五合去滓下大黃更煎兩沸下芒消分爲三服忌海藻菘菜删繁同出第十九卷中

又療骨實酸疼苦煩熱煎方

葛根汁一升　生地黃汁一升　生麥門冬汁一升　赤蜜

右四味汁相攪調微火上煎之三沸分三服忌蕪荑

又療骨髓中疼方

芍藥一斤　生地黃五斤　虎骨四兩炙

右三味切以酒一斗漬三宿暴乾復入酒如此取酒盡爲度擣篩酒服方寸匕日三忌蕪荑出第十九卷中

骨極虛方七首

删繁骨極虛寒主腎病則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢寤驚悸上氣少腹裏急痛引腰腰脊四肢常苦寒冷大小

便或白腎瀝湯方

羊腎一具猪腎亦得　芍藥　麥門冬去心　乾地黃

當歸各三兩　乾薑四兩　五味子二合　人參

茯苓　甘草炙　芎藭　遠志去心各二兩

黃芩一兩　桂心六兩　大棗二十枚擘

右十五味切以水一斗五升煑腎取一斗除腎內藥煑取四升去滓分爲四服晝三夜一若遺小便加桑螵蛸二十枚炙忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑

又灸法

鶌鵲曰第十八椎名曰小腸俞主小便不利少腹脹滿虛乏之兩邊各一寸二分隨年壯灸之主骨極並出第八卷中

千金療骨虛酸疼不安好倦主膀胱寒虎骨酒方

虎骨一具並通炙取黃焦汁盡碎之如雀頭大釀米

三石麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴者其

骨消麴而飲水也酒熟封頭五十日開飲

又療虛勞冷骨節痛無力方

豉二斗　地黃八斤切

右二味再遍蒸暴乾擣篩食後以酒一升服二方寸匕日再服

亦療虛熱等疾忌蕪荑

又虛勞體疼方

天門冬爲散酒服方寸匕日三二百日差忌鯉魚

又方

地黃一石取汁酒二斗相攪重煎溫服日三補髓忌

蕪荑

又療骨髓冷疼痛灸法

灸上廉七十壯三里下三寸是並出第十九卷中

精極論并方三首

删繁論曰凡精極者通主五藏六腑之病候也若五藏六腑衰則形體皆極目視無明齒焦而髮落身重則腎水生耳聾行步不正邪風逆於六腑淫虛厥於五藏故曰精極也凡陽邪害五藏陰邪損六腑陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主高高則實實則熱眼視無明齒焦髮脫腹中滿滿則歷節痛痛則宜瀉於內若陰病者主下下則虛虛則寒體重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行於五藏則欬欬則多涕唾面腫氣逆所以形不足者溫之以氣精不足者補之以味善療精者先療肌膚筋脉次療六腑五藏若邪至五藏則半死半生矣扁鵲曰五陰氣俱絕不可療絕則目系轉轉則目精奪爲志先死遠至一日半日矣非醫所及也宜須精研以表療裏以左療右以右療左以我知彼疾皆差也千金同並出第八卷中

千金療精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱竹葉黃芩湯方

竹葉切三升　黃芩　茯苓各三兩　生薑六兩

麥門冬去心　甘草炙　大黃各二兩　芍藥四兩

生地黃切一升

右九味切以水九升煮取三升去滓分為三服刪繁同忌酢物海藻菘菜蕪荑

又療精極五藏六腑俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痟痛煩悶方

生地黃汁二升　生麥門冬汁　赤蜜　竹瀝各一升

石膏八兩碎　人參三兩　芎藭三兩　甘草二兩炙

黃芩三兩　當歸四兩　桂心四兩　麻黃二兩去節

右十二味切以水七升先煮八物取二升去滓下地黃汁等煮取四升分四服日三夜一忌海藻菘菜生葱蕪荑刪繁同並

出第十九卷中（删繁桂三兩）

虚勞失精方五首

病源腎氣虚損不能藏精故精漏失其病少腹弦急陰頭寒目眶痛髪落診其脉數而散者失精脉也凡脉芤動微緊男子失精

出第四卷中

深師人參丸療虚勞失精方

人參（二兩） 桂心 牡蠣（熬） 署預

黄蘗 細辛 附子（炮） 苦參（各三分）

澤瀉（五分） 麥門冬（去心） 乾薑 乾地黄（各四分）

菟絲子（二分）

右十三味擣合下篩和以白蜜爲丸酒服如梧子大三丸痺加附子一分炮婦人血崩加乾地黄好者二分一本去黄蘗四分忌猪肉冷水生葱生菜蕪荑出第三卷中

范汪療男子虛失精三物天雄散方

天雄三兩炮　白朮八分　桂心六分

右藥擣下篩服半錢匕日三稍稍增之忌豬肉冷水桃李雀肉生葱文仲同出第六十八卷中張仲景方有龍骨

千金療男子虛勞失精陰縮灸法

灸中封五十壯

又男子虛勞失精陰上縮莖中痛方

灸大赫三十壯穴在夾屈骨端三寸並出第十九卷中

以上灸穴尺寸遠近具在第三十九卷中

古今錄驗療虛損失精黃耆湯方

黃耆　當歸　甘草炙各二兩　桂心六兩

蓯蓉　石斛各三兩　乾棗三百十枚　白蜜二升

右八味切以水一斗煮取四升內蜜煎取三升分爲四服日三

夜一以食相間忌海藻菘菜生葱范汪同出第三卷中

虛勞尿精方八首

病源虛勞尿精者腎氣衰弱故也腎藏精其氣通於陰勞傷腎虛不能藏於精故因小便而精液出也出第四卷中

深師療男子尿精方

栝樓根　澤瀉　土爪根各二兩

右三味擣合下篩以牛膝和爲丸如梧子先食服三丸良范汪去用四分餘並同

又尿精小便白濁夢泄韭子散方

韭子　菟絲子　車前子各一外　附子三枚炮

當歸　芎藭　礬石燒各三兩　桂心一兩

右八味擣合下篩溫酒服方寸匕日三亦可蜜和爲丸酒服如梧子大五九忌猪肉冷水生葱出第三卷中千金同

千金療虛勞尿精方

韭子一升 糯米一升

右二味以水一斗七升煮如粥取汁六升分爲三服精溢同此

又方

柘白皮五合 桑白皮五合

右二味切以酒五升煮取三升分爲三服一方柘白皮作石榴皮

又方

乾膠二兩炙

右一味擣末酒二升和溫分三服差一方用鹿角膠

又方

新韭子二升十月霜後採

右一味好酒八合漬一宿明旦日色好童子向南擣一萬杵

平旦溫酒五合服方寸匕日再服

又小便失精及夢泄精方

韭子一升熬　麥門冬一升去心　菟絲子二合　車前子二合

芎藭二兩　白龍骨三兩

右六味擣篩以酒服方寸匕日三不知稍稍增之甚者夜一服並出第十九卷中（肘後用澤瀉一兩半）

古今録驗棘刺丸療男子百病小便過多失精方

棘刺二兩　麥門冬去心　萆薢　厚朴炙

菟絲子　柏子人　蓯蓉　桂心

石斛　小草　細辛　杜仲

牛膝　防葵　乾地黃各一兩　石龍芮三兩

巴戟天二兩　烏頭半兩炮削去皮

右十八味擣下篩以蜜雜雞子黃各半和之擣五六千杵以飲服如梧子十丸日三稍稍增至三十丸以知爲度忌豬

肉冷水生葱生菜深師同並出第十卷中千金有萎蕤

虛勞夢泄精方一十首

病源腎虛爲邪所乗邪客於陰則夢交接腎藏精今腎虛弱不能制於精故因夢感動而泄也出第四卷中

深師韭子丸療虛勞夢泄精方

韭子五合熬　大棗五枚　黄耆　人參

甘草炙　乾薑　當歸　龍骨

半夏洗　芍藥各二兩

右十味擣合下篩和以白蜜棗膏丸如梧子服十九日三

四忌海藻菘菜羊肉餳千金同

又棘刺丸療虛勞諸氣不足數夢或精自泄方

棘刺　天門冬去心各二兩　乾薑　菟絲子

烏頭炮　小草　防葵　署預

石龍芮　枸杞子　巴戟天　萆薢

細辛　萎蕤　石斛　厚朴炙

牛膝　桂心各一兩

右十八味擣合下篩和以蜜雞子白各半相和丸如梧子先食服五丸日三若患風痿痺氣體不便熱煩滿少氣消渴枯悴加萎蕤天門冬菟絲子身黃汗小便赤黃加利加石龍芮枸杞子關節腰背痛加萆薢牛膝寒中氣脹時泄數唾嘔吐加厚朴乾薑桂心陰囊下濕精少小便餘瀝加石斛以意增之菟絲子酒漬之經一宿後有一方十四物長陰加肉蓯蓉磁石其說小異故兩存焉忌猪肉冷水生葱菘菜鯉魚等

又鹿角湯療勞夢泄精方

鹿角一具屑　韭白半斤　生薑一斤　芎藭

茯苓各二兩　當歸　鹿茸各二兩炙　白米五合

右八味切先以水五斗煑鹿角取一斗二升去滓內諸藥煑取四升分服一升日三夜一鹿角唯取肥而解者打令碎也忌酢物

又桂心湯療虛喜夢與女邪交接精爲自出方一名喜湯

桂心　牡蠣熬　芍藥　龍骨

甘草各三兩炙　大棗三十枚一方十枚　生薑五兩

右七味㕮咀以水八升煎取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜生葱並出第三卷中范汪同

千金療夢泄失精尿後餘瀝尿精方

人參　麥門冬去心　赤石脂　遠志去心

續斷　鹿茸炙各六分　茯神一去茯苓　龍齒炙

磁石研　蓯蓉各八分　乾地黃十二分　丹參

韭子熬　柏子人各五分

右十四味擣篩蜜和丸如梧子以酒服二十丸日再稍稍加至三十丸忌酢物蕪荑

又療夢失精方

韭子一升熬

右一味擣篩以酒服方寸匕日再神効並出第十九卷中

古今録驗石斛散療男子夢泄精方

石斛七分 桑螵蛸 紫菀各二分 乾漆熬

五味子 乾地黄 鍾乳研 遠志皮

附子各二分炮

右九味擣合下篩以酒服方寸匕漸漸增至二匕日三服忌猪肉冷水蕪荑出第十卷中

小品龍骨湯療夢失精諸脉浮動心悸少急隱處寒目眶疼頭髮脫者常七日許一劑至良方

龍骨　甘草炙各二分　牡蠣熬三分　桂心
芍藥各四分　大棗四枚擘　生薑五分
右七味切以水四𬼀煑取一𬼀半分再服虛羸浮熱汗出者除
桂加白薇三分附子三分炮故曰二加龍骨湯忌海藻菘菜生葱
猪肉冷水
又薰草湯療夢失精方
薰草　人參　乾地黄　白术
芍藥各三兩　茯神　桂心　甘草炙各二兩
大棗十二枚擘
右九味切以水八𬼀煑取三𬼀分爲二服每服如人行四五里
一方又有茯苓三兩忌桃李雀肉大酢海藻菘菜生葱並出第
三卷中范汪同一本無薰草人參又有薰草人參龍骨別是一分
集驗灸丈夫夢泄法

灸足内踝上一寸一名三陰交二七壯兩脚皆灸内踝

匕大脉並四指是范汪文仲同出第五卷中

外臺秘要方卷第十六

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

外臺秘要方　十七

虚勞下

外臺秘要方卷第十七 虛勞下二十九門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

虚勞虚煩不得眠方八首
病後不得眠方二首
虚勞百病方五首
虚勞陰痿方七首
虚勞小便利方五首
素女經四季補益方七首

素女經黄帝問素女曰男子受氣陰陽俱等男子行陽常先病耳目本其所好陰痿不起氣力衰弱不能彊健敢問療之道素女曰帝之所問衆人同有陰陽爲身各皆由婦人夭年損壽男性節操故不能專心貪女色犯之竭力七傷之情不可不思常能審慎長生之道也其爲疾病宜以藥療之今所說犯者七第一之忌日月晦朔上下弦望六丁之日以合陰陽傷子之精令人臨敵不戰時時獨起小便赤黃精空自出夭

壽喪身第二之忌雷電風雨陰陽晦瞑振動天地日月無精
光以合陰陽生子令狂癲或有聾盲瘖瘂失神或多忘誤心意
不安忽常喜驚恐悲憂不樂第三之忌新飽食飲穀力未行太
倉內實五藏防響以合陰陽六腑損傷小便當赤或白或黃
腰脊疼痛頭項寄強或身體浮腫心腹脹滿毀形夭壽天道
之常第四之忌新小便精氣微弱榮衛不固衛氣未散以合陰
陽令人虛乏陰陽氣閉絕食無味腹脹滿結怫鬱不安忘誤或
喜怒無常狀如癲發第五之忌作事步行身體勞榮氣不定
衛氣未散以合陰陽藏氣相干令人氣乏喘息爲難脣口乾燥
身體流汗穀不消化心腹脹滿百處酸疼起卧不安第六之
忌新息沐浴頭身髮濕舉重作事流汗如雨以合陰陽風冷
必傷少腹急痛腰脊疼強四肢酸疼五藏防響上攻頭面或
生漏瀝第七之忌共女語話玉莖盛強以合陰陽不將禮防氣

腠理開莖中痛傷外動肌體內損腑藏結髮塞耳目視眭眭
心中怵惕恍惚喜忘如杵舂膈欬逆上氣內絕傷中女絕痿
弱身可不防犯此七篇形證已彰天生神藥療之有方
黃帝問高陽負曰吾知素女明知經脉藏腑虛盈男子五勞
七傷婦人陰陽隔閉漏下赤白或絕產無子男子受氣陰
陽同等其病緣由因何而起故欲問之請爲具說對曰深哉
問也男子五勞六極七傷病皆有元本由狀帝曰善哉七傷
之病幸願悉說對曰一曰陰汗二曰陰衰三曰精清四曰精少
五曰陰下濕癢六曰小便數少七曰陰痿行事不遂病形如
是此謂七傷黃帝曰七傷如是療之柰何對曰有四時神藥
名曰茯苓春秋冬夏療隨病形冷加熱藥溫以冷漿風加風藥
色脉診評隨病加藥悉如本經春三月宜以更生丸（更生者茯苓也）
療男子五勞七傷陰衰消小囊下生瘡腰背疼痛不得

俛仰兩膝臏疼時時熱癢或時浮腫難以行步目風淚出遠視䀮䀮欬逆上氣身體痿黃遶臍弦急痛及膀胱小便尿血莖痛損傷時有遺瀝汙衣赤黃或夢驚恐口乾舌彊渴欲飲水得食不常或氣力不足時時氣逆坐犯七忌以成勞傷此藥主之甚驗方

茯苓四分（若不消食三分加一） 昌蒲四分（若耳聾三分加一）

山茱萸四分（若身癢三分加一） 括樓根四分（若熱渴三分加一）

菟絲子四分（若痿泄三分加一） 牛膝四分（若機關不利加一倍）

赤石脂四分（若內傷三分加一） 乾地黃七分（若煩熱三分加一）

細辛四分（若目䀮䀮三分加一） 防風四分（若風邪三分加一）

署預四分（若陰濕癢三分加一） 續斷四分（若有痔加一倍）

蛇牀子四分（若少氣三分加一） 柏實四分（若少力加一倍）

巴戟天四分（若痿弱三分加一） 天雄四分炮（若有風三分加一）

遠志皮四分（驚恐不安三分加一）　石斛四分（若體疼加一半）

杜仲四分（若絕陽腎痛三分加一）　蓯蓉四分（若冷痿加一倍）

右二十味擣篩蜜和丸如梧桐子先食服三九日三不知漸增以知爲度亦可散服以清粥飲服方寸匕七日知十日愈三十日餘氣平長服差而更少忌豬羊肉餳冷水生菜蕪荑等物

又黃帝問曰夏三月以何方藥幸得具聞對曰宜以補腎茯苓丸療男子內虛不能食飲忽忽喜忘悲憂不樂恚怒無常或身體浮腫小便赤黃精泄淋瀝痛絞膀胱脛疼冷痺伸不得行渴欲飲水心腹脹滿皆犯七忌上已其記當療之法隨病度量方用如左

茯苓（二兩食不消加一倍）　附子（二兩炮有風三分加一）　山茱萸（二兩身癢三分加一）

杜仲（二兩腎痛三分加一）　牡丹（二兩腹中遊氣三分加一）　澤瀉（三兩有水氣三分加一）

署預（三兩頭風加一倍）　桂心（六兩顏色不足三分加一）　細辛（三兩目視䀮䀮三分加一）

石斛二兩陰濕囊三分加一　蓯蓉三兩身痿三分加一　黃耆四兩體疼三分加一

右十二味擣篩密和丸如梧桐子先食服七丸日二服忌生葱生菜豬肉冷水大酢胡荽等物

又黃帝問曰春夏之療已聞良驗秋三月以何方藥對曰宜以補腎茯苓丸療男子腎虛冷五藏內傷風冷所苦令人身體濕痒足行失顧不自覺省或食飲失味目視䀮䀮身偏拘急腰脊痛彊不能食飲日漸羸瘦背心懊悶欬逆上氣轉側須人起則扶舁鍼灸服藥療之小折或乘馬觸風或因房室不自將護飲食不量用力過度或口乾舌燥或流涎出口或夢寤精便自出或尿血尿有淋瀝陰下痒濕心驚動悸少腹偏急四肢酸疼氣息噓吸身體浮腫氣乂脊膂堅不能識安加餘療方用如左

茯苓三兩　防風二兩　桂心二兩　白朮二兩

細辛二兩　山茱萸二兩　署預二兩　澤瀉二兩
附子二兩炮　乾地黃二兩　紫菀二兩　牛膝二兩
芍藥二兩　丹參二兩　黃耆二兩　沙參二兩
蓯蓉二兩　乾薑二兩　玄參二兩　人參二兩
苦參二兩　獨活二兩
右二十二味擣篩密和丸如梧子食前服五丸臨時以酒飲下之忌酢物生葱桃李雀肉生菜猪肉蕪荑等
又黃帝問曰春夏秋皆有良方冬三月復以何方治之對曰宜以垂命茯苓丸療男子五勞七傷兩目䀮䀮得風淚出頭項寄彊不得迴庡心腹脹滿上支胷脅下引腰脊表裏疼痛不得喘息飲食欬逆面目痿黃小便淋瀝清精自出陰痿不起臨事不對足脛酸疼或五心煩熱身體浮腫盜汗流離四肢拘攣或緩或急夢寤驚恐呼吸短氣口乾舌燥狀如消渴忽忽

喜忘或悲憂鳴咽此藥主之補諸絶令人肥壯彊健氣力倍常飲食百病除愈方

茯苓二兩　白朮二兩　澤瀉二兩　牡蒙二兩
桂心二兩　牡蠣二兩熬　牡荊子二兩　署預二兩
杜仲二兩　天雄二兩炮　人參二兩　石長生二兩
附子二兩　乾薑二兩　菟絲子二兩　巴戟天二兩
蓯蓉二兩　山茱萸二兩　甘草二兩炙　天門冬二兩去心

右二十味擣篩以蜜和丸如梧子先食服五丸酒飲皆得忌海藻菘菜鯉魚生葱猪肉酢物等

又黄帝問曰四時之藥具已聞之此藥四時通服得不對曰有四時之散名茯苓散不避寒暑但能久服長生延年老而更壯方用如左

茯苓　鍾乳研　雲母粉　石斛

昌蒲　柏子人　菟絲子　續斷

杜仲　天門冬去心　牛膝　五味子

澤瀉　遠志去心　甘菊花　蛇床子

署預　山茱萸　天雄炮　石韋去毛

乾地黃　茯苓並等分

右二十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日再二十日知三十日病悉愈百日以上體氣康彊長服八十九十老公還如童子忌酢物羊肉餳鯉魚猪肉蕪荑等

高陽負曰凡經方神仙所造服之療病具已論訖如是所擬議從開闢以來無病不治無生不救也並出古今錄驗二十五卷中

五勞六極七傷方一十首

病源夫虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞又有五勞肺勞者短氣而

面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨卧目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨溏口內生瘡脾勞者舌本苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡少腹急滿也

六極者一曰氣極令人內虛五藏不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顏色眉髮墮落忽忽喜忘三曰筋極令人數轉筋十指爪甲皆痛苦倦不能久立四曰骨極令人痠削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣噏噏然內虛五藏氣不足髮毛落悲傷喜忘七傷者一曰陰寒二曰陰痿三曰裏急四曰精連連五曰精少陰下濕六曰精液清七曰小便苦數臨事不卒又一曰大飽傷脾脾傷善噫欲卧面黃二曰大怒氣逆傷肝肝傷少血目暗三曰彊力舉重久坐濕地傷腎

腎傷少精腰背痛厥逆下冷四曰形寒寒飲傷肺肺傷少氣欬嗽鼻鳴五曰憂愁思慮傷心心傷苦驚喜忘善怒六曰風雨寒暑傷形形傷髮落肌膚枯夭七曰大恐懼不節傷志志傷恍惚不樂男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞男子勞之爲病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出痠㾓診寸口脉浮而遲浮即爲虛遲即爲勞遲即衛氣不足浮即榮氣竭脉直上者逆虛也脉澀無陽是腎氣少寸關澀無血氣逆冷是大虛脉浮微緩皆爲虛緩而大者勞也脉微濡相薄爲五勞微弱相薄虛損爲七傷其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云唯欲嘿氣養神閉氣使極吐氣使微又不得多言語大喚呼令神勞損亦云不可泣淚及多唾洟此皆爲損液漏津使喉澀大渇又云雞鳴時扣齒三十六下訖舐口脣漱舌聊上齒表咽之三過殺蟲補虛勞令人彊壯又云兩手拓兩頰手不動摚

肘使急腰脊內亦然住足放兩肘頭向外肘髆腰脊氣散盡勢大悶始起來去七通去肘臂之勞又云兩足跟相對坐上兩足指相向外扒兩膝頭柱席兩向外扒使急始長舒兩手兩向取勢一一皆急三七去五勞腰脊膝疼傷冷脾痺又云跪一足坐上兩手髀內捲足努踹向下身外扒一時取勢向心來去二七左右亦然去五勞足臂疼悶膝冷陰冷又云坐抱兩膝下去三里二寸急抱向身極勢足兩向身起欲似胡牀住勢還坐上下來去二七去腰脊足臂內虛勞膀胱冷又云外轉兩脚平蹹向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向極勢捺之二七畢身側兩向取勢二七前後努腰脊去心勞痔病膝頭冷調和未損時須言語不瞋喜偏跏兩手抱膝頭努膝向外身手膝各兩極勢挽之三七左右亦然頭須左右仰扒去背急臂勞又去兩足相蹹令足掌合也蹙足極勢兩手長舒掌相向腦項之後兼至髆相挽向頭髆手向席來去七仰

手七合手七始兩手角上極勢要正足不動去五勞七傷臍下冷暖不和數用之常和調適又云一足蹹地一足屈膝兩手抱犢鼻下急挽向身極勢左右換易四七去五勞三里氣不下又蛇行氣曲卧以正身復起踞閉目隨氣所在不息少食裁通腸服氣爲食以舐爲漿春出冬藏不財不養以治五勞七傷又云蝦蟇行氣正動搖兩臂不息十二通以治五勞七傷水腫之病又云外轉兩足十徧引去心腹諸勞內轉兩足十徧引去心五息止去身一切諸勞疾疹出第三卷中

廣濟療五勞七傷六極八風十二痺消渴心下積聚使人身體潤服之多情性補益養精方

生乾地黃十二分 天門冬十八分去心 乾薑六分 菟絲子十八分酒漬二宿焙乾別擣

石斛八分 當歸六分 白朮六分 甘草八分炙

肉蓯蓉七分 芎藭六分 人參八分 玄參六分

麥門冬十分去心 大黃八分 牛膝六分 紫菀六分

茯苓八分 防風六分 杏人八分去皮尖熬 麻子人八分

地骨皮六分 椒三分去目汗

右二十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹酒下二十丸日再服漸加至三十丸忌鯉魚海藻菘菜桃李雀肉大酢蕪荑等

崔氏腎瀝湯療五勞六極八風十二痺補諸不足方

豬腎一具去脂膜 附子四分炮 芎藭四分 牡丹四分

桂心四分 茯苓八分 乾地黃六分 人參四分

桑螵蛸八分炙 磁石八分研如粉 牡荊子八分 當歸四分

黃耆八分 昌蒲八分

右十四味切以水一斗七升煮腎取一斗一升去腎內藥煎取四升分四服忌羊肉餳冷水酢生葱蕪荑胡荽古今録驗同

又治丈夫五勞七傷百年無不補之乾漆散方

乾漆八兩熬令煙斷　茯苓八兩　石斛八分　枸杞子一升
乾地黃十兩　遠志皮五兩　續斷五兩　菟絲子五兩
天雄三兩炮　桂心三兩
右十味擣篩爲散每旦服一匕暮一匕酒飲皆得忌豬肉冷水生葱蕪荑
又七味乾漆散方韋都水服不踰月光悦倍常療虛羸無比
乾漆三兩熬煙斷　乾地黃八兩　芍藥二兩　茯苓二兩
五味子二兩　食茱萸四兩　枸杞子四兩
右藥擣篩爲散酒服方寸匕漸加至二匕日二服以知爲度忌蕪荑
又五落散主五勞六極七傷八不足裏急胷脅脹滿背痛頭眩四肢重要脊彊環臍腹痛小便或難或數劇者大便去血歙歙少氣手足煩熱卧不能卒起起行不能久立有病若此名曰內極或生

愁憂恐怖生熱或飽食飲酒房室自極陽氣虛竭耳鳴消渴甚則
手足浮腫逆害飲食名曰内消五勞七傷視病所苦加其藥方

大黃六分　麥門冬七分去心　栝樓五分　白薇七分

甘草五分炙　當歸七分　乾地黃七分　山茱萸七分

桑螵蛸七分炙　石斛九分六安者　茯苓五分　桂心三分

鐵屑三分研　厚朴三分炙　吳茱萸二分

右十五味合擣篩以白蜜一斤棗膏一斤當蒸之以温湯浸之
和溲疎有切前藥令如乾飲狀藥悉成又别取牛膝五兩肉蓯
蓉六兩附子三兩炮三物合擣下篩内諸藥和令相得以酒服之
方寸匕日三不知稍增之長肌肉補不足久服益氣力若少氣力
加石斛消渴加栝樓止痛結煩裹急加芍藥腹中痛下濃血
加厚朴四兩炙四肢酸疼加當歸歙歙少氣加天門冬白薇一名
五若散忌海藻菘菜生葱蕪荑酢物鯉魚等

又落腎散一名腎著散療膂背痛少腹攣急尿難白汗出耳聾陰瘻脚冷皆其病候方

羊腎一隻作脯炙燥 磁石六分研 天門冬五分去心 人參二分

防風三分 天雄三分炮 龍骨五分 茯苓三分

續斷七分 肉蓯蓉五分 玄參三分 乾地黃四分

桑白皮三分 白膠五分炙 乾漆五分熬

右十五味下篩空腹以大麥飲下二方寸匕日五六服忌鯉魚猪肉冷水蕪荑酢物等

又枸杞酒療五內邪氣消渴風濕下胃脅間氣頭痛堅筋骨彊陰利大小腸塡骨髓長肌肉破除結氣五勞七傷去胃中宿食利耳目鼻衄吐血內濕風疰補中逐水破積瘀膿惡血石淋長髮傷寒瘴氣煩躁滿悶虛勞喘吸逐熱破血及脚氣腫痺方

用米一石爲一劑黍糯並得計常釀酒米一石用麴一斗此加五升弥佳其麴唯須上好者末之

枸杞一石三十斤去赤皮半寸剉之以水一石浸之三日煮取五斗汁 生地黃二十斤洗去土細切共米同炊之

秋麻子三斗微熬細粉蒸氣出以枸杞湯淋取汁 豆豉二斗以枸杞湯煮取汁

右四味地黃一味共米同蒸之三物藥汁摠合得五斗分半漬米饙半及麴和釀飲如人肌溫摠和一甕蓋瓮口經二七日壓取封泥復經七日初一度釀用麻子二斗多即恐令人頭痛服酒慎蕪荑生冷陳宿猪犬雞魚麪蒜油膩白酒房室等服經一二七日將息病退並出第八卷中

千金五勞六極七傷虛損何謂五勞五藏病六極六腑病七傷表裏受病凡遠思彊慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人慼慼所患傷人寒溫失節傷人故曰五勞六極七傷也論傷甚衆且言其七悉主之方

菝葜七分 五味子八分 地膚子五合 續斷五分

蛇床子五分 車前子五合 菟絲子七合 乾地黃八分

牡蠣六分左顧者熬　天雄七分炮　桑寄生七分　韭子五合

天門冬八分去心　地骨皮八分　白石英八分　陽起石七分

白龍骨七分

右十七味合擣篩以酒服方寸匕日三忌猪肉冷水鯉魚蕪荑等出第十九卷中

古今録驗淮南八公石斛萬病散療五勞七傷大風緩急濕痹不仁甚則偏枯筋縮拘攣胷脅支滿引身彊直或頸項腰背疼痛四肢酸煩陰痿臨事不起痒濕卧便盜汗心腹滿急小便莖中疼痛或時便血咽乾口燥飲食不消往來寒熱羸瘦短氣肌肉損減或無子若生男女纔欲及人便死此皆極勞傷血氣心神不足所致藥悉主之令人康健多子方

牛膝二分　遠志二分去心　續斷二分　蛇牀子三分

菟絲子三兩酒漬　蓯蓉二分　茯苓二分　杜仲二分

桂心二分　乾薑一分　蜀椒一分汗　細辛二分

附子二分炮　天雄二分炮　防風二分　乾地黃二分

白朮二分　草薢二分　石斛二分　雲母粉二分

菊花二分　昌蒲二分

右二十二味隨病倍其分擣篩爲散先食以酒服方寸匕日三以知爲度神良忌猪羊肉冷水桃李雀肉生葱生菜大酢餳等千金有人參山芋巴戟天五味子山茱萸爲二十七味

又淮南王枕中丸療五勞六極七傷胃氣不和發於五藏虛勞小便或難或數令人多思脾氣不和宿食熱所爲流入百脉食飲不進沉滯著中隔并來著一邊或食不消夜服三丸方

芎藭二兩　附子二兩炮　桂心二兩　甘草二兩炙

黃芩二兩　芍藥二兩　乾薑二兩　蜀椒二兩汗

杏人四兩去皮尖熬　白朮五兩　當歸二兩　大黃一兩

右十二味擣篩蜜和丸如梧子以酒服五丸日三忌海藻菘菜生葱猪肉冷水桃李雀肉等並出第二十五卷中

雜療五勞七傷方三首

古今録驗署預丸療丈夫五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不隨食雖多不生肌肉或少食而脹滿體澀無光澤陽氣衰絶陰氣不行此藥能補十二經脉起發陰陽通内制外安魂定魄開三焦破積聚厚腸胃消五藏邪氣除心内伏熱彊筋練骨輕身明目除風去冷無所不療補益處廣常須服餌爲佳七十老人服之尚有非常力況少者乎謹具方如左

乾署預二兩　蓯蓉四兩　牛膝二兩　菟絲子二兩酒漬

杜仲二兩　赤石脂二兩　澤瀉二兩　乾地黄二兩

山茱萸二兩　茯苓二兩　巴戟天二兩去心　五味子一兩半

石膏二兩研　遠志一兩去心　柏子人一兩　白馬莖筋二兩炙之乾

右十七味擣篩蜜和丸如梧子以酒空腹服二十丸至三十丸日再

忌大酢蕪荑蒜陳臭物

又療五勞七傷諸虛補益及下先後用甚驗五石黃耆丸方

黃耆（二兩） 紫石英（二兩研） 赤石脂（二兩） 石硫黃（二兩研）

石斛（二兩） 白石脂（二兩） 白礜石（二兩鍊研） 桂心（四兩）

烏頭（二兩炮去皮） 鍊鍾乳（二兩研） 芎藭（二兩） 防風（二兩）

茯苓（三兩） 乾薑（四兩） 棗（一百枚） 當歸（三兩）

細辛（三兩） 人參（二兩） 肉蓯蓉（二兩） 附子（二兩炮）

乾地黃（二兩） 芍藥（三兩） 甘草（三兩炙） 白朮（二兩）

右二十四味草石各別擣篩棗蜜和丸如梧子空腹酒下十九日三漸加至三十丸忌海藻菘菜豬肉冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑生菜（千金有羊腎羌活無白朮鍾乳紫石英石硫黃赤石脂白石脂礜石止十九味）

又大署預丸療男子五勞七傷晨夜氣喘急內冷身重骨節

煩疼腰背強痛引腹內羸瘦不得飲食婦人絕孕疝瘕諸病服此藥令人肥白補虛益氣方

署預五分　大黃六分　前胡三分　茯苓二分

人參二分　杏人三分熬去皮尖　當歸十分　桔梗二分

防風二分　黃芩八分　麥門冬八分　甘草五分炙加二分

五味子四分　乾地黃十分　棗一百顆　芍藥四分

石膏四分研　澤瀉八分　阿膠四分炙　白术二分

乾薑四分　桂心四分　乾漆三分　黃耆五分

右二十四物擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒下三十丸日再忌猪肉冷水桃李雀肉海藻菘菜生葱蕪荑千金無防風麥門冬茯苓黃耆有天門冬大豆卷白斂附子張仲景方有大豆黃卷麴柴胡白斂芎藭無附子黃芩石膏黃耆前胡爲二十一味

腰痛方六首

病源腎主腰腳腎經虛損風冷乘之故腰痛也又邪客於足少陰

之絡令人腰痛引少腹不可以仰息診其尺脉沈主腰背痛寸口脉弱腰背痛尺寸俱浮直下此爲督脉腰彊痛凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痺風寒著腰是以腰痛三曰腎虚役用傷腎是以腰痛四曰臊腰墜墮傷損腰是以腰痛五曰寢卧濕地是以腰痛其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養生方云飲食了勿即卧久作氣病令人腰疼痛又曰大便勿彊努令人腰疼目澀又笑過多即腎轉動令人腰痛又云人汗出次勿企牀懸脚久成血痺兩足重腰痛導引法云凡學將息人先須正坐並膝頭足初坐先足指相對足跟外扒坐上少欲安穩須兩足跟向内相對坐上足指外扒覺悶痛漸漸舉身似欵便坐足上待共内坐相似不痛始雙立足跟向上坐上足指並反向外毋坐常學去膀胱内冷風膝冷足疼上氣腰疼盡自消適出第五卷中集驗千金同

范汪腰疼方

鼈甲一枚炙令黄刮削令淨潔

右一味擣篩空腹以湯飲酒服方寸匕日三忌人莧菜小品赤主

腎腰痛

備急療腰痛方

蒴藋葉火燎厚鋪牀上及熱卧眠上冷復易之冬月取根春碎熬及熱準上用兼療風濕冷痹及産婦患傷冷腰痛不得動亦用彌良

又療腰膝髀連腿脚疼酸者方

杜仲八兩　獨活四兩　乾地黄四兩　當歸四兩

芎藭四兩　丹參五兩

右六味切以絹袋盛以清酒二斗漬五宿初服二合日再服以知爲度忌蕪荑

古今録驗寄生湯療腰痛方

桑寄生四兩 附子三兩炮 獨活四兩 狗脊五兩黑者

桂心四兩 杜仲五兩 芎藭一兩 甘草二兩炙

芍藥三兩 石斛三兩 牛膝三兩 白术三兩

人參二兩

右十三味切以水一斗煑取三升分三服忌海藻菘菜生葱猪肉冷水桃李雀肉等

又玄參湯療腰痛方

玄參三兩 人參三兩 杜仲四兩 芍藥四兩

桂心一兩 生薑二兩 乾地黄三兩 白术三兩

通草三兩 當歸三兩 寄生四兩 芎藭四兩

防風二兩 牡丹二兩 獨活二兩

右十五味㕮咀以水一斗二升煑取三升日三夜一服忌生葱桃

李雀肉生胡荽蕪荑等

又杜仲獨活湯療腰痛方

獨活四兩　生薑六分　麻黄二兩　桂心三兩

芍藥三兩　甘草三兩炙　葛根三兩　栝樓子二兩

防風二兩　杜仲四兩　附子一兩炮　杏人二兩去尖皮碎

乾地黄二兩

右十三味切以水八升清酒二升煑取三升分三服忌生葱菘菜海藻豬肉冷水並出第十七卷中

風濕腰痛方四首

病源勞傷腎氣經絡既虛或因卧濕當風而風濕乘虛摶於腎腎經與血氣相擊而腰痛故云風濕腰痛出第五卷中

集驗療風濕客於腰令人腰痛獨活湯方

獨活三兩　生薑六兩　乾地黄五兩　芍藥四兩

防風三兩 桂心三兩 栝樓三兩 甘草二兩炙

麻黄二兩去節 乾葛三兩

右十味切以水八升酒二升煎取三升分三服不差重作忌海藻生葱菘菜蕪荑出第五卷中(此方比前方但無杜仲附子杏仁耳)

延年療腰痛熨法

菊花二升 芫花二升 羊躑躅二升

右三味以醋拌令濕潤分為兩劑內二布囊中蒸之如炊一斗米許頃適寒温隔衣熨之冷即易熨痛處定即差集驗范汪同(一云酒拌)

又療腰痛大豆熨法

大豆六升水拌令濕炒令熱以布裹隔一重衣熨痛處令暖氣徹冷即易之張文仲處

又方

取黃狗皮裹腰痛處取暖徹即定並出第十五卷中

腎著腰痛方二首

病源腎主腰脚腎經虛則受風冷內有積水風水相搏浸漬於腎腎氣內著不能宣通故令腰痛其病之狀身重腰冷腹重如帶五千錢狀如坐水中形狀如水不渴小便自利飲食如故久久變爲水病腎濕故也出第五卷中

古今録驗腎著之爲病其人身體重從腰以下冷如坐水中形狀如水不渴小便自利食飲如故是其證也從作勞汗出衣裏冷濕久久之故得也腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘草湯方

甘草二兩炙　乾薑三兩炮　白朮四兩　茯苓四兩

右四味切以水五升煑取三升分服一升日三腰中即溫忌海藻菘菜桃李雀肉酢物經心録方甘草一兩乾薑二兩餘同出第二十七卷中　千金名腎著湯

經心録腎著散方

桂心三兩　白朮四兩　茯苓四兩　甘草二兩炙

澤瀉二兩　牛膝二兩　乾薑二兩　杜仲三兩

右八味擣篩爲散每服三方寸匕酒一升煑五六沸去滓頓服之

一日三忌生葱桃李雀肉海藻菘菜酢物千金同出第四卷中

腎虚腰痛方七首

小品腎虚腰痛治之方

牡丹二分去心　萆薢三分　白朮三分　桂心三分

右四味擣篩以酒服方寸匕日三亦可作湯服之忌生葱胡荽桃

李雀肉等必効備急范汪同

又療腰痛少氣陰弱寒冷小便清冷瀝滴陰下濕癢少腹急無子

息方

甘草十四分炙　續斷三分　麥門冬三分　署預三分

附子炮三分　乾薑二分　棘刺四分

右七味擣篩酒服方寸匕日三忌豬肉冷水海藻菘菜必效同並出第五卷中一方無乾薑

備急陶氏腎氣丸主短氣腰痛身重調中補筋脉不足方

乾地黃五分　續斷五分　人參五分　萆薢三分

阿膠三分炙

右五味擣篩蜜和丸如梧子大以酒下十丸加至二十丸日再服忌蕪荑生冷出第四卷中

必效寄生散療腎虛腰痛方

桑寄生　鹿茸炙　杜仲

右三味各一分作散酒服方寸匕日三服

又方

鹿茸炙作散酒服方寸匕一味任多少為之並出第三卷中

范汪亦主腎膂痛

古今錄驗療腰痛皆猶腎氣虛弱卧冷濕地當風所得不時差久久流入脚膝冷痺疼弱重滯或偏枯腰脚疼攣脚重急痛獨活續斷湯方

獨活三兩　續斷二兩　杜仲二兩　桂心二兩

防風二兩　芎藭三兩　牛膝二兩　細辛二兩

秦艽三兩　茯苓二兩　人參二兩　當歸二兩

芍藥二兩白者　乾地黃三兩　甘草三兩炙

右十五味切以水一斗煮取三升分三服溫將息勿取冷宜用蒴藋葉火燎厚安牀上及熱卧上冷即易之冬月取根擣用事須熱之忌蕪荑生葱生菜海藻菘菜酢物肘後有附子無續斷甘草牛膝人參當歸止十二味

又療男子患腰腎疼痛髀膝有風冷耳鳴食飲無味并有冷氣方

乾地黃四兩　茯苓三兩　白朮二兩　澤瀉五兩

山茱萸三兩　蓯蓉二兩　五味子三兩　桂心二兩

石斛二兩　巴戟天二兩　防風二兩　人參二兩

磁石二兩研

右十三味物擣篩蜜丸如梧子酒下二十丸至三十丸日再忌桃李雀肉生葱酢物蕪荑

暨腰痛方三首

病源暨腰者謂卒然損傷於腰而致痛也此由損血摶於背脊所爲乆不已令人氣自乏少面無顏色損腎故也出第五卷中

范汪療暨腰有血痛不可忍者方

桂心

右一味擣末以苦酒和塗痛處此令人喜卧可勤用之再爲必差

又療暨腰方

生地黃

右一味擣絞取汁三升煎得二升内蜜一升和煎之三五沸日服一升亦可一日盡三升以差止甚効

經心録療腎腰痛方

桑寄生二兩 牡丹去心二兩 鹿茸炙二兩 桂心二兩

右四味擣散以酒服方寸匕日三忌生葱胡荽范汪千金同出第五卷中

卒腰痛方七首

病源夫勞傷之人腎氣虚損而腎主腰脚其經貫腎絡脊風邪乘虚卒入腎經故卒然而腰痛也出第五卷中

集驗療腰卒然痛杜仲酒方

杜仲半斤 丹參半斤 芎藭伍兩 桂心四兩

細辛二兩

右五味切以酒一斗浸五宿隨多少飲之延年經心録同無桂心

忌生葱生菜出第五卷中

延年療腰卒痛拘急不得喘息若醉飽得之欲死者大豆紫湯方

大豆一升熬令焦

右一味以好酒二升煑豆令熟隨多少飲勿至醉亦云用酒一升出第十五卷中

文仲葛氏療卒腰痛不得俛仰方

正立以小竹柱地度至臍斷竹乃以度度後當背脊灸竹上頭處隨年壯灸畢藏竹勿令人知之千金同

又方

鹿角長六寸燒

右一味擣篩爲末以酒服方寸匕陶云鹿茸尤良小品范汪同

又方

桂心八分　牡丹四分去心　附子二分炮

右三味擣篩爲末以酒服一刀圭日再服此主脅肋氣痛如打者
忌生葱胡荽猪肉冷水千金同

又方

灸脊窮骨上一寸七壯左右各一寸灸七壯差備急同

經心録杜仲酒療卒腰痛方

杜仲半斤　丹參半斤　芎藭五兩

右三味切以酒一斗漬五宿隨性少少飲之即差出第四卷中

久腰痛方二首

病源夫腰痛皆由傷腎氣所爲腎虚而受於風邪風邪停滯於腎經與血氣相擊久而不散故爲久腰痛也出第五卷中

小品療腰痛皆積年痛者方

乾地黄十分　白朮五分　乾膝五分　桂心八分
甘草五分炙

右五味擣末以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉生葱海藻菘菜蕪荑等范汪同

必効療積年腰痛方

取一杖令病人端腰立杖以杖頭當臍中分以墨點訖廻杖於背取墨點處當脊量兩口吻折中分炙兩頭隨年壯妙

腰胯痛方二首

廣濟療臍下冷連腰胯痛食冷物即劇方

牛膝八分 當歸八分 黃耆八分 芍藥八分

厚朴六分炙 白朮八分 茯苓六分 人參六分

橘皮八分 訶梨勒皮八分熬 桂心六分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子空腹酒服二十丸加至四十丸日再忌桃李雀肉生葱酢物

又療腹中冷氣食不消腰胯冷痛者方

檳榔人八分　當歸六分　牛膝八分　芍藥六分
枳實八分炙　人參六分　白朮八分　桂心六分
芎藭六分　吳茱萸六分　橘皮六分
右十一味擣篩蜜和丸如梧子酒下二十丸至三十丸若飲酒衝上頭面宜煮薑棗湯下飲服亦得忌桃李雀肉生葱並出第四卷中

腰脚疼痛方三首

病源腎氣不足受風邪之所爲也勞傷則腎虛虛則受於風冷風冷與真氣交爭故腰脚疼痛也出第五卷中

廣濟療患腰腎虛冷脚膝疼痛胷脇中風氣重聽丸方
石斛五分　五味子六分　牡丹皮八分　桂心四分
白朮六分　丹參六分　磁毛石十分研　芍藥四分
檳榔人十分　枳實六分炙　通草六分　細辛四分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒服二十丸漸加至三十丸

日再忌生葱雀肉桃李生菜胡荽出第四卷中

集驗秦艽散療風冷虛勞腰脚疼痛諸病悉主之方

秦艽四分 白朮十四分 桔梗四分 乾薑五分

附子三分炮 牡礪熬 防風六分 人參四分

茯苓四分 椒子二分汗 黃芩三分 桂心五分

細辛三分 甘草三分炙 杜仲三分

右十五味擣篩爲散以酒服方寸匕日再服一方加鍾乳粉一兩

亦好忌桃李雀肉生葱生菜豬肉冷水

文仲療腰髀連脚疼方

杜仲八兩 獨活 當歸 芎藭

乾地黃各四兩 丹參五兩

右六味切以絹袋盛上清酒二斗漬之五宿服二合日再忌蕪荑

備急同

腰胯疼冷方二首

廣濟療下冷腰胯肋下結氣刺痛方

當歸六分　鼈甲八分炙　桑耳八分炙　禹餘粮八分研

白石脂八分　芍藥八分炙　厚朴六分炙　吴茱萸六分

茯苓六分　橘皮六分　檳榔人六分　人參六分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹以飲服二十丸日再加至三十丸忌人莧酢物

延年生石斛酒主風痺脚弱腰胯疼冷利關節堅筋骨令強健悅澤方

生石斛三斤搥碎　牛膝一斤　杜仲八兩　丹參八兩

生地黃切三升暴令乾

右五味切以絹袋盛以上清酒二斗埍器中漬七日每食前溫服

三合日三夜一服加至六七合至一升忌蕪荑出第一卷中

腰腎膿水方二首

必効療腰腎病膿水方

牛膝六分　檳榔人七枚　防已七分　牽牛子八分熬

右四味擣篩爲散空腹以酒下三錢匕以宣瀉即差如利三五行即以醋飲止之慎生冷油膩菻等物後以補腎氣湯丸也

深師療腰疼下膿水方

石鹽　乾薑　杏人去尖　醬瓣各等分

右四味擣以綿裹導之六七過下膿水兼下氣妙差止一方無醬瓣

虛勞補益方九首

深師黃耆湯療丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早牽勞腰背彊直脚中疼弱補諸不足方

黃耆二兩　遠志二兩去心　麥門冬二兩去心　茯苓二兩

生薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙 半夏二兩洗

當歸二兩 前胡二兩 橘皮二兩 蜀椒一兩汗

芍藥二兩 烏頭三枚炮 大棗二十枚 桂心二兩

右十六味切以水一斗二升煮取三升分三服增減量性服之忌羊肉餳海藻菘菜生葱生菜豬肉冷水酢物等出第三卷中千金無遠志橘皮蜀椒烏頭有細辛五味子止十四味

千金療虛勞補養方

豬肚一具淨洗切 白朮一升切

右二味以水一斗煮取六升分服一升日三忌桃李雀肉等

又方

豉二升蒸三斗米下 薤白一斤切

右二味以水七升煮取三升分三服取汗出第十九卷中

崔氏腎瀝湯療腎藏虛勞所傷補益方李子豫增損

羊腎一具切　黃耆二兩　乾薑四分　當歸二兩
甘草二兩炙　黃芩二兩　遠志二兩去心　五味子三合
芍藥三兩　澤瀉二兩　人參二兩　茯苓二兩
大棗二十枚擘　桂心二兩　防風二兩　麥門冬四兩去心
乾地黃三兩
右十七味切以水一斗九升先煑腎減四升即去腎入諸藥煑取三升二合絞去滓空腹分服八合日三忌生葱酢物海藻菘菜蕪荑等出第八卷中

文仲益州長史蔡淳妻褚氏所上補益方

蓯蓉　桂心　菟絲子酒漬　乾漆熬
蛇牀子各三兩並擣爲末　生地黃一斤切以上好酒斗漬之晝暴夜漬盡則止暴乾擣篩以和前藥
右六味蜜和丸如彈丸酒飲任下一丸嚼破日三褚云奴年七十六

患腰脚服之即差顔色如三十時常服者髓滿骨中忌生葱蕪荑出第二十九卷中

延年鍾乳散主補虛勞益氣力消食彊腰脚無比方

鍾乳粉二分　防風一分　人參一分　細辛半分

桂心二銖　乾薑一銖

右六味爲散分作三貼每日温酒服一貼食時服進食不用過飽亦不得飢日一服常飲酒令體中醺醺若熱煩以冷水洗手面即定不用熱食亦不得大冷忌生葱生菜出第一卷中

又單服鹿角膠主補虛勞益髓長肌悅顔色令人肥健方

鹿角膠

右一味擣末以酒服方寸匕日三增至二三匕効

又枸杞根釀酒療風冷虛勞方

枸杞根切一石五斗　鹿骨一具炙碎

右二味以水四石煎取六斗去滓澄清麴一斗須乾好糯米一石炊如常法造酒酒熟蜜封頭然後壓取清酒服之除風補益悅澤人無比

古今錄驗調中湯療虛勞補益氣力方

麥門冬半兩 乾棗一兩 茯苓半兩 甘草半兩炙

桂心半兩 當歸半兩 芍藥半兩

右七味切以水八升煮取三升去滓分服一升日三忌生葱海藻菘菜醋物

補益虛損方七首

延年常服枸杞補益延年方

春夏採苗葉如常食法秋冬採子根以九月九日採子暴乾十月採根取皮作散任服至於造酒服餌各有常宜及羹粥爲妙

又生枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人方

枸杞子二升

右一味以上酒二升搦碎更添酒浸七日漉去滓任情飲之

又生地黃煎主補虛損塡骨髓長肌肉去客熱方

生地黃汁五升　棗膏六合　白蜜七合　酒一升

犛牛酥四合　生薑汁三合　紫蘇子一升研以酒一升絞取汁

鹿角膠四兩炙末

右八味先煎地黃等三分減一內蜜酥以蜜調入膠末候煎成以器盛之以酒和服

又方

黃耆三分　人參三分　防風二分　茯神二分

甘草八分

右五味擣篩爲散內前煎中更鍊爲丸服之大効忌海藻菘

菜酢物張文仲同

又生地黃煎主補虛損填骨髓長肌肉去客熱方

生地黃汁五升　棗膏六合　白蜜一升　好酒七合

犛牛酥三合

右五味先煎生地黃汁如稠糖攪不停手次内棗膏蜜鍊如糖煎成可丸如彈丸日以酒服一枚日服漸至二枚食訖以酒送含咽並得無所忌唯禁蕪荑蔣孝璋處

又地黃煎中加補益鎮心強志力方

鹿茸八分炙　人參六分　枸杞子十二分　茯神六分

乾薑三分　桂心三分　遠志二分去心

右七味擣篩細末取前地黃煎一升内藥臼中和擣令勻丸如梧子大每食前酒下三十丸日再服忌生葱大酢張文仲處

又枸杞子煎方是西河女子神秘有驗千金不傳又名神丹煎服

者去萬病通知神理安五藏延年長生并主婦人久無子冷病有能常服大益人好顏色年如十五時方

枸杞子三升 杏人一升去皮尖研 生地黃研取汁三升 人參十分

茯苓十分 天門冬半斤擣汁乾者末亦得 白蜜五升

生髓一具無亦得 酥五升

右九味各別依法料理先煎汁等如稀餳內諸藥煎候如神膏入水不散即成一服兩匙酒和服之忌鯉魚酢物當合之時淨潔向善即得延年彊記益心力用王相日合雖此日復須天晴明無風雨成滿日大良文仲云此藥性非冷非熱除風理氣鎮心塡骨髓更於方內加白朮令人能食時節既熱又非好日且可五分中合二分多合恐酢壞服覺安穩續合不遅張文仲處忌桃李雀肉等出第二卷中

虛勞羸瘦方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有顏色去蟲而牢齒也玉泉者口中唾也朝未起早漱令滿口乃吞之輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過乃止補養虛勞令人彊壯出第三卷中

崔氏地黄酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方雍州高長史得効

生地黄肥大者一石二斗擣以生布絞取汁四斗四升　杏人一斗去尖皮雙人熬擣末

大麻子一斗熬擣末　糯米一石暴乾簸擇　上麴一斗五升暴乾細剉

右五味先以地黄汁四斗四升浸麴候發炊米二斗作飯冷暖如人肌酘麴汁中和之候飯消更炊米一斗作飯酘如前法又取杏人麻子末各一升二合半和飯攪之酘麴汁中待飯消依前炊米飯一斗以杏人麻子末各一升二合半一如前法酘之凡如此可八酘訖待酒發定封泥之二七日壓取清每溫飲一升漸加至二升日再

服令人能食久飲之去萬病婦人服之更佳無子者令人有子忌
蕪荑
又療虛羸無比署預丸方
署預二兩 蓯蓉四兩 牛膝二兩 菟絲子二兩酒漬
杜仲二兩 五味子十分 澤瀉二兩 乾地黃三兩
巴戟天二兩 茯神二兩本方作茯苓 山茱萸二兩 赤石脂二兩
右十二味擣篩以蜜和丸如梧子食前以酒下二十丸至三十丸日再夜一服無所忌唯禁大醋蕪荑蒜陳臭物服之七日令人健四體潤澤脣口赤手足暖面有光悅消食身體安和音聲清明是其驗十日後日長肌肉其藥通中入腦鼻必酸疼不可怪若欲求大肥加燉煌石膏二兩若失性健忘加遠志二兩少津液加柏子人一兩一月許即充足
古今錄驗通命丸療虛勞百病七傷六極少氣羸弱不能飲

食方

茯苓六分 甘草六分炙 杏人六分去皮尖熬 牛膝七分

黃芩五分 阿膠三分炙 防風四分 乾天門冬六分去

芍藥六分 大黃六分 當歸六分 乾薑六分

乾地黃七分 人參六分 桂心三分 乾漆四分熬

紫菀五分 白朮四分 蓯蓉五分 吳茱萸三分

蜀椒三分汗 石斛三分

右二十二味擣篩以棗膏蜜相拌和作丸食前服七丸日三不知漸增以知爲度病劇者夜更一服忌蕪荑鯉魚生葱海藻菘菜桃李雀肉酢等出第二十五卷中

又療體虛少氣羸瘦不堪榮衛不足善驚胸膈淡冷而客熱欲冷水飲食則心腹弦滿脾胃氣少不能消食或時衂血方

黃耆二兩 附子一兩炮 大棗十四枚 甘草二兩炙

蜀椒（一兩汗）　生薑（六兩）　芍藥（二兩）　茯苓（二兩）
當歸（二兩）　人參（三兩）　黃芩（二兩）　桂心（二兩）
右十二味切以水一斗煮取三升半去滓分五服日三夜一適寒溫
忌海藻生葱菘菜猪肉冷水大酢

又療男子虛羸七傷八公散方
麥門冬（去心）　石韋（去毛）　五味子　茯苓
菟絲子（酒漬）　乾地黃　桂心
右七味等分擣篩為散以飲服方寸匕日三後食二十日知三十日自任意欲行百里並得益顏色久服令人耐老輕身七十有子忌大酢生葱蕪荑出第二十卷中

虛勞食不生肌膚方三首

范汪療男子七傷面目黃黑飲食不生肌肉手足惰疼少腹裏急小便利方

石斛六分　山茱萸六分　肉蓯蓉六分　牛膝六分
五味子六分　附子四分炮　遠志六分去心　桂心四分
人參六分　茯苓六分　兔絲子八分酒漬　秦艽四分
右十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日三食前服之忌猪肉冷
水生葱酢物出第七卷中一方無牛膝用草薢
小品黃耆湯療虚勞胷中客熱冷癖痞滿宿食不消吐噫胷
間水氣或流飲腸鳴不生肌肉頭痛上重下輕目視䀮䀮惚惚志
損常躁熱卧不得安少腹急小便赤餘瀝臨事不起陰下濕或
小便白濁傷多方
黃耆三兩　人參一兩　芍藥二兩　生薑半斤
桂肉三兩　大棗十四枚　當歸一兩　甘草一兩炙
右八味切以水一斗煮取四升分四服有寒加厚朴二兩經心録同
忌生葱海藻菘菜出第三卷中

集驗淮南五柔丸療虛勞不足飲食不生肌膚三焦不調大便秘澀此藥和腸藏并療澼飲百病方

大黃一斤　前胡二兩　茯苓一兩　細辛一兩
蓯蓉一兩　半夏一兩湯洗　當歸一兩　葶藶子一兩熬
芍藥一兩

右九味擣篩蜜和擣萬杵丸如梧子大食前以湯飲下五丸日再服加至十丸忌生菜酢物羊肉餳等延年崔氏同出第五卷中

長肌膚方三首

范汪大行諸散主彊中益氣補力不足長養肌肉推和百脉調利機關輕身潤澤安定五藏彊識不忘方

白防已二兩　菴䕡子五兩　猪苓七兩　六安石斛二兩
占斯四兩一名良無極　鍾乳五兩研　蓯蓉七兩　麥門冬二兩去心
茯苓五兩　牡丹皮七兩　地膚子五兩　澤瀉二兩

桂心五兩　甘草五兩炙　白朮七兩　胡麻三升熬令香
當歸五兩　覆盆子五兩　薔薇五兩　牛膝三兩
八角附子三兩炮
右十一味擣篩蜜一升生地黃汁三斤取汁合令相和微煎以和
前藥丸如桐子大暴乾以酒湯飲下三十丸又和暴乾以作散服方
匕方云作散即恐不得丸忌猪肉冷水海藻菘菜生葱酢物胡荽
桃李雀肉等出第七卷中一方無薔薇用鬼蓋
延年服大豆法令人長肌膚益顏色塡骨髓加氣力補虛久能嗜
食瘦人服兩劑即令肥充不可識肥人不得服之方
大豆五升取肥好者一依作醬法料理取黃
右一味擣末以絹篩之以猪肪脂好銷鍊如法去滓以膏和豆末作
團訖以油帛裹之著於密器中收之一服如梧子五十丸細細加至
一百九日再服以酒飲任用下之一無所禁瘦人不過兩劑即大肥服

十日已去食不知飽也䄂驗神方

又甘草丸主安養五藏長肌肉調經脉下氣補脾胃益精神令人能食彊健倍力方

甘草四兩炙　人參二兩　白术二兩　芍藥二兩

黄耆二兩　遠志二兩去心　大麥蘖二兩熬令黄

右七味擣篩爲散以棗膏和蜜攪調和藥令成丸食後少時以酒或飲任下五丸如梧子漸加至七丸日再服長服勿絶盡即更合非止一劑即停多分兩恐難盡又壞分兩少服盡更常得新藥服忌海藻菘菜桃李雀肉並出第一卷中

腎氣不足方六首

深師療腎氣不足心中悒悒而亂目視𥊳𥊳心懸少氣陽氣不足耳聾目前如星火消疸痔一身悉痒骨中痛少腹拘急乏氣咽乾唾如膠顏色黑補腎方

磁石二兩綿裹研　生薑二兩　防風二兩　桂心二兩
甘草一兩炙　五味子二兩　附子一兩炮　玄參二兩
牡丹皮三兩　大豆二十四枚
右十味切以水一斗二升先於銅器中揚三百過煮藥取六升去滓更煎取二升八合分爲三服忌海藻菘菜猪肉冷水生葱胡荽等出第十三卷中一方無生薑磁石有石膏揚水二千過

小品增損腎瀝湯療腎氣不足消渴引飲小便過多腰背疼痛方
腎一具猪羊並得　遠志二兩　麥門冬一升去心　人參二兩
五味子二合　澤瀉二兩　乾地黃二兩　茯苓一兩
桂心二兩　當歸二兩　芎藭二兩　黃芩一兩
芍藥一兩　生薑三兩　棗二十枚　螵蛸二十枚炙
雞肶胵裹黃皮一兩
右十七味以水一斗五升煮腎取一斗三升去腎煎藥取三升去滓

分三服忌生葱蕪荑酢物

又加減腎瀝湯療大虛內不足小便數噓噏焦熇引水漿膀胱引急方

腎一具猪羊並可用　遠志二兩去心　麥門冬一升去心　人參一兩

大棗四十枚　芎藭二兩　五味子二兩　當歸二兩

澤瀉二兩　桂心四兩　乾薑二兩　乾地黃三兩

黃連二兩　桑螵蛸二十枚　龍骨二兩　甘草三兩炙

右十六味切以水一斗五升如常法煎取三升去滓分三服忌海藻菘菜生葱猪肉蕪荑等物

古今錄驗瀉腎湯療腎氣不足方

芒消二兩　礬石二兩熬汁盡　大豆一升

右三味以水三升煑取一升二合去滓分再服當快下出第二十七卷中

又療丈夫腰脚疼腎氣不足陽氣衰風痺虛損惙惙諸不足腰背痛耳鳴小便餘瀝風虛勞冷腎氣丸方

羊腎二具炙 細辛二兩 石斛四兩 蓯蓉四兩

乾地黃四兩 狗脊一兩黑者 桂心二兩 茯苓五兩

牡丹皮二兩 麥門冬三兩去心 黃耆四兩 人參二兩

澤瀉二兩 乾薑二兩 山茱萸二兩 附子二兩炮

署預二兩 大棗一百枚取膏和丸

右十八味擣篩以棗膏少著蜜合丸如梧子大以酒服二十丸漸加至三十丸日再服忌猪肉冷水生葱生菜胡荽蕪荑酢物出第二十五卷中

經心錄羊腎湯療腎氣不足耳無所聞方

羊腎一具 芎藭一兩 茯苓二兩 人參三兩

附子一兩炮 桂心二兩 牡丹皮一兩 磁石二兩

當歸二兩　乾地黃三兩　大棗五枚擘　牡荊子一兩碎

右十二味切以水一斗七升煮藥腎取一斗去腎煮取四升分四服晝三夜一忌豬肉冷水生葱胡荽蕪荑酢物出第四卷中

虛勞裏急方六首

病源虛勞則腎氣不足傷於衝脈衝脈為陰脈之海起於關元穴在臍下隨腹直上至咽喉勞傷內損故腹裏拘急也上部之脈微細而卧引裏急心膈上有熱者口乾渴寸口脈陽弦下急陰弦裏急故為胃氣虛食難已飽飽則急痛不得息寸微關實尺弦緊者少腹腰背下苦拘急痛外如不喜寒身憒憒也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方云正偃卧以口徐徐內氣以鼻出之除裏急飽食後小嚥氣數十令溫寒者乾嘔腹痛從口內氣七十所大瞋腹小嚥氣數十兩手相摩令極熱以摩腹令氣下也出第三卷中

深師黄耆湯療大虛不足少腹裏急勞寒拘引臍氣上衝

胷短氣言語謬誤不能食吸吸氣乏悶亂者方

黄耆（三兩）　半夏（一升洗）　大棗（二十枚擘）　生薑（四兩一云一斤）

桂心（四兩）　芍藥（四兩）　人參（二兩）　甘草（二兩炙）

右八味切以水一斗二升煮取四升分四服日夜再若手足冷加

附子一兩忌生葱海藻菘菜羊肉餳

又大建中湯療内虛絶裏急少氣手足厥逆少腹攣急或腹

滿絃急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦脣

口舌乾精自出或手足乍寒乍熱而煩苦酸疼不能久立多夢

寤補中益氣方

黄耆（四兩）　人參（二兩）　大棗（二十枚擘）　當歸（二兩）

桂心（六兩）　生薑（一斤）　半夏（一升洗）　芍藥（四兩）

附子（一兩炮）　甘草（二兩炙）

右十味切以水一斗二升煮取四升分四服先服後食忌海藻菘菜生葱豬羊肉餳冷水等

又樂令黃耆湯療虛勞少氣胷心淡冷時驚惕心中悸動手足逆冷體常自汗補諸不足五藏六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病又治風裏急方

黃耆二兩　當歸三兩　烏頭三兩炮去皮尖四片入蜜炙之令黃色

桂心三兩　生薑四兩　蜀椒二兩汗　人參二兩

芍藥二兩　大棗二十枚擘　茯苓二兩　遠志二兩去心

半夏四兩洗

右十二味切以水一斗五升煮取四升分服八合日三夜再忌生葱羊肉餳豬肉冷水大酢千金有橘皮細辛前胡甘草麥門冬無烏頭蜀椒遠志爲十四味

集驗療虛勞裏急諸不足黃耆建中湯方

黄耆三兩　桂心三兩　甘草三兩炙　芍藥二兩
生薑四兩　大棗十二枚擘　飴糖一斤

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內飴糖令消適寒溫服一升間日可作嘔者倍生薑腹滿者去棗加茯苓四兩忌生葱海藻菘菜古今錄驗同（比本仲景方恐是甘草二兩芍藥六兩生薑三兩也）

古今錄驗黄耆湯主虛勞裏急引少腹絞痛極攣卵腫縮疼痛方

黄耆三兩　甘草三兩炙　桂心二兩　芍藥六兩
生薑一斤　大棗十二枚擘　飴糖半斤

右七味切以水一斗二升煮取三升去滓內糖令消分服一升嘔即除飴糖忌海藻菘菜生葱

又黄耆湯療虛勞裏急少腹痛氣引胷脅痛或心痛短氣方

芍藥六兩　黃耆四兩　甘草二兩炙　桂心二兩

乾薑四兩　當歸四兩　大棗十二枚　飴糖六兩

右八味切以水一斗煑取三升去滓下飴糖令消分三服忌海藻生葱菘菜並出第二十三卷中

虛勞心腹痛方二首

病源虛勞者臟氣不足復爲風邪所乘邪正相干冷熱擊搏故令心腹俱痛出第三卷中

古今錄驗療虛勞腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥并婦人少腹痛芍藥湯方

芍藥六兩　桂心三兩　甘草三兩炙　生薑四兩

大棗十二枚擘　飴糖一斤

右六味切以水九升煑取三升去滓下糖分服七合日三夜一忌海藻菘菜生葱此仲景小建中湯方本云甘草二兩生薑三兩

又建中黃耆湯療虛勞短氣少腹急痛五藏不足方

黃耆（三兩） 甘草（三兩炙） 桂心（三兩） 生薑（一斤薄切）

飴糖（半斤） 大棗（十二枚擘）

右六味切以水一斗煑取三升去滓下糖温服一升日三忌海藻菘菜生葱並出第三卷中

虛勞偏枯方一首

病源夫勞損之人體虛易傷風邪風邪乗虛容於半身留在肌膚未即發作因飲水水未消散即勞於腎風水相搏乗偏發風邪留止血氣不行故半身手足枯細爲偏枯也出第四卷中

古今錄驗主新飲水未散而交接令人偏枯身偏不足乾地黃丸方

乾地黃（五分） 乾漆（四分熬） 萆薢（三分） 防風（一分）

椒（一分汗） 附子（二分炮） 烏頭（一分炮）

右七味擣篩以蜜和丸如梧子每服三丸漸加至五丸酒下日三
以知爲度忌蕪荑豬肉冷水出第二十四卷中

虛勞骨熱方二首

集驗枸杞湯療虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒方

枸杞根白皮 切五升　麥門冬 一升去心　小麥 二升洗

右三味以水二斗煮麥熟藥成去滓分服一升差止出第五卷中

古今錄驗療虛勞少氣骨節中微熱諸疼痛枸杞湯方

枸杞葉 十斤　乾薑 二兩　桂心 一兩　甘草 五兩炙
大麻子人 二升

右五味切碎以河水三斗煮取九升去滓每服一升日三忌海藻
菘菜生葱出第二十三卷中

虛勞虛煩不得眠方八首

病源夫邪氣之客於人也或令人目不得眠者何也曰五穀入於

胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胷中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣者泌其津液注之於脉化而爲血以營四末內注五藏六腑以應刻數焉衛氣者其出悍慓疾利而先行於四末分肉皮膚之間而不休息也晝行於陽夜行於陰其入於陰也常從足少陰之分行於五藏六腑今邪氣客於五藏六腑則衛氣獨營於外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠也出第三卷中

深師小酸棗湯療虛勞不得眠煩不可寧者方

酸棗人二升　蝭母二兩　生薑二兩　甘草一兩炙

茯苓二兩　芎藭二兩

右六味切以水一斗煮酸棗人減三升內藥煮取三升分三服一方加桂二兩忌海藻菘菜酢物出第三卷中

小品流水湯主虛煩不得眠方

半夏（二兩洗十遍） 粳米（一升） 茯苓（四兩）

右三味切以東流水二斗揚之三千遍令勞煑藥取五升分服一升日三夜再忌羊肉餳醋物有半夏事須著生薑四兩不爾戟人咽不審古方何以如此今改正之

集驗療虛煩悶不得眠千里水湯方

半夏（三兩洗） 生薑（四兩） 麥門冬（三兩去心） 酸棗人（二兩）

甘草（二兩炙） 桂心（三兩） 黃芩（二兩） 萆薢（二兩）

人參（二兩） 茯苓（四兩） 秫米（一升）

右十一味切以千里流水一斛煑米令蟹目沸揚之萬過澄清一斗煑諸藥取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳酢物生葱

又煩悶不得眠方

生地黃（五兩） 香豉（五合綿裹） 人參（二兩） 粟米（五合）

茯苓（四兩） 知母（四兩） 麥門冬（三兩去心） 前胡（三兩）

甘草二兩炙　枸杞根皮五兩

右十味切以水八升煮取二升七合去滓分四服忌海藻菘菜蕪荑酢物

延年酸棗飲主虛煩不得眠并下氣方

酸棗二升　茯苓三兩　人參三兩　生薑一兩半

麥門冬一兩去心　橘皮二兩陳者　杏人二兩去皮尖碎　紫蘇二兩

右八味切以水七升煮取一升半分再服忌大酢

又酸棗飲療虛煩不得眠肋下氣氣衝心方

酸棗人一升　人參二兩　白朮二兩　橘皮二兩

五味子二兩半　桂心一兩　茯神二兩　生薑四兩

右八味切以水六升煮取二升半去滓分三服忌桃李雀肉生葱酢物蔣孝璋方

又酸棗飲主虛煩不得眠方

酸棗人一升　茯神二兩　人參二兩　生薑三兩

右四味切以水五升煮取一升二合去滓分再服忌酢物蔣孝璋處

又茯神飲療心虛不得睡多不食用此方

茯神四兩　人參三兩　橘皮二兩　甘草一兩半炙

生薑二兩　酸棗人一升

右六味切以水一斗煮取二升去滓分三服忌海藻菘菜酢物

蔣孝璋處並出第十一卷中

病後不得眠方二首

病源大病之後腑藏尚虛榮衛未和故生於冷熱陰氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩而不得睡者心熱也若但虛煩而不得卧者膽冷也出第三卷中

集驗溫膽湯療大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此湯方

生薑四兩 半夏二兩洗 橘皮三兩 竹茹二兩

枳實二枚炙 甘草一兩炙

右六味切以水八升煑取二升去滓分三服忌羊肉海藻菘菜餳出第五卷中

古今録驗療虛勞客熱百病之後虛勞煩擾不得眠臥骨間勞熱面目青黃口乾煩躁傴僅渠斤切煩也不自安短氣乏少食不得味縱食不生肌膚胷中淡熱煩滿憒悶大竹葉湯方

甘草二兩炙 小麥五合完用 黃耆二兩 人參二兩

知母二兩 大棗二十枚擘 半夏三兩洗 栝樓根一兩

粳米一升 黃芩一兩 當歸二兩 生薑四兩

前胡二兩 芍藥二兩 麥門冬六合去心 龍骨三兩

桂心三兩 竹葉切一升

右十八味切用東流水二斗煑取五升去滓分服一升日三夜二不

過兩劑如湯沃雪劾忌海藻菘菜羊肉餳生葱

虛勞百病方五首

廣濟療虛勞百病腎瀝湯方

羊腎一具去脂切八片　茯苓三兩　五味子二兩

肉蓯蓉三兩　牛膝二兩　防風二兩　黃耆二兩

澤瀉二兩　五加皮二兩　地骨皮二兩　磁石六兩

桂心二兩

右十二味切以水一斗五升先煮腎取一斗去腎入諸藥煎取三升去滓分溫服服别相去如七八里久不利春夏秋三時並可服之忌生葱酢物油膩陳臭出第四卷中

古今錄驗彭祖丸無所不療延年益壽通腑藏安神魂寧心意固榮衛開益智慧寒暑風濕氣不能傷又療勞虛風冷百病方

柏子人五合 石斛三兩 天雄一兩炮 巴戟天三兩去心
續斷三兩 天門冬三兩去心 澤瀉二兩 菟絲子五兩
人參二兩 乾地黃四兩 署預二兩 遠志二兩去心
蛇牀子五合取人 鍾乳三兩鍊研成粉 覆盆子五合 蓯蓉六兩
山茱萸二兩 杜仲三兩 昌蒲二兩 五味子五兩
桂心二兩 茯苓二兩

右二十二味擣篩蜜和丸如梧子服八丸日再漸加至十丸本方與天門冬散方同但以覆盆子代菊花先服藥齋五日不食脂肉菜五辛藥宜以酒服勿令醉服二十日斷白瀝三十日漸悅六十日眼童子白黑分明不復淚出溺血餘瀝斷八十日白髮變黑腰背不復痛行步脚輕百五十日都差意氣如年少時諸病皆除長服如神忌鯉魚生葱猪羊肉冷水酢物蕪荑餳

經心録鍾乳散療傷損虛乏少氣虛勞百病令人丁壯能食去風

冷方

鍾乳粉五分用　附子五分炮　白朮十四分　防風十分

牡蠣十分熬　栝樓十分　乾薑五分　桔梗五分

茯苓五分　細辛五分　桂心五分　人參五分

右十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日二漸加至三匕忌食生菜生葱猪肉冷水桃李雀肉大酢

又更生散療虛勞百病方

防風十分　栝樓十分　鍾乳粉十分　赤石脂十分

海蛤十分　乾薑六分　白朮六分　桔梗五分

白石脂十分　細辛六分　人參五分　附子三分炮

桂心三分

右十三味擣篩爲散以酒服方寸匕日再服忌猪肉冷水生菜生葱桃李雀肉等出第四卷中一方以一分半爲一薄以溫酒服一薄日再

又陸抗膏療百病勞損傷風濕厚補益神効男女通服之方

猪脂三升　羊脂二升　牛髓二升並鍊成　白蜜二升

生薑汁三升

右五味先煎猪脂等次下薑汁又煎次下蜜復煎候膏成收之取兩匙溫酒服又一方加生地黃三升忌蕪荑出第六卷中

虛勞陰痿方七首

病源腎開竅於陰若勞傷於腎腎虛不能榮於陰氣故痿弱也診其脉嚌嚌如羮上肥者陽氣微連連如蜘蛛絲者陰氣衰陰陽衰微而風邪入於腎經故陰不起或引少腹痛也養生云水銀不得令近陰令人消縮出第四卷中

廣濟療陰痿不起滴瀝精清鍾乳酒方

鍾乳三兩研絹袋盛　附子二兩炮　甘草二兩炙　當歸二兩

石斛二兩　前胡二兩　署預三兩　五味子三兩

人參二兩 生薑屑二兩 牡礪熬二兩 桂心一兩

菟絲子五合 枳實二兩生 乾地黃五兩

右十五味切以絹袋盛清酒二斗漬之春夏三日秋冬七日量性飲之勿忌海藻菘菜猪肉冷水生葱蕪荑生冷粘食等出第四卷中

范汪療男子虛勞陰痿不起無子方

杜仲十分 蛇牀子八分 菟絲子五分酒漬 遠志五分去心

茯苓四分 天雄五分炮 澤瀉五分 石斛五分

蓯蓉四分 五味子四分

右十味擣篩爲散酒服方寸匕日再勿忌猪肉冷水酢物出第七卷中

備急蓯蓉丸療痿弱益精氣男子服之外充婦人服之內補百病差方

鍾乳粉三分　萆薢三分　蓯蓉三分　乾地黄六分

薏苡人三分　菟絲子四分

右六味擣篩以雞子黄棗膏和丸如梧子酒服十丸漸至二十

丸日再服忌蕪荑

又遠志丸療男子痿弱丸

續斷二兩　署預二兩　遠志二兩去心　蛇牀子二兩

肉蓯蓉二兩

右五味擣篩以雀卵和丸如小豆以酒下七丸至十丸百日知之神良

文仲療陰下濕痒又痿弱粉散方

白粉　乾薑　牡礪各三分熬

右三味擣篩爲散欲卧時粉陰下至起亦粉粉盛疏布袋中撲

之佳此大驗又方加麻黄根三兩

又方

礬石熬令汁盡　蛇牀子　黃連各三分

右三味為散粉之同前

經心錄雄蛾散療五勞七傷陰痿十年陽不起皆由少小房多損陽神女養世得道方

雄蛾熬十分　石斛三分　巴戟天二分　天雄炮二分

五味子二分　蛇牀子二分　署預二分　菟絲子二分

牛膝二分　遠志去心二分　茯苓五分

右十一味擣篩為散以酒服方寸匕亦可丸服日三忌猪肉冷水出第四卷中

虛勞小便利方五首

病源此由下焦虛冷故也腎主水與膀胱為表裏膀胱主藏津液腎氣衰弱不能制於津液胞内虛冷水下不禁故小便利也出第四卷中

深師黄耆湯療虛乏四肢沉重或口乾吸吸少氣小便利諸不足方

黄耆三兩　茯苓二兩　桂心二兩　芍藥二兩

甘草一兩　半夏三兩洗　生薑五兩　當歸一兩

大棗三十枚　人參二兩　桑螵蛸二十枚熬破片

右十一味切以水一斗煑取四升分服一升忌海藻菘菜羊肉餳生葱大酢出第四卷中

又療虛勞腹滿食少小便多黄耆建中湯方

黄耆三兩　甘草三兩炙　大棗三十枚　桂心二兩

芍藥四兩　生薑四兩　人參二兩　半夏一升洗

右八味切以水一斗煑取三升去滓分三服古今録驗同忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第十九卷中

又阿膠湯療虛勞小便利而多有人虛勞服散又虛熱盛當風取

冷患脚氣喜發動兼小便利脉細弱服此方利即減

阿膠二兩 乾薑二兩 麻子一升擣碎 遠志四兩去心

附子一枚炮 人參一兩 甘草一兩炙

右七味切以水七升煮六物取三升去滓內膠烊銷分三服一方云小便利多日夜數十行一石五斗者良忌猪肉冷水海藻菘菜

小品黃耆湯療虛勞少氣小便過多方

黃耆二兩 麦門冬二兩去心 大棗三十枚擘 芍藥二兩

乾地黃二兩 黃芩一兩 桂心二兩 生薑二兩

當歸二兩 甘草二兩炙

右十味切以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜生葱蕪荑猪肉冷水出第十三卷中一方有黃連一兩

必効療虛勞下焦虛冷不甚渴小便數黃耆建中湯方

黃耆三兩 桂心二兩 人參二兩 當歸二兩

、芍藥三兩　生薑八兩　膠飴八兩　大棗二十枚

右八味切以水一斗煮七物取三升去滓下飴烊銷分三服若失精加龍骨一兩白斂一兩忌生葱

外臺秘要方卷第十七

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

外臺秘要方

十八

脚氣上

外臺秘要方卷第十八 脚氣上 十二門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

嶺南瘴氣脚氣酒湯散方一十三首

脚氣論二十三首

千金論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南度衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門僧深師仰道人述支法存等諸家舊方爲三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之世蓋無此病所以姚公集驗殊不慇懃徐王撰錄未以爲意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北之人不識此病自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不襲水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病初得即先從脚起因即脛腫時人號爲脚氣深師云脚弱者即其義也

深師述支法存所用永平山敷施連范祖耀黃素等諸家療脚弱方凡八千餘條皆是精要學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有効者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也荅曰夫人有五藏心肺二藏經絡所起在手十指腎肝與脾三藏經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足當履之所以風毒之中人也必先中脚久而不差遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆

不識此疾謾作餘病療之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故唯卒起脚屈弱不能動有此爲異耳黄帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有脚氣未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五内已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下痢或大小便澀秘不通或胸中衝悸不欲見光明或精神惛憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或脚脛腫或不腫或胜腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或少腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人産後春夏取凉多中此毒宜深慎之其熱悶痸瘲驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞愊愊然不

快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕痺

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脱衣靴韈當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病也故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理踈通風如擊箭或先中足心或先中足趺或先中膝以下踹脛

表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處三二十壯因此即愈不復發也黄帝云當風取涼醉巳入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱荅曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者療以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痺

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意療之傷緩氣上入腹或腫或不腫胷脅逆滿氣上肩息急者死不旋踵寛者數日必死不可不急療也但看心下急則氣喘不停或白汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者皆死也

論脉候法

凡脚氣雖復診候多途而三部之脉要須不違四時者爲吉其逆四時者勿治餘如脉經所説此中不復具載其人本黒瘦者易治本肥大肉厚赤白者難愈黒人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難已也

論腫不腫

凡有人久患脚氣不自知别於後因他病發動療之得差後直患嘔吐而復脚弱余爲診之乃告爲脚氣病者曰我平生不患脚腫何因名爲脚氣不肯服湯餘醫以爲石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫爲候有腫者亦有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不須慎

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜蕺菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒唯得食粳米粱米粟米醬豉葱韭薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸醋之食犯之者皆不可差又大宜生牛乳生栗子

論善能療者幾日可差

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺之傷晚二驕很恣傲三狐疑不決此之三種正當枉死之色世間雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復尠少故雖有騏驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉横亦猶此也今有病者有受入性依法使余療之不過十日可得永差矣若無受入性者亦不須爲療縱令療之恐無差日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者説出第七卷中

病源凡脚氣病皆由感風毒所致也得此病者多不即覺或先
無他病而忽得之或因衆病後得之初甚微飲食嬉戲氣力如
故當熟察之其狀自膝至脚有不仁或若痺或淫淫如蟲所緣
或脚指及膝脛洒洒爾或脚屈弱不能行或微腫或酷冷或痛
疼或緩縱不隨或攣急或有至困能飲食者或有不能者或見
飲食而嘔吐惡聞食臭或有物如指發於踹腸逕上衝心氣上
者或舉體轉筋或壯熱頭痛或胷心忪悸寢處不欲見明或腹
內苦痛而兼下者或語言錯亂有善妄誤者或眼濁精神惛憒
者此皆病之證也若療之緩便上入腹入腹或腫或不腫胷脅
滿氣上便殺人急者不全日緩者或一二三月初得此病便宜
速療之不同常病也病既入藏其脉有三品內外證候相似但
脉異耳若病人脉得浮大而緩宜服續命湯兩劑若風盛宜作
越婢湯加朮四兩若脉轉駃而緊宜服竹瀝湯若脉微而弱宜

服風引湯二三劑此皆多是因虛而得之若大虛乏短氣可間服補湯隨病體之冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三品之中最惡脉也脉或沈細而駃者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在内療亦不異當消息以意耳其形或尚可而手脚未及至弱數日之内上氣便死如此之脉急服竹瀝湯日服一劑湯勢常令相及勿令半日之内空無湯也若服竹瀝湯得下者必佳也此湯竹瀝多服之皆須熱服之不熱輙停在胷膈更爲人患若已服數劑病及脉勢未折而若脹滿者可作大鱉甲湯下之湯勢盡而不得下者可以丸藥助令得下下後更服竹瀝湯輙令脉勢折氣息料理乃佳江東嶺南土地卑下風濕之氣易傷於人初得此病多從下上所以脚先屈弱然後毒氣循經絡漸入腑藏腑藏受邪氣便喘滿以其病從脚起故名脚氣其湯熨鍼

石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云坐兩足長舒自縱身內氣向下使心內氣一作柔和適散然後屈一足安膝下努長舒一足仰取指向上便急仰眠頭不至席兩手急努向前頭向上努挽一時各各取勢來去二七遞互亦然去脚疼腰髆冷血冷風痺日日漸損又云覆卧傍視內踵生腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚酸疼脚痺弱又云舒兩足坐散氣向涌泉可三通氣徹到始收右足屈捲將兩手急捉脚涌泉挽足踏手手挽足踏一時取勢手足用力逆氣向下三七不失氣數尋去腎中冷氣膝冷脚疼又云一足屈之足指仰使急一足安膝頭散心兩足跟出氣向下一手拓膝頭向下急搽一手向後拓席一時極勢左右亦然二七去膝痺疼急又云一足踏地一足向後將足解谿安腨上急努兩手偏相向後側身如轉極勢二七左右亦然去足疼痛痺急腰痛出第十三卷中

吴氏竊尋蘇長史唐侍中徐王等脚氣方身經自患三二十年各序氣論皆有道理具述灸穴備說醫方咸言總試俱有効驗比來傳用實愈非虛今撰此三本勒爲二卷色類同者編次寫之仍以朱題蘇唐徐姓號各於方論下傳之門內以救疾耳

蘇長史論曰脚氣之爲病本因腎虛多中肥溢肌膚者無問男女若瘦而勞苦肌膚薄實皮膚厚緊者縱患亦無死憂一差已後又不可久立蒸濕等地多飲酒食麪心情憂憒亦使發動晉宋以前名爲緩風古來無脚氣名後以病從脚起初發因腫滿故名脚氣也又有不腫而緩弱行卒屈倒漸至不仁毒氣上陰攻心便死急不旋踵寬延歲月耳然則緩風毒氣得其總稱矣近來諸醫多宗小品所說粗爲詳悉而因循舊貫頗爲膠柱肘後單略時有可依集驗亦遵小品胡洽陶公微在梗槩並非身以經患不能原始要終也今略述病有數種形證不同一人經病

三十年中便數發毎發差異爲療亦殊前用經効後用便增一旬之内變候不等未能深達往往致斃死固不可先方救後發也鄙年二十許時因丁憂得此病三十年中已經六七度發毎發幾死後發時大況雖同三分論之二分有異依舊用差方療不復有効更張乃瘳耳一分同者毒氣定後手足緩弱頑痺不仁服側子金牙酒往往得差此酒脚氣之要也餘無以加痿躄不能動者服之指期取起二分異者毒氣入腹冷熱不同已經投藥虛實亦異或補或瀉須臨時變革也按小品集驗脚氣脉三種以緩脉爲輕沈緊爲次洪數者爲下自三十年凡見得此病者數百脉沈緊者多死洪數者並生緩者不療自差大況如此療之違法雖輕亦殆療之得理雖重可生也凡脚氣爲疾不同餘病風毒不退未宜停藥比見病者皆以輕疾致斃或以病小則言疾目愈廢藥不服或已服藥而患未退諸藥病相違乃改

爲佗療皆自取危殆如之何畧述所知以示同病者
蘇凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地憂憒春
發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約如此亦時有異於此
候者近入京以來見在室女及婦人或少年學士得此病者皆
以不在江嶺庸醫不識以爲佗病皆錯療之多有死者風氣毒
行天下遍有非獨江嶺間也旣婦人亦病又非由腎虛而得卑
濕之土斯病由衆不爲此療况死極多深用哀悼無如之何夫
療脚氣者須順四時春秋二時宜兼補瀉夏時疾盛專須汗利
十月以後乃用補藥雖小小變通終不越此法或有凡人曾以
夏時見患汗利得差冬時遇病還令汗利冬時見患用補藥得
除夏時遇病還用補藥此並下愚專固同之醫者雖懷濟物之
心翻有致死之効旣未深達以何差療又如治葛救飢人乎今
録此方並經試驗患者披覽當狀自療必有驗効殊勝庸醫也

幸當傳之以濟危殆矣

蘇凡脚氣病雖苦虛羸要不可補之補藥唯宜冬月酒中用之丸散亦不可補服之臚脹非瀉不差唯昆布丸用葶藶子大黃乃佳耳庸醫多不曉此謂爲腎虛多將補藥有不經劑而斃也古方多用風引續命湯療之猶十愈一二若氣毒少而風多者若以療脚氣法用療風則十愈八九矣如當病用藥終無不差脚氣非死病若不肯療蓋自取死非病能殺人也若在遠無藥物處病毒深非灸不能差病者不論耳中華足藥病不肯療而致死者深可痛哉

蘇夫脚氣病不可常服補藥補藥多令鼓脹緊實難救也每月之中須五六度行利爲佳縱常服藥時時取利亦宜時取汗當候冷熱隨時消息不可專一法覺熱煩口乾頭面熱悶即須取冷覺頑痺不仁身體強屈冷疼者便暖將息此並可解尋常飲

酒作豉酒服之大辟風濕兼利腰脚晝日莫多臥須力遨遊舒暢情性以勿睡也

蘇諸毒氣所攻攻內則心急悶不療至死若攻外毒出皮膚則不仁不仁者膏摩之差若未出皮膚在榮衛刺痛者隨痛處急宜灸三五炷即差不必要在孔穴也遠方無藥物處急宜灸之腹背手足諸要穴皆能療此病縱明堂無正文但隨所苦火艾徹處痛便消散此不可知也又候灸瘡差後瘢色赤白平復如本則風毒盡矣若色青黑者風毒未盡仍灸勿止待肢體輕乃休矣

蘇療脚氣不可全補當依前論隨四時候病虛實療之常宜食犢肉犢蹄鯽魚鱧魚猪兎肉葱芥薤蕈等菜猪肝食法先湯中浸之使纔熟作臠切以醬汁和水幷著一抄米薑椒煮令極熟每食下飯大補益消得脚氣生薑蒜豉當食大佳不宜食麪及

羊肉蘿蔔蔓菁韭酒醉房室久立冷濕船行水氣夏月屋中濕氣熱氣勞劇哭泣憂憒如此等類好使氣發也初以微發即服煑散以壓之服煑散不必日別二三服量病輕重日一服或二日一服以攘毒耳若毒氣盛非煑散所能救者急服麻黄等湯也毒氣既退唯苦頑痺兩脚緩弱十月服側子酒不至三劑皆即能行

蘇凡脚氣復發或似石發惡寒壯熱頭痛手足冷或似瘧發發作有時又似傷寒脉甚洪急七日以後壯熱既定則脚氣狀見也冷毒盛脹即服金牙酒熱盛脹即服紫雪平平脹者單用檳榔飲子亦差患脚氣人遠行在家常有金牙紫雪不虞病發便能起死諸大湯藥卒求難濟

蘇凡脚氣虛病猛在皮膚毒未入者可服三五劑大小竹瀝湯唯宜多熱者大小續命湯時宜可用不宜多至十劑也石斛酒

及鍾乳酒惡於側子而傷緩鈍小石斛散及鍾乳散冝多冷者猶不如側子酒中加鍾乳一二十兩白石英一二斤合漬服之其力數倍兩脚緩弱者服之百日皆起行消息脚氣法依此消息必得氣愈第一忌嗔嗔即心腹煩煩即脚氣發第二忌大語大語即損肺肺損亦發動又不得露脚當風入水以冷水洗脚脚脛尤不冝冷雖暑月常須著綿袴至冬寒倍令兩脛溫暖微有汗是大佳依此將息氣漸薄損毎至丑寅日割手足爪甲丑日指寅日足亦冝十二日一度割少侵肉去氣又數須用梳攏頭毎梳欲得一百餘梳亦大去氣毎旦長展脚坐手攀脚七度虛攀一度令手著脚指漸至脚心脚極踏手極攀毎日如此脚氣亦不傷人

唐君頭面及項少似熱氣上即露背膊取冷勿使腰腎冷其背膊冷極厚著衣須如此姑息必漸差若不解將息立見危殆困

篤轉加易發致性命洗面及脚皆須熱湯小添冷水洗之又不得食酸飲不用乗馬若能步行勞筋力其脚氣自然漸差

唐九脚氣病人不能永差至春夏還復發動夏時腠理開不宜卧睡睡覺令人按接勿使邪氣稽留數勞動關節常令通暢此並養生之要拒風邪法也尋常有力每食後行五百步疲倦便止此脚中惡氣隨即下散雖浮腫氣不能上也出上卷中

服湯藥色目方一十九首

千金風毒之氣入人體中脉有三品内外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應差若風盛宜作越婢湯加朮四兩若脉浮大而緊轉駃者宜服竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯兩劑應差此人脉多是因虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三品之中最惡脉也脉或沉細

而駃者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在内治亦不異但當消息以意耳其形尚可而手脚未及至弱數日之中氣上便終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輙停在胷心更爲人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而若腹脹滿可以大鱉甲湯下之湯勢盡而不得下可以丸藥助湯令得下下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停得服三十二物八風散佳又初得病便摩治葛膏日再頑痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者差後半年始能扶人行耳既覺脉及體内差但當勤服八風散勿以脚未能行輕加餘療餘療未必得益更生諸惡失此諸療也猥

人邊亦勿行治葛膏有人聞竹瀝湯即云恐傷腰脚者即勿與療宜知此法人無受入性者不可醫故也不爲疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者服前方重者次第服後者此風毒乃相注易病人宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人喜易人强健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服宜從少始金牙散方在第十二卷中

病人唯宜服赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯療風毒病初得似天行毒病而脉浮緩終不變駃此不療或數日而死或十日而死或得便不識人或發黃或發斑或目赤或下部穿爛或腿膝穿漏者此最急得之即先服續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故不折更與續命湯兩三劑必差此病大急令湯勢相接不可使半日闕湯即便殺人

又第一竹瀝湯療兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

甘草一兩炙　秦艽一兩　葛根一兩　附子二枚炮

黃芩一兩　麻黃一兩去節　防已一兩　杏人五十枚去皮尖兩人碎

防風一兩半　升麻一兩半　茯苓三兩　細辛一兩

竹瀝五升　桂心一兩　乾薑一兩

右十五味切以水七升合竹瀝煑取三升分三服取汗忌海藻菘菜猪肉醋物生菜生葱翼方無茯苓杏人有白朮

又第二大竹瀝湯療卒中風口噤不能語言四肢緩縱偏痺攣急痛風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝一斗四升　獨活二兩　芍藥二兩　桂心一兩

防風二兩　麻黃一兩去節　白朮二兩　葛根二兩

生薑三兩　茵芋二兩　細辛二兩　茯苓三兩

防已一兩　烏頭一枚炮　人參一兩　石膏一兩碎綿裹

黄芩二兩　芎藭二兩　甘草二兩炙

右十九味切以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一壯相當即服忌猪肉冷水海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉醋物等翼方無白朮

又第三竹瀝湯療風毒入人五内短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

當歸二兩　防風三兩　生薑八兩　白朮三兩

人參二兩　黄芩二兩　芎藭二兩　細辛二兩

桂心二兩　茯苓三兩　甘草二兩炙　附子二枚炮

秦艽三兩　葛根五兩　升麻二兩　麻黄二兩去節

蜀椒一兩汗

右十七味切以甘竹汁一斗九升煮取四升分五服忌猪肉冷水海藻菘菜生菜生葱桃李雀肉醋物並出第七卷中翼方有芍藥茯

神防己 通草無 茯苓 黃芩 芎藭 升麻 蜀椒 麻黃 生薑

千金翼療脚氣常作穀白皮粥防之法即不發方

穀白皮切五升炙勿取斑者有毒

右一味以水一斗半煑取七升去滓煑米粥常食之出第十六卷中

崔氏療脚氣夏月須食瓜及瓜飲子方

生瓜一枚如[illegible]許大去蔕四破以水五升煑令爛去滓 白朮二兩 生薑一兩

右三味切二物以前汁煑取二升去滓分三服禁食桃李雀肉等出第六卷中生瓜恐是木瓜

又療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡者方

服紫雪強人服如兩棗大弱者減之和水服當利熱毒若經服石發熱毒悶者服之如神勝三黃湯十劑備急同

又若冷服毒悶方

服金牙散以湯如桃李許和散如棗核大服卒患取利及吐者一服四分匕用之若神良備急同並出第九卷中

必効療脚氣方

蒼耳子五升　赤小豆二升　鹽一斤

右三味以水一石五斗緩火煎取五六斗去滓別貯取受斗半鐺於前泥四面開一畔入火處鐺內著所煎汁用浸脚纔令沒踝鐺下微著炭火常令溫溫如汁漸盡不沒踝續續添使沒浸時仍於密房中牀前遮閉爲垂脚恐風不能久坐之仰卧亦得連夜浸之彌佳浸經三日外其欲食飲常苦飢便食任食此一劑藥汁盡必差不過用半汁即可覺漸可一日兩日食一頓生猪肉鱠大精此方甚効

又方

取上好椒末經蒸者取三大斗分爲兩袋袋以布作長八寸椒須滿實勿使虛即以醋漿水三大升鹽一大升内在漿中即煑椒袋可經十餘沸即止其鐺釜底仍微著火勿使冷又取冷醋漿一大升安貯盆中即取前件袋一枚内於冷漿盆裏患人於牀上坐垂脚牀下盆安地上將兩脚踏盆中熱袋上其椒袋冷熱令可忍覺椒袋如冷即換取釜中熱袋還准前盆中以脚踏之如冷還於舊釜中以火温使熱更互用之其牀前可垂氊席到地勿使風吹脚如兩脚至膝以來牽風如蟲行頭項及四肢身體揔　中如雷鳴氣下即休踏椒袋得汗間覺心氣悶可取冷飯喫三五口以鹿脯下勿食猪羊肉魚及臭穢又不得食粳米如須和羹可以蘇和兼生薑合皮喫麪餅蒜葱醬豉醋等

並得食踏袋得汗已後覺微利勿怪之此是病狀通洩之候若不差隔日三日二廻取舊湯袋依前法踏之得汗還止覺腹中緩空能食起即停如未覺損終而復始以差爲度白桑葉膏服之亦可不相妨

又方

白椹桑葉切細取大斗十一石以斗量縱剩亦非事如無葉即取軟條還細剉取一石以清水一石五斗於一釜中和上件一石白桑椹葉即火煑使常沸其湯可有五斗許即濾却葉更煎可有二斗以來移於鐺中又煎取三升以下二升以上似稠餳即止每旦空腹服一匙至日晚又服一匙如嘔不能下可和羹和粥和食能喫不嘔能服一七日以上即覺四肢通暢下洩氣洩氣以後兩脚腫勿怪此得藥力是病差候此法

已經療五六十人以上異種神効

又方

吴半夏三兩淨削去皮　生薑汁三升

右二味水五升煑取二升去滓空腹一服盡每日一劑三劑必好禁羊肉餳此方梁公家出方始有本奇異神効並出第三卷中

蘇恭云凡患脚氣每旦早食任意飽午後少食日晚不食彌佳如飢可食䜴粥若瞋不消及喫難消之物致霍亂轉筋十不一活若晚食不消欲致霍亂者方

高良薑一兩打碎

右一味以水三升煑取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑取毋薑一兩切之以清酒一升煑令極沸幷滓飲之雖不及高良薑亦大驗

又若已覺著脚氣宜服此方

蒜三升去心切熬令黄色　桃人一小升去皮尖雙人熬令紫色　豉一大升熬令香

右三味合和生絹袋盛以美酒一斗漬之夏月三日冬月七日初服半升漸加至二升量增減若盡更著五升美酒漬飲之加椒一二合尤妙

又方

香豉一升小便一升和漬少時令有稠色去滓平旦空腹服三日一停三日復作服以差爲度

又紫雪療脚氣毒遍内外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草熱藥毒發邪熱卒黄等瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五疰心腹諸疾絞刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病最良方

黄金百兩側左　寒水石三斤　石膏三斤　磁石三斤

滑石三斤　玄參一斤　羚羊角五兩屑　犀角五兩屑

升麻一升 沈香五兩 丁子香一兩 青木香五兩
甘草八兩炙
右十三味以水一斛先煮五種金石藥得四斗去滓後內八物煮取一斗五升去滓取消石四升芒消亦可用朴消精者十斤投汁中微炭上煎柳木箪攪勿住手有七升投在木盆中半日欲凝內成研朱砂三兩細研麝香當門子五分內中攪調寒之二日成霜雪紫色病人強壯者一服二分當利熱毒老弱人或熱毒微者一服一分以意節之合得一劑支十年許用大神妙不用餘論脚氣病經服石藥發熱毒悶者服之如神水和四分服勝三黃湯十劑以後依舊方用麝香丸下脚氣或熱脹曾用不如金牙散良忌海藻菘菜生血物等
又金牙散方此方並要
金牙研 曾丹研疑 礜石研泥裹燒半日 丹砂研

雄黃研　朴消研　寒水石研　代赭研

龍骨研　犀角屑　獺肝炙　鸛骨炙

狸骨炙　巴豆去心皮熬　大黃　冶葛皮炙各三分

牛黃別入　麝香別入　升麻　桂心

附子生用去皮　鬼臼　鬼督郵　黃環

鳶根本草有鳶尾此云鳶根即是用鳶尾之根也　青木香　牡蠣熬

蘇合香研別入　常山　茯苓　黃耆

知母　龍膽各二分　露蜂房　王支

茼草一本作茵芋　鬼箭羽　徐長卿　石長生

蜀漆　當歸　桔梗　白薇各一分

蜈蚣二枚炙　蜴蜥一枚炙　芫青炙　地膽炙

亭長炙各三十九枚　椒四十九枚汗

右四十九味合擣爲散以湯如桃李許和散三分匕或如棗核

服之常患者日再服卒患取利吐者服四分匕若以絳袋裹
方寸匕三匕帶之辟諸惡癘忌食生冷蘆笋生葱菜猪肉冷
水醋物陳臭生血等物合藥用臘月王相日勿令穢汚風見之
以臘紙裹得二年用此藥能冷熱能虚實說其功効卒不盡矣
凡服藥散酒丸等但所服者衆蒙効者寡或五藏證候不同七
情有所乖舛分兩參差冷熱有異故陶隱居云醫者意也古
之所謂良醫蓋以其意量而得其節是知療病之者皆意出當
時不可以舊方醫療令之人或異於此病勢少與方題似便即
以和合病機未察診候宜然大同小異致令乖舛寔取危殆如
之何又云代無良醫枉死者半此之一言深可悲也凡患脚氣者
雖苦虚羸不得多服補藥服之臚脹非瀉不差但益虚羸也雖
冬月得用補藥如冬月仍患氣不除者亦不得服之甚解此大
都患氣尋常須微利但不得大利益虚耳凡脚頑至冬則定者

多所以然〻腎王王則不受邪所以腰脚得利也凡此有五種冷脚氣熱脚氣平平脚氣大虛脚氣大實脚氣或患變作五者冷者專瀉亦兼療風毒尋赴脚氣乃似傷寒參差危殆深須曉識若不通愽不如不爲金牙散功少大猛就中姑息兼療諸病蠱毒注忤鬼魅野道肺痿骨蒸傳屍相易爲第一藥用物旣多斟酌用悉要者乃爲施功少合之須得眞好法得差不要盡劑用之並出第一卷中

近効療脚氣方

附子五兩炮　甘草五兩大炙

右二味並細剉以水五斗煎取二斗半置盆中以版子闊三寸許橫湯上共水面平脚踏版上以湯搨脚水冷即休此湯得四五度用脚氣永除此方極驗

又桑煎療水氣肺氣癰腫兼風氣方

桑條二兩並用大秤大兩

右一味細剉如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造准此增加先熬令香然後煎每服肚空喫或如茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌

又本方云桑枝平不冷不熱可以常服療遍體風痒乾燥脚氣風氣四肢拘攣上氣眼暈肺氣欬嗽銷食利小便久服輕悅耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子

桑枝細切一小升

右一味熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無問食

前後比服只依前方

脚氣不隨方五首

崔氏側子酒療脚氣不隨方

側子四兩炮　生石斛八兩碎　磁石八兩　獨活三兩
秦艽三兩　甘草三兩炙　紫蘇莖一握　前胡四兩
防風三兩　茯苓八兩　黃芩三兩　五味子四兩
防已三兩　桂心三兩　丹參三兩　蜀椒二兩出汗
山茱萸四兩碎　芎藭二兩　細辛二兩　當歸三兩
白朮四兩　乾薑三兩　薏苡人一升三合

右二十三味薄切絹袋貯以清酒四升浸五日一服四合日再細細加至八九合溫飲慎生冷豬肉蒜麪其中間覺熱渴得飲豉酒豉仍須蒸暴之忌海藻菘菜桃李雀肉生葱生菜及醋物等

又煑散方

地骨白皮十二分　麻黃六分去節　杏人八分去皮尖兩人　防已二十分
黃芩十分　羚羊角八分屑　茯苓十二分　澤瀉六分

細辛五分 薏苡人十二分 生石斛十二分 人參六分
白朮十分 大黃六分 磁石二十分 丹參十分
犀角八分屑 蒺藜子十二分 甘草十分炙 桂心六分
生薑十二分 前胡八分
右二十二味擣以麤葛篩度攪使極調三兩爲一劑以後藥汁二升煑取一升頓服之日服一劑以小便利爲度忌海藻菘菜生葱菜桃李雀肉醋物等

又小飲子法用煑前散

大棗五枚擘 桑根白皮五兩 白前二兩 橘皮二分
右四味切以水五升煑取二升將煑前散慎如藥法

又若脚氣上入少腹少腹不仁即服張仲景八味丸方

乾地黃八兩 澤瀉四兩 附子二兩炮 署預四兩
茯苓三兩 桂心三兩 牡丹三兩去心 山茱萸五兩

右八味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸漸加至三十丸仍灸三里絶骨若脚數轉筋灸承山若脚脛内稍不仁灸三陰交忌猪肉冷水生葱醋物蕪荑

又脚氣雖差至冬季間常須服側子酒方

側子二兩炮　乾薑二兩　石斛八兩　丹參三兩
牛膝二兩　甘草二兩炙　防風三兩　乾地黄四兩
芎藭二兩　當歸三兩　桂心三兩　五味子三兩
白朮二兩　秦艽三兩　防己二兩　椒二兩汗
獨活三兩　山茱萸四兩　細辛二兩　黄芩二兩
茯苓四兩　附子一兩炮

右二十二味切絹袋貯以酒三斗五升浸秋冬七日春夏五日一服四合日二細細加之以知爲度得食羊鹿麞肉雞亦得食忌海藻菘菜猪肉冷水桃李雀肉生葱生菜蕪荑酢物並

出第六卷中

風毒脚弱痺方六首

千金療惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服第一服此麻黃湯次服第二第三第四方

麻黃一兩去節　防風二兩　大棗二十枚擘　當歸二兩

茯苓三兩　升麻二兩　芎藭二兩　白朮二兩

芍藥二兩　麥門冬二兩去心　黃芩二兩　桂心二兩

杏人三十枚去皮尖　甘草二兩炙

右十四味切以水九升清酒二升合煮取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風忌海藻菘菜生葱桃李雀肉酢物

第二服獨活湯方

獨活四兩　乾地黃三兩　芍藥二兩　葛根二兩

桂心二兩　生薑五兩　麻黃二兩去節　甘草二兩炙

右八味切以水八升清酒二升合煑取二升五合去滓分四服日三夜一犯之一世不愈忌海藻菘菜生葱蕪荑脚弱特忌食瓠子蕺菜

第三服兼補厚朴湯幷治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方

吴茱萸一升一方用三兩　半夏七兩洗　乾地黃二兩　生薑一斤

芎藭二兩　桂心二兩　厚朴二兩炙　芍藥二兩

當歸二兩　人參二兩　黃耆三兩　甘草三兩炙

右十二味切以水二斗煑猪蹄一具取一斗二升去上肥肉清酒三升合煑取三升分四服相去如人行二十里久忌羊肉餳蕪荑生葱海藻菘菜

又第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩　人參二兩　附子一兩炮　大豆二升

桂心二兩　防風二兩　芍藥二兩　當歸二兩

茯苓三兩　黃耆二兩　乾薑二兩　甘草三兩炙

升麻一兩半

右十三味切以水九升清酒三升合煮取三升半去滓分四服相去二十里久忌海藻菘菜猪肉冷水生葱醋物

又療脚弱神驗防風湯方

防風二兩　獨活二兩　黃芩二兩　茵芋二兩

葛根二兩　芎藭二兩　細辛一兩　蜀椒一兩出汗

防已一兩　桂心一兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節

石膏一兩碎　生薑三兩　烏頭三枚炮　茯苓三兩

甘草二兩

右十七味切以竹瀝一斗煮取四升去滓分六服一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先常服竹瀝湯四劑

未覺增損作此方後覺得力云脉沈細駛風在内者作此湯也忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜醋物

又越婢湯療風痺脚弱方

麻黄六兩去節　石膏半斤碎　白术四兩　大附子一枚炮

生薑三兩　大棗十五枚擘　甘草二兩炙

右七味切以水七升先煑麻黄再沸去上沫内諸藥煑取二升分三服覆取汗一方用附子二枚忌海藻菘菜豬肉冷水桃李雀肉等並出第七卷中此仲景方本云越婢加术湯又無附子胡洽云若惡風者加附子一枚多冷痰者加白术

大小續命湯中風方二首

唐侍郎大續命湯主手足攣急及不隨此方療若脚氣上又中風四肢壯熱如火攣急或縱不隨氣衝胷中方

當歸二兩　芎藭一兩　桂心一兩　麻黄二兩去節

芍藥一兩 石膏一兩碎綿裹 生薑三兩 人參一兩

防風二兩 黃芩一兩 杏人四十枚去皮尖兩人 甘草一兩炙

右十二味切以水九升煮取三升去滓分四服忌海藻菘菜生葱等深師同

又小續命湯療中毒風口不能言咽中如塞或緩或急身體不自收冒昧不知痛處拘急不得轉側方

麻黃三兩去節 甘草一兩炙 桂心一兩 石膏二兩碎綿裹

芎藭二兩 乾薑二分 黃芩一兩 當歸二分

杏人二十枚去尖皮雙人

右九味切以水九升煮取二升去滓分二服薄取汗莫見風不差復作禁如藥法并療久瘖失聲上氣嘔逆面目腫皆愈服湯已多體虛宜兼補忌海藻菘菜生葱等

不仁不能行方三首

千金風引湯療兩脚疼痺腫或不仁拘急屈不得行方

麻黃二兩去節　吳茱萸一兩碎　獨活二兩　秦艽一兩

石膏二兩碎　杏人六十枚去兩人皮尖碎　白术三兩　茯苓二兩

桂心一兩　人參一兩　細辛一兩　乾薑一兩碎

防風一兩　防已一兩　芎藭一兩　甘草一兩炙

附子一兩炮

右十七味切以水一斗六升煑取三升分三服取汗佳忌海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉醋物等

又小風引湯主中風腰脚疼痛弱者方

獨活二兩　防風二兩　當歸二兩　茯苓三兩

大豆二升　人參三兩　乾薑二兩　附子一枚炮

生石斛二兩　甘草二兩炙

右十味切以水九升酒三升煑取三升去滓分四服服別如

人行十里久忌海藻菘菜猪肉冷水醋等（一方無乾薑石斛有桂心黃耆）

又金牙側子酒療風濕痺不仁脚弱不能行常用古方今新出

側子（炮）　牛膝　丹參　山茱萸

蒴藋根　杜仲（去皮炙）　石斛（各四分）　防風

乾薑　椒（汗）　細辛　獨活

秦艽　桂心　芎藭　當歸

白术　茵芋（炙各三分）　五加皮（五分）　薏苡人（一升碎）

右二十味並細切絹袋盛清酒四五升漬五六宿初服三合日再服稍加以知爲度患目昏頭旋者彌精忌猪肉冷水生葱生菜桃李雀肉等並出第七卷中（方中無金牙未詳其名）

因脚氣續生諸病方四首

千金云雖患脚氣不妨乳動石發皆須服壓石藥療之夫因脚氣續生諸病者則以餘藥對之或大小便不利則以猪苓茯苓

及諸利小便藥療之大便極堅者則用五柔麻人等丸療之遍體腫滿成水病者則取療水方中諸療水之藥療之餘皆倣此更無拘忌出第七卷中

又猪苓散主虛滿通身腫利三焦通水道方

茯苓　葶藶熬　人參　防風

澤瀉　甘草炙　桂心　白术

狼毒　椒目　乾薑各三分　赤小豆二合

大戟二分　蓯蓉二分半　猪苓三分　女萎三合熬

五味子三分

右十七味擣篩酒服方寸匕日三夜一老小一錢匕以小便利爲度忌海藻菘菜生葱桃李雀肉醋物等

又茯苓丸主水脹甄權爲安康公處得差方

茯苓　白术　椒目各四分　葶藶六分熬

澤瀉　防己各五分　赤小豆　前胡

芫花熬　桂心各三分　甘遂十二分　芒消五分

右十二味擣末蜜和丸如梧子湯服五丸日一稍加以知爲度

忌桃李雀肉生葱醋物並第二十一卷中

又淮南五柔丸療秘澀及澼飲食不生肌膚虛損不足三膲不調和

榮衛利腑藏補三膲方

大黃一斤蒸三斗半下　前胡二兩　半夏洗　蓯蓉

芍藥　茯苓　細辛　當歸

葶藶熬各一兩

右九味擣篩蜜和擣萬杵食後服十五丸如梧子日三服忌

羊肉餳生菜醋物一方有黃芩

又麻人丸療大便堅小便利而不渴方

麻子人一升　枳實八兩炙　杏人一升去兩人尖皮熬　芍藥八兩

大黃一斤 厚朴一尺炙

右六味擣篩蜜和丸如梧子飲服五丸日三加至十丸一本芎藭六兩並出第十五卷中此本仲景傷寒論脾約丸方附後無杏人

大法春秋宜服散湯方六首千金但云宜服散此又兼湯煎

千金八風散療風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱准經面青黑主腎不見日月光主肝補腎治肝方

菝葜八分 烏頭二分炮 鍾乳四分研 署預四分

續斷四分 黃耆四分 麥門冬四分去心 五味子二分

澤瀉四分 遠志皮四分去心 菟絲子四分酒漬 細辛四分

龍膽四分 秦艽四分 石韋四分去毛 柏子人四分

牛膝四分 杜仲四分 昌蒲四分 蛇牀子四分

山茱萸四分 防風四分 白朮四分 乾薑四分

乾地黃四分 茯苓四分 附子五分炮 甘草五分炙

石斛六分　天雄六分炮　萆薢四分　人參五分
菊花十二分
右三十三味擣篩酒服方寸匕日三不知加至二匕忌豬肉
冷水羊肉餳海藻菘菜蕪荑桃李雀肉生菜醋物等
又大八風散療諸緩風濕痺脚弱方
巴戟天二分去心　芎藭一分　附子三分炮　黃耆二分
白斂二分　桂心二分　細辛二分　桔梗二分
人參二分　芍藥二分　牛膝四分　署預二分
菊花二分　萎蕤二分　秦艽二分　烏喙四分
牡荊子二分　天雄二分炮　蓯蓉一分　萆薢二分
茯苓四分　遠志四分去心　山茱萸二分　黃芩二分
石斛二分　白朮二分　昌蒲四分　礜石二分泥裹燒半日
厚朴二分炙　龍膽一分　蜀椒二分汗　五味子二分

右三十二味擣篩溫酒服半方寸匕日三不知稍增趣令微覺爲度忌猪羊肉冷水桃李雀肉醋物餳生葱生菜海藻菘菜一本有甘草乾薑無芎藭牛膝

又凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯不服也如此者皆死不療世間大有病人親朋故友遠來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談說異端或言是虛或言是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬說種種不同破壞病人心意莫知孰是遷延未定時不待人欻然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識疾深淺探賾方書博覽古今是事明解者看病不爾大悞人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者讀之以自防備也但有一也憂恚積思喜怒悲歡復隨風濕結氣欬時嘔吐食以

變大小便不利時洩利重下溺血上氣吐下乍寒乍熱臥不安席小便赤黃時時惡夢夢與死人共食飲入塚神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰痿不起住而不卒骨極則傷腎傷腎則短氣不可久立陰疼惡寒甚者卵縮陰下生瘡濕痒搔之不欲止汁出此皆爲腎病甚者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰脚弱一名脚氣醫所不療此皆主之方

天門冬（三斗半去心擣壓取令汁盡）　枸杞根（切三斗半淨洗水兩石五斗煮取一斗三升澄清）

酥（三升煉）　生地黃（切三斗半擣壓如天門冬法）　麞骨一具（碎以水一石煮取五斗澄清）

白蜜（三升煉）

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃合煎取大斗十二斗下後散藥煎取一斗內銅器中重釜煎令隱掌可丸平旦空腹酒服如梧子二十丸日二稍加至五十丸擇四時王

相日合之忌生冷醋滑雞猪魚蒜油麪蕪荑等

散藥如左

茯苓　柏子人　桂心　白朮

萎蕤　昌蒲　遠志去心　澤瀉

署預　人參　石斛　牛膝

杜仲　細辛　蔓荆子　獨活

枳實炙　芎藭　黄耆　蓯蓉

續斷　狗脊黑者　萆薢　白芷

巴戟　五加皮　覆盆子　橘皮

胡麻人　大豆卷各二兩　甘草六兩炙　薏苡人一升

蜀椒一兩汗　阿膠十兩炙　鹿角膠五兩炙　大棗一百枚煮作膏

石南二兩　茯神二兩

右三十八味擣絹下篩內煎中有牛髓鹿髓各加三升大佳小

便澀去柏子人加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿失精去萎蕤加五味子二兩頭風去柏子人加菊花二兩防風二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾薑二兩無佗疾依方合之凡此煎至九月下旬採藥立冬日合而服之至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬即服之若停經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥沙中上加少土覆之即經夏不壞也女人先患熱者得服冷者勿服忌羊肉餳生菜生葱醋物海藻菘菜桃李雀肉青魚鮓等

又大鱉甲湯療脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒及山水瘴氣熱毒四肢痺弱方

鱉甲二兩炙　防風一兩　麻黃一兩去節　白朮一兩

吳茱萸五合　知母一兩　升麻一兩　大棗二十枚擘

貝齒七枚燒　茯苓一兩　橘皮一兩　芎藭一兩

杏人一兩去雙人皮尖碎　犀角半兩屑　生薑三兩　人參一兩

赤小豆三合　青木香半兩　麝香三銖研　羚羊角一八屑

麥門冬一兩去心　大黃一兩半　薤白十四枚　烏頭七枚炮

石膏一兩碎　雄黃二分研　半夏一兩洗　當歸一兩

萎蕤一兩　芍藥一兩　甘草一兩炙

右三十一味切以水二斗煮取四升去滓分六服相去十里久得下止一方用大黃二分畏下可用一分也一方用羚羊角二分毒盛可用三分也忌海藻菘菜莧菜桃李雀肉醋物羊肉餳等一方有山茱萸翼方無知母升麻橘皮芎藭當歸萎蕤

又小鼈甲湯療身體虛脹如微腫胷心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱方

鼈甲三兩炙　升麻三兩　黃芩三兩　麻黃三兩去節

羚羊角三兩屑　前胡四兩　桂心三兩　烏梅二七枚擘

杏人三兩去皮尖兩人　薤白二十一莖

右十味切以水一斗煮取二升七合去滓分三服此常用若體強壯須利者加大黃二兩忌莧菜生葱

又療風虛脚弱手足拘急攣疼痺不能行動脚趺腫上膝少腹堅如繩約氣息急常如憂恚不能食飲者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也宜服内補石斛秦艽散方

石斛四分　秦艽五分　山茱萸三分　蜀椒二分汗

五味子二分　麻黃三分去節　桔梗三分　前胡三分

白芷三分　白朮二分　附子炮　獨活

天門冬去心　桂心各四分　烏頭五分炮　人參五分

天雄四分炮　乾薑五分　防風五分　細辛三分

杜仲五分　莽草三分炙　當歸五分

右二十三物擣篩爲散酒服方寸匕日再服不知加至二匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛既得病後毒氣外滿則炙洩其氣內滿則藥馳之當其救急理必如此至於風消退四體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極爲良妙此既人情可解者無可疑焉忌桃李雀肉豬肉冷水生葱生菜鯉魚並出第七卷中

脚氣嘔逆不下食方二首

文仲瓜飲療脚氣嘔逆不得食方

生瓜一枚四破水九升煑取五升去滓　白朮四兩　甘草一兩炙　生薑二兩

右四味切三物內瓜汁中煑取二升去滓溫分三服忌桃李雀肉海藻菘菜出第九卷中生瓜恐是木瓜

延年茯苓飲主脚氣腫氣急上氣心悶熱煩嘔逆不下食方

茯苓三兩 紫蘇葉三兩 杏人三兩去人尖皮碎 橘皮三兩
升麻三兩 柴胡三兩 生薑四兩 檳榔十二枚并皮子碎
犀角二兩屑

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服如人行八里久忌醋物出第十九卷中

脚氣疼不仁方二首

病源此由風濕毒氣與血氣相搏正氣與邪氣交擊而正氣不宣散故疼痛邪在膚腠血氣則澀隔則皮膚厚搔之如隔衣物不覺知名爲不仁也出第十三卷中

蘇恭療初患脚足皮膚舒緩足上不仁膝下疼痛眉眼動左脅下氣每飽食即發隔上熱臍下冷心虛陰汗且痰兼補煑散方

黄耆 人參 獨活 芎藭
防風 當歸 桂心 萆薢

防巳各六兩 茯苓 白朮 丹參各八兩
附子生用 甘草炙各四兩 杏人去皮尖兩人 生地黃
生薑 磁石二十分碎如小豆

右十八味並切分之爲三十服服別以生薑一兩生地黃一兩杏人十四枚碎以水二升煑取七合布絞去滓一服之常以日晚或夜中服之不妨公事如逆嘔者加半夏一兩如前加減法忌猪肉冷水海藻菘菜生葱桃李雀肉醋物羊肉蕪荑及餳三日以後並無禁忌

又側子酒主脚氣春夏發入秋腫消氣定但苦脚弱不能屈伸足上不仁手指脹悶不得屈伸四肢腰頸背皆廢者服此酒方

側子生用 乾薑各五兩生者良 丹參 牛膝各六兩
金牙碎綿裹 磁石如上 生石斛各一斤乾用八兩 石南炙
獨活六兩炙 萆薢 生茱萸 生地黃各十兩乾者用八兩

防風 茯苓各四兩 五加皮 薏苡人各一兩
茵芋炙 椒各一兩汗 桂心 天雄生用
人參 芎藭 當歸 白朮
細辛各二兩
右二十五味切絹袋貯清酒六七斗漬之七日成一服一小盞日二三服量性多少稍加以痺爲度若婦人服去石南丈夫苦冷著孔公孽鍾乳等多至一二斤少至七八兩服此酒時須隨病內外灸三兩處以洩氣忌豬肉冷水醋物生葱桃李雀肉生菜蕪荑等並出第一卷中

脚氣衝心煩悶方二十二首

廣濟療脚氣衝心悶洗脚漬湯方

糜穰一石內釜中

右一味多煮取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘沸漬脚三

兩度如冷温漬洗差止無所忌

又療脚氣急上衝心悶欲死者方

檳榔人三顆細末　生薑汁三合　童子小便二升新者不須煖

右三味攪頓服須臾即氣退若未全差更服最佳利三兩行無所忌

又療脚氣心煩悶氣急卧不安方

半夏一升湯洗去滑　生薑八兩　桂心三兩　檳榔人一兩半末

右四味切以水八升煮減半內檳榔人末煎取二升八合絞去滓分温三服服別相去如人行五六里進一服微利爲度忌羊肉生葱粘食餳等物

又療脚氣攻心悶腹脹氣急欲死者方

吴茱萸三升　木瓜切二合　檳榔二十顆碎　竹葉切二升

右四味以水一斗煮取三升分三服得快利即差忌生菜熟

麪蕎麥蒜物等

又療腎虛風脚氣衝心疝氣下墜小便數膝冷腰疼時時心悶氣急欲絶四肢無力射干丸方

射干六分 昆布八分洗 通草四分 犀角六分屑

杏人一分去皮尖熬 漢防已八分 茯苓六分 青木香八分

旋復花四分 白頭翁四分 獨活六分 葶藶子八分熬

右十二味擣篩蜜和丸如梧子酒下二十丸漸加至三十丸日再服不利空腹服煑檳榔桑根皮下更佳忌生菜熱麪蕎麥蒜灸肉粘膩醋物並出第二卷中

崔氏旋復花湯療脚氣衝心欲死者服之救病困急此方最先

旋復花二兩 犀角二兩屑 紫蘇莖一握 桂心一兩

赤茯苓三兩 橘皮二兩 生薑三兩 前胡四兩

乾棗七枚擘 白前一兩 香豉七合綿裹文仲用一升

右十一味切以水八升煑取二升四合分三服相去十里久以下氣小便利爲度忌生葱酢物

又治脚氣瘰痺不仁兩脚緩弱脚腫無　重者少腹氣滿胷中痞塞見食即嘔或兩手大拇指不遂或兩脚大拇指不遂或小便澀第一療氣滿嘔逆不下食旋復飲子方

旋復花二兩　橘皮二兩　生薑三兩　紫蘇莖一握

茯苓三兩　香豉一升綿裹　大棗十枚擘

右七味切以水八升煑取二升四合分三服服别相去十里久日一劑凡服五劑上氣即下小便澀者加桑根白皮四兩愼生冷猪肉蒜麪魚粘食如其服此飲二三劑氣下訖即須服犀角湯第一方十四味者是也服當小便利爲度如其胷膈中氣滿者加半夏四兩湯洗待腹內氣和脚腫欲消皮膚猶如隔帛者宜服犀角麻黃湯一二劑五日後然服之忌

生葱醋物

又大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體徧腫悶絶死者方

犀角（二兩屑） 桑根白皮（四兩） 白术（二兩） 桂心（二兩）
香豉（一升無鹽者） 防巳（二兩） 紫蘇（一握） 前胡（四兩）
橘皮（三兩） 黄芩（三兩） 茯苓（三兩） 大棗（十枚擘）
生薑（一兩）

右十三味切以水九升浸一宿煮取二升七合或水一斗煮取三升分爲三服服相去如人行十里久以下氣利小便爲度忌酢物桃李雀肉生葱等

又犀角麻黄湯方

犀角（二兩屑） 麻黄（二兩去節） 甘草（一兩炙） 茯苓（二兩）
防巳（二兩） 黄芩（一兩） 石膏（三兩碎綿裹） 附子（一兩炮）
白术（一兩） 芎藭（一兩） 防風（一兩） 當歸（一兩）

生薑三分　細辛一兩　桂心一兩

右十五味切以水一斗先煑麻黄去沫訖取汁八升下諸藥煎取二升七合分三服相去十里久服訖覆取汁待三四日後若其皮膚不仁差即停不差宜更服之不得過三劑即差差訖脚中無力者宜服獨活犀角湯三二劑即愈忌海藻菘菜醋物猪肉冷水桃李雀肉生葱生菜等

又獨活犀角湯

獨活三兩　犀角二兩屑　石斛二兩先煑　丹參二兩

側子一兩炮　防風二兩　防巳二兩　芎藭二兩

生薑三兩　當歸二兩　芍藥三兩　茯苓四兩

桂心一兩半　甘草二兩炙

右十四味切以水一斗煑取二升七合去滓分三服相去十里久服訖任卧不須取汗凡服三二劑隔五日一服初服此

藥覺腹內氣散兩脚有力行動無妨或可即停又可常服香豉酒灸三里穴絶骨各三百壯忌海藻菘菜豬肉冷水生葱酢物等

又香豉酒方

取香豉一斗以酒三斗浸三日取飲任性多少利即減之不利任性其中用橘皮生薑調適香味任意服盡復作以差爲度並出第六卷中

文仲療脚氣心煩不下食方

牛乳一小升 杏人四十九枚去皮尖兩人熬末之 橘皮一分切 生薑一兩切

右四味合煎取八合空心頓服令盡虛人或微利亦無苦有人服驗備急同

又毒氣攻心欲死者方與蘇徐木瓜二物相加減用

吳茱萸四升 淡竹葉切一升

右二味以水一斗煮取二升去滓分五服兼主上氣腫滿蘇恭云大快比加檳榔人四十枚末之更快於本方備急同徐王用尋常氣滿日服一劑檳榔七枚合皮碎橘皮一兩厚朴炙吴茱萸各二兩生薑四兩水三升煮取一升二合分二服此湯性温去冷脹亦蘇家之法備急同

又若毒氣攻心手足脉絶此亦難濟不得已作此湯十愈七八方千金云治脚氣入腹困悶欲死腹脹茱萸湯方

吴茱萸六升　木瓜二枚切

右二味以水一斗三升煮取三升分三服或以吐汗便活蘇恭云服得活甚易但鑽攣一作急少時熱悶耳此方是爲起死是高麗老師方與徐王方相似故應神妙備急千金蘇徐同方云無木瓜可取吴茱萸一色煮服又方加青木香三兩犀角二兩屑亦云此湯起死人

又脚氣冷毒悶心下堅背膊痛上氣欲死者方

吳茱萸三升 檳榔四十枚去皮取碎 青木香二兩 犀角三兩屑

半夏八兩湯洗 生薑六兩

右六味切以水一斗煮取三升分三服大効破毒氣尤良忌羊肉餳備急同

又脚氣入腹心悶者方

濃煮大豆汁飲一大升不止更飲大驗備急同

又療脚氣入心悶絶欲死者

半夏三兩洗切 生薑汁二升半

右二味內半夏煮取一升八合分四服極効忌羊肉餳備急同並出第九卷中

蘇恭云若風熱輕但毒氣入胃唯心悶煩熱索水灑脣面乾嘔好叫喚欲斷絶者服此犀角湯効方

犀角屑 青木香 羚羊角屑 人參

竹茹 沈香 射干各二兩 麥門冬去心

茯苓各三兩 麝香 雞舌香各二兩 石膏八兩碎綿裹

右十二味切以水六升煑取二升二合分四服相去六七里晚再服如覺眼明心悟若強人作三服此謂救死已試大驗若嘔逆不下食水漿即吐出者加半夏四兩洗 生薑二兩 橘皮一兩 加水一升半煑取二升三合忌五辛羊肉餳醋物唐侍中同出第一卷中

近効救脚氣衝心此方甚効

檳榔人六顆

右一味擣篩取童子小便半升微温和末強半頓服如一炊久不轉動更取半准前服令盡得通即好甚良

又療脚氣撞肩喘并脚氣衝心方

烏豆大斗二

右一味以水五大斗煮取酘有一斗半即休分向兩故瓷瓮中以兩脚各於一瓮中浸遣人從膝向下捋之捋百遍以來必差如無瓷瓮取故瓦瓮不滲者亦得極重不過更浸一度必差房給事用極效

又加減青木香丸方

崑崙青木香六分　大腹檳榔人七分　桂心四分

芍藥六分　枳實七分炙　大黃十分

右六味擣篩蜜和爲丸如梧子大以酒若飲任性服十五丸日二服稍稍加至大便微微通軟爲度忌生葱已前方療一切脚氣發上衝秘悶有所不快即服三兩日取宜通亦療卒心痛腰腎間冷膿水服亦佳吳昇方

又療脚氣上衝心狂亂悶者方

赤茯苓十二分 漢防巳八兩 芍藥十分 檳榔人十二分

甘草八分炙 郁李人十分 枳實八分炙 冬著牛膝十二分

春著大黃十四分

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹清酒服十五丸日再服漸加至二十丸以微通洩爲度利多減丸冬則去大黃加牛膝若體中虛弱去大黃加牛膝服亦得其藥皆須州土上好者惡藥服無益忌海藻菘菜酢物生冷油膩雜肉熱麪新炊飯及陳臭難消之物一切勿食

又療脚氣衝心肺氣氣急及水氣卧不得立驗方

曹州葶藶子四分好者紙上熬令紫色別擣如膏紙裹兩瓦子合淋脚下壓去油

杏人四分去尖皮兩人切碎紙上熬令黃擣如膏 甘草四分炙 海蛤四分別研如麪

郁李人四分去皮小如麻子大別擣 漢防巳五分 吴茱萸二分

檳榔人六分 大黃七分

右九味擣篩爲散合研令調和取蒸餅中棗膏二分去皮攪和白蜜少許更於臼中擣一千二百杵方止空腹一服十五丸如梧子漸漸加至下洩爲度服良久待丸散後可食忌海藻菘菜

又准前狀常服方

白蒺蔾子（取一大升韲如初諫去角簸去浮怯者熬） 五味子（八分） 牛膝（八分）
杏人（一小升去皮尖雙人切碎熬黃白色別擣如泥然可入和散） 枳實（八分炙） 甘草（五分擘破炙）
人參（八分不用亦得） 車前子（二兩） 桑根白皮（一兩） 通草（一兩）

右十味擣篩蜜和丸如梧子空腹一服十五丸漸漸加至二十五丸日再服亦得酒飲任情服良久待散可食忌海藻菘菜牛肉熱麪潘玢待御襄城録留

嶺南瘴氣脚氣酒湯散方一十三首

千金夫脚氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺

或兩脛腫滿行起屈弱或上入少腹不仁或時冷時熱小便祕澀喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若先覺此證先與犀角旋復花湯方

犀角（二兩屑）　旋復花（二兩）　橘皮（三兩）　茯苓（二兩）
大棗（二十枚擘）　香豉（一升綿裹）　紫蘇莖（一握）　生薑（三兩）

右八味切以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服之以氣下小便利爲度如其不下服後大犀角湯忌醋物

備急同（崔氏名小犀角湯）

又大犀角湯方

犀角（二兩屑）　旋復花（二兩）　白朮（二兩）　桂心（二兩）
防己（二兩）　黃芩（二兩）　生薑（三兩）　香豉（一升綿裹）
橘皮（三兩）　茯苓（三兩）　前胡（四兩）　桑根白皮（四兩）
紫蘇莖（一握）　大棗（十枚擘）

右十四味切以水九升煑取二升七合分三服相去十里久取下氣爲度若得氣下小便利脚腫即消能食若服湯訖不下氣急不定仍服後湯忌桃李雀肉生葱醋物以上二方並出崔氏文仲同

又方

甘草炙二兩 犀角二兩屑 防風二兩 桂心三兩

杏人二兩去尖皮兩人碎 獨活二兩 防巳二兩 石膏四兩碎綿裹

芎藭二兩 麻黄三兩去節 生薑三兩 白朮二兩

當歸二兩 羚羊角二兩屑 黄芩一兩

右十五味切以水二斗先煑麻黄取八升汁下藥煎取三升分三服相去十里久三服訖覆取汗五日後更服一劑取汗同前忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

又療脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

取蜱麻葉切擣蒸薄裹之日二三易即消蜱麻子似牛蜱蟲故名蜱麻也若冬月無蜱麻取蒴藋根擣碎和酒糟三分根一分合蒸熟及熱封裹腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺

又若腫已入髀至少腹脹小便澀少者方

取烏特牛尿一升一服日再服取消乃止翼方云羸瘦者二分尿一分牛乳合煑浮結乃服之

又若腫已消仍有此候者急服此湯方

麻黃二兩去節　半夏一兩洗　生薑五兩　射干二兩

獨活三兩　犀角一兩屑　羚羊角一兩屑　青木香一兩

橘皮一兩　杏人一兩去尖皮雙人碎　人參二兩　升麻一兩

吴茱萸一升　茯苓二兩　防已二兩　前胡二兩

枳實二兩炙

右十七味　水九升煑取四升分五服相去二十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門冬一升去心去吴茱萸若心下堅加鼈甲一兩炙忌羊肉醋物餳莧菜並出第七卷中以上三方並出蘇長史

又大金牙酒療瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者少腹不仁名曰脚氣無所不療方

金牙一斤　側子三兩炮　附子三兩炮　天雄三兩炮
人參二兩　蓯蓉三兩　茯苓二兩　獨活半斤
當歸三兩　白朮三兩　防風三兩　黃耆三兩
署預三兩　細辛三兩　桂心三兩　茵芋二兩
石南三兩　芎藭三兩　地骨皮三兩　五加皮三兩
磁石十兩　丹參五兩　杜仲三兩　萆薢三兩

牛膝五兩　狗脊三兩　萎蕤三兩　薏苡人一升
白芷三兩　麥門冬一升　生石斛八兩　厚朴三兩炙
枳實三兩　桔梗三兩　生地黃切三升　蒴藋四兩
黃芩三兩　遠志三兩去心　荊子三兩
右三十九味切以酒八斗漬七日溫服一合日四五夜一石藥細研如粉別絹袋盛共藥同漬藥力和善主療極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須將服之無不療者服者一依方合之不得輒信人大言浪有加減也忌猪肉冷水生葱生菜桃李雀肉蕪荑等並出第七卷中
又小金牙散療南方瘴癘疫氣腳弱風邪鬼注方
金牙五分　牛黃一分　天雄二分　萆薢二分
黃芩二分　麝香二分　蜀椒二分汗　由跋一分
雄黃二分　朱砂二分　烏頭二分　細辛三分

萎蕤三分　桂心二分　莽草二分　犀角三分

乾薑三分　蜈蚣一枚長六十者炙　黃連四分

右十九味擣篩合牛黃麝香擣三千杵溫酒服錢五匕日三夜二以知爲度絳囊盛帶男左女右一方寸匕省病問孝不避夜行塗鼻人中晨昏霧露亦塗之忌猪肉冷水生血物生菜等出第十二卷中

延年療得嶺南瘴氣熱煩短氣心悶氣欲絶方

香豉一升綿裹　梔子十四枚擘　升麻二兩

右三味切以水四升煮取一升半分爲三服即定也

又嶺南瘴氣面脚腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶欬嗽攤緩頑痺方

大麻人一兩綿裹　升麻一兩　射干一兩　昌蒲一兩

甘草一兩炙　麻黃一兩去節　大黃一兩別浸　豉三合綿裹

芒消半兩

右九味切以水六升煮取二升去滓乃內芒消分三服微利一二行解毒熱忌羊肉餳海藻菘菜並出第十九卷中

蘇唐豉酒若能常飲此酒極利腰脚嶺南常服此酒必佳及卑濕處亦惟此又恐有脚氣似著即宜服之方

香豉三升 美酒香者一斗

右二味先取香豉三升三蒸三暴乾內一斗酒中漬三宿便可飲隨人多少用滓薄脚良

又方

大豆新者一斗九蒸九暴

右一味以美酒三斗漬三宿便可隨性多少飲盡復作常服甚佳

又方

香豉三升 犀角八兩末之

右二味其豉如前不能九蒸九暴三蒸三暴亦得用一生絹袋貯用好美酒九升漬之五日許其犀角末散著袋外每服常攪令犀角味入酒中服三合量性增減日三服其酒夏月勿作多恐壞不奈又可用此方豉三合橘皮生薑葱細切任意調和先熬油令香次下諸物熬遣熟以綿裹内罌中著酒任意性飲之並出上卷中

外臺秘要方卷第十八

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘

外臺祕要方

十九

脚氣下

外臺祕要方卷第十九 脚氣下一十六

朝散大夫守光禄卿直祕閣

脚氣腫滿方二十九首

病源此由風濕毒氣搏於腎經腎主水今爲邪所搏則腎氣不能宣通水液水液不傳於小腸致水氣擁溢腑藏浸漬皮膚故腫滿也出第十三卷中千金翼温腎湯主腰脊膝脚浮腫不隨方

茯苓 乾薑 澤瀉各二兩 桂心三兩

右四味切以水六升煑取二升分爲三服忌酢物生葱

又療脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

烏牛尿一服一升日二服腫消止羸瘦者二分尿一

分牛乳合煮乳結乃服之

又方

生猪肝一具細切以淡蒜虀食之令盡若不盡者分再食之並出第十六卷中

崔氏療脚氣遍身腫方

大豆三大升以水一斗煮取五升去豆　桑根白皮一握切　檳榔二七枚碎　茯苓二兩切

右四味將三物以前豆汁浸經宿煮取二升絞去滓添酒二合内藥中隨多少服之或不利即剩服利多量減服之救急同忌酢物

又療遍身腫小便澀者用麻豆方主之療脚腫氣

烏豆一斗水四斗煮取一斗半去豆　桑根白皮五升切　大麻子二升熬研碎

右三味以豆汁内藥煎取六升一服一升日二服三日令盡

又方

烏豆五升　桑根白皮切四升二物以水二斗煑取一斗半去滓

大麻子人一升熬　橘皮二兩　蜀升麻二兩　杏人二兩去皮尖拍

猪苓二兩　丹參三兩　生薑二兩切

右九味切將七物內前桑皮豆汁中煑取四升朝一服相去如三食久藥消進食食消又更進二服此二方並唐尚書送

又療脚氣及腰腎膀胱宿水及痰飲桃花散方

收桃花陰乾量取一大升但隨虛滿不須按捺擣爲散紗羅下之溫清酒和一服令盡通利爲度空腹服之須臾當轉可六七行但宿食不消化等物揔瀉盡若中間覺飢虛進少許軟飯及糜粥無在極安穩不似轉藥虛人廢朝謁但覺腰脚輕快使人勇躍食味倍佳脚先腫者一宿頓消如囊中貯物傾却相似

又無毒易將息唯忌胡荽豬肉三月內腹虛大都消息愼生冷酸滑五辛酒麪及粘食肥膩四五日外諸食復常

又余見古方論云脚氣但腫不悶經服利藥法令人渴但腫縱不服利藥亦遣人渴宜利方

取大麻子熬令香和水研取一大升別以三大升水煑一大升赤小豆取一升汁即內麻汁更煎三五沸渴即飲之冷熱任取安穩飢時噉豆亦佳而利小便止渴消腫大良穀葉及桑白皮熬炙爲飲飲之亦良腫盛力弱不堪大藥者取牛乳一小升烏牛尿一小升無烏牛尿用黄者亦得和調分三服相去十里乆小便大利脚腫即頓消若一劑不除隔一二日更服氣力好者依前服羸弱者每日平旦唯一服六七合以差乃

止忌雜肉並出第六卷中

文仲大麻子酒方療脚氣上脚腫小腹痺

大麻子一升碎研清酒三升漬三宿溫服隨性兼療頭風補益此一方傳用大良備急同

又療脚氣滿小便少者方

檳榔四十枚切爲末　大豆三升　桑根白皮切二升

右三味以水二斗煑取六升分六服間粥亦得若冷脹加吴茱萸二升生薑二兩用亦良備急同

又療脚氣非冷非熱老人弱人脹滿者方

檳榔殼汁中或茶飲中豉汁中服檳榔人散方寸匕利甚快穩良備急同

又脚氣滿方

大豆一升以水四升煑之令熟去滓取桑根白皮切

一大升和豆汁重煎之厚薄如酪布絞去滓空腹日

再備急同

又徐王枳實散宜春秋服消腫利小便兼補療風虛冷脹不

能食方

枳實半斤炙 桂心一斤 茯苓 白朮各五兩

右四味爲散酒服方寸匕日三服加至二匕忌生葱酢物桃

李雀肉等備急同

又手脚酸痛兼微腫方

烏麻五升微熬碎之

右一味以酒一升漬一宿隨多少飲之盡更作大佳備急同

又若身腫氣攻心者方

生猪肉去脂以漿水洗於兩板中壓去汁細切作膾

蒜虀啖之日二頓下氣除風此方外國法備急同

又捋脚方

擣烏麻碎水煑漬捋大驗

又方

水煑杉木浸捋脚去腫滿大驗備急同

又脚洪腫方

取小豆一升和穀楮心一握熟煑喫三二升即差如湯沃雪良此二方經用効備急同並出第九卷中

救急療風水毒氣遍身腫方

穀楮白皮（三兩） 橘皮（一兩） 桑根白皮（五兩東引者） 紫蘇 生薑（各四兩） 大豆（二小升）

右六味切以水九升煑取一大升絞去滓分爲四服其藥並須煖不過三劑必當差百日來唯禁大酢出第七卷中

必効主脚氣數發通身滿妨氣急者方

取大麻子一升碎以小便二升煑取一升去滓頓服之

蘇唐徐同出第三卷中

蘇恭療下焦冷腫滿胷塞吐不下食者兼去温毒方

防巳　芍藥各二兩　枳實炙　獨活

防風　桂心各三兩　生薑八兩　葛根二兩

半夏洗一升

右九味切以水九升煑取三升分作四服相去八九里久中間食少粥一方無防巳枳實加附子二兩炮餘依本方忌羊肉餳生葱出上卷中

唐侍中療若脚氣攻心此方甚散腫氣極驗

大檳榔七枚合子碎　生薑各二兩　橘皮　吴茱萸

紫蘇　木瓜各一兩

右六味切以水三升煑取一升三合分再服忌如藥法

又葶藶丸療水氣及脚并虛腫方

葶藶子七分生用　牽牛子　澤漆葉　海藻洗去鹹炙

昆布炙如上　桑根白皮炙　甘遂熬　椒目

郁李人各三分去皮　桂心一分

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十五丸日再服加至二十

丸其藥用桑白皮切五合赤小豆一合通草一兩切以水二

升煮取一升下藥忌生葱出下卷中

蕭亮療脚氣腫盛因生瘡積年不差膿血長流依狀是風毒氣

爲冬閒服藥酒擁滯散在腠理宜服此方療風痺及舊癬疥百

病輕腰脚兼通大腸療肺中熱毒氣方

漏蘆　葳蕤　烏蛇脯炙各二十四分　苦參一斤擣去筋脉取粉

枳實十六分炙　秦艽九分　乾麥門冬十二分去心　漢防已八分

玄參二十二分　白术　黄耆各十二分　大黄二十四分

黃芩八分

右十三味擣篩蜜和丸如梧子一服四十九日再漸加至五十丸無問食前食後服酒浸藥下之

又方

牛蒡根切三大升 枳實八兩炙 磁毛石一斤綿裹 薏苡人一升

玄參六兩 烏蛇脯六兩炙 生地黃切二大升 烏豆小粒者一大升

右八味細切絹袋盛以好無灰酒一大斗浸經三日任性多少將以下前藥

又洗方

漏蘆切一大升 白斂五兩 槐白皮切 蒺藜子

五加根皮切各一大升 甘草三兩炙

右六味切以水二大斗煑取六升內芒消半大升痒即洗其湯微温如人體如瘡熱濕布搨訖合上忌海藻菘菜

又解風毒入腰脚暴悶痛飲子方

生犀角屑　蜀升麻　黃芩　乾藍

漢防已　枳實炙各二兩　漏蘆三兩炙　白斂一兩

梔子人十箇　甘草元闕分兩

右十味切以水八升煑取二升三合絞去滓分溫三服不問食前後忌海藻菘菜酢此方忌酢恐更有茯苓

又㬎方

取前方加大黃三兩梔子四十顆取軟白布翦作三二十箇孔內藥汁中浸濕傅瘡上乾即換

近効療脚氣兩脚腫滿暴破衝心衆醫不差方

小便三大升　黍穰三大斤

右二味相和煑三五沸將浸脚日三四度極神効其藥於水盆中盛下著火煖之如池瓮法周迴泥塞然後浸脚捋使汗

出立効

脚氣腫滿小便澀方三首

蘇恭防已湯主通身體滿小便澀上氣上下痰水不能食食則脹者方

桑白皮五兩切　大豆五升以水三斗并桑白皮煮取一斗去滓　防已

橘皮　赤茯苓　麻黃去節各三兩　生薑五兩

旋復花一兩　杏人八十枚去尖皮兩人碎　紫蘇莖葉切二兩

右十味切以前件藥汁煮取三升去滓分爲三服力弱者分爲五服相去六七里久微覆當大汗小便利腫氣消下冷多加茱萸四兩熱多加玄參四兩忌酢物

又腫滿小便少者湯方

檳榔三十枚合子碎　大豆三升　桑根白皮二升　生薑一斤合皮切

右四味切以水二斗煮取五升半去滓分爲六七服各相去十

里久再服小便當利腫即消瘦弱不能忍者時復以少粥止之

又紫蘇湯方

紫蘇莖一兩 甘草炙 橘皮各一兩半 生薑三兩

檳榔五枚碎合皮核擣細篩待湯成下別溫和服之一方皮擘核碎和煎快利

右五味切以水五升煑取二升分三服相去十里久若能長服之永〻氣消下忌海藻菘菜並出上卷中

脚氣上氣方五首

病源此由風濕毒氣初從脚上後轉入腹而乘於氣故上氣也出第十三卷中

張文仲硇砂牛膝三物散療脚氣上氣方

硇砂 牛膝 細辛各三兩

右藥爲散酒和服方寸匕日再經四五服即効此方勑賜慕容寶節將軍服者去神効蘇恭脚氣方云是婆羅門法備急

必効同

又脚氣上氣入腹腫方

野椒根（徐上皮細剉一升）

右一味以酒二升投安瓶中泥頭煻火燒得一沸然後溫服一盞甚効唯忌冷肥物其餘不禁並出第九卷中

蘇恭脚氣散主脚弱上氣痺滿不能食常服方

牛膝　硐砂　細辛　丹參

白朮　郁李人（各三兩去皮）

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日二服主脹腫下氣春秋冬三月時得服夏熱不可服春秋冬消腫利小便兼補療風虛冷脹不能食忌桃李雀肉生菜出上卷中

唐療上氣檳榔湯方

檳榔（二七枚碎）　杏人（四七枚去皮尖）

右二味以小便一大升煮取半升分爲二服相去五六里許此方甚下氣一日一服之佳如腹中欲須利檳榔并子搥碎如前煮取汁服之即快利也

又風引湯療痺滿上氣遍身服膝疼并去風濕痛方

大豆三升　附子三兩炮　枳實炙　澤瀉

橘皮各四兩　甘草炙　茯苓　防風各二兩

右八味切以水二斗酒二升煮大豆取一斗去滓内藥煮取三升分五服三劑腫消去大豆澤瀉更服三劑差忌豬肉冷水海藻菘菜酢物並出上卷中

脚氣心腹脹急方四首

病源此由風濕毒氣從脚上入於内與藏氣相搏結聚不散故心腹脹急也出第十三卷中

蘇恭諸脚氣定時候間滿腹脹不能食者四時俱得服下氣

消脹方

昆布八兩 射干四兩 茯苓 乾薑各一兩

羚羊角屑 橘皮各三分 杏人五分熬去皮尖兩人 蓽撥

吴茱萸 大黃各六分大小便澀者著大黃無不須用

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服十五丸利多服七丸以意消息不能食者加白朮六分麴末十分氣發服巳前丸得定如不定作檳榔皮湯壓之忌酢物桃李雀肉等

又方

檳榔七枚碎 生薑三兩切 橘皮二兩 杏人三十枚去皮尖

右四味切以水四升煑取一升五合分二服相去七八里久或作半劑一服亦得氣脹發則服之差止

又若覺吟氣攻喉方

當含吴茱萸三五粒即氣散

又脚氣夏盛秋歇毒氣既謝風緩猶在若諸病皆退但苦食腹脹不安爲氣在咽喉吐不出嚥不入心悶痰滿食已吐酢水者宜此昆布丸若先服諸藥及湯酒等兼服之不相違忤昆布丸方一云吳茱萸丸

吳茱萸　蓽撥　茯苓　白朮

麴　葶藶熬　昆布各四兩洗　杏人去皮尖熬

枳實炙　大黃　乾薑各三兩　旋復花二兩半

橘皮三兩半

右十三味擣篩蜜和爲丸如梧子飲服十丸一本云二十丸日二服利多減之不利加之常令微利覺病退則止發便服之不可常服令人瘦六七日半合之或三分減一分不爾酸敗一本有半夏六兩以湯洗熬之射干三兩又一本無旋復花乾薑大黃杏人橘皮忌羊肉餳桃李雀肉酢物並出上

脚弱寒熱湯酒方一十首

千金甘草湯療脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

甘草一兩炙　人參一兩　半夏一升洗　桂心三兩
小麥八合完用　大棗二十枚擘　生薑八兩　吳茱萸二升
蜀椒三兩出汗

右九味切以水一斗三升煮麥取一斗去麥内諸藥煮取四升一服六合作六服忌海藻菘菜羊肉餳生葱

又若寒熱日再三發可服此常山甘草湯方

常山三兩　甘草一兩半

右二味切以水四升煮取一升半分三服相去五里久進一服

忌海藻菘菜生葱生菜

又白朮膏酒療脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗大升大斗仍須棟擇擣取汁三斗煎取半

濕荊二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭二寸火燒取瀝三斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭一寸燒取瀝三斗煎取半

生地黃五大斤大秤麤大者擣取汁三斗煎取半　生五加根三十斤大秤淨洗訖剉於大釜內以水四石煎之去滓清澄取汁七斗以銅器中盛大釜內水上煎之取汁三斗五升其煎諸藥法一準五加法

右件白朮等五種藥摠計並訖得汁九斗五升上糯米一石五斗上小麥麴八斤暴乾末之以藥汁六斗浸麴五日待麴起第一淨淘米七斗令得三十遍以上下米置淨席上以生布拭之然後炊之下饙以餘藥汁澆饙調強弱更蒸之待饙上痂生然下於席上調強弱冷熱如常釀法醞之蜜蓋頭三日後第二酘更淘米四升一如前法酘之三日後即加藥如左

桂心六兩　甘草六兩炙　白芷六兩　當歸六兩
芎藭六兩　麻黃六兩去節　乾薑一斤　五加皮一斤
細辛六兩　防風六兩　附子五兩炮　牛膝九兩

右十二味㕮咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還以餘汁澆饙重蒸待上㽁生下置席上調冷熱如常釀法和上件藥酘之三日外然甞甘苦得中訖密封頭二七日然押取清酒一服四合日再細細加以知爲度溫酒不得過熱慎生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉桃李雀肉生葱生菜海藻菘菜蕪荑等

又松葉酒療脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆療不得力服此一劑便能遠行不過一兩劑方

松葉六十斤

右一味㕮咀以水四石煑取四斗九升以釀五斗米如常法別煑松葉汁以漬米并饙飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉

得此酒力者甚衆神妙並出第七卷中

崔氏療脚弱獨活湯方

獨活三兩　生石斛三兩　白术一兩　防風一兩半

茯苓四兩　白前一兩　羚羊角二兩屑　芎藭二兩

桑根白皮二兩　黄芩三兩　附子一兩炮　生薑三兩

桂心一兩　防已一兩

右十四味切以水九升煮取二升五合去滓分三服相去十里久服隔四日一劑宜服兩劑佳慎生冷酢滑猪魚蒜桃李雀肉生葱蘇恭同出第六卷中

備急療脚氣屈弱若田舍貧家無藥者可釀菝葜及松節酒皆善方

菝葜一斛淨洗剉之以水三斛煑取九斗以漬麴又以水二斛煑滓取一斛以漬飯釀之如酒法熟沛取

飲隨多少若用松節及葉亦准此法其汁不壓也患
脚氣屈弱積年不能行要脊攣痹及腹内堅結者
服之不過三五劑皆平復如常釀神驗肘後文仲同
又金牙酒最爲療脚氣屈弱之要今載之方如左
金牙　細辛　茵芋肘後作莽草　乾薑
乾地黄　防風　附子去皮　地膚子
蒴藋　升麻各四兩　人參二兩　獨活一斤
牛膝五兩　石斛五兩
右十四味切之以酒四斗漬之六七日服二三合稍加之亦
療口不能語脚屈至良又側子酒亦驗肘後同忌猪肉冷水
生菜蕪荑千金無升麻人參石斛牛膝茵芋乾薑有蜀椒莽草止十味云冷加乾薑
又陶効驗方云金牙酒療脚弱風冷痹曳又令人肥健勝舊
百倍起三十年躃曳不能行口不能語者昔趙寅陽躃曳二十

六年肉冷如鐵唯餘骨髓服此三十日便起郄太山家代傳秘之云一方用茵芋四兩初服無數任性令足使有酒色便止不得食肥肉生菜其方無牛膝石斛二物餘同文仲同並出第二卷中

蘇恭獨活酒十月以後腎脚屈弱兼頭眩氣滿服此方

獨活　生薑　石斛各六兩　牛膝
丹參　萆薢　側子炮　茯苓各四兩
防風　薏苡人　山茱萸　桂心
白朮　天雄炮　芎藭　秦艽
當歸　人參各三兩　甘菊花二兩　生地黃八兩

右二十味切絹袋貯以酒二斗五升漬四日溫服三四合日二服忌食桃李雀肉青魚鮓猪肉冷水蕪荑生葱云頭風患冷者加椒二兩汗出第一卷中

脚氣痺弱方六首

病源此由血氣虛弱受風寒濕毒氣與血并行於膚腠邪氣盛正氣少故血氣澀澀則痺虛則弱故令痺弱也出第十三卷中

肘後療脚氣之病先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺或兩脛小滿或行起忽屈弱或少腹不仁或時冷時熱皆其候也不即療轉上入腹便發氣上則殺人療之多用湯酒摩膏藥種數既多不但五三劑今止取單行效用方

急先取好豆豉一斗三蒸三暴乾以好酒三斗漬三宿便可飲隨人多少欲盡預作若不及待漬便以酒煑豉飲之以滓薄脚其勢得小退乃更營諸酒及膏湯灸之文仲備急同

又獨活酒方

獨活五兩切　附子五兩生用去皮破

右二味以酒一斗漬三宿服從一合始以微痺爲度文仲備

急同忌猪肉冷水

又方

好硫黄三兩末之　牛乳五升

右二味以水五升先煑乳水至五升乃内硫黄煎取三升一

服三合亦可直以乳煎硫黄不用水也卒無牛乳羊乳亦善

千金翼云一服一合不知至三合

又方

先煎牛乳三升令減半以五合服硫黄末一兩服畢

厚覆取汗勿令得風中間更一服至暮又一服若已

得汗不更服但好消息將護之若未差愈後數日中

亦可更作若長將亦可煎爲丸北人服此療脚多效

但須極好硫黄取預備之並出第一卷中

千金松脂散主一切風及大風脚弱風痺方薰陸法亦同

取松脂三十斤以椶皮袋盛繫頭鐵鐺底布竹木置袋於上石押之下水於鐺中令滿煑之膏浮出得盡以後量更二十沸接取置於冷水中易袋洗鐺更煑如此九遍藥成擣篩爲散以麤羅下之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知爲度如覺熱即減不減令人大小便祕澀宜食葱羹仍自不通宜服生地黄汁微取泄利也除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分蜜和爲丸但食淡麪餺飥日兩度一食一小椀勿多食也作餺飥法硬和麪熟挼煑五十沸漉出冷水淘更置湯中煑十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後即覺有驗兩脚如似水流下是効如恐祕澀和一斤松

脂茯苓與棗栗許大蘇即不澀服經一百日後脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服之二年增壽二年服之乃至十年增壽十年出第七卷中

蘇恭煮散療脚氣經春夏及秋脚弱或腫氣時上衝心身體痺悶者方

獨活　茯苓　牛膝　漢防已

白朮　黃耆　麻黃去節　柴胡各六兩

當歸　防風　橘皮　桂心

人參各四兩　附子三兩生用　磁石十六兩碎如豆　羚羊角三兩屑

生薑　杏人　半夏洗　吳茱萸

檳榔碎　丹參八兩

右二十二味諸不著分兩自隨時加減餘二十物切如豆分作三十貼貼著生薑一兩合皮碎切杏人十四枚去皮尖碎

以水二升煑取七合去滓頓服之日一服或二日一服冷多加吳茱萸半兩熱多加麥門冬半兩大熱以竹瀝一升代水嘔逆食不下加半夏一兩毒悶加青木香二分以意消息之患人大便難加大黃半兩脹滿食不消加檳榔三二枚所加藥病差即止不常服忌豬肉冷水羊肉餳生葱桃李雀肉酢物出第一卷中

又療諸脚氣弱未至大發尋常煑散方

獨活 漢防己 麻黃去節 茯苓

丹參 牛膝各六兩 磁石十六兩碎 黃耆

防風 人參 犀角各六兩 升麻

青木香 桂心各四兩 石膏十四兩碎 吳茱萸八兩

生薑 半夏洗 檳榔大者 杏人

大黃切

右二十一味㕮十六物擣切如豆分作三十分分分和爲一服服以檳榔三枚生薑一兩各合皮切杏人十四枚去皮尖以水二升三合煮取七合去滓日晚或夜中服之日一服若氣盛時日二服可一服或二日一服或三日一服若心下滿嘔逆者加半夏一兩嘔定止若大便澀者可去磁石加大黃一兩大便利即停忌生葱醋物羊肉餳

脚氣痹攣方二首

病源脚氣之病有挾風毒者則風毒搏於筋筋爲攣風濕乘於血則痹故令痹攣也出第十三卷中

千金石斛酒療風虛氣滿脚疼冷痹攣弱不能行方

石斛五兩　丹參五兩　防風二兩　側子四兩

桂心三兩　乾薑三兩　羌活三兩　秦艽四兩

芎藭三兩　杜仲四兩　薏苡人一升碎　五加根皮五兩

山茱萸四兩　橘皮三兩　椒三兩　黄耆三兩
白前三兩　茵芋三兩　當歸三兩　牛膝四兩
鍾乳八兩

右二十一味切將鍾乳擣碎別絹袋盛繫於大藥袋內以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加之以知爲度忌猪肉冷水生葱出第七卷中

千金翼防已湯主風濕四肢疼痺攣急浮腫方

木防已三兩　茯苓四兩　芎藭三兩　桑根白皮切二升
桂心三兩　甘草六分炙　大棗十二枚擘　芍藥二兩
麻黄三兩去節

右九味以水一斗二升煑麻黄減一升內藥煑取三升分三服服濈汗出令遍身以粉粉之慎風冷出第十六卷中

風偏枯方二首　比風偏枯以下五門並兼療脚氣風毒等病相類

病源風偏枯者由血氣偏虛則腠理開受於風濕風濕客於半身在分腠之間使血氣凝澀不能潤養久不差生氣去邪獨留則成偏枯其狀半身不隨肌肉偏枯小而痛言不變智不亂是也邪初在分腠之間宜温臥取汗益其不足損其有餘乃可復也診其胃脈沈大心脈小牢急皆為偏枯男子則發左女子則發右若不瘖舌轉者可療三十日起其年未滿二十者三歲死又左手尺中神門以後脈足太陽經也虛者則病惡風偏枯此由愁思所致憂思所為其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云正倚壁不息行氣從頭至足止愈疽疝大風偏枯諸風痹

又云仰兩足指五息止引腰背痹偏枯令人耳聞聲常行眼耳諸根無有障礙

又云正倚壁不息行氣從口趣令氣至頭始止療疽痹大風偏枯

又云一足蹐地足不動一足向側相轉身欹勢并手盡急廻左右迭二七去脊風冷偏枯不通潤出第一卷中

深師大八風湯療毒風濕痺𨇤曳或手脚不隨身體偏枯或毒弱不任或風經五藏恍恍惚惚或多語喜忘有時恐怖或肢節疼痠頭眩煩悶或腰脊強直不得俛仰又加腹滿食少時氣欬或始遇病時卒倒悶絶即不能語便失瘖半身或舉體不隨不仁沉重皆由體虚恃少不避風冷所致二十三種大八風湯方

當歸二兩半 升麻一兩半 烏頭二兩炮 黃芩二兩

芍藥二兩 遠志二兩去心 獨活二兩 五味子一兩半

防風二兩 芎藭二兩 麻黃二兩去節 乾薑二兩半

秦艽二兩 桂心二兩 大豆二升 石斛二兩

甘草二兩炙 杏人四十枚去尖皮熬碎 人參二兩 茯苓二兩

黃耆二兩 紫菀二兩 石膏二兩碎綿裹

右藥㕮咀以水一斗三升酒
人分五六服忌海藻菘菜猪
千金翼同
古今録驗療三十年風躃偏枯不能行香豉散方
生地黃（三十斤） 香豉（三升綿裹）
右二味洗地黃㕮咀先蒸之半日暴燥更合豉蒸半日暴令
燥擣下篩以酒服三方寸匕日三亦可水服益精爽氣服數
月有神効出第十四卷中
風四肢拘攣不得屈伸方五首
病源此由體虛腠理開風邪在於筋故也春遇痺爲筋痺則
筋屈邪客關機則使筋攣邪客於足太陽之絡令人肩背拘
急也足厥陰肝之經也肝通主諸筋王在春其經絡虛春遇
風邪則傷於筋使四肢拘攣不得屈伸診其脉急細如弦者

筋急足攣也若筋屈不已又遇於邪則移變入肝其狀夜卧則驚小便數也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云手前後遞互交拓極勢三七手掌向下低頭面心氣向下至涌泉倉門却努一時取勢散氣放縱身體平頭動膊前後欹側柔轉二七去膊并冷血筋急漸漸如消

又云兩手抱左膝生腰鼻內氣七息展右足除難屈伸拜起脛中痛萎

又云以兩手抱左膝著膺除下重難屈伸

又云踞坐伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自極七息展右足著外除難屈伸拜起脛中疼痺

又云立身上下正直一手上拓抑手如似推物勢一手向下如捺物極勢上下來去換易四七去膊內風兩膊并內冷血兩腋

筋脉攣急

又云踞伸左脚兩手抱右膝生胷以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起脛中疼痹出第一卷中

千金療中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食張仲景三黃湯方

麻黃五分去節　獨活四分　細辛二分　黃耆二分

黃芩三分

右五味切以水五升煑取二升分二服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃二分腹滿加枳實一分炙氣逆加人參三分悸加牡蠣三分熬渴加栝樓根三分先有寒加八角附子一枚炮此方神祕不傳張文仲備急深師及翼古今錄驗同忌生菜

又麻子湯療大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞強服之不虛人又主精神蒙昧方

秋麻子(三升淨擇水漬一宿) 防風(二兩) 麻黃(二兩去節)
生薑(二兩) 橘皮 桂心(二兩) 竹葉(一握洗)
石膏(二兩碎綿裹) 細辛(二兩) 葱白(一握) 香豉(一合)

右十一味切先以水二斗半煮麻子令極熟漉却滓取九升別煮麻黃數沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓空腹分三服服訖當微汗汗出以粉塗身然極重風者不過三劑乃至五劑以來無不差輕者不過兩劑差有人患大風賊風刺風加獨活三兩比小續命湯準當六七劑忌生葱生菜(一方無細辛)

又白斂薏苡湯療風拘攣不可屈伸方

白斂(一升切) 薏苡人(一升) 芍藥(一升切) 酸棗人(一升)
乾薑(一升切) 附子(三枚炮破) 甘草(一升炙切) 桂心(一升切)
牛膝(一升切)

右九味淳酒二斗漬一宿微火煎三沸服一升日三扶杖起

起行不耐酒服五合忌生葱猪肉海藻菘菜出第八卷中古今録驗同（翼方有車前子）

崔氏療暴得風四肢攣縮枯細不能行動用大豆蒸貧人不能辦藥者可依此方

取大豆三大升淨揀擇淘之漉出蒸之待氣溜下甑傾二大升醶醋甑中和攪令遍於密屋内地上設鋪席一帛帕傾豆著帕上仍以五六重綿衣覆豆令病人於豆上卧以被覆之若豆冷漸漸却綿衣令一人於被内引挽攣急處却綿衣盡豆冷收取更著甑中依前法蒸熱下甑復著升半酢和豆一準前法用鋪設每一收豆作二升判瀝湯與病人飲飢即任食日再度夜一度如此經三日三夜即休忌風出第三卷中

古今録驗西州續命湯療中風入藏及四肢拘急不隨緩急風方

麻黃三兩去節　石膏二兩碎綿裹　芎藭一兩　生薑三兩
黃芩一兩　甘草一兩炙　芍藥一兩　桂心一兩
郁李人三兩去皮　防風一兩　杏人四十枚去皮尖雙人　當歸一兩
右十二味切以水九升煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分四服初服取汗米粉於衣裏粉之忌海藻菘菜生葱出第四卷中

風不仁方三首

病源風不仁者由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也診其寸口脉緩則皮膚不仁不仁脉虛數者生牢急疾者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云赤松子曰偃卧展兩脛兩手足外踵指相向以鼻內氣自極七息除死肌不仁足寒
又云展左足右足上除不仁脛寒出第一卷中

深師茵芋酒療新久風體不仁屈曳或拘急腫或枯焦皆主之

施連所增損方甚良

茵芋一兩 狗脊二兩 躑躅花二兩生用 烏頭二兩生用

附子二兩生用 天雄一兩生用

右六味切以酒一斗絹囊盛藥漬之冬八九日夏五六日初服半合不知增之以知爲度忌猪肉冷水千金翼同

又八風湯療五緩六急不隨身體不仁下重腹中雷鳴失小便方

防風二兩 芍藥二兩 茯苓二兩 黃耆三兩

獨活四兩 當歸三兩 人參三兩 乾薑三兩

甘草一兩炙 大豆二升 附子大者一枚炮

右十一味切以水一斗清酒二升合煑取三升分三服忌海藻菘菜猪肉冷水酢物

又犀角丸療百病鬼注惡風入皮膚淫淫液液流移無有常

尅四肢不仁牽引要背腹脹滿心痛逆胷滿不得飲食吸吸短氣寒熱羸瘦夜喜惡夢與鬼神交通欬嗽膿血皆療之方

犀角屑二分　獺肝炙三分　雄黃研四分　桂心二分

丹沙研四分　貝齒炙研十分　巴豆熬去心三十枚　蜈蚣去頭足炙一枚

真珠研四分　射罔一分　麝香研一分　羚羊角屑二分

牛黃研二分　附子炮一分　鬼臼二分

右十五味擣下篩蜜和更擣五千杵平旦服如胡豆二丸酒飲並得日三忌猪肉冷水生葱生血物蘆笋並出第九卷中

風濕痺方四首

病源風濕痺病之狀或皮膚頑厚或肌肉酸疼風寒濕三氣雜至合而成痺其風濕氣多而寒氣少者爲風濕痺也由血氣虛則受風濕而成此病久不差入於絡經搏於陽經亦變令身體手足不隨其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生

方導引法云任縱臂不息十二通愈足濕痺不任行要脊痛又正卧疊兩手著背下伸兩脚不息十二通愈足濕痺不任行要脊痛痺有偏患者患左壓右足患右壓左足久行手亦如足周行滿十方止

又云以手摩腹從足至頭正卧伸臂導引以手持引足住任臂閉氣不息十二通以療痺濕不可任要脊痛出第一卷中

千金諸風痺方

桂心一兩　當歸一兩　茯苓一兩　防風一兩

甘草一兩炙　黃芩一兩　生薑五兩　秦艽二分

葛根二分　乾棗三十枚擘　杏人五十枚去皮尖兩人

右十一味切水酒各四升煮取三升分三服取汗忌海藻菘菜酢物生葱等

又療風痺遊走無定處名曰血痺大　主之方

萆薢四分　署預四分　牛膝四分　澤瀉四分

蠐螬三分熬　天雄三分炮　車前子三分　乾漆熬分

白朮三分　地膚子三分　山茱萸五分　狗脊三分

茵芋一分　乾地黃十分

右十四味擣篩蜜和丸酒服如梧子十丸日三服稍稍加之忌桃李雀肉豬肉冷水蕪荑等物

又白斂散療風痹腫筋急展轉易常處方

白斂二分　附子一分炮

右二味擣下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行爲候十日便覺忌豬肉冷水並出第八巻中

古今録驗六生散療急風痹身軀拘痛方

生昌蒲一斤切　生地黃一斤切　枸杞根一斤切　生商陸根一斤切

生烏頭半斤切　生薑二斤切

右六味以淳酒漬之一宿出暴乾復内酒中令酒盡暴令燥擣下篩以清酒一升服一錢匕日再服之忌猪羊肉冷水蕪荑餳出第十四卷中

風濕方九首

病源風濕者是風氣與濕氣共傷於人也風者八方之虛風濕者水濕之蒸氣若地下濕復少霜雪其山水氣蒸兼值暖猥退人腠理開便受風濕其狀令人懈惰精神昏憒若經久亦令四肢緩縱不隨入藏則瘖瘂口舌不收或脚痺弱變爲脚氣其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方眞誥云櫛頭理髮欲得多過通流血脉散風濕數易更櫛番用之出第一卷中

深師療風濕脉浮身重汗出惡風方

漢防已四兩　白朮三兩　蜀黃耆五分　甘草二兩炙

大棗（十二枚擘） 生薑（三兩）

右六味㕮咀以水六升煮取二升分爲二服服湯當坐被中欲解汗出如蟲行皮中忌桃李雀肉海藻菘菜千金同（此本仲景傷寒論方）

又四物附子湯療風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛白汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或一身悉腫方

附子（二枚炮八破） 桂心（四兩） 白朮（三兩） 甘草（二兩炙）

右藥㕮咀以水六升煮取三升去滓服一升日三當微汗煩者一服五合蔡公數用驗忌猪肉冷水生葱桃李雀肉海藻菘菜等（此本仲景傷寒論方）

又療風濕百節疼痛不可屈伸痛時汗出方

芍藥（四兩） 甘草（三兩炙） 芎藭（四兩） 附子（三兩炮四破）

右四味㕮咀以水五升煮取二升分再服相去十里頃忌猪

內海藻菘菜等

又療風濕身體疼痛惡風微腫湯方

桂心四兩 麻黃二兩去節 芍藥二兩 天門冬二兩去心

生薑三兩 杏人五十枚去皮尖兩人

右六味㕮咀以水一斗煑取三升一服一升日三忌鯉魚生葱海藻菘菜並出第九卷中

古今錄驗附子湯療風濕相薄骨節煩疼不得屈伸近之則痛白汗出短氣小便不得利惡風不欲去衣或一身流腫方

桂心三兩 白朮三兩 附子二枚炮八破 甘草二兩炙

右四味㕮咀以水六升煑取三升分三服微汗即止若汗出煩者稍服五合驃騎使吴諧以建元元年八月二十六日始覺如風至七日卒起便頓倒髀及手皆不隨通引腰背疼痛通身腫心多滿至九月四日服此湯一劑通身流汗即

從來所患悪愈本方不用生薑既有附子今加生薑三兩忌猪肉冷水桃李雀肉生葱海藻菘菜

又療風濕體疼惡風微腫天門冬湯方

天門冬三兩去心 葛根四兩 生薑三兩 桂心四兩

麻黄三兩去節 芍藥二兩 杏人五十枚去皮尖兩人 甘草二兩炙

右八味切以水一斗煑取三升分三服取汗忌海藻菘菜生葱鯉魚並出第十四卷中深師無芍藥名天門冬湯

又療頭風濕面如錣刺之狀身體有腫惡風汗出短氣不能飲食麻黄湯方

麻黄四兩 芎藭一兩 恭草一兩 當歸一兩

杏人三十枚去皮尖兩人

右五味切以水五升煑取二升去滓分三服日三糜粥將息佳

又辨中風偏枯風痱風懿風痺偏枯者半身偏不隨肌肉偏不

用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫臥取汗益其不足損其有餘乃可復也風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微知可療甚則不能言不可治也風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然舌強不能言病在藏腑先入陰後入陽治之先補於陰後寫於陽發其汗身轉軟者生汗不出身直者七日死風痺病不可已者足如履冰時如入湯腹中股脛淫濼煩心頭痛嘔眩時時汗出目眩悲恐短氣不樂不出三年死騎士息王恕毋年五十紗扇自扇汗出中風口不得語身緩不收積一月困篤張苗爲作七物獨活湯服五劑得愈又士度良毋年七十餘中風但苦口不得語積百餘日往來飲食如故苗又與合獨活湯四劑得愈乇物獨活湯方療脚弱及中風濕緩縱不隨 出胡洽

獨活五兩 葛根四兩 乾薑二兩 桂心四兩

半夏四兩洗 甘草二兩炙 防風三兩

右七味㕮咀以水一斗煮取三升每服一升日三得少微汗
出好忌羊肉餳海藻菘菜生葱
又療濕家始得病時可與薏苡麻黄湯方
薏苡半升 麻黄四兩去節 甘草二兩炙 杏人二兩去皮尖兩人碎
右四味㕮咀以水五升煮取二升分再服汗出即愈濕家煩疼
可以甘草麻黄湯發汗不差更合飲家加白朮四兩名白朮
麻黄湯忌海藻菘菜桃李雀肉等並出第十五卷中
此本仲景方分兩小異
許仁則療脚氣方三首
許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成脚氣飲氣即水氣
之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗脚濕氣不散亦成脚
氣亦有腎氣既虛諸事不節因居卑濕濕氣上衝亦成脚氣此
諸脚氣皆令人脚脛大脚趺腫重悶甚上衝心腹滿悶短氣中間

有乾濕二脚氣濕者脚腫乾者脚不腫漸覺枯燥皮膚甲錯須
細察之若先覺心腹脅肋刺痛背滿悶喫食之後此狀彌加
時時氣短手脚沉重骨髓疼多唱氣每食諸黏膩陳敗臭物
即諸狀轉劇此即飲氣下流而成脚氣有此候者自宜依前療
飲氣將成水氣細辛等八味湯葶藶子等十五味丸療之若先
無前狀但覺脚腫疼悶沉重有時緩弱乍衝心腹滿悶小腹下
不仁有時急痛宜依後吴茱萸等五味湯桑根白皮等十味
丸側子等十味酒細細服之吴茱萸湯方

吴茱萸二兩　生薑五兩　橘皮三兩　桂心二兩

大檳榔十枚合皮子碎

右藥切以水七升煑取二升半去滓分温三服服相去如人
行七八里久一服覺諸狀可欲重合服亦佳服湯後將息經
三四日即服後桑根白皮等十味丸忌生葱

又方

桑根白皮五兩 生薑屑六兩 蜀椒許 桂心

升麻四兩 五味子四兩本欠四味

右藥擣篩蜜和爲丸以飲下之初服十五丸日再服稍稍加至三十丸如梧子大覺熱食前服覺冷食後服之忌生葱蜀椒桂心元未見分兩

又至九月以後宜合側子等十味酒服之兼將下丸方

側子五兩 生薑八兩 桑根白皮八兩 桂心四兩

白朮八兩 五加白皮六兩 丹參六兩 續斷五兩

牛膝五兩 細辛四兩

右藥切絹袋盛用無灰酒五升浸五六日初服一雞子黃許日再服稍稍加之以知爲度必用前數法不覺可宜依舊脚氣方用之忌猪肉冷水桃李雀肉生葱生菜吴茱同並出下卷中

論陰陽表裏灸法三十七首

蘇恭云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可要依古方也患陰療陽病表救裏皆爲重虚實危殆之甚也若病從陰發起兩足大指内側上循脛内及膝裏頑痺不仁或腫先發於此者皆須隨病灸復留中都陰陵泉等諸穴灸者先從上始向下引其氣便各灸二十壯向後隔七日灸七壯取差止餘穴皆依此若病從陽發起兩小指外側向上循脛外從絶骨至風市頑痺不仁或腫起於此者須灸陽輔絶骨陽陵泉風市等諸穴灸數及上向下皆依前法若氣毒兼行表裏者乃可量其輕重隨灸膏摩之若上下遍發表裏各灸一二處以此通洩之其用藥内攻各量病投藥也逐徧若處常使灸瘡不差爲佳風氣都除乃隨瘡差差後瘢色赤者風毒盡青黒者猶有毒氣仍灸勿止待身體輕利然後可休矣又一本云常須灸三里絶骨勿令瘡差佳

灸脚氣穴名

陽陵泉二穴在膝外側骨下宛宛陷中是也

絕骨二穴在足外踝上骨絕頭陷中又云一夫是也

風市二穴平立垂手當中指頭髀兩筋間是也黃帝三部鍼灸經無風市二穴此處恐是環銚風市疑其別名未詳所出

崑崙二穴在足外踝後跟骨上陷中是也

陽輔二穴在絕骨前半寸少下是也徐云明堂無絕骨名有陽輔二穴在膝蓋下外側三寸傍廉骨當小指兩筋間是也黃帝三部鍼灸經丙卷陽輔二穴在足外踝上四寸輔骨前絕骨端前三分與此不同

上廉二穴在三里下三寸是也

條口二穴在上廉下二寸是也

下廉二穴在條口下一寸是也

太衝二穴在足大指本節後二寸是或云一寸半

犢鼻二穴在膝蓋上外角宛宛中是也一云膝下黃帝三部鍼灸經丙卷犢鼻二穴在膝臏下骭上俠解大筋中

膝目二穴在膝蓋下兩邊宛宛中是也黃帝三部鍼灸經無膝目二穴

曲泉二穴在膝內屈文頭是又云從三里上度一寸五分又橫向脛二寸當脉中是也黃帝三部鍼灸經丙卷曲泉二穴在膝內輔骨下太筋上小筋上陷者中屈膝而得之

陰陵泉二穴在膝下內側輔骨下宛宛中是蘇徐同

中都二穴在陰陵泉三陰交中間是蘇一名太陰陰穴黃帝三部鍼灸經中郄一名中都在內踝上七寸骱骨中央

三陰交二穴在內踝上二寸是蘇徐云名太陰也

復留二穴在內踝上二寸是蘇徐云名曰外命黃帝三部鍼灸經復留無外命之別名

少陽維二穴在內踝後一寸動筋中是徐同

太陰二穴在內踝上八寸骨下陷中是徐同

太陰蹻二穴在內踝下向宛宛中是徐同黃帝三部鍼灸經并銅人腧穴經

並無少陽維太陰太陰蹻三穴名委中二穴在膝後屈中央是徐蘇同承筋二穴在腨當中陷中是徐蘇同承山二穴在膝後下除八分內間陷中是徐蘇同涌泉二穴在脚心中是蘇徐同

右件穴並要不可拋能灸其穴最要者有三里絕骨承筋太衝崑崙涌泉有患者可灸又謹按明堂制當以立爲正取穴必須直立膝臏骨坐立便即移動不定故宜立取之其寸取病人中指上節爲一寸若取尺寸有長短取穴必不著又按秦承祖華佗等取穴並去三指四指爲准取三里穴四指指闊六分四六二十四只闊二寸四分取穴如何得著黃帝爲本諸說並不可信徐同

徐論患脚氣體皆春發夏甚秋輕冬歇大法春秋宜灸冬差可行夏都不可灸既瘡敗又不得覆風冷因入反更增痾冬時血凝又逆天理急不得已無藥物處可灸一二要穴不可遍身多灸脚氣病大論毒從下上亦有從上向下者或去灸上毒氣便上謬

矣比見毒氣攻處疼痛如刺隨病即灸火徹便瘥不拘上下凡毒氣所衝如賊欲出得穴即出豈在大門也風毒所攻亦復如是此皆經試萬不失一必不為悞耳蘇同

蘇恭云脚氣初發轉筋者灸承山承筋二穴噦逆者灸涌泉若從頭至連背痛寒熱如瘧及膂痛者灸委中頭項背痛隨身痛即灸不在正穴也

又云若脚氣盛發時自要脅以上並不得鍼灸當引風氣上則殺人氣歇以後有餘病者灸無妨唯冬月得灸春夏不可灸自風市以下固宜佳耳

又云若氣上擊心不退急灸手心三七炷氣即便退若未退即悶兼煮豉酒熱飲逐之即差不去即取烏特牛尿一大升煖服以利為止縱至三服五服彌佳

又若已灸脚而胸中氣猶不下滿悶者宜灸間使五十炷兩手

掌横文後一夫兩筋間是也
又若胷中氣散而心下有脉洪大跳其數向下分入兩髀股内
令人心急忪悸者宜以手按捻少腹下兩傍接髀大斜文中有
脉跳動便當文上灸跳三七炷即定灸畢皆須灸三里二十炷
以引其氣下也
又若心腹氣定而兩髀外連膝悶者宜灸膝眼七炷在膝頭骨下
相接處在筋之外陷中是若後更發復灸三炷
又凡人雖不患脚氣但若髀膝疼悶灸此無不應手即愈極爲要
穴然不可鍼亦不可多灸唯只灸七炷以下
又若脚十指痠疼悶漸入趺上者宜灸指頭正中甲肉際三炷即愈
又若大指或小指傍側疼悶覺内有脉如流水上入髀腹者宜隨
指傍處灸三炷即愈並出上卷中
唐論若手指本節間疼稍入臂者宜灸指間疼處七炷即定

又若心背氣滿已灸身歷諸穴及服湯藥而氣猶不可煩急欲死者宜灸兩足心下當中陷處各七炷氣即下此穴尤爲極要而不可數灸但極急乃灸七炷耳以前諸灸法並經用所試皆驗灸畢應時即愈故具錄記之凡灸不廢湯藥藥攻其內灸泄其外譬如開門驅賊賊則易出若閉戶逐之賊無出路當反害人耳

灸用火善惡補寫法一首

張仲景云四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑其分度淺薄灸之不欲過多須依經數也過謂餘病則宜依之若腳氣不得拘此例風毒灸之務欲多也依此經數則卒難愈疾小品論灸有八木火明堂論灸之補寫之法若能依之應有道理八木之火凡灸用松木火則難愈柏木火則瘡多汁橘木火則傷皮桑木火則肉枯棗木火則髓消竹木火則傷筋多壯則筋縱枳木火則陷脉漬榆木火則傷骨多壯則骨枯凡八木之火皆不可

用也火用陽燧之火其次用硈石之火天陰則用槐木之火陽燧
是以火珠向日下以艾於下承之便得火也硈石似玉堅以此石擊
膚鐵即火出仍以極爛榆木承之即得亦用艾取之此是匈奴取
火法今胡人猶爾灸有補寫者甲乙經云用灸補者無吹其火須
自滅也以灸寫者疾吹其火拊其艾須其火滅也此言以口炊艾
炷令疾滅即是寫也不吹聽自滅者即補也小品又云黄帝曰
灸不過三分是謂從穴此言作艾炷欲令根下闊三分也若減
此則不覆孔穴不中經脉火氣不行不能除病也若江南嶺南
寒氣既少當二分爲準燧小不得減一分半也嬰兒以意減之
凡灸瘡得膿增壞其病乃出瘡不壞則病不除矣甲乙經云灸
不發者灸故履底熨之三日即發也甚宜解此又近有蘇恭善醫
此疾馳名於上京顯譽於下邑撰脚氣方卷論方則信爲指南敘
灸亦未成膠柱乃云毒氣如賊出何必要在大門腹背手足皆須

灸也愚謂灸痛風毒所攻腹則引賊入室如何令賊出門特宜知之不可輕脱若手指疾悶灸無妨也出第一卷中

雜療脚氣方一十五首

千金防風湯療肢體虚風微經内發熱肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺悟南方支法存所用多得力温和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門南州人士常用亦療脚弱甚良方

防風三兩　麻黄三兩去節　秦艽三兩　獨活三兩

當歸三兩　遠志二兩去心　木防已二兩　甘草二兩炙

人參二兩　黄芩二兩　升麻二兩　芍藥二兩

石膏一兩碎　麝香二分　生薑二兩　半夏二兩洗

右十六味切以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當三兩行下其間相去如人行十里久更服有熱加

大黃二兩先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩去大黃忌海藻菘菜羊肉餳出第七卷中一方有白术

千金翼青丸主脚氣皮肉身體諸風方

烏頭一兩 附子三兩炮 麻黃四兩去節 加枳實四兩炙

右四味擣篩蜜和丸梧子酒服五丸日三忌猪肉冷水如生用烏頭附子服如麻子五丸出第十六卷中

必効白楊皮酒主脚氣偏廢及主一切風緩風手足拘攣並効方

取白楊東南面皮去地三尺以上去蒼皮勿令見風細切熬令黃赤色即止內不津器中以酒浸隨皮多少每令酒浸皮二三寸乃以泥封冬月二七日春夏一七日開飲晝三夜一隨性多少有酒氣爲度得眷口爲佳病可者飲至一石若重者乃至兩石以差爲度酒唯須不灰其白楊不得取丘塚者服每日一兩行

鴨唐利蘇恭文仲備急同出第三卷中

蘇恭療諸氣方

杏人一百二十枚熬令黃去尖皮 大棗六十枚去皮核 香豉三百粒熬令乾

右三味先擣豉次擣杏人次擣棗令極熟取如彈丸大含之細細咽之忌如藥法此方雖少深有効驗

又凡脚氣内須服藥攻擊外須膏摩火灸發洩等並是脚氣之要若有攣急及有不仁之處不問冬夏常用膏摩之治葛膏療江南風毒先從手脚上腫痺及上頸痺及面却入腹即殺人宜用此膏摩之方

治葛二兩 蛇銜二兩 犀角二兩屑 烏頭二兩

桔梗二兩 茵芋二兩 防風三兩 蜀椒二兩

乾薑二兩 巴豆三十枚又方云二兩去心皮 升麻二兩

細辛二兩 雄黃一兩半 鼈甲一兩炙

右十四味細切以酒四升漬藥一宿以不中水猪膏五斤以煎藥於微火上三上三下令藥色變黃勿令焦黑膏成絞去滓乃下之攪令調和以摩病上忌猪肉冷水生菜莧菜蘆筍等（一方有石南白芷爲十六味千金無菌芋細辛有莽草丹參躑躅花）

又療風痺手足疼弱鼠漏惡瘡毒所有腹內絞痛百病摩之皆愈方

莽草（三分） 牡丹皮（二兩） 蜀椒（四分） 藜蘆（三分）

芫花（二兩） 大黃（四分） 皂莢（二分） 附子（三兩）

右八味擣篩以苦酒三升漬一宿以不中水猪脂三斤微火上煎之三上三下令藥色黃膏成去滓以摩腫傳瘡有毒不可服及近孔要處合藥勿令婦人孝子雞犬見之其二膏療風毒最善然治葛膏救急勝於曲魚膏久摩不已令人肉漸枯細曲魚膏雖稍緩常用爲佳常以臘月合一劑用之

極効忌猪肉冷水胡荽

又治葛膏有巴豆摩多損皮肉用莽草膏方

莽草三兩　附子八兩生用去皮　丹參四兩　漢防巳三兩

芎藭四兩　椒三兩　吴茱萸四兩　白芷三兩

沈香半兩　零陵香半兩　雞舌香半兩　犀角二兩屑

當歸三兩　商陸根四兩　青木香半兩

右十五味切以酢漬一宿以好酥三大斤煎九上九下布絞去滓用摩頑痺并腫處好膏入肉亦無損傷服諸藥不相妨神効忌猪肉冷水

又治葛膏方

冶葛二兩　犀角二兩屑　漢防巳二兩　莽草二兩

烏頭五兩生用　吴茱萸五兩　椒三兩生用　丹參三兩

躑躅花一升　升麻三兩　乾薑二兩　附子五兩

白芷一升　當歸三兩　桔梗三兩

右十五味切酢漬以成煎猪肪七升煎五上五下去滓用之以酥代肪善忌猪肉冷水舊方無白芷防巳茱萸附子當歸有巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲

又神明膏方

附子十四枚小者三十枚炮　吴茱萸一升生用　蜀椒一升半

白芷一升　前胡一升切　芎藭一升切　白朮一升切

桂心三兩　當歸三兩　細辛二兩　漢防巳一升切風多去之腫者去細辛

右十一味切酢淹漬一宿以成煎猪肪五升煎五上五下去滓摩腫及不仁大試有驗有牛酥代猪脂大佳忌猪肉冷水生葱生菜桃李等

又脚氣風毒發不與人期攻心即死若居僻遠無藥物處致

斃爲横巳其要藥常有備隨身

半夏洗　青木香崑崙者　吴茱萸　木瓜子

犀角屑　大黄　生薑　橘皮常須備之

檳榔　茯苓　昆布　蓽撥

紫蘇　杏人　前胡　細辛

桂心　旋復花亦其次也

並須備急救命若卒患無藥處隨病所在三五味濃煮服之後依方合藥服之

又凡人入八月氣自漸定非意氣大發者作半夏獨活湯多唖或睡覺心忪者心悶風熱故也竹葉湯食後服之爲佳如不巳作後湯服

麥門冬三兩去心　茯苓二兩　石膏四兩碎綿裹　小麥五合綿裹

竹葉一物切一升　生薑二兩

右六味切以水五升煑取一升二合食後分再服相去七八里久忌酢物

又尋常氣滿三日兩日服一劑湯方

檳榔七枚碎　橘皮一兩　厚朴二兩炙　生薑四兩

吴茱萸二兩

右五味切以水二升煑取一升二合分三服相去五六里久復服之此藥性温去冷氣

又蒼耳酒去皮節頭足諸熱風藥性冷不便熱方

六月以後收取日乾至九月剉一大斛水三斛煑取四斗漬二大斗麴三度摠以米一大斛漬三日如凡釀法將息醱之酒熟日二三服五合身諸風骨髓中風若差或發瘡瘖差後皮痛膚堅實光悦腰脚甚便若虛熱羸瘦弱人無問男女加生地黃五大升牛

膝根剉三大升丹參二大升天門冬二大升松葉五大升枸杞根五大升杏人一大升去皮尖荊根若子二大升水三大石別煮牛膝丹參松葉等取六大斗幷著耳汁揔一石漬五斗麴用米二石五斗分四度酘杏人末著第一酘飯中下生地黃擣如泥著第二酘飯中下天門冬蒸熟剥去皮擣如泥著第三酘飯中下又大麻子一大斗擣碎著第四酘中下大去皮膚風補虛大良効多頭風者得甘菊花一升漬第五酘糟中下攪之調酒熟大小同服並得餘無禁忌毒魚肉並勿食有藥處可辦無藥處可以蒼耳爲本如或少三兩物亦得不必俱備年常釀至三月服極攘衆疾復延齡輕身將漬石斛等藥酒彌佳忌鯉魚

又單釀鼠黏根酒和蒼耳單酒法大去風疢癢止欬嗽消淡澼著疽

瘻亦是良藥脚氣人作漬側子等酒彌佳一名牛蒡根草名惡實根又患昬昬頭旋彌甚氣滿背痛取前蒼耳酒漬此後藥方

獨活　山茱萸　天門冬去心　黃耆

甘菊花　防風　天雄炮　側子炮

防巳　白朮　茯苓　牛膝各四兩

枸杞三兩　丹參四兩　生薑六兩　磁石十兩綿裹

貫衆三兩　生地黃八兩切

右十八味切以絹袋盛酒二大斗漬七日溫服一盞日二三服忌豬魚陳臭物餘無禁主腰脚兼去酒風忌豬肉冷水桃李雀肉鯉魚蕪荑酢物並出第一卷中

外臺秘要方卷第十九

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　校勘

外臺秘要方

二十

水病

外臺秘要方卷第二十水病二十六門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

上氣大便澀方二首

水病雜療方一十二首

水腫方一十三首

病源腎者主水脾胃俱主土土性尅水脾與胃合相爲表裏胃爲水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水氣滲液經絡浸漬腑藏脾得水濕之氣加之則病脾病則不能制水故水氣獨歸於腎三焦不瀉經脉閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裏上微腫如臥起之狀頸脉動時欬股間冷以手按腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得臥臥則驚驚則欬甚小便黃澀是也水病有五不可療第一脣黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍凸傷脾第四足下平滿傷腎第五背平傷肺凡此五傷必不可療脉沈者水也脉洪大者可療微細者不療也養生方云十一月勿食經夏自死肉脯內動於腎喜

成水病其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蝦蟇行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治五勞水腫之病也又云人臥勿以脚懸蹹高處不久必成腎水出第二十一卷中

黃帝問曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯對曰水始起也目裹上微腫如新臥起之狀頸脉動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹陷而不起腹色不變此其候也鼓脹者腹脹身腫大與膚脹等其色蒼黃腹脉起此其候也腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相薄正氣不得營因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉乃生其始也大如雞卵稍以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月按之則堅推之則移月事不以時下此其候也

石瘕者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫衃以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下曰膚脹鼓脹可刺耶對曰先寫其腹之血絡後調其經亦刺去其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黄汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證胕腫按之没指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿不喘黄汗其脉沈遲身體發熱胷滿四肢面腫久未愈必致癰膿並出甲乙經第八辛卷千金范汪同

范汪療水腫方

葶藶子一兩熬黑 甘遂一兩熬 吴茱萸四兩

右三味別擣異下篩和以蜜丸如梧子服可至五丸經心録云服三丸日三服餘同

又葶藶丸療水腫方

葶藶熬一升　吴茱萸一升

右二味各別擣篩合以蜜和更擣二萬杵藥成飲服二丸如梧實不知增之當以小便利及下爲候若下者但可清旦一服若不下但小便利者日可再三服常將服腫消耳一名二利丸

又利小便消水腫郁李核丸方

郁核中人三分　松蘿三分　海藻二分　桂心二分

大黃五分　葶藶熬五分　黃連二分　通草一分

石韋去毛一分

右九味擣合下篩和以蜜丸如梧子先食飲服七丸日二稍增以知爲度並出第二十八卷中

又療水腫大檳榔丸方

檳榔三兩 桂心三兩 附子二兩炮 括樓三兩
杏人三兩熬一方無 乾薑二兩 甘草二兩炙 麻黄三兩去節
葶藶三兩 茯苓三兩 厚朴二兩炙 葶藶三兩熬
椒目三兩 吴茱萸五合 白术三兩 防巳二兩
右十六味下篩蜜和服如梧子大二丸日三不知稍增至四丸不知又加二丸不下還服四丸得小下爲驗此療老小水腫虚腫大病後客腫作喘病療之佳忌海藻菘菜猪肉冷水生葱桃李雀肉大酢出第四十五卷中千金翼有海藻二兩

小品療水腫方

大豆三升

右一味以水六升煮令熟出豆澄汁更内美酒五升微火煎如餳服一升漸增之令小下

又桃皮酒療水腫方

桃皮三斤削去上黑取裏黃皮　女麴一升　秫米一升

右三味以水三斗煑桃皮令得一斗以五升汁漬女麴五升汁饙飯釀如酒法熟漉去滓可服一合日三耐酒者增之以體中有熱爲候小便多者即是病去便愈忌生冷酒麪一切毒物

又麝香散療水腫方千金云治婦人短氣虛羸遍身浮腫皮虛急

麝香三銖　芫花三分熬　甘遂三分

右三味合下篩酒服錢半邊匕老小錢邊三分匕亦可丸服之強人如小豆十丸老人五丸千金有雄黃一味并麝香各用六銖肘後又有人參二分

又療水腫商陸膏方

商陸根一斤生者　猪膏一斤先煎可有二升

右二味合煎令黃去滓以摩腫亦可服少許忌犬肉並出第一卷中經心録同千金云塗以紙覆之燥輒塗不過三日愈

集驗療水腫方

黃犍牛尿一飲三升若不覺更加服之以得下爲度
療老小者寧從少起飲半亦可用後方

又療水腫方

猪腎一枚分爲七臠甘遂一分末篩爲散以粉腎微火炙令熟食之至三四臠乃可止當覺腹中鳴轉攻兩脅下小便利去水即愈若三四臠不覺可食七臠令盡肘後經心録文仲同並出第六卷中

千金翼療水腫方

葶藶子六兩生用 桂心二兩

右二味擣蜜和丸飲服十丸如梧子日二愼蒜麪猪雞油膩出第二十卷中

必効療水腫方

皂莢一挺去皮子炙 烏錫五兩

右二味以酒二升煮取六沸絞去滓頓服之即史即小便二三升腫消忌一切肉及麪生冷鹹酢食一周年

又方

取苦瓠一枚

右一味以水一石煮一炊久去滓煎汁令堪丸如胡豆一服二丸當小便下後作小豆羹飯慎勿飲水効並出第二卷中

水病方七首

千金論曰大凡水病難療差後特須慎於口味又病水人多嗜食不廉所以此病難愈世有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見一愈者耳又此病百脉之中氣水俱實療之皆令瀉之使虛羊頭蹄極補那得瘳愈所以治水藥多用葶藶等諸藥本草云葶藶久服令人虛故水病非久虛不得絶其根本又有蠱脹但腹

滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫醫者不善詠候療蠱以水藥療水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云醫殺之今錄愼忌如左其療蠱方具在備急中

喪孝産乳音樂房室諠戲一切魚一切肉生冷酢滑蒜粘米豆油膩並不得食之亦不得用心

右以前禁者並具本方之下其房室等猶三年愼之不復重發不爾差而更發重發不可更療古方有十水丸歷驗多利大便不利小便所以不能述錄也

諸從腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈出第二十一卷中

范汪療水病方

黄連末

右一味以蜜和擣萬杵丸如梧子飲服二丸可至三四丸禁飲

水并冷物

又方

以苦酒一升飲之一方取鹽豉各一撮以飲飲之一方

取角木葉滿虎口擣取汁飲之並出第二十八卷中

崔氏療水病方

烏豆一大升粒小者　桑根白皮五大升細切

右二味以水五大斗和煮可有一斗汁濾去滓於銅器中重湯煎如餳可作丸即成所患人每服取利小便爲度其小便復舊色身上腫除候體中熱煩即服之禁房及死牛馬肉油膩麪酒等經數日得食羊頭肉兎肉水病忌食羊頭蹄此云得食恐誤也

又療水病洪腫氣脹不消食方

乾香薷五十斤陪用濕者亦得

右一味細剉內釜中以水淹之出香薷上數寸煮使氣兩盡

去滓清澄之漸火煎令可丸服五丸如梧子日三稍加之以
小便利爲度也經心録同無所忌
又療水病身腫方
鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉
右一味以水二斗赤小豆一大升和魚肉煮可取二升以上汁
生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服溫令煖服訖
下利利盡即差愼牛肉白酒生冷麪猪魚油酪藥滓埋之勿
令人食並出第六卷中
古今録驗療水病方李馬
木防已八分 蜀大黄八分如錦文者別擣 人參八分 杏人八分去尖兩人熬令紫色別擣
葶藶子十分熬
右五味擣和擣篩蜜和爲丸先食後初服七丸如梧子日再
日加一丸至十二丸還日減一丸至七丸復漸加至十二丸循

還服之以白飲服若病人熱多加黃芩茯苓各八分如病久冷多加厚朴八分如病久心驚加弔藤八分忌酒麪羊肉其牛肉一色永斷不得食外禁酢物得食鵝鴨麞兎鯉魚鱧魚等肉

又療水病牛黃桂枝丸方

牛黃六銖研　桂枝十二銖又一方云桂六銖　牡蠣十二銖熬研

椒目十二銖一方云海藻二十四銖不須椒目　葶藶子半升熬一方云用一升

右五味擣篩蜜和丸如梧子飲服七丸日再小便利爲度注者是刀長史勖禮所服者忌生葱並出第十一卷中

十水方三首

病源十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風水石水裏水氣水也青水者先從面目腫遍一身其根在肝赤水者先從心腫其根在心黃水者先從腹腫其根在脾白水者先從脚腫上氣

兩效其根在肺黑水者先從脚足趺腫其根在腎懸水者先從面腫至足其根在膽風水者先從四肢起腹滿大目盡腫其根在胃石水者先從四肢小腫腫獨大其根在膀胱裏水者先從腹滿其根在小腸氣水者乍盛乍虛乍來乍去其根在大腸皆由榮衛痞澀三焦不調腑藏虛弱所生雖名證不同並令身體虛腫喘息上氣小便黃澀也出第二十一卷中

古今録驗十水丸療十種水腫方

腫從頭(諸書云脚)起名爲白水其根在肺(椒目主之)腫從面起名爲青水其根在肝(大戟主之)腫從胷起名爲黃水其根在脾(甘遂主之)腫從腹起名爲氣水乍實乍虛其根在大腸腹(芫花主之)腫從股起名爲黑水其根在腎(玄參主之)腫從頭面起至足名爲懸水其根在膽(赤小豆主之)腫從內起堅塊四肢腫名爲石水其根在膀胱(桑根白皮主之)腫從四

肢起腹大名爲風水其根在胃（澤漆主之）腫從腫起名爲裹水其根在小腸（巴豆主之）腫從背中氣起名爲赤水其根在心（葶藶子主之）

右十味分等隨其病始所在增其所主藥皆一分巴豆四分去心皮擣末合下篩蜜和丸服如梧子三丸得下爲度不下日三亦可散末食服半錢匕便利明朝復服如法再服病愈節禁飲但得食乾物耳

又方

第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝（大戟主之）

第二之水先從心腫名曰赤水其根在心（葶藶主之）

第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾（甘遂主之）

第四之水先從脚腫上氣而欬名曰白水其根在肺

氣藁本主之

第五之水先從足趺腫名曰黑水其根在腎連翹主之

第六之水先從面腫至足名曰女水其根在膽芫花主之

第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水四肢小其腹腫獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之

第九之水先從小腹滿名曰裏水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛乍來乍去名曰氣水其根在大腸赤小豆主之

右十病藥皆分等所病形同則倍之擣合白蜜丸如小豆先食飲服一丸日三欲下病服三丸人弱者以意節之療宿食飲寒熱溫病禁辛菜猪肉生魚不禁熟也范汪千金翼同

又療十水大黃丸方

大黃一分　消石一分　大戟熬一分　甘遂熬一分

芫花熬一分　椒目一分　葶藶熬一分

右七味擣合下篩以蜜和丸如小豆先食飲服一丸日再漸增以知爲度並出第十一卷中范汪同

大腹水腫方五首

病源夫水病皆由榮衛痞澀腎脾虚弱所爲而大腹水腫者或因大病之後或積虚勞損或新熱食訖入水自漬及浴令水氣不散流溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於内乃腹大而腫故四肢小隂下濕手足逆冷膂痛上氣欬嗽煩疼故云大腹水腫也出第二十一卷中

肘後療卒大腹痳病諸方此病本由水來應水字而經方皆水爲病故施痳𤸎水病之初先兩目上腫起如老蠶色俠頸脉動

股裏冷脛中滿按之没指腹内轉側有聲此其候也不即療須

臾身體稍腫腹盡脹按之隨手起則病已成猶可療此皆從虚

損大病或下痢後婦人産後飲水不即消三焦決漏小便不利

乃相結漸漸生聚遂流諸經絡故也療之方

防巳　甘草炙　葶藶子熬各二兩

右三味擣篩苦酒和丸飲服如梧子三丸日三常將之取消

平乃止忌海藻菘菜

又方

將服牛溺商陸羊肉臛及香葇煎等在腫滿條中

其十水丸諸大方在別卷若止皮膚水腹内未有者

服諸發汗藥得汗便差然慎護風寒爲急

又方

牽牛子熬三分　厚朴炙一分

右二味擣篩強人服三蔆角殼弱人二殼酒飲隨意樞筋等
悉不同有水氣病水腫諸藥不能瘥者此方効驗出第一卷中
千金療大腹水腫氣息不通命在旦夕者方
牛黃二分研　昆布十分洗　海藻十分洗　牽牛子八分熬
桂心八分　椒　葶藶六分熬
右七味別擣葶藶如膏合丸如梧子飲服十丸日再稍加小
便利爲度正觀九年漢陽王患水醫所不療余處此古方日
夜尿一二斗五六日差差後有他犯因爾殂矣計此即是神
方忌生葱出第二十一卷中
崔氏療大腹水病身體腫上氣小便澀赤臍深頸上有兩大脉
動唾稠不得眠睡每腫先隨脚腫亦有在前頭面腫或大便澀
者服此藥大佳若先患大便利臍凸腹大脹手掌平滿即不可
服此藥方

大棗（四十枚肥不蚛者先以煖水浸令歡以炊飯裏蒸乃剥去皮核）葶藶子（五兩取苦者熬令紫色）
杏人（三兩不取合歡者以湯撻去皮熬令黃色去尖）

右三味先擣葶藶子一萬杵寫出之乃擣杏人三百杵訖揔和合棗膏擣一萬杵藥成平旦空腹服八丸日晚食消更服五丸以飯汁下之三日後每旦服五丸日晚服三丸丸如棗核如大便利未得服此藥若正服藥次忽患痢即先食二三口飯然後喫藥若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌鹹粘脂膩及大冷熱物等唯得食秔粟米飯及淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳如欲食粥即稠煮不得遣大便利並出第六卷中（一方加螢火蟲糞）

風水方八首

病源風水者由腎脾氣虛弱所爲也腎勞則虛虛則汗汗出逢風風氣內入還客於腎脾虛又不能制於水故水散溢皮膚

又與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如裹水之狀頸脉動時欬按腫上凹而不起也骨節疼痛而惡風是也脉浮大者名風水也出第二十一卷中

深師療大風水脉浮浮爲在表其人或頭汗出表無他病但下重故知從腰以上爲和腰以下當腫及陰難以屈伸木防已湯方

生薑三兩　大棗十二枚擘　白朮四兩　木防已四兩

甘草二兩炙　黃耆五兩

右六味切以水六升煮取二升分三服喘者加麻黃身重胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂心下久寒者加細辛防已黃耆爲本服藥欲解當如蟲行皮中狀從腰以下冷如冰服湯後坐被上又以一被繞腰溫下令得汗汗出則愈也忌海藻菘菜桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

又療風水氣舉身腫滿短氣欲絕大豆湯方

大豆一大升　杏人一升去尖皮熬　黄耆二兩　防風三兩
白术五兩　木防已四兩　茯苓四兩　麻黄四兩去節
甘草四兩炙　生薑六兩　清酒一升

右十一味切以水三斗先煑豆取一斗去滓内酒及藥煑取七升分七服一日一夜令盡當下小便極利神驗忌海藻菘菜桃李雀物大酢等

又療暴水風水氣水腫或瘡中水通身皆腫香薷术丸方

乾香薷一斤　白术七兩

右二味擣术下篩濃煑香薷取汁和术爲丸飲服如梧子十丸日夜四五服利小便極良夏取花葉合用亦佳忌桃李雀肉青魚酢等

崔氏療風水腫毒氣遍身方

楮白皮三兩　桑根白皮五兩　橘皮一兩　紫蘇四兩

生薑四兩　大豆三升

右六味切以水九升煑取一大升絞去滓分溫爲四服與三劑佳百日內忌鹹酢出第六卷中

古今録驗療風水惡風舉身悉腫脉浮不渴欲自有汗而無大熱越婢湯方

麻黃六兩去節　生薑三兩　甘草二兩炙　石膏半斤碎綿裹

大棗十五枚擘

右五味切以水六升先煑麻黃再沸去上沫内諸藥煑取三升分三服惡風加附子一枚炮風水加朮四兩服如上法欬肺脹加半夏五合洗一服五合稍稍增之忌猪羊肉餳海藻菘菜桃李雀肉等此本仲景傷寒論方云裏水越婢加朮湯主之

又療風水腫瘤癖酒癖方

商陸根一斤薄切

右一味以淳酒二斗漬三宿服一升當下下者減從半升起日三服盡更合不堪酒者以意減之忌犬肉

又甘遂丸療人風水黃疸體大如囊面目皆合陰腫如斗正如霜瓜方

甘遂二兩熬　葶藶子一升熬　杏人五十枚去皮尖兩人熬　巴豆四十枚去心皮熬

右四味下篩蜜和丸如大豆一服三丸飲下當吐不知可至五丸禁野猪肉蘆笋

又麻黃湯療風水身體面目盡浮腫腰背寄引髀股不能食方

麻黃五兩去節　桂心四兩　生薑三兩　甘草二兩炙

附子二枚炮

右五味切以水一斗先煑麻黃減二升內藥煎取三升一服一升日三忌猪肉冷水海藻菘菜生葱

水蠱方四首

病源此由水毒氣結聚於内令腹漸大動摇有聲常欲飲水皮膚麄黑如似腫狀名爲水蠱也出第二十一卷中

肘後療唯腹大動摇水聲皮膚黒名曰水蠱方

白茅根一大把切　小豆三升

右二味以水二升煑取乾去茅根食豆水隨小便下

又方

鼠尾草　馬鞭草各十斤

右二味切以水一石煑取五斗去滓更煎餘五升以粉和丸飲服如大豆二丸至四五丸禁肥肉生冷勿食並出第一卷中

文仲療若唯腹大動摇水聲皮膚黒名曰水蠱方

鬼扇擣絞取汁服如雞子即下水更服取水盡若渴研麻子汁飲之良肘後同

又方

巴豆九十枚去心皮熬令黃 杏人六十枚去皮尖熬令黃

右二味擣相和服如小豆一枚以水下爲度勿飲酒佳忌猪肉蘆笋肘後同並出於第五卷中

卒腫滿方六首

肘後療卒腫滿身面皆洪大方

灸足內踝下白肉際三壯差備急同

又方

香薷剉煮令濃及熱以漬亦可服之

又方

商陸根一斤刮去皮薄切之煮令爛去滓內羊肉一斤下葱鹽豉亦如常作臛法隨意食之腫差後亦可宜作此可常擣商陸與米中拌蒸作餅子食之忌犬肉范汪方云數用愈經心錄千金同並出第一卷中

范汪療卒腫滿身面皆洪大方

用大鯉魚一頭以淳苦酒三升煑之令苦酒盡訖乃食魚勿用酢及鹽豉他物雜也不過再作愈備急同（肘後用淳酒）

又方

車下李核中人十枚研令熟粳米三合研令破以四升水中煑作粥令得一二升服之日三作未消更增核肘後古今録驗同並出第二十八卷中

備急療卒患腫滿効方曽有人忽脚趺腫漸上至膝足不得踐地諸療不差方

以蒴藋莖葉埋熱灰中令極熱以薄腫上冷又易一日夜消盡出第三卷中

腫入腹苦滿方三首

肘後論凡此滿或是虛氣或是風冷氣或是飲氣此方皆療之

腫入腹苦滿急害飲食方

大戟　烏翅　白术各二兩

右三味擣篩蜜和丸如梧子旦服二丸當下漸退更服取令消乃止

又方

葶藶七兩　椒目三兩　茯苓三兩　吴茱萸二兩

右四味擣篩蜜和丸如梧子飲服十丸日三忌酢物

又方

鯉魚一頭重五斤者以水二斗煑取汁半去魚　澤漆五兩　茯苓三兩

桑白皮切三升　澤瀉五兩

右五味取四物内魚汁中煑取四升去滓分四服小便當利漸消也忌酢物並出第一卷中

水通身腫方一十一首

病源水病者由腎脾俱虚故也腎虚不能宣通水氣脾虚又不能制水故水氣盈溢滲液皮膚流遍四肢所以通身腫也令人上氣體重小便黄澀腫處按之隨手而起是也出第二十一卷中

千金麻子湯主遍身流腫方

麻子五升　商陸一斤切　防風三兩切　附子一兩炮破

赤小豆三升

右五味先擣麻子令熟以水三斗煑麻子取一斗三升去滓內藥及豆合煑取四升去滓食豆飲汁日再忌猪肉及冷水犬肉

又療水氣遍身洪腫百藥不愈待死者方

大麻子一石未入窨不鬱悒者爲佳　赤小豆一石不得一粒雜

右二味取新精者仍淨揀擇以水淘汰暴令乾蒸麻子使熟

更暴令乾貯於淨器中欲服取五升麻子熬令黃香唯須緩
火勿令焦擣極細作末以水五升搦取汁令盡淨器密貯之
明旦欲服令夜以小豆一升淨淘漬之至旦乾漉去水以新
水煑未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煑令爛熟爲佳空
腹恣意飽食日三服當小心悶少時止五日後小便數或赤
唾粘口乾不足怪之服訖常須微行不得即卧十日後灸三
里絶骨下氣不爾氣不洩盡服藥後五日逆不可下者取大
鯉魚一頭先死者去鱗尾翅以湯脫去滑淨洗開肚去藏以
上件麻汁中和小豆完煑令極熟作羹下葱豉橘皮生薑紫
蘇調和下藥食之始終一切斷鹽渴飲麻汁秋冬煖飲春夏
冷飲常食不得至飽止得免飢而已慎房室瞋恚大語高聲
酒麪油酢生冷菜茹一切魚肉鹽醬五辛療十十差神驗并
療一切氣病服者皆差凡作一月日服之大良麻子熟時多

收新瓮貯之施人也

又方

吴茱萸 華撥 昆布 杏人去尖皮兩人熬

葶藶子熬

右五味等分擣丸如梧子氣急飲服五丸勿令至利食訖飽悶氣急服之即散

又苦瓠丸主大水頭面遍身大腫脹滿方

苦瓠白穰實捻如大豆粒

右一味以麪裹煑一沸空腹吞七枚至午當出水一升三四日水自出不止大瘦乃差三年内愼口味也苦瓠須好無黶翳細理妍淨者不爾有毒不堪用

又方

苦瓠膜二分 葶藶子五分熬

右二味擣丸服之日五丸如梧子

又方

葶藶子熬　桃人去皮尖熬

右二味等分擣丸服之利小便一方用杏人

又方

大棗去皮核七枚　苦瓠膜如棗核大

右二味擣丸一服三丸日三

又方

燒薑石令赤內黑牛尿中令熱服一升日一並出第二十一卷中

千金翼澤漆根湯主水通身洪腫四肢無堪或從消渴或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通血氣不化氣實皮膚中喘息不安腹中響響脹滿眼不得視方

澤漆根十兩 赤小豆二升 甘草二兩炙 鯉魚一枚重五斤淨去腸冒

麥門冬二兩去心 茯苓三兩 人參二兩 生薑八兩

右八味切以水一斗七升先煑鯉魚豆減七升去之內藥煑取四升半去滓一服三合日三弱人二合日再服氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或小溏下若小便大利還從一合始大利止若無鯉魚鮦音同魚亦可用若水甚不得臥臥不得轉側加澤漆一片渴加括樓二兩欬加紫菀二兩細辛一兩欵冬花一兩桂心三兩增魚汁二升忌海藻菘菜酢物深師同出第二十卷中

古今録驗療祖承郎水腫通身衆醫不能療得此湯一劑一夜小便五六升即差療水欬逆氣通身流腫短氣腹滿晝夜倚壁不得臥喉中水雞鳴白前湯方

白前六分 紫菀三兩 半夏五合又方四兩洗之三十遍 生澤漆根七合切量一方三兩

右四味切以水一斗內藥刻誌水度復加水七升微火煎令至刻去滓次內藥七種白朮二兩吴茱萸五合桂心三兩人參二兩乾薑一兩或生薑五兩栝樓五合或六合六物微火煑取三升半分三服小便當利或當溏下勿怪氣即低腫減呂計方經傳楊氏有驗忌羊肉餳桃李雀肉生葱范汪同一方有棗二十枚擘

又小消化水丸療水病冷通身微腫腹大食飲不消方

芫花一兩熬　甘遂一兩熬　大黃一兩　葶藶一兩熬

巴豆四十枚去心皮熬研

右五味合擣下篩蜜爲丸如梧子一服一丸不知稍增以知爲度忌蘆笋野猪肉並出第十一卷中

水氣腫鼓脹方三首

千金翼療水氣腫鼓脹小便不利山連治韋司業得差司業姪

雲表所送云數用神驗葛砦丸方

葛砦子一升 羚羊肺一具青羊亦佳湯微薄切之暴乾擣作末

右二味以三年大酢漬葛砦一伏時出之熬令變色熟擣如泥和肺末蜜和擣作丸食後一食久服如梧子大四丸麥門冬飲服之喉中乾口粘妄語為候數日小便大利即差

麥門冬飲法

麥門冬二十五枚去心 米二十五粒

右二味以大合三合半水煮之米大熟去滓以下丸每服常作千金同出第二十卷中

救急療水氣腹鼓脹硬頻試要效方

葶藶子七兩熬 茯苓三兩 吴茱萸二兩 椒目三兩水者洗

甘遂五兩絶上者

右五味擣篩蜜和為丸如梧子大以飲服五丸日三服不知

損加丸以利爲度禁食如藥法并酢物出第九卷中

古今録驗療大水腫腹如鼓堅如石方出胡洽

葶藶一升熬　椒目一升　芒消六兩　水銀十二兩

右四味以水煮錬水銀三日三夜數益水要當令黄白以合擣藥六萬杵自令相和如梧子先食服一丸日三日增一丸至十丸不知更從一丸始病當從小便利當飲好牛羊肉羹晝夜五飲當令補養禁猪肉生魚菜勿忘飲漿水渴飲羹汁少少善鄧夫人常服釋僧深所撰方云錬水銀一日一夜亦是也水銀用十兩芒消用七兩如小豆先食服二丸文仲陶氏集驗范汪同出第十一卷中

水腫欬逆上氣方三首

病源腎主水肺主氣腎虚不能制水故水妄行浸溢皮膚而身體腫滿流散不已上乘於肺肺得水而浮浮則上氣欬嗽也出

第二十一卷中

深師療水欬逆上氣通身洪腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉中水雞鳴大小便不通不下食而不甚渴白前湯方

白前三兩　紫菀四兩　半夏一升洗　生澤漆根一斤切

凡四味水一斗七升煮取一斗汁又內後藥

桂心三兩　人參六分　大棗二十枚擘　白朮五兩

生薑八兩一方乾者二兩　茯苓四兩　吳茱萸五兩　杏人三兩去兩人皮尖碎

葶藶二兩　栝樓五合一方十合

右十味內前汁中煮取三升分四服當得微下利小便氣即下腫減深云增損用之若神忌羊肉餳生葱桃李雀肉酢物出第十九卷中

古今錄驗夫水在五藏令人欬逆喘上氣腹大響響兩脚腫目下有卧蠶微渴不得安卧氣奔短氣有頃乃復小便難少而數

肺痿胸滿隱痛宜利小便水氣迫肺吸吸寒熱澤漆根湯方

生鯉魚一頭重五斤麤剉　麥門冬二兩去心　甘草二兩炙　人參二兩

茯苓二兩　澤漆根八兩生者

右六味切以水一斗七升煮魚取一斗去魚以煮藥取四升分服日三小便利爲度不利增服之大便如利而小便未利者增至四合服一日氣即下得安臥有寒可內生薑八兩深師

同忌海藻菘菜酢物

又防已煮散療水腫上氣方出許諫議

漢中防已三兩　澤漆葉三兩　石韋三兩去毛　澤瀉三兩

郁李人五兩　白朮三兩　丹參三兩　赤茯苓三兩

桑白皮三兩　橘皮二兩　生薑十兩　通草二兩

右十二味麤篩爲散以水一斗七合內四方寸匕散煮取八合去滓一服令盡日三大便利者一服取小便利爲度許澄秘方

忌桃李雀肉大酢千金同出第十一卷中

氣兼水身面腫方四首

張文仲周大候正大將軍平公于禮患氣兼水身面腫垂死長壽公姚僧垣處二方應手即差先服湯方

桑根白皮四兩　橘皮二兩　海藻三兩洗去鹹　茯苓

郁李人碎各四兩　赤小豆一升

右六味切以水八升煮取二升半分三服甚効古今録驗療氣水身腫脹滿姚大夫治燕公雍州録事于志光送云從來知不能服湯事較急勿不努力服之服此湯若微覺爲益頗服三兩劑勿不服此藥甚易必無逆忤如不能服可服後丸丸遲不應急耳

又方

橘皮五分　郁李人十分　茯苓八分　葶藶六分熬

防已　桑根白皮各五分　甘遂四分熬　蘇子四合

右八味擣下篩蜜和丸取穀白皮火炙焦黃煑飲服十丸如梧子日再服若不得宣通稍稍加常以宣爲度渴者飲此方老蔣公處與張大夫家効忌酢物

又方

灸丹田穴在臍下二寸灸三壯療水腹女子禁灸並出第五卷中

古今錄驗療氣水身腫脹滿方

杏人十分去皮尖熬　蘇子五分　白前六分　昆布八分洗方鹹

李根白皮五分　橘皮六分　五味子六分　大麻人五分熬

茯苓八分　生薑八分切暴燥

右十味擣篩蜜和丸粥清服二十丸如梧子日再稍稍加至三十丸忌酢物出第十一卷中

水氣方七首

范汪療風虛水氣腫豆酒方

大豆一升

右一味以水四升煑取二升汁去豆内美酒一升合煎取一升能隨意飲之日三常令有酒氣當清酒作之

又療通身腫皆是風虛水氣亦療暴腫蒲黃酒方

蒲黃一升　小豆一升　大豆一升

右三味以清酒一斗煑取三升去豆分三服

又療腫患下水氣四肢腫聶聶動木防已湯方

木防已三兩　甘草二兩炙　桂心二兩　茯苓六兩

黃耆三兩　生薑三兩　白朮三兩　芍藥二兩

右八味切以水八升煑取三升二合分爲四服有人患下是胃寒加當歸三兩人參二兩半龍骨二兩水一斗煑取三升二合

分四服相去二十里頓服不下即不須内此三物也忌海藻菘菜桃李雀肉生葱犬酢並出第四十五卷中

崔氏療水氣方

葶藶子三兩

右一味以物盛於甑上蒸令濕徹上即擣萬杵自堪爲丸不須蜜和如不得以少蜜和之一服五丸漸加之七丸以微利爲度得利即停不可多服令人不甚能食若氣發又服之得利氣下定即停此方療水氣無以加蕭駙馬時任太常卿患水腫見在名醫悉療不差唯服此丸得平復故記

又葶藶子療水氣極効方

取葶藶子一合熬令色黄擣碎別研如麪取大棗二十顆去核以水一大升煮棗取半升汁去棗滓内前件葶藶子并棗汁於銅器中緩火煎令堪成丸平旦

空腹頓服盡必不能頓者分爲兩服得利兩行差至
日午宜食乾飯慎如藥法並出第六卷中

近效療水氣方

商陸根去皮取白者不用赤色切如小豆一大盞

右一味以水三升煮取一升以上爛即取粟米一大盞煮成粥
仍空腹服若一日兩度服即恐利多每日服一頓即微利不
得喫生冷等

皮水方三首

病源肺主於皮毛腎主於水腎虛則水妄行流溢於皮膚故令
身體面目悉腫按之沒指而無汗也腹如故不滿亦不渴四肢
重而不惡風是也脉浮者名皮水也出第二十一卷中
深師療皮水如腫水氣在皮膚中四肢集集動木防已湯方
集集一作聶聶

木防已三兩 黄耆三兩 桂心三兩 茯苓六兩
甘草二兩炙
右五味切以水六升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱酢
物出第十九卷中
范汪皮水一身面目悉腫甘草麻黄湯主之方
甘草二兩炙㕮咀之 麻黄四兩寸斬之去節
右二味以五升水先煮麻黄再沸去上沫乃内甘草煮得一
升絞去滓適寒温先服一升重覆之日移二丈所當汗出汗
出勿復服不汗乃復服當慎護風寒數日乃出入忌海藻菘
菜出第二十八卷中
古今録驗皮水越婢湯加朮主之方
麻黄六兩寸折去節 大棗十二枚擘 白朮四兩 生薑三兩切
甘草二兩炙 石膏半斤碎綿裹

右六味㕮咀以水七升煮麻黃一二沸去上沫乃內餘藥煮取二升絞去滓適寒溫服七合日三忌海藻菘菜桃李雀肉等范汪同已上三方並本出仲景傷寒論

水腫從脚起方四首

病源腎者陰氣也主於水而又主腰脚腎虛則腰脚血氣不足水之流溢先從虛而入故脚先腫也出第二十一卷中

肘後若腫從脚起稍上進者入腹則殺人療之方

小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝以下日日爲之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫雜喫飯及鮭音圭魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此之病十死一生急救之

又方

削楠及桐木煮取汁以漬之并飲少許如小豆法並

出第一卷中

范汪療水腫從足始轉上入腹則殺人豚肝方

生猪肝一具持如食方一物細切頓食令盡不得用鹽可用苦酒猪重五六十斤以上肝者一頓啖盡百斤以上猪中分服再食肘後同

又若但兩足腫者方

剉葱葉煑令爛以漬之日三四度良也集驗同並出第二十八卷中

水癖方二首

病源水癖者由經絡痞澀水氣停聚在於腹內大小腸不利所爲也其病腹內有結塊堅強在兩脅間膨膨脹滿遍身腫所以謂之水癖出第二十一卷中

深師療癖水腹內胷脅牢強通身腫不能食海藻丸方

海藻一兩洗　水銀一兩　椒目一兩　芒消一兩
葶藶一兩熬　大黃一兩　杏人三十枚去尖皮熬　甘遂一兩熬
桂心一兩　附子一兩炮　茯苓一兩　大戟一兩
松蘿一兩　乾薑一兩　巴豆三十枚去心皮熬
右十五味下篩蜜和服如小豆二丸日三不知稍稍加之忌猪肉大酢生葱蘆笋出第十九卷中范汪同

范汪療水腫大腹水癖丸方

礬石十分熬　躑躅花十分　細辛十分　半夏十分洗
藜蘆十分　丹參十分　承露十分承露是落葵　巴豆十枚去心皮熬
苦參十分　雄黃十分　大黃十分　芒消十分
大戟十分　烏頭二十分炮　狼毒十分　野葛二分
右十六味擣下篩蜜和藥成以置腫上并服如黍米三丸日三欲取下者服五丸禁食生魚生菜肥肉千金不傳謂之

千金九並出第三十五卷中

水瘕方一首

病源水瘕者由經絡痞澀水氣停聚在於心下腎經又虚不能宣利溲便致令水氣結聚而成形段在於心腹之間抑按作水聲但欲飲而不用食遍身虚腫是也出第二十一卷中

古今録驗水瘕病心下如數升油囊裹𡘋𡘋音學作聲日飲三斗不用食但欲飲久病則爲瘕堅有蝦蟆鼈龜療之方

取革蔴成熟好者二十枚去皮柸中研令熟不用擣水解得三合宿不食清旦一頓服盡日中許當吐下青黄如葵汁當囊結裹其病不盡即三日更增服三十枚革蔴如上法若病如故復不盡復增十枚服如上法其以盡病根爲限藥但去病不令人悶亂下病之後慎不可飲當五日斷飲止進白糜鬭高方已試

神良范汪同出第十一卷中

石水方四首

病源腎主水腎虛即水氣妄行不依經絡停聚結在臍間少腹腫大鞕如石故云石水其候引脅下脹痛而不喘是也脉沈者名曰石水脉微大亦曰石水腫起臍下至少腹垂垂然上至胃管則死不療出第二十一卷中

集驗膀胱石水四肢瘦腹腫方

大豆五升　桑根白皮切三升　穀白皮四兩一云切三升　白朮四兩

澤漆葉切三升　防已四兩　射干四兩

右七味切以水一斗半煑取六升去滓內好酒三升更煎取五升分五服日再夜一餘煎明日服之千金同忌桃李雀肉等出第六卷中

千金療膀胱石水四肢瘦腹腫方

桑根白皮六兩　射干四兩　澤瀉三兩　澤漆切一升

茯苓四兩　防已一兩　黄芩四兩　白术四兩

大豆三升

右九味切以水五斗煮大豆取三斗去滓澄清取汁一斗下藥煮取三升空腹温分三服出第二十一卷中

集驗療石水痛引脅下脹頭眩痛身盡熱灸法

灸關元

又灸石水法

灸章門然谷

暴腫滿方四首

集驗療暴患遍身腫滿方

大豆揀去黒皮

右一味擣篩爲散粥清服三方寸匕日再甚良驗

又療身體暴腫如吹方

巴豆三十枚合皮㕮咀

右一味以水五升煑取三升綿內汁中以拭腫上隨手減矣日五六拭勿近目及陰范汪同並出第六卷中

備急療身體暴腫滿方

榆白皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利即消陶効方出第三卷中

古今錄驗澤漆湯療寒熱當風飲多暴腫身如吹脈浮數者方

澤漆二兩炙　知母二兩　海藻二兩　茯苓二兩

丹參三兩　秦艽二兩　木防已二兩　猪苓二兩去皮

大黃三兩　通草二兩　青木香二兩

右十一味切以水九升煑取三升分三服忌酢物出第十一卷中

氣滿胷急方八首

古今録驗療氣忽發滿胷急者方

茯苓（四兩） 杏人（四兩去皮尖碎） 橘皮（二兩）

右三味切以水六升煑取二升分作三服日三隨小便下愈飲盡更作忌酢物

又茯苓杏人煎方

茯苓（四兩） 杏人（四兩去兩人尖皮碎） 橘皮（三兩） 蘇子（一升碎）

甘草（三兩炙） 芍藥（四兩） 白前（三兩） 五味子（三兩）

生薑汁（五合） 蜜（六合） 竹瀝（二升）

右十一味切以水九升先煑諸藥取三升去滓内竹瀝生薑汁蜜等和攪微火煎取四升一服四合日再夜一忌海藻菘菜酢物

又方

甘遂三兩熬 茯苓四兩 杏人四兩去兩人皮尖碎 澤漆葉三兩炙

黃芩四兩 澤瀉三兩 郁李人五兩碎 橘皮三兩

朴消四兩

右九味切以水九升煮取二升七合分三服忌酢物

又方

桑根白皮切二升 郁李人一升碎 赤小豆二升 橘皮三兩

蘇葉三兩 茅根切二升

右六味切以水一斗煮取三升適冷煖稍稍飲之

又方

桑白皮四兩 橘皮三兩 茯苓四兩 甘遂三兩熬

杏人三兩去皮尖兩人碎 澤瀉三兩 黃芩四兩 赤小豆一升

右八味切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方甘草三兩

又方

羊腎一具去脂破　桑根白皮四兩　茯苓四兩　橘皮三兩
李根白皮四兩　黄耆三兩　玄參三兩　生薑四兩
右八味切以水九升煑取二升七合分三服忌酢物
又方
猪腎一具去脂破　桑根白皮五兩　茯苓四兩　澤漆葉三兩炙
防巳三兩　澤瀉三兩　橘皮三兩　大豆三升
甘遂三兩熬　郁李人一升碎
右十味切以水一斗三升先煑腎桑根皮澤漆葉大豆取八升去滓内餘藥煎取一升七合分爲三服忌酢物
又方
大棗三十枚擘破　烏梅三十枚打破
右二味以水四升煑取二升内蜜和調不得過甜不得過酢稍稍含咽之並出第十一卷中

虛熱及先服石風水腫方三首

集驗葱豆洗湯療虛熱及服石熱當風露卧冷濕傷肌熱阻在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小便不利大便難四肢腫如皮囊盛水晃晃如老蠶色陰卵堅腫如升莖腫生瘡臭如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕痺故也內宜依方服諸利水藥外宜以此湯洗四肢訖以葱豆膏傅之別以猪蹄湯洗瘡爛處及卵腫也方

赤小豆一升 葱合青切一升 蒺藜子一升碎 菘菜子一升舂碎

蒴藋切五升 巴豆一百枚去心皮打破

右六味以水一石二斗煮取四斗以淋洗身腫處古今錄驗同

又猪蹄洗湯療丈夫服石有虛因勞損熱盛當風卧傷於風濕身變成熱風水腫病腹滿氣急四肢欲腫小便不利陰卵堅腫莖腫生瘡赤爛臭如死鼠名水疽以湯洗之方

猪蹄一雙　黃蘗五兩剉　蒴藋根三升切　葶藶子五合

蒺藜子一升

右五味以水三斗煑取二斗冷以洗之日三古今録驗同並出第六卷中

古今録驗葱白膏方療與前葱豆湯同

葱青白半升切　菘菜子半升　葶藶子半升破　蒴藋半升切

青木香二兩切　莽草一兩切　丹參半升切　生蛇銜半升

蒺藜子一升破

右九味以猪肪五升煎之三沸令水氣竭去滓傅痛處集驗同出第十一卷中

三焦決漏水病方二首

深師療三焦決漏水在胷外名曰水病腹獨腫大在腹表用大麝香丸華他方

麝香三銖研　雄黃六銖研　甘遂十二銖熬　芫花十二銖熬
右四味擣合下篩和以白蜜丸如大豆二丸酒下日三服可至四丸節飲食禁肥肉生菜之輩有効千金同
古今録驗療通身手足面目腫食飲減少此是三焦決漏精液不通水氣却行者鯉魚湯方
鯉魚重五斤者　茯苓六兩　澤漆五兩炙　人參二兩
杏人一兩去皮尖兩人碎　澤瀉五兩　甘草二兩炙
右七味切以水二斗五升煑魚取一斗半汁内藥煑取四升未食服一升日三以小便利爲度年八十病大困服此差忌海藻菘菜酢物並出第十一卷中
男女新久腫方三首
范汪療久腫新腫方
黒大豆一斗清水一斗煑之令得八升去豆以八升

薄酒投中更微火上煎令得八升一服之爲佳不能者亦可分再三服腫當隨小便去腫除後渴難忍要不可飲愼之出第二十八卷中

千金療男女新久腫得惡暴風入腹婦女新産上圊風入藏中如馬鞭者噓吸短氣欬嗽大豆煎方

大豆一斗擇令淨以水五斗煮取一斗三升澄清內釜中以一斗半美酒內汁中更煎取九升宿勿食旦服三升溫覆取汗兩食頃當下去風氣腫減愼風冷十日平復也除日合服之若急不可待逐急合服無令六畜婦人見之腫差更服三升若醒醒差勿服之神驗也亦可任性飲之常使酒氣相接范汪并翼同

又方

楮枝皮一大束切煮取汁隨多少釀酒旦服醉爲佳

不過三日腫減差後可常服之並出第二十一卷中

水腫小便澀方三首

廣濟主下水氣若小便澀水腫氣妨悶不能食海蛤丸方

昆布洗　橘皮　赤茯苓　漢防巳

海蛤研　郁李人　桑根白皮　澤漆炙

檳榔人　杏人去皮尖雙人熬各四分　葶藶子二十分微火熬令黃　大黃六分

右十二味擣篩蜜和丸飲服如梧子十五丸日二服加至二十五丸以小便利爲度忌熱麪冷滑大酢出第五卷中

崔氏療水腫盛滿氣急喘欬小便澀如血者方

桑根白皮六兩　澤漆葉切二升炙　白朮二兩　生薑四兩

郁李人六兩　杏人二兩去皮尖雙人　橘皮二兩　玄參三兩

右八味切以水九升急著火煮取四升溫分四服相去六七里又或利黃水三五升及小便利爲候即差者可頻服三四

佳忌桃李雀肉青魚酢等出第六卷中

古今録驗療男女心上脹滿背痛食進少面微似腫小便如方出姚大夫

杏人八分去兩人尖皮熬　橘皮五分　蘇子三合　防已五分

葶藶六分熬　茯苓八分

右六味擣篩蜜和爲丸如小豆細切桑根白皮煑爲飲用服此丸初服十丸日再漸加至三十丸出第十一卷中千金同

上氣大便澀方二首

崔氏療上氣大便澀方

葶藶子四兩熬　牽牛子一兩熬　杏人二百顆去尖皮兩人熬　大棗四十枚湯洗剝去皮

芒消一兩　牛酥一合

右六味擣一萬杵更別著牛酥乃更擣一萬杵空腹服入丸用粥飲下藥先禁鹹醬等物

又療上氣大便祕澀方

杏人五兩去兩人尖皮熬 印城鹽三兩 乾薑三兩

右三味擣篩以醬汁和之令得相著作充可長一寸餘如指大兩頭尖仍以薄綿裹之於風日中暴令少乾內下部中時時易之不過一兩易即有惡物下氣上即定亦下食內藥痛時少須忍如深內少須亦不大痛急出時物即出痛忍之不得然可便轉時出膿及惡物多大便不澀任停之並出第六卷中

水病雜療方一十二首

集驗療水腹大臍平者法

灸臍中腹無文理者不可療

又水腹脹皮腫法

灸三里風水灸解谿並出第六卷中

千金翼鯉魚炙主腫滿方

鯉魚長一尺五寸以尿漬令沒一宿平旦以水從口中灌至尾微火炙令微熟去皮宿勿食鹽頓服之不能者再服令盡神方附後備急張文仲千金同

又有人虛肥積年氣上似水病眼似腫而脚不腫方

穀楮葉八兩

右一味以水一斗煮取六升去滓內米煮粥亦當以水煮羹菜等皆用之秋中多收以擬經冬用其水多少濃淡任人勿拘此方愼蒜麪豬雞魚油膩重者三年服之永差輕者一年

並出第二十卷中

崔氏療一切腫方

取紅藍花熟挼擣取汁服之不過再三服便愈服之多少量腫大小而進花汁也

又療水腫已上少腹連臍硬氣上悶方

苦瓠子一兩

右一味以麪如作餛飩法其麪勿著鹽作二七枚湯中煑待浮漉出及煖吞之如不下以湯汁下之能禁生冷酢滑及肉油膩佳若恐虛者以牛乳服之如此隔日作漸加至三七枚以小便利爲候小便若太多即歇一二日以腹腫消即止

又療水病差後口中習習熱瘡出方

先以鐵鐺中著水一小斗煑金器不問多少煎取二小升出金取金水著病人口中含良久應欲言語有要事方可吐出勿嚥之殺藥氣並出第六卷中

張文仲羊胃湯久病羸瘦不生肌肉水氣在脅下不能食四肢煩熱方

羊胃一枚切 白朮一升切

右二味以水二斗煑取九升服一升日三三日盡更作兩劑

乃差忌桃李雀肉等

備急小品小女麴散療利後虛腫水腫者服此藥小便利得止

腫亦消方

女麴一升生用　乾薑　細辛　椒目

附子炮　桂心各一兩

右六味爲散酒服方寸匕不知服二三匕日三產後虛滿者

大良忌猪肉生葱生菜出第三卷中

古今錄驗療水或下不下則滿溢下之則虛竭還復十無一活

桑酒方

桑枝幷心皮細剉以水八升煑取四升汁以四升米

釀酒一服一升

又療脾胃水面目手足胕腫胃管堅大滿短氣不能動揺方

右四　水三升煮桑白皮得一升絞去滓內桂心等并

桑根白皮切二升　桂心一尺　生薑三兩　人參一兩

餹十一兩煑之竭得七合消息更服須臾當下不盡復一升

忌生葱

傳效鯉魚湯療水腫腹大面目身體手足盡腫喘欬短氣又脅滿不得卧方

鯉魚一枚重三斤　桂心三兩　紫菀一兩　木防已二兩

黃芩兩　消石二兩　乾薑二兩　人參二兩

右八味切以水一斗五升煑魚如食法取汁一斗二升出魚內藥煑取三升去滓先食溫服一升日三忌生葱並出第十一卷中

外臺秘要方卷第二十　右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子

外臺祕要方

二十一

眼疾

外臺秘要方卷第二十一 眼疾二十四門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

蓋聞乾坤之道唯人爲貴在身所重唯眼爲寶以其所繫妙絶通神語其六根眼最稱上是以療眼之方無輕易爾

敘眼生起一首

謝道人曰夫眼者六神之主也身者四大所成也地水火風陰陽氣候以成人身八尺之體骨肉肌膚塊然而處是也大也血淚膏涕津潤之處是水大也生氣溫暖是火大也舉動行來屈伸俛仰喘息視瞑是風大也四種假合以成人身父母精血寔斯增長而精成者也其眼根尋無他物直是水耳輕膜裹水圓滿精微皎潔明淨狀如寶珠稱曰眼珠實無別珠也黑白分明肝管無滯外託三光內因神識故有所見凡人不解謂眼有珠喻若魚之被煑此事不然夫魚畜水陸有目之者悉皆是水無有別珠直以湯火煎煑水凝結變自成珠但看生魚未被煑炙豈有珠義直置死魚水已凝厚論其活者水亦輕薄

出眼疾候一首

謝道人曰夫人眼白睛重數有三設小小犯觸無過傷損但黑睛水膜上有一重不可輕觸致敗俄頃深可慎之凡人不究謬據多重或七或五此皆是其妄說一家成言耳然眼之精微火映輕薄無所堪耐易致諸疾故學療之者事須安審不可麤踈恐致毀傷患眼之家自須謹慎諸所禁忌悉不應犯若覺有疾即宜早療當及其初根脚未立則易驅遣若其久後根盤四布既成固疾雖復所療極難成効且身禀四大性各不同是以治者詮候非一冷熱風損病生不同傷勞虛實其方各異宜應察其元起尋究本根按法依源以行療救不得謬濫措方以乾薑療熱毒之眼以冷水療風寒人目非直冷熱無効蓋亦致患俄頃常見愚人不識病源直尋古方輕欲立療或經有疾遇藥得愈便以此法遞相傳授都不知病有冷熱之殊虛

實之異或有遒姑嫫嫗爲人求食輕得有損寧慮幽冥良爲
病家不別真僞聞語便從遂使應愈之病增爲固疾驪珠之
眸永成盲瞽一何可哀故目有條貫以示後人皆苦眼無所因
起忽然膜膜不痛不痒漸漸不明歷年歲遂致失明令觀容
狀眼形不異唯正當眼中央小珠子裏乃有其障作青白色雖
不辨物猶知明暗三光知晝知夜如此之者名作腦流青盲都
未患時忽覺眼前時見飛蠅黒子逐眼上下來去此宜用金篦
決一針之後豁若開雲而見白日針訖宜服大黃丸不宜大泄
此疾皆由虛熱兼風所作也

眼疾品類不同候一首

謝道人曰若有人告患眼漸膜膜狀與前青盲相似而眼中一
無所有此名黒盲宜針刺服藥如瞳子大者名曰烏風如瞳子
瞖綠色者名爲錄瞖青盲皆是虛風所作當覺急須即療

湯丸散煎針灸禁慎以驅疾勢若眼自闇多時不復可療此疾之源皆從內肝管缺少眼孔不通所致也亦宜須初欲覺時即須速療之若已成病更不復可療亦無勞措意也若因時病後得眼生白障者此名爲瞖也爲熱毒所作宜應速服湯丸依法鐮之傅食瞖散若因病後生肉者此爲膚障也

鉤此是風熱所作宜服湯丸鉤割除之若眼赤痒淚出者爲熱虛風服散煎除之若見黑煙赤光瞳子黑大者爲烏風勞水動故宜服車前空青丸以消息之若眼忽爾赤痛者此是天行眼痛風熱所作故應宜早急療之不者當生於瞖後難療若人眼痛當黑珠生白瞖并黑子等大如米如此之者名爲痛損眼此不易可療勿輕犯觸但眼因破損看物橦作瞖障瘢痕者悉不可療亦無勞措意

眼將節謹慎法一首

謝道人曰五行云肝者眼家之根本此乃一家之同類而言無實五藏六腑悉皆相連故欲療眼而審其虛實察其由起既識病源宜先作內療湯丸散煎事事分明既服諸藥便須依方謹慎凡欲療眼不問輕重悉不得涉風霜雨水寒熱虛損大勞并及房室飲食禁忌悉不得犯若虛勞冷者宜服補肝丸出千金翼第十卷十五味在此卷下也若人患眼不值明師遇遭姑嫂嫗欺詐妄語云犯神鬼或以環鈎或復蒜熏或火燒杵熨此皆不識病源而逆療包陰陽爲益實微動致傷余見此途內懷稔疑學療之者勿習是方非直疾勢不除亦自奇成蠱道此法中文句未全別本挍

眼暴腫痛方一十首

謝道人療眼暴腫毒痛不可忍欲生瞖方

決明子一升　石膏四兩研　升麻四兩切　梔子人一升肥精者

湯丸散煎針灸禁慎以驅疾勢若眼自闇多時不復可療此疾之源皆從內肝管缺少眼孔不通所致也亦宜須初欲覺時即須速療之若已成病更不復可療亦無勞措意也若因時病後得眼生白障者此名爲瞖也爲熱毒所作宜應速服湯丸依法鎌之傅食瞖散若因病後生肉者此爲膚障也此是風熱所作宜服湯丸鉤割除之若眼赤痒淚出者爲熱虛風服散煎除之若見黑煙赤光瞳子黑大者爲烏風勞水動故宜服車前空青丸以消息之若眼忽爾赤痛者此是天行眼痛風熱所作故應宜早急療之不者當生於瞖後難療若人眼痛當黑珠生白瞖并黑子等大如米如此之者名爲痛損眼此不易可療勿輕犯觸但眼因破損看物橦作瞖障瘢痕者悉不可療亦無勞措意

眼將節謹慎法一首

謝道人曰五行云肝者眼家之根本此乃一家之同類而言無實五藏六腑悉皆相連故欲療眼而審其虛實察其由起既識病源宜先作内療湯丸散煎事事分明既服諸藥便須依方謹愼凡欲療眼不問輕重悉不得涉風霜雨水寒熱虛損大勞并及房室飲食禁忌悉不得犯若虛勞冷者宜服補肝丸出千金翼第十卷十五味在此卷下也若人患眼不值明師遇迺姑嫗欺詐妄語云犯神鬼或以環鉤或復蒜熏或火燒杵熨此皆不識病源而逆療包陰陽為益實微動致傷余見此途内懷矜愍學療之者勿習是方非直疾勢不除亦自奇成蠱道此法中文句未全別本校

眼暴腫痛方一十首

謝道人療眼暴腫毒痛不可忍欲生瞖方

決明子一升 石膏四兩研 升麻四兩切 梔子人一升肥精者

地膚子　茺蔚子各一升　苦竹葉切一升　乾藍葉切一升

芒消二兩　春車前草汁一升二合　冬瓜子三升為末

右十一味以水二斗煑竹葉取七升二合去滓内諸藥煑取四升分為四服每服相去可兩食間再服為度小兒減藥以意裁之

又療眼暴腫痛方

苦竹葉切一升　柴胡二兩　蛇銜二兩　黃連

白芒消　細辛各一兩

右六味切以水三升煑取一升去滓溫服之忌猪肉

又方

秦皮　黃連各一兩　苦竹葉切一升

右三味切以水三升煑取八合洗眼與前方相類眼忽腫■痛者須煑秦皮作湯洗是主療也忌猪肉

又方

細辛　蕤核人　盧鹽各一兩　決明子二兩

右四味切以地骨汁煑取一升半去滓更以蜜一升半合煎取一升半與前方同

又療眼天行暴腫痒痛方

地骨皮三斤切

右一味以水三斗煑取三升絞去滓更內鹽二兩煎取一升傅目或加乾薑一兩

又方

決明子二兩 [illegible]　芍藥　青葙子各二兩　決明子

細辛二兩　車前子五合　梔子四兩　芒消二兩

淡竹葉一升切

右九味切以水九升煑取三升温分爲三服忌生菜

地膚子　茺蔚子各一升　苦竹葉切一升　乾藍葉切一升

芒消二兩　春車前草汁二升一合　冬瓜子三升爲末

右十一味以水二斗煑竹葉取七升二合去滓內諸藥煑取四升分爲四服每服相去可兩食間再服爲度小兒減藥以意裁之

又療眼暴腫痛方

苦竹葉切二升　柴胡二兩　蛇銜二兩　黃連

白芒消　細辛各一兩

右六味切以水三升煑取一升去滓溫服之忌猪肉

又方

秦皮　黃連各一兩　苦竹葉切一升

右三味切以水三升煑取八合洗眼與前方相類眼忽腫■痛者須煑秦皮作湯洗是主療也忌猪肉

明子■■

又方

細辛　蕤核人　盧鹽各一兩　決明子二兩

右四味切以地骨汁煑取一升半去滓更以蜜一升半合煎取一升半與前方同

又療眼天行暴腫痒痛方

地骨皮三斤切

右一味以水三斗煑取三升絞去滓更內鹽二兩煎取一升傅目或加乾薑一兩

又方

前胡三兩　芍藥　青葙子各二兩　決明子

細辛二兩　車前子五合　梔子四兩　芒消二兩

淡竹葉切一升

右九味切以水九升煑取三升溫分爲三服忌生菜

又方

半夏一升洗 生薑八兩 前胡四兩 枳實二兩炙

細辛一兩 烏梅七

右六味切以水七升煮取二升半温分爲三服忌羊肉餳生菜

又方

甘草一兩炙 粟米三合無以食米代 甘竹茹雞子大 蘆根五兩

右四味切以水八升煮取二升七合分爲三服忌海藻菘菜

又療兩眼痛大黃湯方

大黃四兩 芍藥五兩 細辛 甘草炙各四兩

黃芩二兩

右五味切以水七升煮取二升半温分爲三服甚妙忌海藻

菘菜生菜

又方

大黃切八兩

右一味以水五升漬之一宿明旦絞取汁分三服之病甚多因

脾實以上忌油膩生冷房室蒜菜酒麪等物

目赤痛方二十一首

病源凡人肝氣通於目言肝氣有熱熱衝於目故令赤痛出第

二十八卷中

廣濟療目赤痛及胎赤方

以蜯蛤裹置蜜二分鹽碌一分夜卧火炙煖著目皆三

四日差止

又方

猪膽和鹽碌五分點眥効

深師療眼赤痛除熱黃連煎方

黃連半兩 大棗一枚擘

右二味以水五合煎取一合去滓展綿取如麻子注目日十夜再忌猪肉

集驗療目赤痛方

甘竹葉二七片 烏梅四兩擘 大錢三文

右三味以水二升洗漬藥半日早向東竈煮之三沸三上三下取二合臥以注目眥

又療目赤痛洗眼方

蕤核人二十枚碎 苦竹葉一把 細辛半兩切

右三味以水三升煮取半升以洗眼日三五度甚妙忌生菜

删繁療眼赤洗眼竹葉湯方

淡竹葉五合切 黃連四兩切 青錢二七文 大棗二七枚去皮核

梔子人七枚 車前草五合切

右六味以水四升煮取二升以洗眼目六七遍此方甚良忌

猪肉

千金療眼赤闇方

杏未熟時杏人汁一合　鹽五兩　青錢三文

右三味合内瓷器中封頭勿令泄百日後出著四眥頭日二

三不避風冷良

千金翼療赤眼方

杏人四十九枚去皮末之絹袋裹飯底蒸之承熱

絞取脂以銅青胡粉各如大豆乾薑石鹽各如半大

豆許熟研之以雞毛沾取掠眼中眥頭日二度不過

三差至夜再

又方

杏人脂一合　鹽碌如棗核大　印成鹽三顆

右三味取杏人脂法先擣杏人如脂布袋盛蒸絞取脂置瓷

器中內諸藥直坐著其中密蓋二七日夜卧注目四眥不過七度差止

又療赤眼不問久近方

硇砂三兩以酢漿㙈器中浸日中暴之三日藥著器四畔乾者取如粟大夜著兩眥不過三四度永差并石鹽石膽等分尤佳並出第十一卷中

張文仲療兩眼熱赤方

東壁上土帛細羅內如豆大兩眥中令渡出三五度即差常用大効肘後同

又傳効療眼赤無新久皆差神驗方

石鹽棗核大人乳一棗許置故銅梡中以古錢一文研之使青稠著梡底取熟艾急搏一雞子許掘地作小坑子坐艾於坑中燒使煙出以銅梡覆上以土擁

四邊勿令煙出量艾然盡即止刮取著椀青藥每以半豆許於蛤蜅中和棗核大人乳汁研細以綿纏杖頭注入兩眥夜即仰卧著之至五六度必差無石鹽以白鹽無古錢以青錢替之亦得肘後同

延年療眼赤熱不能得好差此由肝中客熱不絕方

黃連三兩　秦皮三兩

右二味切以水三升煑取一升五合去滓食後温服分二服如人行七八里服必効同禁蒜麪猪肉

又療眼赤飲方

前胡　黃連　秦皮　黃芩

梔子人各二兩打碎　決明子二兩半　蕤人二兩碎　竹葉切一升

右八味切以水六升煑取二升五合去滓分三服食後服之忌猪肉

又療眼赤方

蕤人　黄芩　梔子人　黄連

秦皮各二兩　竹葉切一升

右六味切以水五升煑取一升六合分三服忌猪肉

又療目赤熱方

前胡三兩　防風　決明子　黄連

蕤人各二兩　竹葉切一升

右六味切以水六升煑取二升分爲五服忌猪肉

又竹葉飲主淡熱眼赤頭痛方

竹葉一握　犀角屑　升麻　乾葛各二兩

黄芩　麥門冬去心各三兩

右六味切以水六升煑取二升分爲三服

又方

竹葉一握切　麥一升淘　地骨白皮三分切

右三味以水五升煮取二升以麥熟爲度食後分二服蔣孝璋處此方

近效療眼赤痛眼漠漠方

消石研末於眼四角各點一粟許須臾熱淚出便睡睡覺以漿水洗又明目

又療赤眼及眼睛上瘡方

秦皮一大兩以清水一大升於白瓷椀中浸春夏一食久以上看碧色出即以筋頭纏綿點下碧汁仰卧點所患眼中仍先從大眥中滿眼著微痛不畏量久三五度飯間即側卧瀝却熱汁每日十度以上著不過兩日差忌酢蘿蔔李諫議近效方

又勑賜源乾曜療赤眼方

生石蜜　朱砂（光明者）　石鹽　芒消
鹽碌　石決明（去麤皮細研各六分）　蕤人（三百顆）　黃連（宣州者）
細辛（各一兩）　烏賊魚骨（長二寸去甲）
右十味擣篩細研欲著時少少取白蜜和置眼兩大角中如菉豆許大仍不避風日唯破及枯除此並差萬金不傳忌猪肉生菜

胎赤久赤方七首

病源胎赤者是人初生洗目不淨令穢汁浸漬於眼使瞼赤爛至大不差故云胎赤出第二十八卷中

千金療胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子以木研之至瞑止取夜卧時以塗向眥日三度差止

崔氏療三五十年眼赤并胎赤方西域法太常丞呂才進効

生烏麻油半雞子許著銅器中以細礪石磨之使述述不能研乃止　熟艾三升

杏人一升去尖皮　黃連一兩　雞糞一升　鹽一合

亂頭髮如半桃許大

右七味穿一坑其形如瓶口小裏大燒使乾別開一小風孔以前藥并艾等一重重布著坑内狀如炙灶以火燒之將前所磨銅器以蓋坑口煙盡收取銅器上脂煙傅眼眥瘡上欲卧時著胎赤三十五十年者不過三兩日差忌猪肉

又方

胡粉六分　蕤人四分

右二味先研蕤人使碎内胡粉中更熟研又擣生麻子爲燭然使著別取猪肪脂於燭燄上燒使脂流下滴入蕤人胡粉中更研攪使均如餳以綿纏細杖子内藥内承軟點眼兩眥

藥須臾冷還於麻燭上燒而用之

又療積年赤眼方

取古字錢四十九文重著又取石鹽末填心孔中令滿以五月五日中於石上用烈炭火燒令極赤然後內一升醶酢中以傾甖內用四十九重紙封一日去一重去盡然後用黍米大點眼眥中極効並出第四卷中

必効主眼風赤久赤胎赤方

銅鍃鑼一尺以下面者一枚著石鹽末如杏人許油脂半雞子許相和合鹽取柳枝如著一握急束齊一頭用研油脂三日狀如墨取熟艾如雞卵大剜地作小坑置几於下安艾著火合銅鍃鑼於上其下仍令通氣火盡即成常蓋頭欲用時以綿纏杖子頭點取藥著兩眥頭每夜著即卧蘇六方云頓用甚効

又療積年風赤眼方

取生油生猪脂胡粉各等分和研傅眼中二日内赤揔除

救急療久患風赤眼方

黄連一小兩碎 肥大乾棗兩顆去核細切 印成鹽兩大豆許

右三味以井花水半大升内前件藥攪緩火煑三分去一以綿濾使盡其餘汁更緩火煎之候藥上有紫液起即是更煎以物盡刮取於合内貯之勿使塵污取用一度取二大豆許以人乳和之置兩眼眥頭從淚出每著苦人咽喉即停積年患赤眼者不過五度即差及風胎赤皆差亦不勞避風每欲出時口含鹽水以洗之甚良忌猪肉

目暴卒赤方六首

肘後葛氏療目卒赤痛方

又方

以鹽湯洗之

又方

燒荆木出黃汁傅之

竹葉 黃連各一兩 錢二七枚

右三味以水三升煎取二合綿染傅眥日五六度忌猪肉

並出第二卷中

深師療眼忽赤痛方

鯉魚膽一枚 黃連二十一枚碎

右二味和淹於飯下蒸之熟去滓塗目眥五六度愈忌猪肉

必効療眼暴赤方

雞舌香二七枚 乾棗二七擘 黃連二七枚碎

右三味以水半大升煎五六沸澄取清點目中惣差多著

令人目明韋丞傳之忌猪肉

又目暴赤熱毒方

蕤人一分擣成膏　吴黄連一分　雞子白一枚

右三味以綿裹二味内雞子白中漬一宿塗眼四五度厚則洗之

目痒方四首

肘後療目卒痒且痛方

削乾薑令圓滑内眥中有汁拭薑復内之未盡易之姚同

又風目常痒瘥出方

以鹽注眥中差止

文仲療眼暗及風赤痒方

煎成白鹽三匙　烏賊魚骨四枚去甲

右二味以清酢漿水四升煎取二升澄清每旦及晚洗眼亦去膚肉單鹽漿水煎之洗亦佳

又療風痒赤方

黃連（半兩碎） 丁香（二七枚碎） 蘗皮（半兩切） 蕤人（三七枚碎）
錢（七文古者）

右五味以水二升煎取一升去滓綿纏杖點取著眼角差止肘後同忌猪肉

目中風腫方五首

病源目爲肝之外候肝虛不足爲冷熱所干故氣上衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令瞼內結腫或如杏核大或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫出第二十八卷中

肘後療目中風腫弄眼方

礬石（二錢熬末）

右一味以棗膏和如彈丸以磨目上下食頃止日三姚同（磨一作柔）

又方

取頭垢著眥中亦得

又方

枸杞根白皮　伏雞子殼

右二味等分擣爲末著目上

范汪療目中風腫痛方

取薤白刀截仍以膚上令遍漠皆差薤頭辛痛者止之

集驗療目中腫痛方

擣枸杞汁洗之日六七度肘後同（深師療眼有熱生瞖）

眼熱磣痛赤腫方三首

删繁療眼熱眥赤生赤脉息肉急痛閉不得開如芒在眼磣

痛大棗煎方

大棗十顆去皮核　黃連二兩去毛棟擇須如金色者碎綿裹　淡竹葉五合切

右三味以水二升煎取一升澄取八合下棗黃連煎取四合去滓綿濾細細點傅眼中忌猪肉

又連前草湯洗方

車前草切半升　乾藍五合　淡竹葉三兩

右三味切以水三升煑取二升綿濾去滓用上好鹽半刀圭內湯中攪令調取冷細細用洗眼一刀圭者準丸如兩大豆大

必効同

張文仲療眼暴赤腫磣痛不得開淚出方

黃連　黃蘗　蕤人　鹽綠

芒消各等分

右五味擣篩和如黍米大內眥中忌猪肉

眼闇令明方一十四首

千金論曰凡人年四十五十以後漸覺眼闇至六十以後還漸目明療之法五十以前可服瀉肝湯五十以後不可瀉肝目中病可傅石膽散藥等無病不可輒傅散但補肝而已目病肝中有風熱令人眼闇者當灸肝俞五百壯穴在明堂部中及服除風湯丸散數十劑當愈也

凡生食五辛接熱食飲刺頭出血過多極目遠視夜讀細書不避煙火博弈不休日沒後讀書飲酒不已熱飡麪食抄寫多年雕鏤細作泣淚過度房室無節數向日月輪看夜遠視星火月中讀書雪山巨晴視日極目瞻視山川草木

右十九件並是喪明之由養性之士宜熟慎之又有馳騁田獵冒涉霜雪迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意爲百年之痼疾可不慎歟可不慎歟凡人從少時不自將慎年

至四十即漸漸眼闇若能依此將慎可得白首無他所以人年四十已去當須瞑目非有要事不可輒開此之一術護慎之極也其讀書博弈等過度患目者名曰肝勞若欲療之非三年閉目不覩不可得差徒自瀉肝及作諸療終是無効也人有風疹多必眼闇先攻其風而闇自差出第六卷中

廣濟主令明目方

三月中取新杏人研脂絞取汁一升石鹽兩大豆大銅器盛之取銅古錢二七文浸之二七日綿注目中夜洗眼用出第五卷中

小品療眼漠漠黃連洗湯方

黃連二兩 秦皮二兩 蕤人半兩

右三味㕮咀水三升煑取一升半絞去滓適寒温以洗目日四五度又加升麻二兩加水煎之忌猪肉

集驗明目令髮不落方

十月上巳日取槐子內新甖中封口三七日洗去皮初服一枚再服二枚至十日服十枚滿十日却從一起千金云從月一日一枚二日二枚每日加一枚計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減去十枚此藥主補腦早服髮不白好顏色長生舊病冷人勿服

刪繁療肝虛寒目䀮䀮視物不明諦視生花防風補煎方

防風 細辛各二兩 芎藭 白鮮皮
獨活各三兩 甘草炙 橘皮去脉各二兩 大棗二七枚去核
甘竹葉切一升 蜜五合

右十味切以水一斗二升煑取四升去滓下蜜更煎兩沸分為四服日三餘一服若是五六月燥器貯冷水藏之忌海藻菘菜生菜千金崔氏同

千金補肝散療男子五勞七傷明目方

地膚子一斤陰乾　生地黃七斤取汁

右二味擣地膚末和汁暴之令乾更擣爲散酒服方寸匕日三

又方

白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍訖以酢五升漬一宿暴乾擣下篩酒服方寸匕日三久服佳

又神麴丸主明目百歲可讀細書方

神麴四兩　磁石二兩燒研　光明朱砂一兩研

右三味末之蜜和丸如梧子飲服三丸日三常服益眼力衆方不及學者須知此方神驗當寶祕之忌生血物並出第六卷中

千金翼瀉肝湯主藏中淡實熱衝眼漠漠闇方

苦竹根八兩　半夏四兩洗　乾藍　茯苓

枳實炙 白朮各三兩 杏人一兩去皮尖熬 乾地黃二兩

細辛二兩 甘草二兩炙

右十味切以水一斗二升煮取二升七合分三服忌羊肉餳酢物海藻菘菜生菜蕪荑桃李雀肉等

又補肝丸主明目方

地膚子 藍子 蒺藜子 車前子

瓜子 菟絲子 茺蔚子 青葙子各二合

決明子五合 細辛 桂心 螢火蟲各三分

大黃八分 黃連六分

右十四味擣篩蜜和爲丸如梧子飲服十五丸日三加至三十丸忌熱麪生冷酢滑油蒜猪雞魚蕎麥黃米生葱生菜眼暗神方

又主眼闇方

蔓菁子一升淨洗

右一味以水四升煑自旦至午去汁易水又煑至晚去汁易水又煑至旦暴乾以布袋貯之一度擣三升以粥飲服三方寸匕日三服美酒等任性所便並出第十一卷中

延年令目明方

波律香取黍米一粒内目眥中當有水出并目中習習然引風出此即明之候也常以日申時傅之若似痛以冷水洗之即定以申時傅藥者爲其目至日下便漠漠暗如有物即以藥内中渡出以熟帛拭之以水洗訖便豁然明也此香以單主百病服之益人勝石乳也本云是外國用之明目甚驗天竺沉香中出此

必効主眼湯去熱氣漠漠視物不見并翳方

秦皮　黃蘗皮　蕤人各三分　細辛二分

肉魚

茺蔚子三分 黃連四分 古銅錢七文

右七味切以水二升煑取八合平旦洗目忌生菜

又青葙子丸主眼風闇有花方

青葙子 槐子 覆盆子 地膚子

菥蓂子 車前子各五分

右六味擣篩蜜和丸如梧子日服十五丸忌五辛猪雞牛羊

肉魚 蒜麪酢

近効療眼中一切諸疾青盲瞖天行風冷熱胎赤淚出常瞙瞙不多

見物唯不療睛破餘悉主之方

石膽一兩蒲州解縣出光明者 波斯鹽綠一兩色青陰雨中直黏不濕者是

眞石鹽二兩 硇砂二分以上四味各別研 烏賊魚骨一兩去上甲別研

蕤人三兩別研 秦皮三兩 馬蹄決明二兩七孔者仍以煖水刷洗去上細皮數過用

細辛一兩 防風三兩 鈆丹一兩 黃連三兩連珠者

右十二味草石藥合擣篩唯似粉仍以重絹羅重篩訖以
白蜜於火上微煖去上沫取下清者加之作塊更擣千杵以
油臈紙裹之亦取瓷瓶子盛貯勿使見風可得多年不敗每
欲著以兩米許硬和少許蜜稀稠如熟麪胡荽子頭分置兩
眼眥至夜仰卧枕之合眼至明不漱口含清漿和一豆許鹽
鹽消吐洗眼不避風日未差之前忌食麪羊肉醬果子葷辛
生菜虀汁苜蓿萵苣麞鹿惟羊頭蹄肝冷鹽下餘並不
得至著後復更七日慎之過此一任喫食每日一度著藥
甚妙

失明方六首

肘後療積年失明不識人方

七月七日取蒺藜子陰乾擣篩食後服方寸匕

深師療失明主一歲二歲三歲四歲拭目中無他病無所見如

絹中視決明散方

馬蹄決明 升二

右一味擣篩以粥飲服方寸匕忌魚蒜猪肉辛菜

千金補肝散療目失明漠漠無所見方

青羊肝一具去上膜薄切之以新瓦盆子未用者淨拭之内肝於中炭火上炙令極燥脂汁盡取之別擣決明子半升蓼子一合熬令香下節三味合和更節以飲汁食後服方寸匕漸加至三匕不過兩劑能一歲服可夜讀書

又補肝散療三十年失明方

細辛 鍾乳研 茯苓 雲母粉

遠志去心 五味子

右六味各等分擣作散飲服五分匕日三加至一錢匕忌生

菜大酢

又方

胡麻一石蒸三十遍末之日服一升良

又方

三月採蔓菁花陰乾末之空腹以井花水服方寸匕久服長生目明可夜讀細書並出第六卷中

青盲及盲方六首

病源青盲者謂眼本無異瞳子黒白分明直不見物耳但五藏六腑之精氣皆上注於目若藏虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱但内生鄣是腑藏血氣不榮於睛故外狀不異只不見物而巳是謂之青盲養生方云勿塞故井水瀆令人耳聾目盲

又云正月八日沐浴除目盲出第二十八卷中

深師療青盲方

猪膽一枚一味微火煎之可丸如黍米內眼中食頃良

又黃牛肝散療青盲積年方

黃牛肝一具 土瓜根三兩 羚羊角屑三升 蕤人三兩

細辛六兩 車前子一升

右六味藥合肝於瓶中春夏之月封之十五日冬月封三十日出暴乾擣下篩酒服方寸匕忌肥肉魚五辛生菜等

又療肝藏病眼青盲內或生障惡風赤痛補肝散方

乾薑六分 甘遂三分 桂心 茯苓

附子炮 黃連 甘草炙 當歸

乾漆熬 貝齒燒 猪苓 白朮各五分

乾地黃八分 丹參六分 防風七分 黃耆六分

右十六味爲散酒服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等

又療肝氣之少眼視䀮䀮面目青眼中眵淚不見光明調肝散方

細辛　柏實各二兩　蕤人　甘草各一兩炙

羊肝一具去脂膜炙乾

右五味擣爲散以酒服方寸匕甚良忌海藻菘菜生菜

又療眼盲腦痛方

鯉魚腦并膽等分調以注目眥日三良肘後療雀目

必効蔓菁子散主青盲瞳子不壞者主十得九方

蔓菁子六升蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之即暴乾如是三度訖擣篩清酒服二方寸匕漸至加三匕陰雨日勿合散壞百日尅愈神効甚良

雀目方四首

病源人有晝而睛明至暝則不見物世謂之雀目言其如鳥雀暝便無所見也出第二十八卷中

廣濟療雀目地膚子丸方

地膚子五兩 決明子一升

右二味擣篩米飲和丸每食後以飲服二十丸至三十丸

又雀目至暮無所見者柏皮散方

老柏白皮四兩 烏梅肉二兩熬 細辛 地膚子各四兩

右四味擣篩爲散每食後清酒服二方寸匕日三四服差

崔氏療雀目方

七月七日九月九日取地衣草淨洗陰乾末之酒和服方寸匕日三服一月即愈出第四卷中

千金翼療眼暮無所見方

猪肝一具細切以水一斗煑熟置小口器中及熱以目臨上大開勿閉也冷復温之取差爲度出第十一卷中

目膚瞖方一十五首

病源陰陽之氣皆上注於目若風邪痰氣乘於腑藏腑藏之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚瞖膚瞖者明眼睛上有物如蠅翅者即是又此言肝藏不足爲風熱之氣干之故令目睛上生瞖瞖久不散漸漸長侵覆瞳子出第二十八卷中

深師療眼瞖方

胡粉注瞖上以療三年瞖

又療眼黑瞖覆瞳子膚起方

貝子四枚燒 空青一兩 礬石一兩熬汁盡

右三味末取如黍米注瞖上日二

又主眼瞖方

書中白魚末注少許於瞖上

千金療目赤及瞖方

烏賊魚骨去甲 鉛丹等分合研細和白蜜如泥蒸之半

食乆著少許四眥中差

又去瞖方

貝齒十枚燒 細篩末取胡豆著瞖上日再正仰卧令人傅之炊一石米久乃拭之息肉者加真珠如貝子分等研如粉

又療目瞖鄣白膜落方

雄雀屎人乳和研以傅上當漸漸消爛良妙肘後并翼同

又洗眼湯療熱出攻眼生鄣瞖方

秦皮 黃蘗 決明子 黃芩

黃連各三分 蕤人五分 梔子人七枚 大棗五枚

右八味切以水一廾煑取六合洗目日二差忌猪肉

千金翼眞朱散主白瞖覆瞳睛不見物方

炭

光明朱砂二分研 貝子五枚燒末之 白魚七枚炙 乾薑末分

右四味擣爲末相和研之如粉以熟帛三篩之仰卧遣人以小指爪挑取少許將傅眼中亦主白膚瞖風淚忌生血物

又七寶散主目瞖經年不愈方

白真珠一分 珊瑚一分 紫貝一分 馬珂一分

朱砂二分 琥珀一分 蕤人二分 決明子一分

石膽一分

右九味擣下篩極細傅目中如小豆日三大良忌生血物並出第十一卷中

崔氏療瞖五十年不差方

貝齒一枚燒 豆豉三十枚 三年苦酒三升

右三味先漬貝齒三宿消盡力內豉微火煎如膠取三合藥置筒中夜卧時著如小麥大於瞖頭明日以湯洗之十

日愈

又療眼中瞖少輕者方

取枸杞及車前子葉分等手中熟挼使汁欲出又別取桑葉兩三重裹之懸於陰地經宿乃摘破桑葉取汁細細點目中不過三五度瞖自當爛

又瞖如重者方

取楮白皮暴乾合作小繩子如麤釵脚許火燒作灰待冷隨便以灰點瞖上不過三五度瞖自當爛張右司送並出第四卷中

延年療眼熱暈白瞖覆瞳子方

車前子九分　決明子　黃連各九分　黃芩
秦皮　玄參　沙參　瞿麥
地骨皮　蕤核人各七分　藍實九合

右十一味擣篩蜜和丸如梧子食後飲服二十丸漸加至三十丸差止爲度忌豬肉

謝道人療眼瞖欲盡微微猶有者傳此散方

珊瑚　虎珀　玉屑　曾青

紫貝　朱砂　伏雞子殼去白皮

右七味各等分研重篩爲散仰卧以米許置瞖上四五度忌血物

暈瞖方四首元本闕病源

延年主眼熱暈瞖覆瞳子方

柴胡三兩　茯苓　枳實炙　決明子

瞿麥各三兩　黃連別漬　甘草炙　蕤人各二兩

右八味切以水一斗煑取二升七合去滓分再服忌海藻菘菜豬肉酢物

黃連　決明子　車前子各九分　黃芩

沙參　人參　地骨皮　蕤人

瞿麥　茯神各七分　秦皮　甘草

澤瀉各五分

右十三味擣篩蜜和爲丸如桐子飲服二十丸日再服爲度

又療眼因赤差後翳暈方

決明子六兩碎　黃連　蕤人各六兩　黃蘗四分

鹽綠三分

右五味擣末更研極細取少許内目中日三四度忌猪肉

又方

秦皮一兩切

右一味以水一升五合煮取七合澄清決明用漬散内目中

一如前法並出第四卷中

生膚肉肉方八首 元本闕病源

肘後療目中生肉稍長欲滿目及生珠管方

貝齒　眞珠分等

右二味並研如粉拌令和以注肉上日三四度良

小品療眼膚肉生覆瞳子者方

取針燒令赤爍著膚上不過三爍縮也有令人割之三復生不如爍之良

刪繁療肝熱不止衝眼爲眥赤脉息肉閉痛不開但熱勢彭彭不歇及目睛黃洗肝乾藍飲方

乾藍切　車前子　苦竹葉切各三升　秦皮三兩

細辛　決明子　蕤人　山梔子

升麻　芍藥各三兩

右十味切以水二斗煮乾藍取一斗去滓取清八升煮藥取

一升下芒消三兩沸去滓分再服忌生菜

千金療眼中息肉方

驢脂石鹽末和以注眥即差

千金翼礬石散主目瞖及努肉方

礬石上上白者內如黍米大於瞖上及努肉上即令淚出以綿拭之令得惡汁盡日一其疾逐惡汁盡日日漸自薄便差好上上礬石無過絳礬色明淨者慎如

療眼常法

崔氏療人眼熱冷膚肉瞖方

光明朱砂一兩研 硇砂一兩各大秤研 漿水一大升

右三味以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀子刮取以新帛裹之每夜眠時以草筳著一米許安眼四眥各一米盡一月間內外暗者皆愈忌生血物出第四卷中

必効療眼熱努肉及赤痒方

黃連一兩碎　竹葉一兩切

右二味以水一升半煎取半升置銅器中湯上煎似稀餳止卧時點眼中熱淚出即差止

謝道人療眼風熱生赤肉方

大黃二兩　黃芩一兩　甘草炙　人參

地骨白皮　決明子各三兩　防風　石膽

地膚子　黃連　兎肝各一兩　車前子一升

螢火蟲一百枚

右十三味擣篩爲散以鯉魚膽一合和丸飲下十五至三十丸忌猪肉海藻菘菜

目風淚出方六首

病源目爲肝之外候若被風邪傷肝肝氣不足故令目淚出其

湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以鼻內氣左手持鼻除目暗泣出又云端坐生腰徐以鼻內氣以手持鼻除目暗淚出又夫五藏六腑皆有津液通於目者爲淚若藏氣不足則不能收制其液故目自然淚出亦不因風而出不止本無赤痛並出第二十八卷中

深師療眼淚出雞舌香丸方

雞舌香二銖　黃連六銖　乾薑二銖　蕤人一百枚

礬石二銖熬

右五味擣爲末以棗膏和丸如雞距以注眼眥忌猪肉

又療眼白瞖淚出雞距丸方

乾薑三分　蕤人三十枚　雞舌香十枚　黃連二銖

胡粉四銖　礬石五銖熬

右六味擣末以棗膏丸如雞距注眼大眥日再忌猪肉

又療風淚出眼痒痛散方

貝齒燒十枚　决明子　黄連　細辛

乾薑各一分

右五味擣下篩以指瓜取如麻子注眥中日再三夏月加乾薑一分眼痛以三指撮二合水煑三沸去滓以汁洗之良何漢壽用甚有効驗忌生菜猪肉

集驗療目中風寒淚出眥赤痒乳汁煎方

黄連三分　蕤人二分　乾薑四分

右三味擣散以乳汁一升漬藥一宿明旦於微火上煎得三合綿絞去滓取如米内眥中

崔氏療目淚出方

苦酒一斗　古錢一百五十文

右二味以苦酒漬錢微火煎取三升去錢濾取汁更煎取

七合漸漸點著眥中甚良

又療目中煙㾓出不得開即刺痛方

取石鹽如大豆許用內目中習習去鹽以冷水洗數

日差並出第四卷中

眯目方八首

廣濟療眯目氈帶灰方

取少許氈帶燒作灰水服方寸匕立出肘後同

又療眯目不出涇膚瞿麥散方

瞿麥　乾薑各二分

右二味爲散以井花水服方寸匕日三不過三眯出

又療眯目豬膏塞鼻方

以豬膏如半雞子裹鼻孔中隨眯左右著鼻中以

噏之即便仰卧須臾不知眯處

又麥芒入目不出方

煑大麥汁注眼中即出良

肘後療目萃芒草沙石輩眯不出方

磨好書墨以新筆點注目中瞳子上

又方

鹽豉各少許著水中臨目視之即出並出第一卷中

深師療目痛及眯忽中傷因有熱瞑者方

取地膚白汁注目中

千金翼主眯目不明方

椎羊鹿筋擘之如被筋法内筋口中熟嚼擘眼内著瞳子瞼上以手當瞼上輕挼之若有眯者二七過挼便出之視眯當著筋出來即止未出者復爲之如此法常以平旦日未出時爲之以差爲度出訖

以好蜜注四眥頭鯉魚膽亦佳若數挼目痛可間日挼之出第十一卷中

肝氣不足方二首

千金翼補肝湯主肝氣不足兩脅拘急痛寒熱目不明并婦人心痛乳癰膝脛熱消渴爪甲枯口面青方

甘草炙 防風各三兩 烏頭二兩炮 大棗二十枚 細辛 柏子人 茯苓各二兩 蕤人 桂心各一兩

右九味切以水八升煑取三升分爲三服忌海藻菘菜猪肉生葱菜酢物

又補肝湯主肝氣不足方

甘草炙 黄芩 人參 桂心各二兩

右四味切以水六升煑取二升分三服忌海藻菘菜生葱

肝實目痛方二首

刪繁療肝實熱目痛胷滿急塞瀉肝前胡湯丸方

前胡　秦皮　細辛　梔子人

黃芩　升麻　蕤人　決明子各三兩

芒消三兩　苦竹葉切一升　車前草切一升

右十一味切以水九升煑取三升去滓內芒消分爲三服千金同忌生菜

又療肝實熱或眼痛熱不止生地黃煎方

生地黃汁一升　玄參汁五合　蜜五合　車前汁五合

升麻　細辛各二兩　芍藥　梔子各三兩切

右八味切以水五升煑升麻等四物取一升五合去滓下生地黃等汁蜜沸沸分五六服忌生菜蕪荑

眼雜療方二十首

廣濟療客熱衝眼赤痛淚出決明湯方

決明子　升麻　枳實炙　柴胡

黄芩　芍藥各二兩　梔子十四枚　竹葉切一升

車前草切四升　甘草一兩炙

右十味切以水九升煮取二升五合去滓内芒消温服分爲

三服忌海藻菘菜

又療先服石熱衝上眼赤方

黄連　苦參　槐子各八兩　蕤人

決明子　黄芩各五分　麥門冬六分去心　萎蕤

大黄各六分

右九味擣篩蜜和丸如梧子食後以蜜水下二十至三十丸忌

猪肉

肘後療目卒痛珠子脱出及有青瞖方

越鷰矢　眞丹　乾薑各等分

右三味末如粉以少許著目中瞖上良妙

小品療眼風結腫合或眼生瞖人口吹之睛中牽引疼痛白睛赤起出或黑變黃從下上覆半睛者秦皮湯方

秦皮洗　黃連各二分　黃蘗三分　大棗五枚

蕤人二分

右五味切以水二升煑取一升以洗眼忌猪肉

集驗療眼闇熱病後失明方

以羊膽傅旦暮各一

又療風眼爛眥者方

竹葉四分　柏白皮六分　黃連四分

右三味切以水二升煎取五合稍稍滴兩眥日三度忌猪肉

删繁療肝陽氣伏邪熱喘逆悶恐眼視無明狂悸非意而言

竹瀝泄熱湯方

竹瀝一升 麻黃 大青 梔子

人參 玄參 升麻 茯苓

知母各三兩 石膏八兩碎 生薑四兩 芍藥四兩

生葛八兩

右十三味切以水九升煮取二升去滓下竹瀝更煎三五沸

分三服忌酢物

千金翼蕪菁子主明目益飢膚方

蕪菁子三升淨淘高著水煮二十沸出著水盆中淘

之令水清接取以別釡煮之水盡即添益時甞看味

美漉出暴乾

右一味擣末酒飲等任意和服三方寸匕日惟服七合飽食

任性酒服即服無限時慎生冷百日身熱瘡出不久自差

又療目赤口乾脣裂方

石膏一斤綿裹 生地黃汁一升 赤蜜一升 淡竹葉切五升

右四味以水一斗二升煑竹葉取七升去滓入石膏取一升半下地黃汁蜜取三升細細服之忌蕪荑並出第十一卷中

文仲陶氏療數十歲䁾眼爛眥方

摘葫葉中心一把著鐺中水五升煑用小板覆上穿作孔以目臨上瘡當痛食頃出淚一升便即差

必效朱砂散主人眼中有黑白花逐眼上下方

光明砂六分研 地骨白皮五分 車前子三分 龍腦香六分

決明子五分

右五味擣篩細研如粉少少傅之

近効療熱風暴赤瞼爛生瘡或磣或疼或痒或痛久患虛熱遠視不明喻若隔絹看花或服石乳發動冷熱淚出白睛赤紅腫

脹滿裹眼珠皆是肝膈實熱腎藏已虚宜先服竹葉飲子治之然後可點藥凡患眼有連睛疼痛者皆不得以辛辣藥點之幸請細意詳思不得措手比見投方點藥未曾試驗酸毒不諳各説異能競施衆療微有瘡障似翳者或有庸人不審眼珠厚薄乃將針穿豆爪甲摩之傷敗非一令輙附數方百無一失且服之不令吐利點藥不痛不疼將攝旣有所憑疾苦豈能不愈如前病狀宜服此竹葉飲子除風客熱暴磣澁疼痛睛赤目黄冷淚熱淚兼理石乳天行眼疾方

竹葉一握　乾葛三兩　地骨白皮　薺苨各五兩

甘草三兩炙

右五味切以水二大升煎取半升去滓内車前子三兩分三服一日令盡皆食後服之良不過三劑眼中疼痛歇次得點藥一無疼痛神効前方亦須傅藥抽熱毒風不然恐尋經脉

入眼熱深入亦難差也又取羊肝一具或豬肝亦得豬肉精
處亦堪取三斤皆須破作手許大片厚薄亦如手掌候其疼
處或從眼後連耳上頭或有從眉向上入頭掣痛者火急新
汲水中漬令極冷貼其疼痛脉上及所患部分候肝或肉稍
暖徹則易之須臾間其肝肉等並熟如煮來者豈不是熱毒
之候出也此即損眼之禍又恐三長齋忌之月無肉以大豆
還作四五替如漬肝肉法更互熨之其疼痛忽連鼻中酸辛
者並是難差之候亦宜急覓吳藍莖葉擣如泥傅痛處亦
有差者十得三四凡是此患不宜久忍痛若深入於眼中漸
成痼疾

又療眼睛不疼亦不痛上下瞼赤風痒生瘡淚多者宜點此
藥方

蕤人（四十九枚去赤皮研） 胡粉（如碁子許大上火燒看赤變如金色）

右二味各别研取好眞酥如杏核許大都一處和研令勻入龍腦香如大豆許大三粒報研令消宜油帛裹或銅合子盛之勿泄氣傷風則不堪用或有小兒胎赤並宜用此方且不疼痛亦不損眼大人久患赤痛爛瘡者冝先取鹽花或好白鹽一方寸匕醋漿水不用絶酢中中者一大升煎鹽三五沸則綿濾取汁欲夜卧先以清水洗眼次以鹽湯洗之拭令眼乾次以爪甲挑取麻子許多藥塗眼大小眥佳眼開合湏臾少淚出眼中凉冷狀若人吹不經三日内其赤便差視物漸明恐眼中忽有到睫毛刺眼者速令一人以鑷子摘去之亦令人眼亦淚多磣痛若不除之塗藥終無益耳

又凡目疾不問少長男女等所忌有五一房室二麪酒三目衝風冷霜雪向日遠視四哭泣嗔怒五終身不用喫生五辛蕎麥葵菜若因疾犯者則疾深難療幸細意將慎百無一失故具

五忌也

又療眼赤腫熱疼淚出燒人皮肉不可堪忍或石乳發動連睛疼悶乍歇乍發頭痛增寒臉赤瘡爛無所見物白膜覆黑珠或因天行斑毒入眼無所見者一切藥並不可著唯宜用此法甚驗萬無失一方

千歲虆汁一名蘡薁藤汁也不問春秋冬夏此採其莖削去上蒼皮麤細如大母指大者即得截斷可長六七寸取一銅器或瓷器中盛水三五升漬之一食頃其頭白乳汁出可長半寸許取此汁將

又療眼中一切諸疾青盲瞖者天行風赤無端忽不見物悉主之此方兵部侍郎盧英所傳價重千金

石膽研 波斯 碌鹽石決明研 烏賊魚骨去甲

鈆丹 細辛 濃沙各三分疑 蕤人三兩研

馬蹄決明二兩淨洗 防風三兩末 秦皮二兩末

右十一味擣散及研避風者貢以白蜜鍊濾使淨和訖於臼中更擣五七千杵以油臘紙重裹之重合盛勿令見風可致百年不敗合之不欲見蟲犬與鳥雀婦女及孝子穢惡之類仍取臘月合之有患取米粒更和上蜜如稀餳夜臥點之衝風行亦不畏每日點以差即止夏侯拯處傳

又凡自天行病後皆不得食葵熱麪生五辛蒿麥魚膾毒物傷目就中更犯房室加之疼痛連眉乍疼乍痒鬢邊脉掣微似憎寒愚醫不曉遂妄針灸兼服補藥因茲失明或有先服英乳之人亦同斯疾宜即將理不得妄服湯丸甘苦酸辛須知冷熱只如腎風虛損瞳人脹大無醫而便失明假如肝藏熱風筋膜連睛生薄浮翳宜服甘平苦味之藥辛酸温熱入口發其風毒唯宜傅薄膏散熱氣自除少飲湯方攝理不盈三劑日漸痊愈吐利湯鍼灸不得妄施準狀宜服後方療天行從因犯食毒失明兩鬢脉掣熱疼兼頭痛憎寒天陰即發及先食英乳者方

前胡三兩　生麥門冬五兩去心　竹葉一握　甘草二兩炙

梔子二七枚　乾葛　漏蘆各三兩　萎蕤三兩

右八味切以水二大升煮取一大升分作三服神驗良忌海藻

生菜

又鼴鼠土膏療眼疼脉掣連耳熱疼不可堪者方

取田中鼴鼠土二升 青木香一兩 大黃五兩 白斂三兩

寒水石六兩

右五味擣篩爲散用熟新白酒和如稠餳當痛掣處摩之如手掌許傅之乾即易至平旦午即止神効無比

又眼有倒睫毛或折在瞼中聚生刺人白睛唯覺痒悶漸赤膜起連上下瞼多赤生瘡若掣刺黒睛則淚出似白瞖出若刺著瞳人令眼疼痛磣澁不欲見明連鼻酸痛兼腦掣疼止多損傷宜速救療其法如左

若欲療之者皆取平晨日未出之際令一眼明人把鑷子拔之去倒睫毛勿使毛斷連根去之下手十減八九疼痛立止至夜點前千歳蘽汁三五日將息方

得平復點首生男乳汁良若點辛辢之藥從此傷
敗實可痛哉愼風寒日月光及煙火房室五辛一
月內即差

又凡是黒睛及瞳人瑩薄有瘡瞖皆不可用辛辢及溫藥洗
之並是害眼之兆宜用秦皮湯洗之方

秦皮一兩　梔子人二七枚　淡竹葉一握

右三味切綿裹以水一大升半著銅器中煎三五沸以綿濾
取洗眼切須淨器物盛之夏侯拯錄用

外臺秘要方卷第二十一

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

外臺祕要方

二十三

耳鼻牙齒
脣口舌喉咽

外臺祕要方第二十二 耳鼻牙齒脣口舌喉咽病五十六門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

耳聾方二十二首

病源腎為足少陰之經而藏精氣通於耳耳宗脉之所聚也若精氣調和則腎氣強盛耳聞五音若勞傷血氣兼受風邪損於腎藏而精脫精脫者則耳聾然五藏六腑十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相并時并則有藏氣逆名之為厥厥氣相搏入於耳之脉則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰顴色黑手少陽之脉動而氣厥逆而耳聾者其候耳內煇煇焞焞也手太陽

厥而耳聾聵者其候聾聵而耳內氣滿養生方云勿塞故井及水瀆令人耳聾聵目盲其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭叉項上治久寒不自溫耳不聞聲又云脚著項上不息十二通必愈大寒不覺暖熱久頑冷患耳聾聵目眩久行即成法法身五六不能變

出第二十九卷中

廣濟療耳聾聵方

生地黃長一寸半麤肥者　杏人七枚去皮熬令黃色　巴豆七枚去皮熬令黃

印成鹽兩顆　髮灰半錢匕

右五味擣碎研堪丸如棗核大用髮薄裹內耳中以物推入日一易耳內當痛有水出即去當直以髮塞耳耳內黃水出痛定不得更著若未差還依前著藥取差千金翼同

又療耳聾聵不聞人語聲方

松脂四分 巴豆二分去皮心熬 麻子人四分 臘二分

薰陸香二分 石鹽二分

右六味擣如膏丸棗核大內耳中三日一易取差

集驗療耳聾方

杏人去皮熬 葶藶子熬 鹽末各等分

右三味擣研以少許猪脂和合煎以綿裹塞耳

又方

附子炮 瓜子 杏仁去皮熬各等分

右三味擣以綿裹塞耳中

千金療耳聾方

淳醋微火煎附子五六宿削令可入耳以綿裹塞耳中取差

又方

巴豆十四枚去皮心熬　成鍊松脂一分

右二味合擣丸如黍米簪頭著耳中以差爲度

又方

以竹筒盛鯉魚腦蒸之令烊以灌耳中

又方

雄黃硫黃各等分綿裹塞耳中數月聞

又方

取鐵燒令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中差

又方

萆麻子一百粒去皮　大棗十五枚去皮核

右二味擣丸如杏人内於耳中二十日差

又方

芥子擣碎以男乳和綿裹塞耳取差

又方

作泥餅子厚薄如餺飥覆耳上四邊勿令洩氣當耳孔上以刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍則止頃側耳瀉却黄水出盡即差灸時泥乾即數易之

又方

截箭竿竹二寸内耳中以麪擁四畔勿令洩氣灸箭上七壯取差並出第六卷中

崔氏療耳聾方鄭少卿云頻用

波律膏一蜆殼無以大麻脂一合小器中煎取一蜆殼替之

楓木脂半兩無以薰陸香替以乳頭香更佳　松脂半兩研

巴豆三七枚去皮熬研　臘如彈丸大

右五味先擣松脂巴豆一千杵次下大麻油令熱丸如棗核

大一頭尖通中作孔以綿裹塞耳數日一易更互塞之取差

不得併塞出第四卷中

備急療耳聾昌蒲根丸方

昌蒲一寸　巴豆一枚去皮心

右二味合擣可丸分作十丸以綿裹塞耳中日別一丸取差

肘後同

又昌蒲散方

昌蒲二兩　附子二兩炮

右二味擣篩以苦酒和丸如棗核許綿裹卧即塞耳中

夜一易之十日有黃水出便差肘後千金崔氏同

又方

磁石　昌蒲　通草　薰陸香

杏人去皮熬　萆麻子去皮　松脂等分

右七味擣篩以臘及鵝脂和丸稍長作以鍼脚子穿中心爲孔先去耳中垢然後內藥日再初著痒及作聲月餘即差殿中侯監云非常良驗肘後同

救急療耳聾方

眞崑崙青木香一兩碎以苦酒浸一宿胡麻油一合微火上緩煎之三上三下以綿濾去滓以點耳孔中以差爲度

必効療耳聾方

以好神明膏如棗核許內耳中日一度頻著以差三五日以篦子挑耳中塞或痒取差亦治蟲入耳中

又方

取杏人七枚去皮搥碎爲三分以綿裹各於中著一裹鹽如小豆許以器承於飯甑中蒸之候飯熟出一裹令患

耳者側卧和綿捻以油汁入耳中久又以一裹準前
捻之差爲度
又方
雞矢白（半大升淨擇碎熬令黃色）　烏豆（一大升熬令爆聲絶）
右二味先取無灰酒二升及熱以沃中良久濾去滓分温
服厚取汗其耳如鼓鞞勿訝
又療耳聾神驗方
取純烏羊新濕糞和杏子脂石鹽末
右三味研滿耳孔中塞勿令風入乾即易之乃至七日二七
日耳内有聲漸大即以葦筒長二寸内耳孔裹四畔以麪塞
勿令氣出以麪薄餠子裹筒頭以艾灸上從第一度灸三壯
爲始耳内即有烏塞乾膿出末間内裹滿疼痛即出之即差
但有塞即須桃却還依前法乃至一日兩日差即停以後常

用亂髮塞之甚驗

風聾方三首

病源足少陰之經宗脉之所聚其氣通於耳其經脉虛風邪乗之風入於耳之脉使經氣否塞不宣故爲風聾風隨氣脉行於頭腦則聾而時頭痛故謂之風聾出第二十九卷中

崔氏療耳風聾牙關急不得開方

取八角附子二枚釅酢漬之三宿令潤徹削一頭内耳中灸上十四壯令氣通耳中即差出第四卷中

古今録驗療風聾年久耳中鳴魚腦膏方

生雄鯉魚腦八分　當歸六銖　昌蒲六銖

細辛六銖　白芷六銖　附子六銖

右六味㕮咀以魚腦合煎三沸三下之膏香爲成濾去滓冷以一棗核大内耳中以綿塞之取差

又方

附子　昌蒲各等分

右二味擣以綿裹塞兩耳中取差

耳聾有膿方三首

千金療耳聾有膿方

烏賊魚骨去甲炙　釜底墨各二分　附子四分炮

禹餘粮一分　龍骨二分　伏龍肝二分

右六味擣末取皂莢子許大綿裹内耳中日一易取差有蟲者加麝香一豆大

又方

擣桂末以魚膏和塞耳中不過三四度並出第六卷中

必効耳聾有膿方

鯉魚腸一具切　酢三合

右二味合擣以布裹塞耳兩食頃當悶痛白蟲出更著新者蟲盡乃止取差無新者擇去蟲還可用良千金同

久聾方五首

病源足少陰腎之經宗脉之所聚其氣通於耳勞傷於腎宗脉虛損血氣不足爲風邪所乘故成耳聾勞傷甚者血氣虛極風邪停滯故爲久聾出第二十九卷中

廣濟療風聾三十年無所聞方

萆麻子五分　杏人四分熬　桃人四分去皮熬　巴豆一枚去皮熬

石鹽三分　附子一分炮　薰陸香一分　磁石四分研

昌蒲四分　臘八分　通草二分　松脂二兩半

右十二味先擣昌蒲石鹽磁石通草附薰陸香成末別擣萆麻子等四味乃內松脂臘擣一千杵可捻作丸如棗核大綿裹塞耳中日四五度抽出別捻之三日一易以差爲度千金翼云一日一易之

肘後療二三十年聾方

取故鐵三十斤以水七斗漬之三宿取其水以釀七斗米用麴如常法酒熟出酒一斗取引針磁石一斤研末置酒中三宿乃可飲之取醉以綿裹磁石塞兩耳中好覆衣衾卧酒醒良久去磁石即聞人語聲也飲盡更為以差為度甚良千金同

又方

茱萸　巴豆去皮熬　乾薑各等分

右三味擣末以葱涕和以綿裹塞耳食頃乾去之更和塞之如此五日當覺病去無苦八九日便聞人語取差止常以髮塞耳慎避風

又方

柘根三十斤剉之以水煮用釀酒如常法久而服之甚良

古今録驗療三十年聾方

天雄一分　雞子一枚　附子一枚

右三味擣末取雞子開一孔取黄和藥却内雞子中封合其頭還令雞復之藥成以綿裹塞所聾耳中取差爲度

耳鳴方六首

病源腎氣通於耳足少陰腎之經宗脉之所聚勞動經血而血氣不足宗脉則虚風邪乘虚隨脉入耳與氣相擊故爲耳鳴診其右手脉寸口名曰氣口以前脉浮則爲陽手陽明大腸脉也沉則爲陰手太陰肺脉也陰陽俱虚者此爲血氣虚損宗脉不足病苦耳鳴嘈眼時妄見光此是肺與大腸俱虚也左手尺中名曰神門其脉浮爲陽足太陽膀胱脉也虚者膀胱虚也腎與膀胱合病苦耳鳴忽然不聞時惡風膀胱虚則三焦實也膀胱爲津液之府若三焦實則剋消津液剋消津液故膀胱虚也耳

鳴不止則變成聾出第二十九卷中

廣濟療耳鳴塞耳丸方

巴豆（二枚去皮熬） 桃人（二枚去皮熬） 松脂（大豆許）

右三味擣作二丸綿裹塞耳中

又療耳鳴沸鬧方

吴茱萸 巴豆（去皮熬） 乾薑 石上昌蒲

磁石 細辛（各一分）

右六味擣末以鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽五升布裹蒸之以熨耳門令其煖氣通入耳内冷復易之如此數用差後常以亂髮卷以塞耳中慎風

肘後療耳中常鳴方

生地黄截斷塞耳日十易之以差一云紙裹微火中煨之用良出第四卷中

千金療耳鳴聾方

當歸　細辛　防風　附子

芎藭　白芷各六銖

右六味末之以雄鯉魚腦和煎三上三下膏香去滓以棗核許塞耳中以綿裹之魚腦用六合微火鍊之

又方

通草　細辛　桂心各三分　昌蒲四分

附子一分　礬石一分　當歸　甘草各二分

獨活六分　葱涕半合

右十味擣末以白鵝膏半合旋旋和以綿裹棗核大塞耳中日三取差忌如常

又療耳聾鳴如流水聲久不治成聾方

生烏頭淨洗削如棗核大以塞耳中日一易之三日

愈亦療痒及卒風聾並出第六卷中

聤耳方一十首

病源耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎之經也勞傷血氣熱乘虛也入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生膿汁故謂之聤耳出第二十九卷中

廣濟療聤耳痒有膿不止昌蒲膏方

昌蒲一兩　狼毒　附子炮　磁石燒

礬石熬汁盡各一兩

右五味擣篩以羊髓和如膏取棗核大塞耳中以差爲度

又療聤耳膿血出方

取車轄脂綿裹塞耳中差肘後同千金治蟲入耳

又療聤耳方

黃連　龍骨　白斂　赤石脂

烏賊魚骨各等分

右五味擣末以綿裹塞耳中毋著以綿纏拭之著藥

肘後療聤耳耳中痛膿血出方

取釡月下灰吹滿耳令深日三易之毋換即以篦子

去之然著藥取差爲度千金云竈下灰薄耳中

又方

附子末以葱涕和灌耳中取差單葱涕亦佳側卧

令入耳中出中卷

又方

桃人熟擣以故緋絹裹塞耳中日三易以差爲度千金同

又方

黃連　附子炮各等分

右二味擣末以少許微微吹入耳中毋著藥先拭惡物然吹之

又方

釜月下墨末以猪膏和綿裹内耳中日再

集驗療聤耳出膿水散方

礬石　烏賊魚骨　黄連　龍骨

右四味擣末以棗核許綿裹塞耳中日再

千金療聤耳出膿方

黄礬石　烏賊魚骨　黄連　赤石脂各一兩

右四味擣末以綿裹棗核大内耳中取差止日二出第六卷中翼方用龍骨無赤石脂

耳卒疼痛方三首

病源凡患耳中策策痛者皆是風入於腎之經也不治流入腎則卒然變脊強背直成痙也若因痛而腫生癰癤膿潰邪氣歇則不成痙所以然者足少陰爲腎之經宗脉之所聚其氣通於耳

上焦有風邪入於頭腦流至耳內與氣相擊故耳中痛耳為腎候其氣相通腎候腰脊主骨髓故邪流入腎脊強背直出第二十九卷中

肘後療耳卒疼痛方

蒸鹽以軟布裹熨之取差良

備急療耳疼痛有汁出方

熬杏人令焦黑擣如泥作丸以綿裹內耳中頻易之差

廣濟療耳卒疼痛求死者方

昌蒲　附子各一分

右二味末以麻油和以點耳中立止肘後崔氏同

耳卒腫方二首

肘後療耳卒腫出膿方

礬石燒末以葦管吹耳中日三四過或以綿裹塞耳

孔內取差

備急療耳卒腫方

栝樓根削可入耳以臘月猪脂煎之三沸冷以塞耳中取差日三作七日愈（肘後治卒得風覺耳中怳怳者）

通耳中膿方二首

廣濟療耳膿水通耳礬石散方

吴白礬（八分燒汁盡）　麻勃（一分）　青木香（二分）　松脂（四分）

右四味擣末先消松脂然入藥末可丸如棗核淨拭以塞耳中取差

又療通耳膿水出方

吴白礬（八分燒令汁盡末）　花燕脂（二七枚）

右二味和粉淨拭耳中以粉粉之每拭然著藥

蟲入耳方一十首

廣濟療蟲入耳腫不聞人語聲有膿血出方

黃耆四分　乾薑二分　蜀椒一分

右三味擣末以生地黃擣取汁和用綿裹棗核大塞耳中日三夜一以差止

肘後療百蟲入耳方

苦酒漬椒灌之即出

又方

温湯灌耳中

又方

擣藍青汁以灌之

千金療蟲入耳方

取桃葉火熨以塞耳卷之入中肘後同

又方

以葱涕灌耳中即出並出第六卷中

崔氏療蟲入耳方

若甲蟲入耳者以火照之手打木入勿令損之即向

明出之或蚰蜒諸蟲入耳以酢灌之或麻油或人尿亦佳或酢酪更妙

備急療蟲入耳方

以銅錢二七枚以猪膏煎之用將灌耳

又方

以兩刀於耳前相敲作聲蟲即出走

蜈蚣入耳方三首

肘後療蜈蚣入耳方

以木葉裹鹽炙令熱以掩耳上即出冷復易之驗

又方

閉氣滿即吐之復閉準前以出爲度或死耳中徐徐以鉤針出之若積久不出者取新㹠肉炙以耳中搨之以出爲度

千金療蜈蚣入耳方

炙猪肉掩耳即出集驗小品同出六卷中

蚰蜒入耳方三首

肘後療蚰蜒入耳方

熬胡麻擣以葛囊盛枕之蟲聞香則自出

又方

以水銀大豆許瀉耳中欹卧空耳向下擊銅器叩齒十下即出蚰蜒呼爲土蛄似蜈蚣黄色細長是也

備急療蚰蜒入耳神効方

以牛酪滿耳灌之即出當半消若入腹空腹食好酪二三升即化爲黄水不盡更服神効肘後同

飛蛾入耳方二首

肘後療飛蛾入耳方

先大噏氣仍閉口掩鼻呼氣其蟲隨氣而出

又方

閉氣以筆管極吹之即出亦治百蟲入耳

蟻入耳方二首

肘後療蟻入耳方

燒陵鯉甲末以水和灌之即出

備急療蟻入耳方

炙猪脂安耳孔上即出或兩邊

耳雜療方八首

廣濟療耳鳴或聾漬酒方

昌蒲一斤　通草一斤　磁石一斤碎綿裹

右三物切以絹袋盛清酒二斗浸之春夏三日秋冬五日

温服三合漸加之至五合以下丸藥亦甚良

又療兩耳腫膿水出不聞人語聲方

黄耆　升麻　犀角屑　梔子各六分

玄參八分　乾藍　芍藥　人參各四分

大黄八分　青木香　黄芩　芒消各六分

右十二味擣篩蜜和丸食後少時以枸杞根湯下二十丸漸

增之忌如常

又療兩耳腫方

青木香　防已　芍藥　玄參

白歛　大黃　芒消　黃芩各八分

赤小豆十分　紫葛八分

右十味擣散以榆木白皮擣汁和之塗布帛上貼腫取消

千金療卒聾方

細辛一分　昌蒲一分　杏人三分　麴末三分

右四味擣篩研杏人合之如脂棗核大以綿裹塞耳中日一易小差二日一易夜去之旦即著

又底耳方

燒黃礬擣末綿裹塞耳中二三日即差

又療耳乾耵聹（上都挺切下乃挺切耳垢也）不可出方

爛擣自死蚯蚓取汁灌耳不過數灌即桃出之並

出第六卷中

千金翼赤膏主耳聾齒痛方

丹參五兩 蜀椒一升 大黃 白朮

細辛 芎藭各一兩 大附子十枚 乾薑二兩

巴豆十枚去心 桂心四寸

右十味㕮以苦酒漬一宿以豬膏三斤煎三上三下藥成

去滓可服可摩耳聾聾者綿裹膏內耳中齒冷痛著齒間

諸痛皆摩腹內有痛以酒服一棗許大咽喉痛吞一棗核

大一枚出第十一卷中

崔氏療風氣及腰脚并耳聾方

磁石十二兩碎綿裹 石上昌蒲四兩 通草三兩 瞿麥二兩

山茱萸三兩 白朮三兩 獨活四兩 芎藭二兩

署蕷三兩　甘草二兩炙　附子二兩炮　桂心三兩
生薑五兩　杏人二兩去皮尖熬碎　茯神二兩　人參
前胡各三兩　葱白一升切　竹葉一握　石膏二兩碎綿裹
右二十味切以水一斗四升煑取二升半去滓分三服宜向暮服之令盡愼如常法五日禁食羊肉

鼻中息肉方一十一首

病源肺氣通於鼻肺藏爲風冷所乘則鼻氣不和津液壅塞而爲鼻齆冷搏於血氣停結鼻内故變生息肉其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云端坐生腰徐徐以鼻内氣以右手捻鼻除目暗淚苦出徐徐閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦能除又云東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻中息肉出第二十九卷中

肘後療鼻中塞肉不通利方

礬石燒一兩 通草半兩 眞珠一兩

右三味末以綿裹如棗核内鼻中日三易之有加桂心細辛各一兩同前擣末和使用之

又方

陳瓜蔕擣末以付塞内上取差

又方

礬石燒 胡粉熬各等分

右二味末之以青羊脂和塗塞内上以差

又方

細辛 瓜蔕各等分末以吹鼻中須臾涕出頻吹之即差千金方以絮裹如棗大塞鼻中須臾通張文仲亦治鼻齆不聞香臭

小品療鼻中塞肉通草散方

通草半兩 眞珠六銖碎 礬石燒[redacted]兩 細辛一兩

右四物擣末以綿裹如棗核沾散如小豆并綿頭内鼻中日三取差千金同

千金療鼻中息肉方

灸上星二百壯入髮際一寸又夾上星兩傍相去三寸各百壯灸之取差出第六卷中

千金異鼽鼻鼻中息肉不得息方

礬石燒三分　藜蘆二分　瓜蔕二七枚　附子炮二分

右四物擣末蘆管吹小豆許於鼻孔中成以綿裹塞鼻中日再以差爲度一方加葶藶半兩出第十一卷中

崔氏療鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和著鼻中數日息肉隨藥出千金同

必効療鼻中清涕生塞肉方

細辛六分　附子炮五分　甘遂六分　通草五分

乾薑四分　吴茱萸三合　桂心四分

右七味擣篩末蜜丸如杏人綿裹塞鼻卧時著即涕出日

三避風以差爲度或以帛裹頭甚良妙

古今録驗療鼻中息肉通草散方

通草　細辛　蕤人　雄黄研

皂莢去皮子各一分　白礬燒二分　礜石泥裹燒半日研三分　䕡蘆三分炙

地膽熬三分　瓜蔕三分　巴豆去皮十枚　䕡茹三分

地榆三分

右十三味擣篩末以細辛白芷煎湯和散付息肉上又以膠清和塗之取差

又療鼻中息肉方

生地膽一枚　細辛　白芷末

右三味以地膽押取汁和藥以塗貼息肉上取消亦只以地膽汁於竹筒中盛當上灌之即消無生者乾即酒煮取汁用之

鼻齆方五首

病源肺主氣其經手太陰之脉也其氣通於鼻若脉藏調和則鼻氣通利而知香臭若風冷傷於藏腑而邪氣乗於太陰之經其氣藴積於鼻者則津液壅塞鼻氣不宣調故不知香臭而爲鼻齆也出第二十九卷中

千金療鼻齆方

甘遂　通草　細辛　附子炮各一分

右四味擣末以白雄犬膽丸少許内鼻中差崔氏同云卒熱四五日出弟升愈

又方

皂莢炙末如小豆以葦管吹鼻中

又方

以乾薑末吹之又蜜和塞之

又方

以鐵磦一錢去磨石取末以猪脂和綿裹塞鼻中取差止

又方

伏面臨牀前以新汲水淋玉枕上取差並出第六卷中

肺寒鼻齆方二首

刪繁療肺寒損傷氣欬及多唾呼聲鼻塞乾棗補肺煎方

棗肉二升取膏　杏人一升去尖皮研　酥一升　薑汁一升

蜜一升　餳糖一升

右六味依常微火煎每服一匙差止

又療鼻塞有清涕出方

細辛　蜀椒汗　桂心　芎藭

吴茱萸各三分　皂莢炙去皮三分　附子八分炮

右七味切以苦酒漬一宿以豬脂一斤煎以附子色黄膏成以綿裹内鼻中兼以摩頂

鼻窒塞不通利方七首

小品療鼻中窒塞香膏方

白芷　當歸　芎藭　細辛

辛夷　通草　桂心　薰草各三分

右八味㕮咀以苦酒漬一宿以豬膏一升煎以白芷色黃成膏濾去滓取少許點鼻中或綿裹內鼻中以差止（千金無桂心不用薰草用莽草）

千金鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過蒺蔾一把擣以水三升煎令熟先仰卧使人口含一合灌鼻中不過再大嚏出一兩箇息肉似爛蟲即差（一方用黃連各二兩）

又療鼻窒氣息不通方

小薊一把

右一味以水三升煮取一升去滓分服

又方

綿裹瓜帶末少許塞鼻中並出第六卷中

古今錄驗療鼻中不通利窒塞者香膏方

當歸　芎藭　青木香　細辛

通草　蕤核人　白芷（各二分）

右七味切以羊髓微火煎白芷色黃膏成去滓以小豆許內鼻中日再以差爲度千金有塞草無青木香云大熱鼻中赤爛者以黃芩梔子代當歸細辛

又療人鼻塞不通皂莢散方

皂莢一分炙去皮子　細辛　辛夷　蜀椒　附子炮各等分

右五味擣末以少許吹鼻中或以綿裹塞之即通

又療鼻窒塞不得喘息皂莢散方

皂莢去皮子炙　昌蒲各等分

右二味以末綿裹塞鼻中暮卧之時乃著甚良

鼻塞常清涕方二首

病源夫津液涕唾得熱即乾燥得冷流溢不能自收肺氣通於鼻其藏有冷冷隨氣入乘於鼻故使津涕不能自收出第二十九卷中

肘後療老小鼻塞常有清涕出方

杏人二分　附子二分　細辛一分

右三味切以苦酒拌用猪脂五兩煎成膏去滓以點鼻中即通又以摩顖上佳

必効療鼻塞多清涕方

細辛　蜀椒　乾薑　芎藭

吴茱萸　皂莢去皮尖　附子各三兩　猪膏一升三合

右八味切㕮咀以苦酒浸一宿以猪脂煎候附子色黄去滓膏成凝以綿裹少許導鼻中并摩頂

鼻生瘡及疳蟲蝕方九首

病源鼻是肺之候肺氣通於鼻其藏有熱氣衝於鼻故生瘡也養生方導引法云踞坐合兩膝張兩足不息五通治鼻瘡出

第二十九卷中

千金療疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筯投酢中以塗之

又方　綿裹人屎灰夜卧著之

又方　燒祀竈飯末以傅之

又方　燒牛狗骨灰末以臘月猪脂和傅之差

又方　燒杏人壓取油傅之又乳和傅

又方　取烏牛耳垢傅之良

又方　燒故馬絆末傅之

又方　取牛鼻頭津傅之良並出第六卷中

必効療鼻內熱氣生瘡有膿臭并有蟲方

礬石一兩燒　生地黄三兩　苦參一兩

右三味切以水八合煑取三合以綿濾之微微點鼻中日三五度差止

牙疼方八首

廣濟療牙疼巴豆丸方

巴豆 十枚去皮心熬研如膏 大棗 二十枚取肉 細辛 一兩末

右三味相和研爲丸以綿裹著所疼處咬之如有涕唾吐却勿咽入喉中日三差

崔氏療牙疼方

烏頭 獨活 郁李根白皮 各一大兩

右三味切綿裹以好酒一大升半漬一宿緩火煎取一升去滓看冷熱漸含良久即吐却含取差齒痛不問風蟲無不差必須含吐之不可咽却也有毒恐傷人單用烏頭獨活亦差

又方 令患人所患牙齒齧宅東南桑枝一條教三姓人於桑枝灸三炷一炷呪之曰東方有蟲子不食五穀專食牙齒三姓灸齒痛蠍蟲自然死一呪一再拜即令灸

人患人等還不得迴頭更看之

張文仲療牙疼驗方

獨活五分　莽草二分　細辛二分　附子一枚

右四味切以苦酒五合浸以銅器中温之稍熱含良久吐却汁未差更含之勿咽汁欲食以煖水漱口甚良

救急療牙疼方

莽草　細辛　枳根皮各三兩　椒一合汗

右四味切以水一升煮取半升細細含之十度永不發藥有毒不得嚥之含了以煖水三五度漱口訖以胡桐律一豆著痛齒上風痛蟲食並差

必効療牙疼方

取皂莢子擣末以綿裹如彈子大兩顆於釅醋中煮熱徹於牙疼處齧之冷即易日三五度以差爲度

又方　取桃李槐並白皮各等分以酒煑含之取定

姜君療牙疼方

白楊皮一握　地骨皮一兩　椒二七枚　杏人二七枚去皮
細辛一兩　生地黃二兩碎　好鹽一合　蒼耳子二兩碎

右八味切以酒二升煎六七沸去滓含之冷即吐却別含以差爲度

齒痛方一十一首

病源手陽明之支脉入於齒齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛若蟲食齒而痛者齒根有孔蟲在其間此則針灸不差傅藥蟲死痛乃止其湯熨針石別有正方補養宣道今附於後養生方道引法云常向本命日櫛髮之始叩齒九通陰呪曰大帝散靈五老反真泥丸玄華保精長存左廻拘月右引日根六合清錬百疾愈因咽垂三過常數

行之使齒不痛髮牢不白頭腦不痛又云東向坐不息四通琢
齒二七治齒痛病大張口琢齒二七一通二七又解四通中間其
二七大勢以意消息差病而已不復疼痛解病鮮白不䵝亦不
䟽離久行不已能破金剛又去東向坐不息四通上下琢齒三十
六下治齒痛出第二十九卷中

廣濟療齒痛及落盡石膽傅方

取石膽研以人乳汁和以傅齒痛上或孔中日三兩
度止痛後生齒百日復故齒生止每以新汲水漱令淨

集驗療齒痛方

雞屎白燒灰末以綿裹置齒痛上咬咋之差

又方

芎藭　細辛　防風　礬石燒令汁盡

附子炮　藜蘆　莽草

右七味各等分擣篩爲末以綿裹彈丸大酒漬熨所患處含之勿嚥汁千金同

又方

獨活三分　黃芩　芎藭　當歸

華撥各二兩　丁香一兩

右六味切以水五升煑取三升去滓微微含漱良久吐却更含

又方

含白馬尿隨左右含之不三五口差張文仲備急同

並出第六卷中

張文仲療齒疼痛方

燒牛膝根末以綿裹著齒痛處含之

又方

蜀椒　礬石各一兩

右二味以水一升煎取六合去滓含之嗽口吐却勿咽之

備急療齒痛方

胡菓子五升應是胡荽子也以水五升煑取一升含吐之謹按本草菓耳一名胡菓殺疳濕䘌封丁腫此治齒痛相近即非是胡荽子也

又方

馬夜眼如米許以綿裹著痛孔中斷根源也

古今録驗療齒痛方

取楊柳細白皮卷如指大含嚼之以汁漬痛齒根數過即差

又方

獨活三兩　芎藭　當歸　蓽撥

黃芩　甘草　細辛各二兩　雞舌香一兩

右八味切以水五升煑取三升去滓含之取差千金無甘草

千金療齒疼方

齒疼方六首

又方　灸外踝下高骨前交脉三壯

以繩量手中指至掌後一横文又折爲四分量文後當臂中灸一壯隨左右取之

又方　雞屎白以醋漬煑稍稍含之差

又方

生地黄一節　蒜一瓣

右二味擣以綿裹著痛處咬之勿嚥汁汁盡吐出日日爲之差止

又方　含驢尿須臾止並出第六卷中

姜生療齒疼方

附子一分　胡椒　蓽撥各二分

右三味擣末著齒痛上又以散用臘和爲丸置齒痛孔上取差止

牙齒疼痛方八首

病源牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所養手

陽明之支脉入於齒若髓氣不足陽明脉虛不能榮於牙齒爲風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒根有孔蟲居其間又傳變餘齒亦皆疼痛此則針灸不差傅藥蟲死痛乃止出第二十九卷中

廣濟療牙齒疼痛牙齗腫痒齒根宣露方

肥松節四分　細辛二分　蜀椒二分　胡桐律四分

右四味切以清酒四升煑十沸承熱含之冷即吐却更含差止

又療牙疼齒痛方

取槐白皮一握切

右一味以酢一升煑去滓著鹽少許適寒温含日三易之

備急姚氏療牙齒疼痛方

取枯竹燒竹一頭以柱錢上得汁多著齒上即差

必効療牙齒疼痛方

防風　附子　蜀椒各二兩　莽草一兩炙

右四味擣篩爲散温清酒一盞和少許含勿嚥汁以酒漱口十年患亦差止

又方　獨頭蒜煨之乘熱截一頭以熨痛上轉易之亦主蟲痛

又礬石散療牙齒疼痛風齲顆羽切說之齲齒蠹蝕也下同蟲食挺根出齒已落者方

礬石燒令汁盡　藜蘆炙　防風　細辛

乾薑　白朮　椒汗　甘草炙

蛇牀子　附子炮各八分

右十味擣篩爲散温酒半升内散方寸匕攪調含之漱吐勿嚥之日三度差百日齒已落者還生每食時更以空酒漱去藥氣然後喫食

又療牙齒疼肉宣露風疼効方

莨菪子擣末綿裹著痛上吐却汁勿嚥之良

又方

獨活十兩　生地骨白皮切三升　細辛一兩

楓柳皮一兩　甘草二兩炙

右五味切以水五升煑取一升細細含勿咽冷即吐之

䘌齒方五首

病源齒䘌者是蟲食齒至斷膿爛汁臭如屯之狀故謂之䘌齒出第二十九卷中

廣濟療䘌齒石黛散方

五月五日乾蝦蟇燒灰石黛甘皮各等分擣末以傅齒上取差

又療䘌齒及口瘡蟲食紫藍灰方

取紫藍燒作灰以塗傅之日三五度取差爲度

又療䘌齒并蟲積年不差從少至老方

雀麥一名牡姓草一味苦瓠葉三十枚淨洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作五六十裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器以水內中解裹於水中洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此方甚妙千金同

必効近貴勝共傳𧐐齒方

細辛　當歸　甘草炙　蛇牀子各一兩

青葙子三兩

右五味擣以綿裹如大豆著齒上日三勿嚥汁差止肘後同

又𧐐齒方韋給事處得之

每見月拜呪云月阿姑𧐐齒蟲枯月阿姨𧐐齒蟲死

以差即止

齒風疼痛方三首

張文仲療頭面風口齒痛不可忍方

椒一合 莽草十葉熬 白朮 雀李根郁李根也

獨活 芎藭各二兩 細辛 防風各一兩

右八味切以酒三升煑三五沸去滓含之以差為度勿嚥汁千金無白朮

救急療齒風動痛方

蒼耳一握以漿煑著鹽含之

古今錄驗療齒中風疼痛齲腫芎藭湯方

細辛一兩 芎藭二兩 附子一兩炮

右三味切以水六升煑取二升去滓含之少許冷即吐却日三四度勿嚥汁

齲齒方七首

病源手陽明之支脉入於齒足太陽脉有入於頰遍於齒者其經虚風氣客之絡搏齒間與血氣相乗則齗腫熱氣加之膿汁出而臭侵食齒齗謂之齲齒亦曰風齲養生方云朝夕琢齒齒不齲又云食畢當漱口數過不爾使人病齲齒出第二十九卷中

廣濟療齒齲痛方

五月五日蝦蟇（燒作灰）　石黛　甘皮

細辛　白雞屎　麝香　乾薑

熏黄

右八味各等分以薄綿裹少許内蟲齒孔中日三易之差

集驗療齲齒方

取松脂鋭如錐注齲孔内須臾齲蟲縁松脂出

又方　煑雞舌香汁含之差

千金療䶌齒及蟲齒方

白附子一分　知母一分　細辛五分　芎藭三分

高良薑二分

右五味末以綿裹少許著䶌上勿嚥汁日二三亦治口氣

又方

取白馬懸蹄少許塞孔中日三度即差止翼同並

出第六卷中

張文仲療䶌齒方

以郁李根白皮切水煑濃汁含之冷易之當吐蟲出

備急䶌齒方

皂莢炙去皮子末少許著齒痛上差

齒蟲方五首

病源齒蟲是蟲食於齒齒根有孔蟲在其間亦令齒疼痛食一

齒盡又度食餘齒養生方云雞鳴時常叩齒三十六下長行之齒不蠹蟲令人齒牢又云朝未起早漱口中唾滿口乃吞之輒啄齒二七過使人丁壯有顏色去蟲而牢齒又云人能常服玉泉必可丁壯妍悅去蟲牢齒謂口中唾也出第二十九卷中

小品療齒蟲腐棘刺漱湯方

腐爛棘鍼二百枚即是棗木刺朽落地者用一物以水二升煎取一升含之即差日四五度以差爲度

删繁療䵟齒蟲方

莨菪子三合青錢七文燒令赤取小口瓶子可令口含得者將錢內瓶子中取莨菪子一撮安錢上令爆烢聲仍以水少許淋錢上即氣出用熏齒冷止三合藥盡爲劑蟲食䵟齒風痛並用千金同

又療蟲齒痛椒湯方

蜀椒一兩　礬石半兩　桂心一兩

右三味以水三升煑取一升去滓含之漱齒勿嚥汁甚良

又附子塞蟲孔丸方

附子一枚炮末以臘和之爲丸準齒蟲孔大小內之取差止

必効殺齒蟲方

雄黄末以棗膏和爲丸塞牙孔中以膏少許置齒燒鐵篦烙之令徹熱以差止一方有附子一枚

風齒方四首

病源手陽明之支脉入於齒頭面有風陽明之脉虛風乗虛隨風流入於齒者則令齒有風微腫而根浮也出第二十九卷中

集驗療風齒疼腫悶方

莽草二兩

右一味以水五升煎取三升含漱之勿嚥汁

又方

椒二十粒　枳根皮　莽草　細辛

昌蒲　牛膝各二兩切

右六味切以水四升煑取二升去滓細細含之以差爲度未差更作取差

備急療風齒疼刺腫方

煑獨活含之良

又療風齒腫杉葉湯方

杉葉三兩　芎藭　細辛各二兩

右三味切以酒四升煑取二升半稍稍含之取差勿嚥之

風齒根出方二首

廣濟療熱風䘌齗肉欲盡根出恐是疳蟲食齗及耳鼻疼痛方

石黛五分　細辛　棘刺　昌蒲

香附子　當歸　青木香　胡桐律

乾薑各四分　青葙子六分

右十味擣爲散以半錢匕綿裹就齒痛處含之勿停差止

服後丸方一方無細辛有雞舌香

丸方

苦參八分　大黃　黃芩　枳實各六分

地骨皮六分　玄參八分　黃連八分

右七味擣篩蜜爲丸食後少時以漿水服一十五丸日再服

至二十丸增減自量之忌蒜麪豬肉

風齒口臭方二首

廣濟療風齒口氣臭芎藭湯方

芎藭三兩　當歸三兩　獨活四兩　細辛

白芷各四兩

右五味切以水五升煑取二升去滓含漱日三五度取差

齒敗口臭方

取芎藭煑一味含之

牙齒風齲方三首

延年療牙齒風齲方

鼠粘子

右一味擣以水四升煑取二升半濾去滓適寒温含之冷吐

別含取差

又方

薏苡根四兩切

右一味以水四升煑取二升含冷易之

又方

郁李根白皮切四兩　細辛一兩　鹽一合

右三味切以水四升煑取二升半去滓內鹽含之取差

牙齒疼風蟲俱療方五首

廣濟療牙齒疼痛風蟲俱差方

獨活　防風各四兩　芎藭　細辛

當歸各五兩　沈香八分　雞舌香　零陵香各五兩

黃芩十分　升麻八分　甘草六分炙

右十一味擣篩烊臘少許丸如小豆以薄綿裹當痛上含有汁嚥亦無妨口臭氣尤妙

又療齒痛不問蟲風者方

熏黃一兩　莽草一兩　臘月羊脂　蜀葵莖兩枚

右四味擣熏黃等爲末消羊脂以葵莖蘸脂點藥末注齒痛

處孔中日三五度每令葵莖熱用之良

又療牙齒疼蟲痛含湯方

肥松脂三兩　皂莢一枚去皮子炙令黃　石鹽七枚

右三味切以水二升煑取八合去滓温含冷吐之即差止

崔氏療牙齒隱隱痛無問風蟲摇動齒齗腫宜露含此藥效其齗便生方

取細柳枝捋去皮剉一升炒之内大豆一升和柳枝更炒以豆炮聲盡於堉器盛之以清酒三升漬之經三日含之頻吐即無妨兩劑無不愈其齗亦生

出第四卷中

必効療風蟲疼痛方

取屋間蜂窠一枚炙　椒七粒

右二味以水一升煎取半升含之或齗腫勿怪之

風衝牙齒搖動方二首

延年療風衝牙齒搖動方

車下李根白皮（郁李根也三兩切）　蒼耳子（三合碎）

右二味以水三升煑取二升含之良

又方

芎藭（三兩）　細辛（一兩）　防風（二兩）　薏苡根（三兩）

右四味切以水六升煑取三升去滓含漱齒日三五度差止

疳蟲食齒方一十首

千金凡齒齗宣露多是疳䘌及月蝕方

以角蒿燒灰夜塗齒齗間使滿不過兩三度即差愼油膩沙糖乾棗及桂切忌之

又方

每旦以鹽一捻內口中以煖水含和鹽揩齒百遍可長為之口齒牢密

又凡人好患齒病多由月蝕夜食飲所致識者特宜愼之所以日月蝕未平復時特忌飲食小兒亦然方

蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒之令極赤末之如粉以臘月猪脂和傅齒齗上日三即差止

又疳蟲食齒根方

伏龍肝置石上著一撮鹽須臾化爲水以麪展取待凝厚取以内病上

又方

以皁莢去皮炙末塗上蟲即出

又方

純麻子燭燼研以井花水和傅之

又方

黒羖羊脂　莨菪子各等分

右二味和先燒鋤銎使赤内其中煙出以布單覆頭令煙入口熏之並出第六卷中

張文仲㾦䘌方

大酢一升煑枸杞白皮一升取半升含之䘌即出

姜生論云齒齗虛軟而無膿血又口蠹其齒齗觸著即膿血出又口㾦其齒齗不觸自然膿血出又口瘻其齒齗上有小孔如蜂窠形又齒㾦其骨脆爛其齒齗脣口吻變作白色或作青紫黑色者是急㾦之狀死不過旬月宜急療之先看脣頰邊有赤白黑脉處即須以針針去惡血便燒鐵篦烙之如此變即定或附齒有黃色物如爛骨狀名爲食床凡療齒看有此物先以甘刀略去之然後依方用藥其齒齗內附著齒根者形如雞子膜有如蟬翼纏著齒者亦須細看之不爾其齒齗永不附著齒根也病狀如前後方自有委曲也又雄黃膏療齒中㾦瘡蠹瘻䘌蝕牙齒口裏之疾皆療之其膏以十二月合即得一年用不爾難久停方

好牛酥五大兩　蜜臘半兩　雄黃一小兩研　朱砂二分研

藁本半大兩　蔾蘆二分　杏人四分去皮尖　芎藭

白芷　鰻鱺魚　升麻各三分

右十一味以酥中煎諸藥魚令黃色去魚煎三上三下入臘煎沫盡膏成收器中攪勿住手凝定以本方即諸藥並爲末不去滓甚良

又升麻揩齒方

升麻半兩　白芷　藁本　細辛

沈香各三分　寒水石六分研

右六味擣篩爲散每朝楊柳枝咬頭軟點取藥揩齒香而光潔一方云用石膏貝齒各三分麝香一分尤妙

齒痛有孔方四首

備急療牙齒有孔方

莨菪子數粒内齒孔中以臘封之即差

古今録驗療齒痛有孔不可食飲面腫莽草湯方

莽草葉七 猪椒九箇

右二味以漿水二升煑取一升適寒温含滿口冷即吐之日二三含之千金同

又療齒䶌痛有孔方

取雄雀屎以綿裹内齒孔中日二易之

姜生療齒有孔方

附子二分炮去皮 蜜臘五分

右二味相和爲丸塞齒孔中即差忌冷水油膩

齒挺出及脱落方五首

廣濟療齒牙風挺出疼痛郁李根湯方

郁李根五兩 芎藭二兩 細辛二兩 生地黄四兩

右四味以水六升煑取二升半去滓先以鹽湯漱口然溫含之冷即吐更含取差

崔氏療牙齒挺出疼痛不可忍方

羊腎脂二合 泔澱二合 牛糞一合絞取汁 甘草半兩生用末之

青黛一大棗 熏黃半兩末

右六味相和銅器中微火煎五六沸取東引桃枝如筯大六枝以綿纏頭點取藥更互熱烙齒齗際隔日又烙之不兩三度看好肉生以差乃止欲烙時淨刮齒牙根上然後爲之不爾肉不生十餘日忌生冷酢酒肉陳臭一年禁油

又療疳濕牙齒脫落剌脣穿破及下部侵蝕并痔䘌齒悉療之方顧叅軍授君家祕之

青黛二兩 雄黃研 朱砂研 莨菪子熬

青礬石 黃礬石 白礬石並燒令汁盡 附子炮

苦參　甘草炙　藜蘆炙　細辛

麝香一兩各研

右十三味擣篩爲散有前齒疾稍稍著病上日二三濕䘌者以井花水平旦抄取半錢匕水中服之兼以薄綿裹如棗核許著蝕蟲䘌處日三差止下部中濕䘌蝕之以苦參甘草作湯和半錢匕灌之良並出第四卷中

張文仲療齒根欲脫落方

取生地黄擣以綿裹貼齒根長含之甚妙

備急比見患齒風傷齒挺出一分者方

長咋地黄尤妙更不復發

齒間血出方三首

病源手陽明之支脉入於齒頭面有風而陽明脉虛風挾熱乘虛入齒齗搏於血故血出也出第二十九卷中

千金齒間血出者方

竹葉濃煑著鹽含之冷吐

又方

童子小便温含之冷吐血即止並出第六卷中

備急療齒疼痛斷間血出神驗方

好鹽熬每夜封齒根上瀝水盡乃扣齒一二百遍即差忌棗沙糖等

齒血不止方四首

千金療齒血不止方

刮生竹皮以苦酒漬之令其人解衣坐使人含噀其背三遍仍取茗草濃煑汁含之漱嚥終日爲之

又療齒斷間津液血出不止方

生竹茹四兩醋浸一宿含之

又方

右二味醋一升煑夜含之及熱尤良
細辛二兩　甘草二兩炙
又方
礬石一兩燒末以水二升煑先拭血乃含之並出
第六卷中
齒腫方二首
千金療齒根腫方
松葉一把　鹽一合
右二味以好酒三升煑取一升含之冷吐差即止
又療齒腫痛及蟲方
黃芩　甘草　桂心　當歸
細草　蛇牀子各一兩
右六味切以漿水七升煑取三升去滓含之日三夜一良並
出第六卷中

牙疼痛及蟲方三首

必効療牙風疼方

取東牆下朽骨削之如疼牙齒許大於煻灰中煨燒令熱於所痛處齧之冷即易之

又牙蟲痛并蟲蝕方

以水煮露蜂房細辛各等分含之即差止

又療牙疼及頭牙齗風腫口急不開面目虛腫皆瘨都雷切起者方

蒴藋五兩以水五升煮取四升去滓　蜀椒一兩　吴茱萸

獨活　烏賊魚骨　桃膠各一兩　桂心半兩

酒一合

右八味切以水二升煮取八合投蒴藋汁及酒更煎取一小升去滓含之就病處日三以差止爲度

牙齒雜療方七首

集驗療齒楚痛方

生地黃　桂心

右二味合以含嚼咽汁無妨千金同

刪繁療心虛寒口氣臭衝人又蟲齒痛芎藭散方

芎藭八分　白芷七分　甘草五分炙　桂心四分

杜蘅四分　當歸五分

右六味擣篩爲末以酒和方寸匕服之日二服

千金療酒醉牙齒涌血出方

燒釘赤柱血孔中即止

又療齒痛方

當歸　桂心　甘草炙各二兩　礬石六分燒

右四味切以漿水二升煮取一升含之日五六差止

張文仲療齒痛風引腫搖動發作不聊蟲蝕盡方

礬石燒　乾薑　藜蘆　蛇床子

甘草炙　細辛　蜀椒　防風各一兩

右八味擣散以一錢匕和温酒二合含之勿嚥汁冷即吐出日三度差止齒落自復生甚効

又療歷齒稍碎壞欲盡方

礬石如棗大以綿裹含之取差

古今録驗療牙齒根揺擬欲墮者齲齒方

取生地黄綿裹含之微嚼候汁味盡棄之乃更含之

緊脣方一十三首

病源脾與胃合胃為足陽明其經脉起鼻環於脣其支脉入絡於脾胃脾胃有熱氣發於脣則脣生瘡而重被風邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發積月累年謂之緊脣亦名瀋脣出第三十卷中

廣濟療緊脣水銀膏方

水銀 熏黃研 青礬研 苦參各二兩末

絳緋方三寸 亂髮雞子大一 細辛三兩末

右七物以緋裹髮用麻油一斤臘二兩先煎苦參細辛以緋髮消盡入水銀石藥及臘候膏成收凝定以傅病上取差爲度水銀和石藥兩味研令盡入煎之

又療緊脣瘡久不差石硫黃膏方

石硫黃研 白礬燒 朱砂研 水銀

麝香 黃蘗末各一分

右六味和水銀研於瓷鉢中以水銀盡用臘月猪脂和如泥先拭淨然以塗之日三五以差爲度甚良

小品療緊脣方

以白布緾作燭著空斧中燒布斧刃有汗出以指

歷取塗病上取差千金同

千金療緊脣方

灸虎口男左女右七壯

又方　灸承漿三壯良

又方　青布燒灰酒服之又以脂和塗

又方　以臘片灸貼之一宿差

又方　灸松脂貼上

又方　先灸瘡燒蛇皮灰以傅之並出第六卷中

崔氏療緊脣方

取膝頭垢綿裹燒傅之

又方　取屠兒肉机上垢燒塗之

又方　燒人屎灰傅之

又方　馬芥亦名刺芥擣取汁日暴令濃先揩脣使血出以

藥七塗之亦療刺風並出第四卷中

瀋脣瘡爛方五首

肘後療瀋脣常瘡爛方

以五月五日鯉魚血以書光墨和塗

集驗療瀋脣緊脣方

以青布卷燒炷著斧上取汁塗之良千金同

又方

取亂髮蜂房六畜毛燒作灰以猪脂和如膏傅千金同

又方

鼈甲及頭垢燒灰末傅之千金同

又方

礬石燒末和胡粉傅之差

脣瘡方三首

肘後療脣瘡方

以頭垢付之日三千金同

又方　以東壁土傅之

千金療脣瘡方

胡粉傅之

口瘡方一十一首

廣濟療口瘡煎方

龍膽　黃連　升麻　槐白皮

大青各二兩　苦竹葉一升切　白蜜半升

右七味切以水五升煑取一升去滓下蜜煎之塗口瘡差

又療口舌生瘡含煎方

升麻　大青　射干各三兩　梔子

黃蘗切各一升　蜜八合　薔薇白皮五兩

苦竹葉一升切　生地黃汁五合　生玄參汁五合無用乾者二兩

右十味切以水六升煎取二升去滓入生地黃汁蜜煎成一

升如錫細細含之取差即止

又心脾中熱常患口瘡乍發乍差積年不差方

升麻八分　大青　枳實炙　甘草炙各六分

苦參七分　黃連八分　生乾地黃八分

右七味擣羅蜜丸以水服二十九日再忌如常法

集驗療口瘡方

升麻　黃蘗　大青切

右三味切以水煑含之冷吐差止

又方

蘆根四兩　黃蘗　升麻各三兩　生地黃五兩

右四味切以水四升煑取二升去滓含取差含極冷吐却更含之

千金療口瘡不歇生牛膝漱口煎方

生牛膝　生蘘荷根各三兩　刺蘗葉一兩

右三味㕮綿裹以酒三升漬一宿微煎一兩沸含之

必効口瘡方

黄芩　芍藥　羚羊角屑　黄蘗

大青　苦竹葉各二兩　升麻三兩

右七味切以水七升煎取二升去滓内蜜二合攪含冷吐以差止肘後同

古今録驗療口瘡湯方

細辛　甘草　桂心各三兩

右三味切以酒一升煑取六合含之

又黄芩湯療口瘡喉咽中塞痛食不得入方

黄芩　黄連　甘草炙　黄蘗各一兩

右四味切以水三升煎取一升含之冷吐取差

又方

大青四分　山梔子　黃蘗各一兩　白蜜半升

右四味切以水三升煮取一升去滓下蜜更煎一兩沸含之取差止

又升麻散主口瘡方

升麻六分　黃蘗六分

右二味擣末以綿裹含之

口瘡久不差方二首

千金療口瘡不差入胸中生瘡三年以上不差方

薔薇根濃煮汁含之又稍稍嚥之三日三夜差冬取根夏取莖葉

又方

以角蒿灰塗之一宿知二宿差勿嚥汁取差爲度

又論云凡患口瘡及齒切禁油麪酒醬醋醎膩乾棗差後七日斷

之彌佳若不久愼尋手即發發而更療其差稍遲愼之愼之薔薇根角蒿爲口瘡之神藥人皆不知之

口吻瘡方四首

病源足太陰爲脾之經其氣通於口足陽明爲胃之經手陽明爲大腸之經此二經並夾於口其府藏虛爲風邪濕熱所乗氣發於脉與津液相搏則生瘡常濕爛有汁世謂之肥瘡亦名鷰口瘡出第三十卷中

千金療口吻瘡方

楸白皮及濕貼之數易取差

又方

掘經年葵根欲腐者彌佳燒灰以傅之

又方

白楊枯枝鐵上燒一頭取瀝塗之本方云療鷰吻

又方

以新炊飯了甑脣及熱熨之二七下三兩上差止

口乾燥方五首

刪繁療口熱乾燥甘草丸方

甘草六分炙　人參六分　半夏六分洗　烏梅肉六分

棗膏十分

右五味擣篩四味棗膏相和入蜜丸如彈子含之差千金同分兩小異

千金療口乾除熱下氣方

石膏五合碎綿裹

右一味以水三升煎取二升入蜜二升煑取二升去滓稍稍含咽之差止

又口乾方

猪肪脂雞子大擘內醋半升漬一宿絞汁服之取差爲度

又方

酸棗一升去核　酸石榴子五合　乾葛三兩　烏梅五合去核

麥門冬四兩去心　覆盆子三合　甘草炙　栝樓三兩

右八味擣以蜜丸含如棗核大潤為度

張文仲主口乾方

乾棗肉三兩　甘草炙　杏人去皮尖　烏梅二兩

右四味擣以蜜和丸如棗核含以潤差止

口臭方九首

千金療口中臭方

桂心　甘草　細辛　橘皮各等分

右四味擣篩以酒服一錢匕差止為度

又方

甘草五兩　芎藭四兩　白芷三兩

右三味擣篩以酒服方寸匕日三三十日口香

又方

濃煮細辛含之久却吐甚良

又方

橘皮五分　桂心三分　木蘭皮四分　芎藭六分一云棗四十个

右四味擣篩以酒服方寸匕日再服一方無芎藭亦可以棗丸含化

又方

大豆熬令焦以醋沃取汁含之

又方

細辛　豆蔻

又方

梔子　甘草炙各三分　細辛五分　桂心二分

右二味等分擣末煑含之甚良

芎藭四分

右五味擣篩蜜丸食後服七丸日再服差止

又方

芎藭　白芷　橘皮　桂心各四分

棗肉八分

右五味擣篩四物以蜜和棗肉爲丸食後服十丸又含之以差爲度此方甚驗

古今録驗療口臭方

甘草二兩炙　細辛二兩末

右二味臨卧三指撮以酒服之甚良千金同

舌論一首

删繁舌者主心小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能知五味凡有所噉若多食鹹則舌脉凝而變色多食苦則皮槁而外毛拔多食辛則舌筋急而枯乾多食酸則舌肉䐈而脣揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五藏之氣也若藏熱則生瘡脣揭赤色若腑寒則舌本縮而口噤脣青寒宜補之熱宜瀉

之不寒不熱依腑藏調之

舌本縮口噤方二首

刪繁療舌小腸腑寒應舌本縮口噤脣青獨活解噤膏方

獨活　芎藭各三兩　天雄一兩炮　防風一兩

蜀椒二合　莽草十葉　細辛　桂心各一兩

苦李根皮三兩　猪肪二升

右十味㕮咀綿裹以苦酒一升淹漬一宿以猪肪微火煎之去滓膏成凝以綿裹少許口含於舌下嚥之取差日三度易之此方甚良

又生艾葉薄法

無生艾葉者取乾者擣之以水淹一升巳來熟擣以帛塗之於寒處上封裹之以差爲度

舌上瘡方二首

千金云舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此因心虛熱所致療之方

柴胡　升麻　梔子人　芍藥　通草各四兩　黄芩　大青　杏人去皮尖　生薑各三兩　石膏八兩綿裹

右十味切以水一斗煎取三升半分四服日三夜一

又療舌上瘡方

豬膏一斤　蜜二升　甘草如指節三寸

右三味相和煎相得即含棗許嚥之日三差止

千金喉舌諸疾方

咽喉舌諸疾方七首

松子　苦芥子

擣以苦酒和貼上

又方　麥麪以苦酒和塗之痛止

小品療喉諸病方

雞子一枚破以黃白攪吞之差

文仲療咽喉舌諸方

瓜耳下張口解間突處痛爪勿止兩三食久即得咽喉開

又方　隨所近左右刺手中指爪甲下令血出當先縛中指令血聚然刺之

備急療急喉咽舌病者方

隨病所近左右以刀鋒裁刺手大指甲後爪中令出血即愈

又方　病人卧急爪其蹠心隨所近左右以差爲良

口脣舌鼻雜療方一十四首

廣濟療疳蟲蝕脣鼻齒口及餘處皆効方

石硫黃研　乾漆熬　文蛤燒作灰

右三味各等分絹篩之每用減取胡桃大麝香棗核大研和先拭上惡物血等然傅之日三

肘後療脣裏忽生丸核稍大方

以刀鋒決之令血出差

刪繁療舌主心藏熱即應舌生瘡裂破脣揭赤升麻泄熱煎方

升麻三兩　射干三兩　子蘗一斤切　苦竹葉五合切

大青二兩　生蘆根　薔薇根白皮各一斤切

生玄參汁五合　生地黃汁五合　赤蜜八合

右十味切以水四升煑七物取一升絞去滓下諸汁蜜等候成煎放冷以綿取之封貼舌上含之細細嚥之以差為度忌千金同

千金療舌上有瘡四五孔大如簪者出血如涌泉此心藏病治方

戎鹽五分　黃蘗　黃芩各五分　人參二分

甘草二分炙　大黃三分　桂心二分

右七味擣末蜜和丸以飲服十丸漸增之或燒鐵篦烙孔上

又療膀胱熱不已口舌瘡咽腫升麻煎方

升麻　大青　黃蘗各二兩　薔薇根

射干　玄參各四兩　蜜五合

右七味切以水七升煑六物取一升去滓下蜜煎成含之

以差即止

又療口傍瘡方

亂髮灰故絮灰黃連末各等分以傅瘡取差翼中有乾薑

又療脣邊生瘡連年不差方

以八月藍葉十斤擣汁澄取淀以傅之

又療脣舌忽生瘡方

燒雞舌香末綿裹傅之取差

又療脣黑腫痛痒不可忍方

取大錢四文於石上磨似泥或乾用臘月豬脂和塗之差

又方

以竹彈弓彈之要惡血出差

又療遠行脣口面皸破方

前臘月豬脂傅之差

又療冬冬月脣乾坼血出方

擣桃人以豬脂和塗

張文仲療舌強不能言方

礬石　桂心各一兩

右二味擣末傅舌上差

必効療舌忽然麤滿口方

以釜下煤和鹽等分以塗舌腫令遍瀝清水塗之取差止

外臺祕要方卷第二十二

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺秘要方

二十三

癭瘤咽喉
瘰癧

外臺秘要方卷第二十三 瘿瘤咽喉瀝瘻二十八門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

漏腋方三首

七孔臭氣方三首

令人體香方四首

雜療汗出不止方一十首

癭病方一十八首

病源癭者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不急垂搥搥然是也恚氣結成癭者但垂核搥搥然無脉也飲沙水成癭者有核瘟瘟然無根浮動在皮中又云有三種癭有血癭可破也息肉癭可割之有氣癭可具針之養生方云諸山水黒土中出泉流者不可久居常食令人作癭病動氣增患出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欲成癭海藻酒方

海藻一斤去鹹 清酒二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三盡更作三劑佳崔氏文仲同

又方

昆布海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽汁日四五

並出中卷

深師療癭方

桂心 昆布洗 海藻洗 甘草炙

白蘞熬各三分 龍膽 海蛤研 土瓜根

半夏洗 吳茱萸 牡蠣熬各一兩

右十一味爲散酢漿水服五分匕先食日三十日知盡藥愈

節食鹽羊肉餳生葱松菜

又方

海藻洗二分　龍膽二分　昆布洗二分　土瓜根二分

半夏洗二分　小麦麪炒二分

右六味爲散先食酒服方寸匕日三二十日知三十日愈忌羊

肉餳並出第二十九卷中

小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中央不

偏兩邊也乃不急膇膇直僞切重膇病也然則是癭也中國人息氣結癭

者但垂膇膇無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜癭有核瘰

瘰耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則

令腎實故病癭也北方婦人飲沙水者產乳其於難非針不出

是以比家有不救者良由此也

療癭方

小麥一升

淳苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡暴麥

熳擣篩以海藻三兩別擣以和麥末令調酒服方寸匕日三禁鹽生魚生菜猪肉肘後崔氏備急云療三十年癭疾集驗文仲范汪等同出第十卷中肘後用海藻五兩

集驗療癭酒方

是水雨經露出柳根三十斤

右以水一斛煑得五斗同米三斗釀之酒成先食服一升日三范汪同出第四卷中

崔氏海藻散療癭方

海藻八兩洗去鹹汁　貝母二兩　土瓜根二分

小麥麴二分炒

右四味作散酒服方寸匕日三

又方

秫米三升依酒法炊

右一味取圓葉白楊皮十兩去上蒼者愼勿令見風細切以水五升煮取二升濃汁漬麴末五兩用前件秫米依酒法醞之熟訖封塞一七日然後空腹服一大盞日再服三日內即効神驗無比並出第四卷中

張文仲隱居効驗療癭方

昆布洗 松蘿各三分 海藻五分

右三味擣蜜丸如杏核大含咽津日三夜二大佳備急肘後同

又療癭司農楊丞服効第一方

昆布六分洗 海藻七分 松蘿 乾薑 桂心各四分 通草五分

右六味擣篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在頸下癭處欲至食時即先飲少酒下却丸子然進食禁酢蒜鹽酪臭肉

倉米等若瘻大者加藥令多耳差

又第二方

昆布[洗] 海藻[洗各一斤]

右二味細切好酒五升浸七日量力耳數服酒盡以酒更浸兩遍藥力盡當以此酒下前丸藥益善備急肘後同

又方

小麥[三升]

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾擣篩爲散別擣昆布爲散每服耳麥散二匕昆布散一匕旦飽食訖清酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩惱等事

肘後備急集驗同

又含丸方

檳榔人三兩　馬尾海藻三兩洗　昆布三兩洗

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一丸徐徐令津液取汁咽之忌鹽並楊丞方服驗肘後備急同並出第六卷中

救急療瘿要切方

鼠粘草根一大升湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差一方削除皮細切取三大升擣篩爲散蜜和丸如梧子一服二十丸日再服之稍稍加至三十丸以無灰酒進之出第五卷中

古今錄驗療氣瘿方晉州熙公奏徐公方

問荆一兩出海島　羯羊靨五具去脂炙　白斂　椒目

甘草炙各一分　小麥麴末二兩熬

右六味擣篩爲散羊靨一種別擣爲末相和好漿浸更擣作丸

如小棗大一服五丸無禁

又方 懸令

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸服

忌愼如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便差

又療癭海藻散方

海藻 十分洗 昆布 一兩洗 海蛤 一兩研 通草 一兩

菘蘿 洗 乾薑 桂心 各一兩

右七味下篩酒服一錢匕日三出第四十一卷中 附後無乾薑有白斂

氣癭方一十首

廣濟療氣癭氣胷膈滿塞咽喉項頸漸麤昆布丸方

昆布 二兩洗去鹹汁 通草 一兩 羊靨 二十七枚炙

馬尾海藻（一兩洗去鹹汁） 海蛤（一兩研）

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁無食前後忌生菜熱麪炙肉

蒜笋

又療冷氣築咽喉噎塞兼癭氣昆布丸方

昆布（八分洗） 乾薑（六分） 犀角（六分屑）

吳茱萸（四分） 人參（八分） 馬尾海藻（四分洗）

葶藶子（六分熬） 杏人（八分去皮尖熬）

右八味擣篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷熱麪炙肉魚蒜

笋粘食陳臭等

又療氣妨塞方

昆布（三兩洗） 菘蘿 通草 柳根鬚（各三兩近水生者）

右四味擣篩蜜丸如彈丸大以海藻湯浸細細含之咽盡勿停

忌舉重生嗔憂悲等

又療癭細氣方

昆布十二分洗　馬尾海藻十分洗　杏人各八分去皮尖熬

通草　麥門冬去心　連翹子六分

乾薑　橘皮各六分　茯苓八分　松蘿三兩

右十味，㕮咀，以齒微微嚼藥袋子汁出入咽中，日夜勿停。看有問荆加四分，佳。忌嗔及勞、油膩、粘食。並出第二卷中

深師蘇子膏療氣癭方

臘月猪脂一升　蘇子　桂心　大黃

當歸　乾薑　橘皮　蜀椒汗，各三分

右八味，切，以水六升煑取二升，去滓，内猪脂，消盡，服。差。忌生葱。出第二十九卷中

崔氏云：凡水癭、氣癭可差，石癭不可治。療氣癭方

平旦手挽癭令離項，搯他勞切其下根脉斷，愈。一日一

度摺易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布洗二兩　海藻洗二兩　龍膽一兩　馬刀炙半兩

海蛤研半兩　大黃一分　熏黃半兩

右七味擣蜜丸如梧子大破除日以綿裹一丸含咽津朝暮

空腹服忌五辛猪肉

又方

海藻洗二兩

右一味以淳酒四升漬二宿漉去滓細細煖含咽之盡即更

造取差爲度范汪同並出第四卷中

必効主氣癭方

白頭翁半兩　昆布洗十分　海藻洗七分　通草七分

玄參　連翹子各八分　桂心三分　白斂六分

右八味擣篩蜜丸如梧子五丸若冷用酒服禁蒜麪猪魚生
葱出第五卷中

古今録驗療癭有在咽喉初起游氣去來陰陽氣相搏遂停住喉中前不去腫起如斛羅諸療不差小麥湯方

小麥三升 昆布二兩洗去鹹 厚朴炙一兩 橘皮
附子炮 海藻洗各二兩 生薑五兩 半夏洗五兩
白前三兩 杏人一百枚去尖皮

右十味切以水一斗煮取三升半分五服相去一炊頃忌猪羊肉餳冷水出第四十一卷中

五癭方八首

深師五癭丸方

取鹿靨以酒漬令没炙乾内酒中更炙令香咽汁味盡更易十具愈千金翼同出第二十九卷中

范汪療五癭方

昆布三兩洗　海蛤二兩研　松蘿三兩　海藻三兩洗

通草　白斂　桂心各二兩

右七味作散酒服方寸匕日三千金翼同出第四十二卷中

千金療石癭勞癭泥癭憂癭氣癭方

海藻洗　龍膽　海蛤研　通草

昆布洗　礜石燒　松蘿各三分　小麥麴四分熬

半夏洗二分

右九味作散酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛生菜羊肉餳十日知二十日愈

又方

昌蒲二兩　海蛤研一兩　白斂一兩　海藻洗一兩

松蘿一兩　桂心一兩　椒汗一兩　羊靨百枚

半夏洗一兩　續斷一兩　神麯三兩　到桂草一兩

右十二味擣作散以醬漬羊牛髓脂爲丸如梧子日服三丸忌羊肉生葱等翼同

又方

小麥麪一升　特生礜石一斤燒　海藻一斤洗

右三味三年酢一升漬小麥麪暴乾更漬令酢盡乾各擣下篩每服兩方寸匕日四五服含乃咽之忌薑辛生菜猪魚大誦大語吹火用氣翼深師用小麥麪一斗餘同並出第二十五卷中

千金翼五癭方

海藻一兩洗　昆布洗　半夏洗　細辛

土瓜根　松蘿各一兩　白斂　龍膽各二兩

海蛤二兩　通草二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉餳生菜葱不得勞動

又方

昆布洗二兩

右一味切如大指酢漬含咽汁盡愈

又方

海藻一斤　小麥麪一斤

右二味以三年酢一升溲麪暴令乾往復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忌怒出第十一卷中

千金灸諸癭法

灸癭法一十三首

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯再三以差止

又法

又法

灸風府百壯風府夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中

又法

灸大椎兩邊相去各一寸半小下垂各三十壯

又法

灸頸衝頸衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴翼深師普同

又癭上氣并短氣方

灸肺俞一百壯

又癭上氣胷滿法

灸雲門五十壯

又癭惡氣方

灸胷堂百壯

又癭惡氣法

灸天府十五壯

又癭勞氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈横文頭是據此是曲池穴衝陽在足趺上

五十

又療癭法

灸天瞿三百壯横三間寸灸之

又癭氣面腫法

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸癭法

灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中並出第二十五卷中

又灸癭法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脉準

前灸大効出第六卷中已上穴所在具三十九卷明堂
中

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不堅強桉之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦愼不可破方乃有大療今如覺但依瘿家療療若不消更引別大方出中卷

深師療瘤脂細瘤方

吴茱萸一分　礬石燒　芎藭　當歸
大黃　黃連　芍藥　白斂
黃芩各二分

右九味合擣下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知

膿血盡著生肉膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘤潰漏及金瘡百瘡悉療之方

真當歸　附子炮　甘草　白芷

芎藭各一兩　薤白二兩　生地黃三兩

右七味㕮咀以豬膏三升半合微火煎白芷黃去滓稍以傅瘡上日三良出第二十九卷中千金並同

千金云凡肉瘤勿療療則殺人慎之慎之出第二十五卷中

千金翼療瘤病方

麞鹿二種肉割如厚脯火炙令熱搨掩可四炙四易痛膿便愈不除更炙新肉用之良出第二十四卷中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金翼白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熟刮瘤上

洗之日三即愈

又方

白礬　硫黃等分

右二味末以酢和封上並出第二十四卷中

千金陷腫散主二十三十年瘤癭及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如杯盂升斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或耎或潰令人驚惕寐寤不安體中掣縮愈而復發療之方千金翼云陷麥散

烏賊魚骨一分　白石英二分　石硫黃一分

紫石英二分　鍾乳二分研　乾薑一兩

丹參三分　琥珀一兩研　大黃一兩

附子一兩炮　胡鷰屎一兩

右十一味爲散貯以韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅之若瘡

乾無汁者以猪膏和傅日三四以乾爲度若汁不盡者至五劑十劑止勿措意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩益佳忌猪肉出第二十五卷中　翼無胡鷰屎

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脉沉者爲陰浮者爲陽若右手關上脉陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動樓肘使急腰内亦然住定放兩肋頭向外附膊腰氣散盡勢大悶始起來去七通去喉痺出第三十一卷中

廣濟療喉痺急疼悶妨不通方

馬蘭根切一升　升麻三兩　瞿麥二兩　射干十兩

犀角二兩屑　通草二兩　玄參三兩

右七味切以水八升煑取二升去滓細細含咽一日令盡得破

膿愼熱麪炙肉蒜

又療喉痺方

馬藺子八分　牛蒡子六分

右二味擣爲散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一匕半日

再並出第二卷中

肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人

療之方

巴豆一枚開其口

右一味以綿裹極堅令有繩出外以巴豆内鼻中隨腫左

右時時吸氣半日許即差無巴豆用杏人以塞耳如

之文仲范汪同

又方

熬杏人熟擣蜜丸如彈子含咽其汁亦可擣杏人末帛裹含之小品文仲備急范汪同

又方

礬石一兩水三升漬洗手足

又方

生地黄汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍含之

又方

射干　當歸各三兩

右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

又方

剥葫塞耳鼻孔日再易之有効

又方

昌蒲根嚼燒秤鎚令赤内一杯酒中沸止飲之文仲備急同

又療喉痺方

射干一片含咽汁

又方　升麻斷含之喉塞亦然

又方

桔梗三兩

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉

又方

取芥子擣碎以水及蜜和滓傅喉下燥輒易

又傅用神効方

桔梗　甘草炙各一兩

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出備急同忌猪肉

海藻菘菜

又療舌死者方

擣馬藺根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以物拗灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痺方

半夏末方寸匕

右一味開雞子頭去中黃白盛淳苦酒令小滿内半夏末著中攪令和雞子著刀子鐶令穩炭上令沸藥成置杯中及煖稍咽之但腫即減忌羊肉餳肘後文仲同此與仲景苦酒湯同半夏不可作末剖之可也

又療喉痺塞射干丸方

射干二兩　豉三合　芎藭　杏人去尖皮各一兩

犀角一兩屑　升麻二兩　甘草一兩炙

右七味擣下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海藻菘菜

又射干湯療喉痺閉不通利而痛不得飲食者若閉喉并

諸疾方
當歸二兩　升麻一兩　白芷三兩　射干
甘草炙　犀角屑　杏人去尖皮各一兩
右七味切以水八升煮取一升半分服神良忌海藻菘菜出第二十九卷中
近効療喉痹方
大附子一箇刮去皮作四片
右一味以蜜塗火上炙稍熱即含咽汁甜盡又取一片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌猪肉冷水
又方　朴消一兩細細含咽汁一食頃差
又若腫全盛語聲不出者方
大附子一枚炮令裂削去皮切如豆
右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌猪肉冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻　通草　黃蘗　玄參各八分

麥門冬十分去心　竹茹　前胡各六分　芒消十分

右八味切以水八升煮取二升五合去滓內消溫分三服服別如人食頃自利去消

又方

生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煻火煨沸起擎下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二即差並出第二卷中

近效療喉痺喉咽塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬藺根葉二大兩

右一味切以水一大升半煮取一大盞去滓細細喫須臾即通

絡石草亦療煎法分兩亦同

喉舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒即愈文仲備急同

又方

酒漬蘘荷根半日含漱其汁

又方

杏人二十枚　甘草一寸　黃連一分

右三味末綿裹含之千金同

又方

礬石二兩燒去汁　黃連一分末

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連一兩

右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌豬肉冷水

張文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之肘後同

又方

刲黃蘗含之肘後同並出第七卷中

備急療喉中及舌生瘡爛方

刲薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉文仲肘後同出第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方

生地黃五兩　青竹茹　玄參　雞蘇各二兩

茯苓　升麻　麥門冬去心各三兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服相去如

人行七八里不能多服含細細咽亦得忌生冷熱麪炙肉油酢出第五卷中

千金療口中塞及咽喉不利生瘡口燥膏方

猪膏一斤　白蜜一斤　黃連一兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗日四五度

又療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸　射干根　升麻各一兩　附子半兩炮

白蜜四兩

右五味切以猪膏四兩先煎之成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎附子色黃藥成絞去滓內蜜復上微火煎令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五度稍稍咽之並出第六卷中

古今錄驗升麻湯療咽喉生瘡方

甘草一兩炙　升麻　石膏碎綿裹　牡丹皮各一兩

右四味切以水七升煑取三升一服七合日三忌海藻菘菜出第二十九卷中

咽喉腫方五首

肘後咽喉卒癰腫食飲不過方

用薤一把擣傅腫上冷復易之用苦酒和亦佳范汪同

又方

吞薏苡人子二枚

延年療喉中熱腫方

鼠粘根切一升

右一味以水五升煑取三升去滓分温三四服忌蒜麪出第十九卷中

古今録驗羚羊角豉湯療喉痛腫結毒氣衝心胷方

豉一升半綿裹　犀角二兩屑　羚羊角一兩屑

芍藥三兩　升麻四兩　杏人一兩去尖皮

梔子七枚　甘草二兩炙

右八味切以水七升煑取一升半去滓分三服忌海藻菘菜

又五香湯療諸惡氣喉腫結核方

沈香二兩　薰陸香一兩　麝香二分研湯成下

青木香二兩　雞舌香二兩

右五味以水五升煑取一升半去滓分三服並出第二十九卷中

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

范汪療卒喉中塞痛不得飲食方

取敗筆一枚燒屑以漿飲服一方寸匕良驗出第十五卷中

文仲療喉中卒毒攻痛方

章陸根切炙令熱隔布熨之冷轉易立愈姚云苦

酒熱敷傳喉亦療喉痺肘後小品同

又方

擣艾傳之並出第七卷中

懸癰腫方三首

肘後療懸癰腫卒長數寸如指隨喉出入不得食方

開口捧頭以筯抑舌及燒小鐵於管中灼之令破止若不須爲苦可三爲之寧小根不盡勿大畢以鹽隨烙

敷塗之

又方

擣鹽綿纏筯頭點鹽傅以揩之日六七度文仲備急同

千金療懸癰垂暴腫長方

乾薑　半夏洗等分

右二味末之以少少著舌本出第六卷中翼同

咽喉雜療方四首

范汪療咽喉不利下氣丸方

射干根　附子炮　人參

杏人去尖皮熬各一分

右四味合擣下篩蜜丸如梧子含一丸咽汁日三夜一忌猪肉

冷水千金同

又療口中咽喉不利當歸含丸方

當歸末二兩　杏人一兩熬去皮尖

右二味擣合下篩以蜜和爲丸如梧子二丸含漸漸咽汁日

三夜再

又療咽喉中痛不利丸方

升麻　甘草炙　鬼臼　射干根

丹砂各一兩　雄黃一兩　杏人一十枚去皮尖　麝香半兩

右八味擣下篩和以蜜丸如梧子飲服一丸日三漸加之酒

下亦得咽痛失聲不利用良忌海藻菘菜千金同出第五十卷中

崔氏療尸咽咽内瘡痛欲失聲方

桂心二兩　杏人去尖皮熬一兩　蕪荑一兩

右三味擣末合和綿裹含如杏人許咽汁消盡更含日三夜二忌膩食以外無忌出第四卷中

寒熱瘰癧方一十一首

病源此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結爲瘰癧或如梅李等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則變膿潰成瘻也其湯熨針石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蹲踞以兩手從脚入據地曲脚加其上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳癰出第三十四卷中

甲乙鍼經寒熱瘰癧論黄帝問曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆

何氣所生歟伯對曰此皆鼠瘻寒熱之氣也稽留於脉而不去者也鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脉中未著於肌肉而外爲膿血者去易問曰去之奈何對曰請從其末引其本可使衰去而絶其寒熱審安其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已決其生死法反其人目視之其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歳死見一脉半一歳半死見二脉二歳死見二脉半二歳半死見三脉三歳死此赤脉不下貫瞳子者可療出第八卷中千金同

廣濟療瘰癧九方

鸛骨　狸骨並炙　射干　玄參

升麻炙　青木香　沈香　犀角屑

丁香　羚羊角屑　丹參　甘草炙各四分

人參　砂參各三兩　獺肝六分　連翹子六分

光明沙二分研

右十七味擣篩蜜丸以飲服十五丸日二服漸加至三十丸空腹服之不利忌生冷油膩血食并酢熱肉海藻松菜粘食陳臭生血物等

又療瘰癧方

連翹子 射干 玄參 芍藥

青木香 芒消 升麻 梔子人擘

前胡 當歸 甘草炙 大黃各二兩

右十二味切以水一斗煑取三升分三服服別相去如人行六七里快利忌生冷猪肉海藻菘菜蒜酢並出第五卷中

劉消子療寒熱瘰癧散方

狸骨五兩炙 烏頭七分炮 黃連七分

右三味擣下篩先食以酒服一錢匕日三良忌猪肉冷水芫

汪同出第十卷中

千金療瘰癧方

白殭蠶爲散以水服五分匕日三十日差深師救急同

又方　於患人背兩邊腋下後文上隨年壯灸之

又方　灸耳後髮際七壯

又方

槲白皮三斤

右一味細切以水七升煮取三升去滓眞珠砂方寸匕和汁一升旦向日服之強行湏臾吐鼠出三朝服良

又方

狸頭一枚炙擣下篩旦白飲服方寸匕日再服之

又方　狼糞灰封上良

又療寒熱瘰癧散方

連翹　土瓜根　龍膽　苦參
黃連　括樓　芍藥　常山皮各一兩
狸頭骨一枚炙
右九味擣下篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水翼集驗古
今録驗同一方云無狸頭骨加之名狸頭散餘同並出第
二十四卷中
救急療瘰癧方
馬齒隂乾燒灰臘月猪膏和之以煖泔清洗瘡拭
乾傅之日三出第三卷中
瘰癧結核方四首
廣濟療瘰癧息肉結硬薄方
白斂　甘草炙　青木香　芍藥
大黃各三兩　玄參三兩

右六味擣爲散少減以少酢和如稀泥塗故布貼上乾易之
勿停忌猪肉五辛熱肉飲酒熱麪等

又瘰癧結核令消散方

黄耆七分　玄參八分　連翹子　人參
升麻　青木香　茯苓　蒼耳子
甘草炙　朴消　桂心各四分　枳實炙去穰
大黄　羚羊角屑　麦門冬去心各五分　鼠粘子
苦參各九分

右十七味擣蜜丸如梧子以酒下十丸日夜三四漸加至二三十丸以知爲度忌生冷猪肉海藻菘菜酢生葱蒜陳臭等並出第五卷中

肘後療頸下生瘰癧瘰如梅李宜使消之方

海藻一斤洗

右一味以酒三升漬數日稍稍飲之文仲備急等同

又方

人參　甘草炙　乾薑　白斂各四分

右四味擣篩酒服方寸匕日三忌海藻菘菜劉涓子文仲備急同出第六卷中

惡核瘰癧方四首

文仲五香連翹湯療惡肉惡脉惡核瘰癧風結腫氣痛方

青木香　沈香　雞舌香各二兩　麝香半兩

薰陸香一兩　射干　紫葛　升麻

桑寄生　獨活　通草　連翹各二兩

大黄三兩　淡竹瀝二升

右十四味切以水九升煑取減半内竹瀝更煑取三升分三服忌五辛古今録驗同出第五卷中千金方無紫葛雞舌香有丁香

延年丹參湯療惡肉核瘰癧諸風氣結聚腫氣諸病並主之方

蒴藋　丹參各二兩　甘草炙　秦艽

獨活　烏頭炮　牛膝各一兩　躑躅花

蜀椒各半兩汗

右九味切以水八升煮取三升溫服一升古今錄驗有白及餘並同忌海藻菘菜豬肉冷水

又玄參湯主惡核瘰癧風結方

玄參　升麻　獨活　連翹子各二兩

木防己　菊花各一兩

右六味切以水八升煮取三升分服一升日三文仲同

又丹參膏主惡肉結核瘰癧脉腫氣痛方

丹參八分　白斂　獨活　連翹子

白及各四分　升麻　蒴藋各六分　防巳
玄參　杏人各五分去皮尖
右十味細切以生地黄汁淹漬一宿以鍊成猪膏四升微火煎五上五下藥成絞去滓以摩病處日三四
癰腫瘰癧核不消方五首
經効犀角丸療瘰癧方
犀角四分　升麻三分　大黄六分　牛蒡子八分
烏蛇十分炙去頭尾　玄參八分
右六味末之蜜和丸如梧子大每日至午後煎牛蒡湯下三十五丸
又方
龍骨八分　牡礪八分熬
右二味末之酒下三錢匕日三度良

又大黃膏方

大黃六分　附子四分炮　細辛三分　連翹子四分

巴豆一分

右五味以苦酒浸一宿以臘月猪膏煎三上三下去滓以綿濾之用傅之日三五度塗之良

集驗療寒熱瘰癧散方

連翹六分　土瓜根四分　龍膽五分　黃連四分

苦參六分　栝樓四分　芍藥五分

右七味爲散食後溫酒下五六分匕日三

又方　陵鯉甲二十一枚燒擣末傅瘡上効千金同

鼠瘻及瘰癧方一十一首

文仲療瘰癧方

苦參四大兩擣末生牛膝和丸如梧子食後煖水下十丸

日三服

又方

昆布四分 海藻四分

右二味各洗去鹹擣末蜜和丸如杏核許大含之日三度良差

救急療鼠瘻久不差方

取狼鼠不限多少常作羹粥任喫之必驗千金經効同

范汪療鼠瘻瘰癧方

取臘月豬膏正月鼠頭燒令作灰以膏和傅之愈若不差者瘰癧右灸右肩頭三指度以下掐灸炷皆如雞子大良若不能堪者可如中黄亦可已試有良驗

又療頸鼠瘻累累者方

貝母 乾薑 藁本

桂心 蜀椒各一分汗

右五味擣下篩先食吳茱萸一分以酒服一撮忌生葱

又療鼠瘻瘰癧身熱方

豬椒二十斤

右一味以水淹足煎熟去滓置瓶中覆瓶口以瘡當上熏候熱極乃止痛膿血鼠當從瘡出便愈

又寒熱鼠瘻瘰癧散方

狸骨炙　龍骨各五分　躑躅熬半兩　鼠粘子

當歸　王不留行　土瓜根各一兩

右七味擣合篩先食酒服方寸匕日再夜一出並第四十二卷中

集驗療鼠瘻及瘰癧膏方

白馬牛羊豬雞等矢屑各一斤

漏蘆　藁本各二斤

右七味並於石上燒作灰研絹篩之以豬脂一升三合煎亂髮一兩半令沸髮盡乃內諸藥屑微火上煎五六沸藥成先去瘡上痂以鹽湯洗新綿拭瘡令燥然後傅膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛覆無令風冷神驗療癧以膏傅上亦日再古今錄驗范汪同

又療寒熱瘰癧散方

白曽青半兩　當歸　防風　括樓根

芎藭　黄耆　狸骨炙　甘草炙各二兩

細辛　乾薑　露蜂房各一兩炙　礜石燒半日

大附子炮　茌子各半兩　斑猫去首足羽熬　芫青去首足羽各五枚熬

右十六味擣下篩爲散以酒服一錢匕日再忌豬肉冷水海藻菘菜古今錄驗范汪同並出第八卷中

又療鼠瘻方

蛇腹中鼠蝦蟇燒末酒服方寸匕甚効

又方

以槲葉擣末傅腫上熱炒鹽熨之即消良効並出第五卷中

毒腫瘰癧方四首

崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脉寒熱如瘰癧痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急速與湯并以滓薄腫脉上方

青木香　雞舌香　沈香　升麻各五分

藿香　犀角屑　吴茱萸　桂心

麻黄　甘草炙各三分　薰陸香四分　細辛二分

右十二味㕮咀以水七升煑取二升分三服不差復合吕若嗇嗇惡寒加附子中形者一枚炮令坼八破用忌生葱菘菜海藻猪

肉冷水生菜五辛古今錄驗同

又五香湯療毒腫瘰癧方

麝香研　青木香　雞舌香　藿香

薰陸香　當歸　黃芩　升麻

芒消各三分　大黃五分

右十味㕮咀以水六升煑取二升去滓內消分二服相去如人行七八里再服諸卒尸注惡氣亦療出第五卷中

經心錄射干湯療惡毒身強痛瘰癧方

射干　桂心各二兩　麻黃去節　生薑

甘草炙各四兩　杏人四十箇去皮尖

右六味切以水四升煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜出第五卷中

又升麻湯療風毒咽水不下及瘰癧腫方

升麻　芍藥各四兩　射干三兩　杏人去尖皮三兩
麻黃去節二兩　甘草炙二兩　楓香　葛根各三兩
右八味切以水八升煎取半分三服忌海藻菘菜出第三卷中

灸瘰癧法六首

千金灸瘰癧法
兩腋中患癧處宛宛中百壯止

又法
擣生章陸根捻作餅子置漏上以艾炷灸餅子上乾熟易之灸三四炷

又法　灸五里大迎各三十壯

又法
葶藶二合　豉一升
右二味合擣令極熟作餅如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上

作艾炷如小指大灸餅上三壯一日易三餅九炷隔三日一灸翼同古今録驗兼主瘻不可灸頭瘡葶藶氣入腦殺人劉涓子同

又法

一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝以作瘻瘡及癰節者以獨頭蒜截兩頭却心作孔大艾炷勝蒜大小貼癧子上灸之勿令上破肉但取熱而已七炷一易蒜日三易日日灸之取消止翼同

又方

七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合擣作炷灸癧子一百壯並出第二十四卷中

九瘻方三十五首

廣濟療瘻有九種不過此方

芫青（四十枚去足羽熬）　海藻（八分洗）　昆布（八分洗）　雄黄（八分研）
狸骨（五分炙）　牡蠣（四分熬）　地膽（二十枚熬）　青木香（三分）
右八味擣篩爲散酒服一錢匕日二服病從小便出如爛筋
忌生冷粘食猪魚肉陳臭物出第五卷中

劉涓子療鼠瘻方

死蜣蜋（燒作灰）
右一味苦酒和塗之數過即愈先以鹽湯洗古今錄驗千金同

又方

五月五日樓桃擣末先鹽湯洗拭之令乾以末傅瘡上（樓桃末詳）

又方

烏頭（炮）　附子（炮各二兩）

右二味㕮咀著五升淳苦酒中漬之待乾復内苦酒中燥復内以苦酒盡暴令乾擣末酒服方寸匕日三忌猪肉冷水等

又張子仁療鼠瘻要方

柞木皮五升

右一味以水一斗煑熟去皮煎令汁得二升稍稍服盡當有宿肉出即愈備急文仲古今録同並出第六卷中

肘後療若阜内肉外查瘤膿血出者是蜂瘻方

取蜂房火炙焦末酒服方寸匕日一

深師療鼠瘻方

鰻鱺魚□□炙令焦　野猪皮□□□□□　斑猫二十枚去羽首足熬

瞿麥一兩　巴豆□□□□□□　五月五日蟾蜍一箇炙

臈月猪脂五兩

右十味擣野猪皮下篩合諸藥更擣下篩內鰻鱺魚頭膏和擣千杵平旦未食服如梧桐子二枚覺者寒熱不覺暮投明日旦起更服三丸稍稍增之慎勿食熱食煩悶殺人蟲當從小便出以坩盛之尿便視乃有百數耳不可以見亦大便出此方驗服百要愈忌猪肉蘆笋等

又方

馬齒礬石燒　真珠粉

右二味擣下篩爲散厚塗瘡上不過三愈

又方

松脂　硫黃　狼毒各二兩

猪腦一具　白斂二兩

右五味熬猪腦取汁狼毒白斂㕮咀以水三升煮取一升內腦汁中煎令得五合細末硫黃松脂下篩內中攪令相

得綿裏內磨中七日知一七日病除神良

集驗凡有九種瘻

一曰狼瘻始發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連耳本種大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸爲佐

二曰鼠瘻始發於頸無頭尾如鼷鼠瘻核時上時下使人寒熱脫肉此得之由食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母爲佐

三曰螻蛄瘻始發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃得之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸茬子主之桔梗爲佐

四曰蜂瘻始發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之多飲流水水有蜂餘毒不去其根在脾雄黃主之黃芩爲佐

五曰蚍蜉瘻始發於頸初得之如傷寒此得之因飲食中有蚍蜉毒不去其根在腎礜石主之防風爲佐

六曰蠐螬瘻始發於頸上下無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因恚怒哭泣得之其根在心礬石主之白术為佐

七曰浮疽瘻始發於頸如兩指使人寒熱欲卧此得之因思慮憂憶其根本膽地膽主之甘草為佐

八曰瘰癧瘻始發於頸有根初苦痛瘰癧覺之使人寒熱得之新沐頭濕結髮汗流入於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為佐

九曰轉脉瘻始發於頸如大豆浮在脉中濯濯脉轉苦驚惕身如振寒熱始得之時驚卧失枕其根在小腸斑猫主之白芷為佐

療瘻九種方

空青研鍊之　商陸根　狸骨炙　知母

荏子　桔梗　雄黃　黃芩

礜石燒　防風　礬石燒汁盡　地膽熬

白朮　甘草炙　雌黄　芍藥

斑猫去足羽熬　白芷各二分

右十八味擣其論病者特加其分餘種令分等細篩末空青最在後內之苦酒服一刀圭日三服三十日知五十日愈七十日平復病者百日禁食魚肉忌生菜桃李雀肉海藻菘菜犬肉生血物餘無所忌二大豆爲一刀圭小兒服之半大人全服八歲以下寧從少起過度令人淋淋即減之出第九卷中

千金問曰何謂九瘻荅曰一曰狼瘻二曰鼠瘻三曰螻蛄瘻四曰蜂瘻五曰蚍蜉瘻六曰蠐螬瘻七曰浮沮瘻八曰瘰癧瘻九曰轉脉瘻謂之九瘻

又療狼瘻發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連延耳根腫大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸爲佐方

空青研二分　蝟腦二分乾之　獨活一分　蝟肝一具乾之

芎藭半兩 女婦草一分 黃芩 鼈甲炙

斑猫去翅足熬 乾薑 當歸 茴香

礬石燒 地膽各一分 蜀椒三十枚汗

右十五味作散下篩酒服方寸匕日三十五日即止忌生血物莧菜

劉涓子古今錄驗同

又療鼠瘻發於頸無頭尾如鼷鼠使人寒熱此得之因食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母爲佐方

陵鯉甲炙 山龜殼炙 甘草炙 桂心

雄黃 乾薑等分

右六味作散下篩服方寸匕日三蜜和內瘡中無不愈先灸作瘡後與藥良忌海藻生葱劉涓子備急古今錄驗文仲同

又療鼠瘻瘰癧差復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂㕮咀生地黃內脂中令其脂與地黃足相淹

和煎六七沸去滓桑灰汁淨洗瘡去惡汁以地黄膏塗上日一易范汪同

又療鼠瘻方

得蛇虺所吞口中鼠燒末服方寸匕日再不過三服此大驗難過耳并傅瘡中范汪同

又療鼠瘻方

死鼠一枚中形者　亂髮如雞子一枚

右二物以臘月猪膏令淹鼠髮煎之令其鼠髮都盡消膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分以酒服之即愈矣鼠子當從瘡出神良祕不傳翼備急文仲集驗范汪同

又療螻蛄瘻發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黄此得之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸茬子主之桔梗爲佐方

桂心　乾薑　桔梗　礬石燒

獨活各一分　附子一分炮　椒一百粒汗　芎藭半分

龍骨半分　茬子一分

右十味擣下篩棗二十枚合擣以酢漿丸如大豆温漿下五丸忌猪肉冷水生葱生菜古今録驗劉涓子同

又方

槲葉灰先以泔清煑槲葉取汁洗拭乾内灰瘡中

又療蜂瘻發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之飲流水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩爲佐方

蜂房一具炙　鼈甲一分炙　茴香一分　吳茱萸二分

椒一百粒汗　乾薑一分

右六味擣下篩作散傅瘡孔中日十度十日止忌莧菜

又療蜂瘻初生時狀如桃而痒搔之則引大如雞子如覆手者方

熬鹽熨之三宿四日不差至百日成瘻其狀大如四五寸

又廣三寸中生蜂作孔乃有數百治法以石硫黃隨多少然燭燒令汁出著瘡孔中須臾皮中見蜂數十唯蜂盡即差

又療蚍蜉瘻發於頸初得如傷寒此因食中有蚍蜉毒不去其根在腎礜石主之防風為佐方

桃白皮一分㕮咀 白朮四分 知母 雌黃

乾地黃 獨活 青黛 斑猫去首足熬

白芷 柏脂 芍藥 海藻一云海苔

當歸各一分 蝟皮四分炙 椒一百去汗

右十五味擣下篩作散服一錢匕日三忌桃李雀肉蕪荑等劉涓子古今錄驗同

又療蠐螬瘻發於頸無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為佐方

白朮一分　礬石一分　空青三兩分　當歸二分

細辛一分　蝟肉炙　枸杞根　斑猫去翅足熬

地膽各一分熬　乾烏腦三大豆

右十味擣下篩散服方寸匕日三酢漿服之忌生菜桃李雀肉生血物等病在上側輸卧在下高枕卧使藥流下劉涓子古今録驗同

七日浮沮瘻發於頸如兩指使人寒熱欲卧得之因思慮憂憶其根在膽地膽主之甘草爲佐方

雄黃一分　乾薑一分　龍膽二分一作龍骨　石决明

續斷　菴䕡子根各分　細辛二分　大黃半分

地膽一分熬

右九味擣下篩爲散傅瘡日四五忌生菜劉涓子同古今録驗無雄黃有硫黃餘同

又療瘰癧瘻發於頸有根初苦痛歷歷覺之使人寒熱此得之

新沐頭濕髮汗流入於頸其根在腎雌黃主之芍藥爲佐方

茯苓　續斷　礬石燒令汁盡　乾薑

雌黃　芍藥　桔梗　椒汗

乾地黃　常山　空青　狸肉

烏腦并腎肝　斑猫去翅足熬　虎指各一分一云虎腎　附子一兩炮

礜石二分燒半日

右十七味擣篩爲散蜜丸如大豆夜酒服十丸日三忌猪肉冷水生葱生菜生血物蕪荑酢物古今錄驗同

又瘰轉脉瘻發於頸如大豆浮在脉中濯濯脉轉苦驚惕身如振寒熱得之於驚卧失枕其根在小腸斑猫主之白芷爲佐方

緑青二分　礜石半分燒半日　防風一分　甘草半分炙

大黃二分　桂心二分　人參二分　當歸二分

升麻一分　地膽一分熬　白朮一分　鍾乳一分研

斑猫一分去翅足熬　白芷一分　續斷一分　麝香一分
麥門冬一分去心

右十七味擣下篩蜜丸酒服如大豆十丸日三勿食倉米慎房百日忌海藻菘菜桃李雀肉生葱劉涓子古今錄驗同並出第二十四卷中

崔氏療九種瘻方

芫青二十枚去足翅熬　地膽十枚去足羽熬　斑猫三十枚準上
蜈蚣一枚肥大者折取一寸半微火熬　生犀如棗核大屑
豉心四十九粒　大豆黃一百枚生用　牛黃棗核大

右八味擣篩蜜丸如梧子初欲服藥必夜食明旦飲服二丸須臾可煑酢漿薄粥稍稍冷飲之其瘻蟲有形狀皆從小便出至日西甚虛悶可煑湯飡食蔓菁菜羹醬食之自餘脂膩醋脯一名口味五辛果子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服服藥以

瘡差蟲盡爲度若差仍作二十日許將息藥欲盡豫合勿使斷絶藥氣不能將息便不須服忌猪肉冷水救急千金同出第五卷中

張文仲療鼠瘻方

石南　生地黃　雌黃

茯苓　黃連各二兩

右五味作散傅瘡日再忌猪肉蕪荑大驗備急同

又療鼠瘻諸惡瘡方

苦參三斤　露蜂五兩　麴二升

右三味以水三斗漬藥三宿去滓黍米二升釀熟飲日三一方得蝟皮一具劉涓子同並出第五卷中

備急劉涓子鼠瘻方

山龜殼炙　桂心　雄黃

乾薑　狸骨炙　甘草炙

右六味等分擣篩爲散飲服方寸匕日三蜜和內瘡中無不愈先灸作瘡後與藥良忌生葱海藻菘菜

又方

礬石三分燒　斑猫一分去足羽熬

右二味擣下篩用酢漿服半匕須臾瘻蟲從小便出删繁文仲同

出第五卷中

古今録驗療鼠瘻麝香塗方

麝香研　雌黃研

右二味等分並爲散取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一度

又療鼠瘻著頭生小者如杏大者如杯方

斑猫一分去足羽熬　牡蠣二分熬　海藻四分洗去鹹味

右三味擣下篩酒服五分匕日三病當從小便出如魚胞忌菘並

出第四十一卷中

諸瘻方一十五首

劉涓子瘻腫病方

斑猫四十枚去足翅熬 桂心四分 芫青十枚去足翅熬 葛上亭長三十枚熬

右四味擣下篩酒服半錢匕日一忌生葱

又療瘻方

斑猫四十枚去足羽熬 地膽三十枚去首足翅熬 蜥蜴三枚炙

右三味擣之千杵蜜和如大豆服二丸

又療瘻衆方不差効驗方

牡蒙數兩

右一味擣之湯和適寒温取一升許薄瘡上冷易經宿佳

又療瘻生肉膏方

桑薪灰三升水四升淋之復重淋之取三升石灰熬令黄内灰汁中以兩重帛裹絞去滓更魚目煎取二

升勿用急火煎隨瘻孔深淺初時作服散而差孔若深四寸新藥與孔裏薤白使濡安藥薤白入藥孔裏若深四寸隨瘻根而灸兩處每處與四十壯唯勿灸瘻孔隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裏十五過少遷延日月取差肉滿膿亦斷神良無比出第六卷中

肘後論此本在諸方瘡條中病類既多今狀出爲別一篇凡瘻病有鼠蛇蜂蛙蚓類似而小異皆從飲食中得其精氣入人肌體變化成形瘡既穿潰浸諸經脉則示殺人而鼠蟻最多以其間近人故也

通治諸瘻方

以八月中多取斑猫蟲即内苦酒中半日許出暴乾使十取六七枚著銅器中微火上遥熬令熟擣作屑巴豆一粒去皮熬之又拔取黄犬背上毛二七枚

亦熬作屑好朱以錢五分匕都合和以苦酒頓服之蟲當盡出若一服未効先時可預作三兩劑後日服遠不過三兩劑

又方

斑猫一枚一方云三枚去頭足翅熬 杜蘅 枳根 酸棗根 虎薊根 猫薊根各一把

右六味擣蜜丸日一服如棗一枚以小丸著瘡中

又方

若先著下部邊或上出耳後頸項諸處者苦參切五升以苦酒一斗漬三四日宜服一升亦加之但多作以知爲度不過三四度必差

又療瘻方

槲木皮長一尺闊六寸去黑皮細切以水一斗煮取

五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器接
吐出看視之病矣

又方

新生兒矢一百日以來皆收置密器中五十六十日
取塗瘡孔中

又方

鯉魚腸切作五段火上脫之洗瘡拭乾以腸封之冷
即易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

崔氏療瘻方

槲白皮（切取五升）

右一味以水八升煮令泣泣絞去滓重煎令成膏日服半
棗漸加至一棗許亦著瘡上無忌患瘡唯宜煮飯
醬又不得多食之出第五卷中

備急療瘻生肉膏方

楝白皮二兩　鼠肉二兩　薤白三兩　當歸二兩

生地黃五兩

右五味以臘月猪膏三升煎薤白黃色膏成傅瘡孔上令生

肉肘後文仲同

又葛氏云若著口裏方

楝大東引根切

右一味水煮取濃汁含之數吐勿咽肘後同並出第五卷中

備急療諸瘻方

取葶藶子擣細羅取好白蜜和丸每欲著藥先温泔

洗著瘡孔中以丸内之若塞以物道開日三度瘡痛

是差候勿停藥大効出第五卷中

必効療諸瘻方

先以泔清溫洗以綿拭之取葵葉微火煖貼之瘡引

膿不過三二百葉膿盡出即肉生忌雜諸魚蒜房室

王丞頻用大奇効

腋臭方三十七首

病源人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐貍之氣者故謂之狐

臭此皆血氣不和蘊積故氣臭出第三十一卷中

肘後療人體及腋下狀如狐犼(思晉切小獸也)氣世謂之胡臭方

炊甑飯及熱丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一如

此即差文仲備急同

又方

煮雞子兩枚熟去殼及熱各内腋下冷弃之三路口

勿反顧三爲之文仲備急並同

又方

燒好礬石末絹囊盛之常以粉腋下不過十度小品

集驗文仲備急同

又方

青木香二兩 附子一兩 礬石半兩燒 白灰一兩半

右四味細末著粉腋下汗出因以粉之亦差

又方

青木香一斤 石灰半斤熬

右二味常以粉身亦差並擣末傅之

又方

乾薑 胡粉 白灰等分

右三味合作末粉之范汪同並出第五卷中

千金療胡臭漏腋有天生胡臭有為人所染臭者天生者難療

為人所染者易差然須三年傅白礬散勿止并服五香丸乃可

得差勿言一度傳藥即差止可傳藥時暫得一度差耳凡胡臭
人通忌食芸薹五辛療之終身不差胡臭方

辛夷　芎藭　細辛　杜蘅
藁本各二分

右五味㕮咀以苦酒漬之一宿煎三日取汁傅之欲傅臨時
以差爲度小品集驗必効范汪同

五香丸主口臭及身臭止腫痛散血氣方

豆蔻子　丁香　藿香　白芷
青木香　當歸　桂心各一兩　零陵香一兩
甘松香二分　香附子二兩　檳榔人二枚

右十一味擣下篩蜜丸如大豆日三夜一時含之咽津五日
内口香十日身香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日
靜洗手水落地　七日把他人手亦香禁五辛下氣去臭

出第六卷中

又石灰散主胡臭方

青木香　楓香　丁香　薰陸香各二兩

陽起石　橘皮各三兩　礬石燒四兩　石灰一升熬

右八味擣下篩以綿作篆子麤如四指長四寸展取藥著上

即以絹囊盛之繫著臂先以布拭揩令痛然夾之

又方

水銀胡粉面脂研和傅之大驗救急同

又方

辛夷　細辛　芎藭　青木香

右四味等分擣下篩作散熏畢粉之

又方

伏龍肝作泥傅之良

又方

牛脂和胡粉三合煎令可丸塗腋下一宿即愈集驗同

又方　三年苦酒和石灰傅之

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止

又方

附子炮　石灰熬　青木香三兩　礬石燒三分

米粉一升

右五味擣篩常粉之

又方

馬齒草一束

右一味擣碎以蜜和作團以紙裹之以泥紙厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令先以生布指之夾藥腋下痛久忍不能得然後以手中勒兩臂差出第二十五

卷中

崔氏療胡臭有效方

先用泔清淨洗又用清酢漿水淨洗訖微揩使破取銅屑和釅酢熱揩之不過三四度差

又方

胡粉　銅青

右二味等分研以人乳和塗腋下若成瘡且停瘡差又塗以差爲度出第四卷中

張文仲療胡臭若股內陰下常汗濕且臭或作瘡者方

但以胡粉一物粉之即差常用大驗備急同

又隱居効驗胡臭方

雞舌香　藿香　青木香　胡粉各二兩

右四味擣散作粉綿裹內腋下常傅即差備急同出第七卷中

救急療腋臭方
銅屑（一升） 石灰（三升熬）
右二味合和囊盛粉之有汗便粉之
又方
甘草（炙） 松根白皮 甘瓜子 大棗（各四分）
右四味爲散食後服方寸匕日三出第三卷中
又方
雞矢 白礬石（熬令汁盡） 黄礬（熬） 附子（炮）
木蘭皮 青木香（各一大兩）
右六味擣爲散粉之又石龍衣一大兩蛇蜕皮是也以子日
夜半燒爲灰服之
又方
常以釅綠和醶酢塗之一遍一年再塗永除以胡粉

和水銀和令相入塗腋下十日以來無氣出第八卷中

又方

黃礬　細辛　芎藭各二兩　雄黃一兩

右四味擣下篩爲散先以泔清洗腋拔去毛令血出以粉之腋下出第九卷中

必効療腋臭方

好硇砂三兩　好白礬熬　蜜陀僧各三兩　酢酪二兩去汁

胡粉二分　金屑八分　鉛錫　生銅屑各二分

右八味並研令細酢一升新銅器中盛藥密封其口二七日看上青綠色鬱鬱然其藥即成還須研令極細至用時若乾更以好酢和藥以塗病處若有毛先拔去以石灰水淨洗拭使乾以生布揩令微赤可作瘡一日一塗洗遠不過十日即待腋瘡差訖更取銅屑細研成粉粉病處日五六即止病

差終身不帶帶麝香食胡荽

又方

取五月五日承露百草陰乾火燒爲灰用井華水和灰爲團重火鍊如燂灰色鍊訖即以釅酢和爲餅厚如掌大小徑二以來即於兩腋下挾即易夾時一身連頭並悶二日後若病不差復著藥微發亦不甚臭還依法療之永斷

又金錯屑塗法

金錯屑一銖 銀錯屑一兩 赤銅屑 香附子

胡粉 錢錯屑各一兩 三年醋三升

右七味以羊酪一升於銅器中煮得三沸以用塗之

又方

三年釅酢二升 碎銅一斤 塩半斤 灰二合

右四味浸藥攪藥色青即塗腋下日三四塗三日小愈一月全差

又方

大銅錢（二七文）　白梅（二七箇）　塩（一升）

右三味以五月五日水一升共置瓶子裏挂戶上百日畢可取用塗不得婦人見塗藥食粘食蒜發

又方

以酢五合內銅器中以錢十四文胡粉五銖置中涅頭七日後以粉十銖和之訖去腋下毛日再傅之合藥勿令人見祕之

又方

以首子男兒乳汁浸塩研銅青拔去毛使血出塗差

又方

酸醋浸青木香置腋下夾之即愈

又方

錢三七文　胡粉二兩　馬齒草三兩乾者　青木香二兩

大酢一升半

右五味切先以醋漬錢五六日然後總漬諸藥一物煑五六沸置垍器中先以石灰汁洗病處拭乾訖塗之以差為度並出第三卷中

古今錄驗療胡臭青羊脂粉方

胡粉　銅青等分

右二味先以塩湯洗兩腋下及著藥且淋洗又以青羊脂和傅數日差

又錢汁傅方

錢二七文

右以礦石磨令平以夾腋下神良范汪同並出第三十卷中

漏腋方三首

病源腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和爲風邪所搏津液蘊瘀故令濕臭出第三十一卷中

集驗療漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕致臭六物胡粉傅方

乾枸杞根半兩　胡粉一兩　乾商陸根一兩

乾薔薇根半兩　甘草半兩炙　滑石一兩

右藥擣下篩以苦酒和塗腋下當微汗出易衣復塗著藥不過三傅便愈或更發復塗之不可多傅傷人腋餘處亦塗之

小品文仲備急范汪同出第九卷中

經心録漏腋方

正朝旦以小便洗文仲備急集驗小品范汪千金同

又方

擣馬齒草脓下夾之令燥後復易之先用雌黃石灰等分合水煎一兩沸如泥泥之毛落然塗諸藥良並出第五卷中

七孔臭氣方三首

千金療面目口齒七孔臭方

沈香五兩 甘草二兩炙 白瓜瓣半升 芎藭二兩

丁香五兩 藁本二兩 麝香二兩 當歸二兩

右八味擣下篩蜜丸食後含如小豆五粒日三秘不傳久服令人舉體皆香救急同出第六卷中

救急療人七孔臭氣方

甘草五分炙 芎藭四分 白芷三分

右三味作散下篩食後飲服方寸匕日三

又方

瓜子一分　芎藭　藁本　當歸

杜蘅各一兩　細辛二分　防風一分

右七味擣下篩食後溫水服方寸匕日三

令人體香方四首

肘後令人體香方

白芷　薫草　杜若　杜蘅

藁本等分

右五味末之蜜和旦服如梧子三丸暮服四丸三十日足下

悉香文仲備急范汪同

又方

甘草炙　瓜子　大棗　松根皮等分

右四味擣下篩食後服方寸匕日三二十日覺効五十日身

體並香百日衣服牀幃悉香文仲備急范汪千金同

又方

瓜子　芎藭　藁本　當歸

杜蘅　細辛各二分　白芷　桂心各五分

甘草二分炙

右九味擣下篩食後服方寸匕日三五日口香二十日肉香

文仲備急同出第五卷中

千金療諸身體臭方

竹葉十兩　桃白皮四兩

右二味以水一石二斗煑取五斗浴即香出第六卷中

雜療汗出不止方一十首

集驗療止汗粉藥方

牡蠣二兩熬　附子半兩炮　麻黃根二兩

右三味擣篩以白粉一升和合粉汗汗止忌猪肉

又汗後遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝
加附子湯方

大棗十三枚擘 附子一枚大者炮去皮破八片 桂心三兩 芍藥三兩

生薑三兩 甘草二兩炙

右六味切以水七升煮取三升溫服一升忌猪肉冷水海藻
菘菜生葱延年同此本張仲景傷寒論方

千金止汗方

青松葉一斤

右一味擣令汁出清酒一升漬二宿近火一宿初服半升漸
至一升頭面汗即止出第八卷中

延年澤瀉湯療大虛煩躁止汗治氣方

澤瀉 茯苓各二兩 牡蠣熬 白朮各一兩

生薑半升

右五味切以水八升煮取二升分服一升日再服忌桃李雀肉酢物等

又都梁散療汗出如水及汗出衄血吐血小便血殆死方

都梁香二兩　紫菀　人參　青竹茹

蓯蓉各一兩　乾地黃二兩熬令燥

右六味擣下篩水服方寸匕不效須臾再服忌蕪荑

又療大病之後虛汗不可止方

杜仲　牡蠣等分熬

右二味擣下篩向暮卧以水服一錢匕午前汗止者不再服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必愈有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不止者

又療大病後虛汗出不禁者方

粱粉　豉等分焦炒　故竹扇如手掌大燒取灰

右三味合擣以絹囊盛粉體立止最驗當先熬末粉之千金
並同
又粉散療大病後身體虛腫汗出止汗方
麻黃根三兩　防風　乾薑　細辛各二兩
白斂一兩
右五味合下篩以粢粉五升熬令黃合和以粉身忌生菜出
第十一卷中
古今錄驗療汗出不止术桂散方
麻黃　桂心各五分　白术　附子炮
昌蒲各三分
右五味擣末酒服方寸匕日三未食服忌羊肉餳猪肉桃李
雀肉等
又止汗熱雷丸散方

雷丸　桂心　牡蠣各五分熬

右三味擣下篩粉身日三忌生葱出第二十六卷中

外臺秘要方卷第二十三

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺秘要方

二十四

癰疽發背

外臺秘要方卷第二十四 癰疽發背九門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

集驗癰疽論黄帝曰夫子言癰疽何以别之岐伯荅曰榮衛稽

留於經脉之中則血泣而不行不行則衛氣從之從之而不通壅遏不得行故曰熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不爲焦枯五藏不爲傷故命曰癰黃帝曰何謂疽歧伯荅曰熱氣純盛下陷肌膚筋髓骨肉内連五藏血氣竭盡當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者其上皮夭瘀以堅亦如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候黃帝曰善出太素第十六卷中

經言五藏不調致疽六腑不和生癰一曰熛疽急者二三日殺人緩者十餘日殺人二曰癰疽急者十餘日殺人緩者一月死三曰緩疽急者一年殺人緩者數年四曰水疽所發多在手足數年猶可療疽者數十種要如此于氏法癰之疾所發緩地不殺人所發若在險地宜令即外消若至小膿猶可療大膿致禍矣

一爲腦户　二爲舌本　三爲玄癰　四爲喉節
五爲胡脉　六爲五藏俞　七爲五藏繫　八爲兩乳
九爲心鳩尾　十爲兩手魚　十一爲腸屈之間　十二爲小道之後
十三爲九孔　十四爲兩腨腸　十五爲神主之舍一本云主客之舍
凡十五處不可傷而况於癰乎若癰發此地遇良醫能不及
大膿者可救至大膿害及矣范汪同
候賊風證但夜痛應骨不可按抑不得迴轉痛處不壯熱體亦
不乍寒乍熱但覺體痹瘮然冷欲得熱熨痛處即小寛時
有汗此是賊風證也宜即得針灸服療風藥温也方在療風條上大法宜知二條如此也
又初得附骨疽即服漏蘆湯下之傅小豆薄得消也
又下利已腫處未消者可除大黄用生地黄及乾地黄隨時也
熱漸退餘風未歇者可服五香連翹湯除大黄餘熱未消可傅
升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散如療癰法又有騙

必忍切下同疾喜著四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於脚者喜從蹁跦起至踝赤如編繩謂之膈病也又其發於臂者喜腋下起至掌也皆由四肢勞熱氣盛爲凉濕所折風結筋中成此疾也不即療取消潰去膿則筋攣縮也其若但置不消復不潰其熱歇氣不散喜變作膈也

又療之宜服漏蘆湯令下外以鋒針針去血氣針寫上結脉處傅小豆薄則消也皆可依療丹法消之及潰成膿出火針傅膏散如療癰法也

又亦用甘蕉根薄之差

又癰發腫高者疢源淺腫下者疢源深大熱者易療小熱者難療初便大痛傷肌晩乃大痛傷骨都堅者未有膿半堅半軟者有膿發腫都軟血瘤也非癰發腫以漸知長引日月亦不大熱時時牽痛瘤也非癰吴音曰謂諸氣結亦有腫久久不消成癰療

之宜散氣氣已散若初腫處有浮氣年衰皆發癰療之宜及年盛并折散熱可無此憂

于氏法夫癰疽脉洪麤難療脉微濇者易療諸浮數之脉應當發熱而反惡寒者癰也此或附骨以有膿也

趙乃言無虛勞腹中疾或發血瘤瘡瘡狀墳𡋯起頭黑正爾置不當灸療療之火熨便焦爛剥刮去焦痂則血泄不可禁必死癰起於節解遇頑醫不能即消令至大膿者豈膏藥可得復生乎

又發癰堅如石走皮中無根瘰癧也久不消因得他熱之疾時有發爲癰也

又發癰至堅而有根者名爲石癰療之法當服也非酒即藥勢不宣但當稍飲取令相得和散便止凡癰腫有肥人用貼宜栝樓根和平體宜赤小豆貼方

以赤小豆五合內苦酒中熬之畢擣爲散以苦酒和之塗拭紙上貼腫從發腫兩頭以下范汪同

又論少小有渴年四十以外多發癰疽有膈淡而渴者年盛必作黃疸年衰必發癰疽也范汪同

又黃帝曰願聞癰疽之形與其期日歧伯曰略說癰疽之極者十八種

又癰疽發咽名曰猛疽猛疽不療則血化爲膿膿不寫塞咽半日死其化膿者寫已則含豕膏無冷食三日而已一云無食

又發於股胻名曰股脫疽其狀不甚變而癰腫膿搏骨不急療三十日死髀內曰股股外曰髀膝上股下骨稱曰股胻也

又發於脇名曰改訾改訾者女子之疾也久之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆療之方

剉連翹草及根各一升以水一斗六升煮令竭取三

外即強飲厚衣坐釜上令汗出至足巳
又發於尻者名曰兑疽其狀赤堅大急療之不療三十日死
又發於脛者名曰兔齧其狀赤至骨急療之不療害人
又發於足上下者名曰四淫其狀大如癰不急療百日死
又發於肩及臑者名曰疵疽其狀赤黑急療之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日逆焫之
上灸百壯石子當碎出也不出可益壯從癰發高下以後范汪並同
又石癰者始發皮核相親著不赤頭不甚堅微痛熱熱漸自歇便堅如石故謂之石癰難消又不可得自熟縱愈皆百餘日也
又發癰兩頭牽而傍推無根者又不痛結筋非癰也發癰狀如蛇雖極大此肉瘤非癰也腫一寸至三寸癤也三寸至五寸癰也
五寸至一尺癰疽也一尺至三尺名曰竟體疽腫成膿九孔皆出

諸氣憤鬱不遂志欲者多發此疾癰及疽血瘤鼠乳石癰結筋瘰癧皆不可就針角針角少不及禍者

凡癰疽之疾未見膿易療之當上灸三百壯四邊間子灸各二百壯實者可下之虛者可補之有氣者下其氣服占斯內塞散得愈絶房三年凡癰瘡審知膿者破之皆當近下邊膿出後當膏藥兊之常使開潤勿令燥合也若其人羸勿一頓盡膿徐徐令後稍出乃盡癰方潰其上皮薄人喜當上破之此終不愈當下破之乃得膿耳勿要其皮厚也凡癰有膿當破無膿但氣腫若有血慎不可破針灸也按之四邊堅中軟此爲有膿瀋也一邊軟亦有膿都堅者此爲疽核或但有氣也都軟者此爲有血血瘤也當審堅軟虛實爲要若堅疽積久後若更變熟偏有軟處當軟之不可破者疽當溫暖裹置耳若灸刺破療必暴劇不可救及結筋腄馳僞切肉鼠乳皆不當療也又服內塞散不與他療

相害晝夜十餘度服散當以酒
又發於腋下堅赤者名曰米疽療之用砭石欲細而長踈啓之塗
以豕膏六曰已勿裹其癰堅而不潰者爲馬刀挾纓急療之（太素經曰頸前曰纓）
又發於股陰者名曰赤弛不急療六日死在兩股之内不可療
一云六十日死
又發於膝者名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石石之
死須其柔色異乃石之者生（砭石熨之柔乃破之準例砭之也）
又諸癰腫之發於節而相應者不可療（太素經云膿入節間故不可療也）
又發於陽者百日死
又發於陰者三十日死（丈夫陽器曰陽婦人陰器曰陰）
又發於踝者名曰走緩疽其狀肉色不變數石其輸數而止其
寒熱不死

又發於足傍者名曰厲疽其狀不大初從小指發急療之去其黒者不消輙益不療百日死側云足外側也

又發於胷者名曰井疽狀如大豆三四日起不早療下入腹入腹不療十日死太素經云寒熱不去十日死

又發於足指者名曰脫疽其狀赤黒死不療不赤黒可療療不衰急斬去之得活不去者死

又發於膺者名曰甘疽其狀如穀實瓜蔞常苦寒熱急療之去其寒熱不療一歲死死後出膿

又發於頸者名曰夭疽其狀大而赤黒不急療則熱氣下入淵腋前傷任脉内熏肝肺十餘日死太素經曰項前曰頸一云發頭以前十八種並與千金翼劉涓子太素經范汪刪繁同並出第八卷中

千金論曰夫癰疽初發人皆不以爲急此實奇患唯宜速療若療不速病成難救以此致禍者不一發背外皮薄爲癰皮厚爲

疽宜急治之夫癰壞後有惡肉者以猪蹄湯洗去穢次傅食肉膏散惡肉盡傅生肉膏散及摩四邊令善肉速生當斷絕房室慎風冷勞煩待筋脉平復乃可任意耳不爾新肉易傷傷則重潰發發則禍至慎之慎之

凡癰疽始發或似小節或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿子此皆微候宜善察之見有少異即須大驚忙須急治之及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥即灸當頭百壯其大重者灸四面及頭上二三百壯壯數不慮多也復薄冷藥貼膏種種救療必差也

又其用藥貼法皆須當瘡中處開孔口令泄瘡熱氣出亦當頭以大針針入四分即差

身中忽有痛處似打狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬〻受溫風至春暴寒風來折之

不成溫病乃作氣痛也又宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煑楊柳皮及煖熨之有赤氣點點刺出血也其連翹湯可服數劑及竹瀝湯勿以一劑未効便謂即止遂不服耳中間將

白薇散佳

素問曰寒氣客於經絡血凝澀不行擁結爲癰疽也不言熱之作也其後成癰又陽氣湊集寒化爲熱熱盛則肉腐爲膿也

又以酢和蚌蛤灰塗之乾即易差即止

凡腫根廣一寸以下名癤一寸以上名小癰如豆粒大者名皰子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取差止並出第二十三卷中

廣濟療癰疽排膿散方

黃耆十分膿多倍 青小豆一分熱口乾倍 芎藭三分肉不生倍 芍藥三分痛不止倍

白歛三分有膿不合倍 栝樓三分若渴小便利倍 甘草三分炙

右七味爲散酒服方寸匕日三服不利忌海藻菘菜熱麪魚蒜等千金同一方無白歛甘草

又療發癰疽排膿散方

人參二兩 當歸二兩 桂心二兩 芎藭一兩

厚朴一兩炙 甘草一兩炙 防風二兩 白芷二兩

桔梗一兩

右九味擣篩爲散以酒服方寸匕日二服不利若瘡未合常服之忌生冷菘菜海藻生葱蒜並出第五卷中

劉涓子療癰疽先宜傅大黃食肉膏方在發背部千金云食惡肉散後用大黃附子等十物者乃是次兑膏方

當歸 芎藭 白芷各二兩 烏頭一兩

巴豆二十枚去皮 松脂二兩 豬肪二升

右七味㕮咀內膏中微火合煎三沸巳內松脂耗令相得

以綿布絞去滓以膏著綿絮兑頭大瘡雖深兑之膿自出就兑盡即生善肉瘡淺者不足兑著瘡中日三惡肉盡即止

又療癰疽發壞出血生肉黃耆膏方

黃耆一兩　芍藥一兩　當歸一兩　大黃

芎藭　獨活　白芷　薤白

生地黃各一兩

右九味切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傅兑瘡中摩左右日三文仲同並出第四卷中

又療癰疽瘡生肉黃耆膏方

黃耆　細辛　生地黃　蜀椒

當歸　芍藥　薤白　白芷

芎藭　丹參　猪膏一升半臘月者　甘草

蓯蓉　獨活　黃芩各一兩

右十五味以苦酒一升二合夏月漬一宿冬月二宿微火煎三沸煑酒氣盡成傅之忌海藻菘菜生葱菜蕪荑

又療癰疽始作便壞熱毒發瘡膏方

羊髓一兩 甘草二兩 胡粉五分一法五兩 大黃一兩半

猪膏二升

右五味切合膏髓煎二味烊內甘草大黃三上三下絞去滓內胡粉絞令調和傅瘡上日五度

又療癰疽已潰白芷摩膏方

白芷 甘草各二分 烏頭三分 薤白十五挺

青竹茹雞子大一枚

右五味切以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡四邊勿著瘡中並出第五卷中

深師內塞散療癰疽潰漏血脉空竭方

黄耆　細辛　芍藥　薏苡人
白芷　瞿麥各二兩　赤小豆七兩　乾地黄
人參　防風各二兩
右十味切先以新成白苦酒置新器中内赤小豆須臾出銅器中熬令燥復須内苦酒中更熬凡五反止合擣爲散酒服方寸匕日夜六七過腹痛甚倍芍藥口未閉倍薏苡人膿多倍黄耆忌生菜生葱蕪荑出第二十八卷中
删繁療癰疽等毒潰爛猪蹄洗湯方
猪蹄一具治如食法　薔薇根一斤　甘草五兩炙　芍藥五兩
白芷五兩
右五味切以水二斗煑猪蹄取八升去滓下諸藥煑取四升稍稍洗瘡出第九卷中
千金翼黄帝問曰有疽死者柰何岐伯曰身有五部伏菟一腓

二一云𦜝背三五藏之腧四項五五部有疽死也刪繁同本一云靈樞

又王不留行散主癰疽及諸雜腫潰皆服之亦療癰腫不潰苦困無賴方

野葛皮半分　五色龍骨五兩　王不留行子三升千金方用末三合翼云一升

桂心一兩　當歸二兩　乾薑一兩　栝樓六合

右七味爲散食訖温酒服方寸匕日三以四肢習習爲度不知漸漸加之此浩仲堪方隨日濟闍梨施行實爲神散癰腫即消極理安穩忌生葱冷水等物此方妙千金同出第十四卷中

癰腫方二十五首

集驗療癰腫大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之即復者有膿若當上破者膿出不盡不盡稍深食骨骨碎出當以角導側際從下頭破令膿出盡出盡則骨生愈

矣若惡肉不盡者食惡肉藥去之膏塗之即愈惡食肉藥方

取白荻灰水淋之煎令如膏此不宜預作作之十日則

歇并可以去黑子黑子藥住便即拭去不時拭則傷膚

又一方以桑皮灰亦妙

凡破諸病肉厚處當先廣封四面不爾瘡披裂氣泄便死不可

救也以前范汪同有久癰餘瘡爲敗癰深疽有脛間喜生瘡中外惡

瘡霜寒凍不差經年或骨疽亦名脛瘡深爛青黑四邊堅強

中央膿血惡汁出百藥療不差汁潰好肉處皆腫亦有碎骨從

中出者可溫赤龍皮湯洗之夏月日日洗之冬月三日四日一

洗潰肉多者可時傅白䕡茹散食去之可一日之中三四傅之

止後長傅家豬散得差也

取豬矢燒作灰下絹篩以粉疽敗瘡中令滿汁出脫

去便傅之長傅須差也若更生青肉復著白䕡茹

散如前法也出第八卷中

千金翼凡五子日夜半　五丑日雞鳴　五寅日平旦

五卯日日出　五辰日食時　五巳日禺中　五午日日中

五未日日昳　五申日晡時　五酉日日入　五戌日黃昏

五亥日人定

右以此日時遇疾發者皆不起也出第二十三卷中

廣濟療癰腫膿潰內服藥外宜貼膏方

松脂一斤鍊者　膒脂三合生　椒葉一兩　白臘三兩

蛇銜一兩　黃耆一兩　芎藭一兩　白芷一兩

當歸一兩　細辛一兩　芍藥一兩

右十一味切以水先煎脂臘烊盡內諸藥三上三下白芷色

黃膏成用剪故帛可瘡大小塗膏貼上日夜各一

又療癰腫膿潰瘡中有紫肉硬不消以此散兌頭內蝕之方

石硫黄（研二分） 馬齒礬石（二分熬令汁盡） 漆頭蕳茹（二分）

麝香（研二分） 雄黄（二分） 雌黄（研一分） 白礬（二分熬令汁盡）

丹砂（研二分）

右八味擣篩爲散攪令調熟以傅瘡中瘡惡肉上貼膏日二易千金并翼深師同並出第三十卷中

劉涓子療癰腫方

白斂 烏頭（炮） 黄芩（各等分）

右三味擣下篩和雞子白傅上即愈出第十卷中

療癰腫有熱黄耆貼方數用神驗

甘草（炙） 大黄 白斂 黄耆

芎藭

右五味各等分擣篩以雞子黄和如濁泥塗布上隨赤熱有堅處大小貼之燥易甚効

删繁療癰腫白斂薄貼方

白斂　當歸　芍藥　大黃

莽草　芎藭

右六味各等分擣篩下雞子黃和如泥塗布隨大小貼之燥易

又療癰腫堅核下不消白斂貼之方

白斂　大黃　赤石脂　芍藥

莽草　黃芩　黃連　茱萸

右八味各等分擣篩以雞子黃和如濁泥塗布上隨核大小貼之燥易

又療癰腫黃耆貼之方

黃耆一兩半　黃芩一兩　芎藭一兩　黃連

白芷　芍藥各一兩　當歸一兩半

右七味擣篩以雞子白和如膏諸暴腫起處以塗著布上已

貼燥易腫處不覺貼冷便愈熱勢毒者加白斂一兩尤佳

又療癰腫黃耆貼方

黃耆　大黃　白芷　牡蠣熬

白斂

右五味各等分擣篩和雞子貼燥易

又療癰腫已潰四物黃連薄貼方

黃連　黃蘗　地榆　白芷各一兩

右藥擣篩雞子白和塗布薄癰上對瘡口穿布出癰氣令疎氣

又療癰腫一物栝樓薄貼方

以栝樓根隨多少止一物切五度內苦酒中熬燥擣

篩之苦酒和塗紙上以貼癰腫上服散人宜用並出

第九卷中

千金療癰腫松脂貼方

當歸　黃耆　黃連　芍藥

臘　黃芩　芎藭　大黃各一兩細切

松脂一斤半　膒脂一合半

右十味切以微火煎之三上三下綿布絞去滓向火炙塗生牋紙上隨大小貼之一日三度易之即差

又療腫蒺蔾散方

蒺蔾子一升熬令黃

右一味擣篩以麻油和之如泥炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搨上無蒺蔾子用小豆和雞子如前乾則易之甚妙

又搨湯方

大黃　黃芩　白歛各三兩　芒消六分

右四味以水六升煮取三升以故帛四重内汁中以搨腫上燥

復易晝夜爲之𦐂同

又癰腫痛煩困方

以生楸葉十重貼之以布帛裹緩急得所日二易止痛消腫食膿血良無比勝於衆貼冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之亦可薄削楸皮用之備急張文仲肘後同

又諸癰腫牢堅諸藥不療方

削附子如棊子厚一指正著腫上以少唾濕附子火炙附子令熱徹附子欲乾輙令更唾濕之常令附子熱氣入腫中無不愈者此法絶妙並出第二十三卷中

千金𦐂黄耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渇方

黄耆　升麻　栝樓　乾地黄各二兩

麥門冬去心　芍藥各二兩　黄芩一兩半　梔子二十枚擘

右八味切以水一斗煑取三升分三服劉涓子用升麻一兩梔子十四枚餘藥同

又白斂薄貼主癰腫方

白斂　大黃　黃芩各等分

右三味擣篩和雞子白如泥塗布上薄貼腫上乾則易之可以三指撮藥末内三升水中煑三沸綿注汁拭腫上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易之一易輙以煑汁拭之日夜三十度劉涓子同

又療癰腫方

伏龍肝以大酢和作泥塗布上貼之乾則易之消矣

又凡腫已潰未潰者方

以膠一片水漬令軟納納然稱腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡

未有膿者腫當自消矣

又方

燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度至良

又温中湯主癰腫取冷過多寒中下利食完出方

甘草炙　乾薑　附子各六分炮　蜀椒二百四十枚汗

右四味切以水六升煑取二升分三服忌海藻菘菜猪肉冷水劉涓子同出第二十三卷中

張文仲劉涓子療癰消膿木占斯散方

木占斯　桂心　人參　細辛

敗醬　乾薑　厚朴炙　甘草炙

防風　桔梗各一兩　栝樓一兩

右十一味擣爲散服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰及疽炙亦不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已壞發膿者内敗醬

此藥時有化癰疽令成水爲妙

隱居必效方消癰腫

白斂二分　藜蘆一分

右二味擣爲末以苦酒和如泥貼腫上日三大良以上二首

備急同出第五卷中

石癰方五首

千金堅如石核復大色不變或作石癰療之鍊石散方

鹿角八兩燒作白灰　白斂三兩　麤理黃石一斤酢五升先燒石令赤內酢中復燒內之酢盡半止

右三味擣篩作細末以餘醋拌和如泥厚塗之乾即塗取消止盡更合諸漏瘰癧藥悉皆主之並須火針瘡上除膏

又方

單磨鹿角半夏塗不如上方佳也集驗文仲小品古今録驗同

又療石癰堅如石不作膿方

以生商陸根爛擣傅之燥則易又治腦及諸癰癤

古今録驗同

又方

以蜀桑根白皮陰乾擣末消膠以酒和蜀桑根白皮傅上即拔出並出第二十三卷中

備急療若發腫至堅而有根者名曰石癰也方

灸腫上百壯當石子破碎出如不出益壯乃出其癰疽石癰結筋瘰癧皆不可鍼角鍼角殺人集驗文仲千金同出第四卷中

癰癤方一十四首

劉涓子療癰癤諸腫有熱方

地黃 三斤洗細切

右一味以水一斗煑取三升去滓煎湯令小厚以塗紙當瘡
中央貼之日再三易數用大良并療牛領上腫出第十卷中
集驗療癰及癤如結腫赤熱者方
以水磨半夏塗之燥復更塗得流便消也出草中
可自掘生半夏乃佳此療神勿不信也出第八卷中
千金療凡癤無頭者方
吞葵子一枚即出勿多服頭多也
又方
燒葛蔓灰封上自消
又方
牛糞封之佳
又方
以鼠粘葉貼之
又方
用水和雀糞傅之
又方
狗頭骨　芸薹子

右二味等分爲末和酢封之

又療癰癤潰後膿不斷及諸物刺傷不差方

取石硫黃三兩粉之一味筋一片碓頭令碎少濕之內石硫黃中刺瘡孔以瘡差爲度

又乾地黃丸主虛熱消瘡癤方

乾地黃四兩　大黃六兩　桂心二兩　芍藥三兩

茯苓三兩　王不留行二兩　黃芩二兩　麥門冬二兩去心

遠志二兩　升麻二兩　人參二兩　甘草二兩炙

枳實二兩炙

右十三味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十丸日三加至二十丸長服令人肥健翼同

又地黃煎方補虛除熱可將和服取利也散石癰疽瘡癤痔熱悉宜服百日癰疽永不發也

取生地黃隨多少三擣三押取汁令盡一味以新布重絞其汁澄清置銅器中湯上煮之減半復下更新布絞去麤碎結濁者滓穢盡復煎之濃竭令如飴糖置甆器中酒服如彈丸大日三勿加至百日服之有驗

又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒消二兩 大黃四兩 梔子二七枚擘 黃芩三兩

知母二兩 甘草二兩炙

右六味切以水五升煑減半下大黃煑取一升八合去滓內芒消二兩分三服忌海藻菘菜並出第二十三卷中

千金翼論曰一切癰疽皆是瘡痕根本所患癰之後膿汁不止得冷即是鼠瘻是以漏方次之大須急救之

馬齒草五升切 槲白皮一斤水五升煑取一升清澄 麝香半臍乾之仍研作末

杏人半升油煎令黒擣如膏

右四味以甆器貯之合和以三四重帛密繫口病巳成瘡者以泔清淨洗拭乾剪作貼子塗藥貼著瘡上日三易若未作瘡如作瘰癧子者以艾一升熏黄如棗大乾漆如棗大末之釜月下土三味並末和艾作炷灸三七壯並出第二十三卷中本

方療鼠瘻

又主癬腫方

生椒末麴末釜月下土末之以大酢和傅之並出第二十四卷中

附骨疽方七首

千金許附骨癰法凡附骨疽者無故附骨成膿故名附骨疽喜著大節解中丈夫產婦喜著胯髀嬰兒亦著脊背丈夫急者先覺痛不得動揺按之應骨痛經曰便覺皮肉漸急洪腫如肥狀

是也小兒纔近便大啼呼即是肢節有痛候也大人緩者先覺肥洪洪然經日便覺痺痛不隨小兒四肢不能動揺亦如不隨狀著肢節解中有洪洪處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰死體皆青黯大人亦有不別是附骨疽呼爲賊風風腫也

又凡人身體患熱當風取凉風入骨解中風熱相搏便成附骨疽其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露卧爲冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何意而有此疾由其血氣盛肌凑爲風冷折之即腠理凝結故也

又凡骨疽者久瘡不差差而復發骨從孔中出名爲骨疽方

以猪膽和楸葉擣封之

又方　擣白楊葉下篩傅之

又方

穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎五升以艾及

剕茱和之令可然火令煙出内疽孔坑中以衣擁坑口勿洩煙半日許當有蟲出

又癰疽敗及骨疽方

末龍骨粉瘡四面厚二分

又方

用自死蝦蟇一枚頭髮一把以猪膏一斤半内二物煎之消盡下之欲冷内鹽一合攪和以膏著瘡中日一易蟲出如髮蟲盡愈

又骨疽百方療不差方

可瘡上以艾炙之三日三夜無不愈也並出第二十三卷中

備急若骨疽積年每一年一發汁出不差方

取膠熬擣末粉勃瘡上及破生鱧魚以搨之如

食頃刮視其小蟲出更洗更傅蟲出盡止備急文

仲同

又療疽瘡骨出方

黄連　牡蠣各二分熬

右二味末先以鹽湯洗以粉之文仲同出第四卷中

瘭疽方一十六首

集驗論胷中痛少氣急入闇中以手掩左眼胷視右眼見光者胷中結癰也若不見光瘭疽内發若吐膿血此不療之疾宜以灰掩膿血上不爾著傍人也又齒間臭熱血出是瘭疽也七日死療所不差宜以灰掩地血瘭疽喜著指與代指相似人不別者亦呼作代指不急療其毒逐脉上入藏殺人也南方人得此疾皆斬去指恐其毒上攻藏故瘭疽著指頭者其先作黯疱然後腫赤黒黯瘮痛入心是也出第八卷中

千金瘭疽論說曰瘭疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤黑青白不定一種其狀有根不浮腫痛瘆應心根深至肌少久便四面悉腫皰黯黲紫黑色能爛壞筋骨也毒散逐脉入藏殺人南方人名爲搨著毒著厚肉處即割去之亦燒鐵烙疱上令焦如炭亦疱上灸百壯爲佳單擣酸草葉傅腫四面防其長大飲葵根汁及藍青汁若犀角汁升麻汁竹瀝汁黃龍湯諸單療折其勢耳其病亦喜著指故與代指相似人不識之呼作代指不急療之亦逐脉上入五藏殺人南方人得之皆斬去指疽著指初指頭先作黯疱然後腫赤黑黯瘆痛入心是也復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不療自長出不止不痛痒此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾療之宜服漏蘆湯外燒爍日日爲之令焦盡訖以升麻膏傅之積日乃差備急同出

第二十三卷中

劉涓子療瘰癧侵淫廣大羊髓膏方

羊髓二兩　大黃　甘草炙　胡粉各二兩

右四味㕮咀以猪膏二升半合煎微火三上三下絞去滓傅日四五深師云兼療赤黑爛壞成瘡出第五卷中

千金療瘰癧疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈復發方

黃耆六分　款冬花二分　升麻四分　附子一分炮

苦參一分　赤小豆一分

右六味下篩酒服半錢匕漸增至一錢日三服忌猪肉冷水范汪方無苦參有赤小豆

又方

虎糞白者以馬尿和之暴令乾燒灰粉之翼同

又方

胡粉　青木香　龍骨　滑石各三兩

右四味下篩以米粉一升和之稍以粉之日四五

又方

竈室塵　竈突中墨　竈釜底土各一升

右三味合研令勻以清水一斗煑三沸取汁洗瘡日二三度

又凡瘭疽手足肩背忽磦磦如赤小豆剌之汁出者是療之方

剥却瘡皮溫泔清洗胡鷰窠和百日男子矢塗之

又方

熬蕪菁子熟擣帛裹傅之勿止文仲備急肘後同

又方

熬麻子末摩上日五六度

又方

麪和酒傅之

又方

鯽魚三寸長者亂髮如雞子大猪脂一升煎以成膏塗之

又療瘭疽秘方世所不傳神良無比

射干　甘草炙　升麻　枳實炙各二兩

大黃十分　麝香二分研　乾地黃二兩　犀角六分屑

前胡三兩本方云三分

右九味切以水九升煮取三升分三服差止不限劑數翼同

深師加黃芩十分餘同忌海藻菘菜蕪荑

又瘭疽漏蘆湯方

漏蘆　白斂　黃芩　麻黃去節

白薇　枳實炙　升麻　芍藥

甘草各二兩炙　大黃三兩

右十味切以水一斗煮取三升分三服無藥單用大黃下之

良張文仲備急并翼並同

又升麻膏方

升麻　白薇　漏蘆　連翹

芒消各二兩　黃芩　蛇銜　枳實各三兩炙

梔子人二十枚　蒴藋四兩

右十味切擣破令細然以水三升漬半日以猪膏五升煎水氣竭去滓傅諸丹毒皆用及熱瘡腫上並日三易之

又升麻搨湯方

升麻　漏蘆　芒消各二兩　梔子二十枚

黃芩三兩

右五味切以水一斗合蒴藋五兩煑取七升冷搨諸丹腫上常令濕內宜服漏蘆湯甚佳

又療瘭疽侵淫多汁日就浸大胡粉散方

胡粉二分熬　黃連三分　甘草二分炙　䕡茹二分

右四味下篩以粉瘡上日三翼文仲備急深師同並出第二十

三卷中

千金翼薄搨湯主㾮疽侵淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤焮方

甘草炙　黃芩　大黃　黃連

當歸　芒消各一兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓鐺中下芒消一沸攪之貼布帛中以搨腫上數百遍劉涓子深師同出第二十三卷中

緩疽方四首

集驗論有緩疽者初結腫形似癰回回無頭尾其色不異但痛深有根核又與皮肉相親著外耳一名肉癰其有大者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮肉俱爛如牛領瘡狀便通體遍青黯色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鑱去

血以小豆薄塗之其間數針鑱去血又薄之取消也若不消色未
變青黯者以鍊石薄之若失時不得療已爛者猶服五香連翹
湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方也外以升麻湯搨洗之薄升麻
膏若生臭惡肉者可以單行一物白蔄茹散傅之青肉去盡便
停也好肉既生但傅升麻膏良不生單傅一物黃耆散也若傅
白蔄茹散積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮蔄茹取半錢
上和三大錢上白蔄茹散中合和傅之惡肉去盡還以淳用白
蔄茹散也視好肉欲生可傅黃耆散也黃耆散方白蔄茹散
方漆頭蔄茹散方並一味單行隨多少擣篩爲散出第八卷中

范汪飛黃散療緩疽惡瘡食惡肉方

取丹砂著瓦盆南雌黃著中央磁石北曾青東白石
英西礬石上石膏次鍾乳下雄黃覆雲母薄布下各
二兩先擣篩瓦盆中以一盆覆上羊毛泥令厚作三隅

竈燒之以陳葦一日成取其飛者使之甚妙

又療緩疽以飛黃散食惡肉令盡作土竈熏之方

雄黃一兩　雞白屎一兩　藜蘆一兩　丹砂一兩

乾鰻鱺魚一兩

右五味擣下篩青布裹之熏經三日乃止止畢要以蛇銜膏摩之良並出第三十一卷中檢范汪方其蛇銜膏今檢崔氏方附於後

崔氏蛇銜膏療癰腫瘀血産後血積耳目暗等牛領馬鞍瘡方

蛇銜一兩　大黃　附子去黑皮　芍藥一

當歸　細辛　黃芩　大戟

椒去目　莽草　獨活各一兩　薤白十四莖

右十二味並切之以苦酒淹之一宿以不中水成鍊猪膏二升龍銜藤一兩合膏煎名龍銜膏今又有龍草似蛇銜而葉大耳

亦有取其根合煎者亦名龍銜膏出第二卷中
小品療緩疽初作即以小豆薄塗之亦消也出第十卷中

發背方四十一首 其乳石發背自有正方在第三十八卷中具述

千金論曰凡發背皆由服餌五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服諸石而自發背者此是上代有服之者其候率多於背兩胛間起初如粟米大或痛或痒仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至不救其臨困時方圓徑三四寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔之膿皆反出尋即失音不言所以養生者小覺背上痛痒有異即取淨土冷水和泥捻作餅子徑一寸半厚二分以麤艾大作炷灸泥上貼著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅即差若榆莢大灸二七炷即差至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又常以冷水射之漬冷石熨之日夜勿止

待差住手此病忌麪酒肉五年等亦有當兩腎上發者

又論曰凡服石人皆須大勞役四體無得自安如其不爾多有發動亦不得逐便恣意取暖稱適已情必須違欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮

又發背方

凡腫起於背胛中頭白如黍粟四面相連腫赤黑令人悶亂者名發背也即禁房慎蒜麪不速灸治即入内殺人灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫療之皆死

又方

取亂髮灰酒服方寸匕

又方

以三年酢滓微火煎稠和以牛脂封上日一易

又方

取狗牙灰酢和傅之

又方　取猪羊脂封之亦療發乳

又方　以蛇頭灰水和傅之

又方　飲鐵漿三升下利爲佳

又方　以鹿角灰酢和塗之古今録驗同

又方
燒古蜯末之如粉雞子白和傅上日三即差止

又發背及癰疽潰漏并未潰毒腫方
栝樓　榆皮　胡鷰窠　鼢鼠土
女人月水布洗取汁

右五味並須等分以月水汁和如泥封腫上乾即易之潰者四面封亦覺即從一日至五日令差翼同

又療癰疽潰漏發背及小小瘰癧李根散方
李根　半夏洗　栝樓各一升　甘草二兩炙

葛根三兩　桂心四兩　當歸二兩　通草一兩

芎藭一兩半　白斂一兩　桔梗二兩　厚朴炙

黄芩各一兩　芍藥四兩　附子一兩炮

右十五味爲散酒服方寸匕日三瘡大困者夜再服朱大明患發背骨出身有三十餘癰癤服此差忌羊肉餳海藻菘菜猪肉冷水生葱范汪同

又治諸虚不足發背癰疽經年差後復發或由大風聚結毒氣在内閉塞得夏月出攻背不療積聚作膿血爲瘡内漏大内塞排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六分

當歸四分　附子二分炮　肉蓯蓉八分　瞿麥三分一云地地膚子也

石斛五分　菟絲子三分酒漬　巴戟天八分　遠志八分去心

人參五分　甘草五分炙　麥門冬八分去心　石韋四分

芎藭四分 芍藥五分 乾地黃八分 桂心五分

右二十味爲散酒服方寸匕日三夜一稍加至兩匕長服終身不發癰癤忌猪肉冷水海藻菘菜生葱蕪荑醋物等

又內補散療癰瘡發背方

蜀升麻 黃芩 人參各二分 乾薑

白歛 桂心 甘草炙 附子炮

防風各一兩 芎藭二兩 赤小豆一合半

右十一味爲散酒服方寸匕日三夜再忌猪肉冷水海藻菘菜生葱一云蜀椒非

又內補散主癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸 桂心 人參各二兩 芎藭

厚朴炙 桔梗 甘草炙 防風

白芷各一兩

右九味爲散酒服方寸匕日三夜再瘥未合服勿停忌海藻
菘菜生葱范汪同

又瞿麥散主排膿止痛利小便方

瞿麥二兩　芍藥二兩　桂心半兩　赤小豆半合
芎藭半兩　白斂半兩　黄耆一兩　當歸二兩
麥門冬二兩去心

右九味爲散先食温酒服方寸匕日三翼深師同忌生葱陳
臭肉汁等

又薏苡人散主令癰自潰長肌肉方

薏苡人　桂心　乾薑　白斂
當歸　肉蓯蓉各一兩

右六味爲散先食温酒服方寸匕日三夜再翼同忌生葱

又黄耆竹葉湯主胷背遊熱癰疽方

生地黄八兩 黄耆 甘草炙 芍藥

黄芩 麥門冬去心各三兩 人參 石膏碎裹

芎藭 當歸各二兩 生薑五兩 大棗二十枚擘

半夏四兩洗 淡竹葉一升切

右十四味以水一斗二升煮竹葉取九升去滓内藥煮取三升分四服相去如人行五六里再服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳古今録驗同

又排膿内塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虚疼痛方

防風 茯苓 白芷 桔梗

遠志去心 甘草炙 人參 芎藭

當歸 黄耆各一兩 桂心二分 附子二枚炮

厚朴二兩 赤小豆五合熬

右十四味擣散酒服方寸匕日三夜一忌酢猪肉海藻菘菜生

葱冷水

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背上惡肉方

麝香研　雄黃研　真珠研各一兩　礬石一兩熬

右四味細篩以猪膏攪令如泥塗惡肉盡止更傅生肉膏佳

又療癰疽敗壞生肉膏方

生地黃一斤　辛夷一兩　獨活一兩　當歸一兩

黃耆一兩　大黃一兩　芎藭一兩　薤白五兩

白芷一兩　芍藥一兩　黃芩一兩　續斷一兩

右十二味切以臘月猪脂四升煎傅之佳

又方

大黃　附子炮　芎藭　雄黃

真珠各一兩　白斂　礬石燒　黃芩

藺茹各二兩　雌黃一兩　莽草一兩

右十一味先以猪膏一升半煎六沸去滓内藺茹礬石末攪之塗瘡上惡肉盡止劉涓子同

又方

藺茹（漆頭者） 礬石（各二分熬） 雄黃（二分研） 硫黃（二分）

右四味爲散内瘡口中惡肉盡止勿使過好肉也

又發背上初欲作腫即服此方

梔子人（一百枚） 大黃 升麻 黃芩

甘草（各三兩炙）

右五味切以水九升煮取三升半分三服使利便止不下更進一服忌海藻菘菜文仲備急同並出第二十三卷中從瞿麥散以下十方並療發背部中已次之

范汪療癰腫發背虎牙散方

虎牙（炙） 乾薑 附子（炮） 當歸

甘草炙　防風　桂心　王不留行
茯苓各一兩
右九味擣下篩服方寸匕日三飲服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱酢物出第三十一卷中

又療癰發背排膿內補鐵屑散方

當歸　人參　細辛　甘草炙
蓯蓉　黃耆　桂心　防風
黃芩　鐵屑　芎藭　芍藥
右十二味各等分合擣爲散服方寸匕忌海藻菘菜生菜生葱酢物

又療癰腫牢核發背成膿莽草膏方

莽草　芎藭　當歸　細辛
附子炮　黃芩　烏頭炮　牛膝

躑躅　野葛　茯苓　防風
杜蘅各一兩　猪脂二斤
右十四味切用猪肪合煎去滓傅瘡上日再忌猪肉冷水
生菜大酢
又卓氏曰膏療癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸瘑疥
患療之方
當歸　附子炮　細辛　芎藭
續斷　牛膝　通草　甘草炙
白芷各二兩　蜀椒三合　芍藥　黄耆各一兩
右十二味㕮咀以猪膏二升煎之微火上以白芷色黄藥成
絞去滓以傅瘡上日三過忌海藻菘菜猪肉
又療發背發乳房及諸惡瘡膏方
黄連　當歸　馬齒　芎藭

礜石半兩燒　黃蘗半兩
署預各一兩　珣珠十四枚
石韋三分去毛　生竹皮三合　猪肪一斤
右十一味㕮咀之細切肪向美酒一升中合煎石韋焦膏成去滓有病稍稍傅上亦酒服棗核大一枚忌猪肉冷水並出第四十一卷中

救急療發背百無不差方

取猪羊脂切作片冷水浸取貼上暖徹易之五六十片即差若初貼少許即寒寒定好眠甚妙

又療發背若初覺赤腫腫上作小瘡疼不可近方

急用針刺上七八針取冷水用筒擊射腫上日夜不止疼歇腫消出第五卷中

又療發背方

取白麪搜圍腫四畔令童子七人尿濆之

又方　以馬糞封之乾易婦人發乳亦差

又方

取蔚臭草擣取汁服一雞子滓封上熱即易之

又方　擣地菘汁一升日再服以差止

又方

大黃　石灰熬　小豆

右三味等分末白酒和塗立効並出第六卷中忌羊肉熱麫大酢

近効凡發背皆發出自腸胃流入五藏仕流多脚氣爲主或有先服乳石并熱肉麫并失飢房室過度皆作此疾縱身不曾服乳石先代服亦有此病或有下里人服麫過度亦有患者請依後方萬不失一發背亦覺有腫即須審看根硬軟如硬頭一點白燒四邊紫黑色時掣痛憎寒不食狀若天行此石癰知

是此狀即須當上灸一百壯艾炷大如鼠屎許大凡發背初亦
一點白四邊赤色漸漸長大或盃盞并椀許大四邊生飯粒小
小瘡如粟米許大亦時時抽掣痛此兩狀皆是死病十日內堪
醫十日以外不濟就中冬月得此病即延得三五日其發背初
覺即須當頭灸二十一壯炷如盃許大即五花灸之各二十一壯
即服牛蒡子栝樓葛粉第二服犀角湯瀉之不然服犀角
丸亦得大効也忌梨鯉魚麪酒肉漿水粥眞鴻臚賈顯錄
凡發背候憎寒壯熱身如拘束或口乾不用食瘡初出如青紫
色者毒重赤者輕膿如稀泔者極重膿稠白赤者輕張道士昇
玄房陵口錄留
又療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫隱軫起方
消石三兩
右一味以煖水一斗和令消待冷取故青布疊三重可似欲禁

處方圓濕布搨根熱即換之頻易差

又療發背及一切毒腫方

生麻油六合　黃丹二大兩半　生栗子四十九枚取大小中者熬焦去皮碎絹篩

地膽兩錢擣碎篩

右四味和於銅器中盛用炭火重湯煎候沫溢出與器口欲平取小麥一合分二人嚼取筋急內藥中攪使與相和膏碎下安銅器冷水中成膏訖以故帛塗膏貼所苦處晨夕換膏

又療前瘡定訖令生肌方董四員外云極効

麝香兩錢　棗皮灰半兩碎　生麻油六合

右三味依法和用火重湯上煎十餘沸稀稠前藥相似取故帛塗膏貼瘡上膏漸取瘥減唯得喫白羊頭肉但是豆並不得喫餘如藥法

又療癰腫犀角丸主腸癰乳癰發背一切毒腫服之化為水神驗方

犀角十二分　蜀升麻　黃芩各四分　大黃五分
防風四分　巴豆二十二枚去心皮熬令黃　人參四分　當歸四分
黃耆四分　乾藍　黃連　甘草炙
梔子人各四分
右十三味擣爲末別擣巴豆成膏內末和以杵研擣令相得鍊蜜和搜更擣二三百杵煖湯服三丸如梧子得利三兩行喫冷粥止即差不利加至四五丸初服取快利後漸減丸數取鴨溏微洩爲度老小以意增減腫消及和潤乃止利却黃水即覺輕皮皺色變一切腫皆內消神驗不可論忌熱麪蒜猪肉蘆笋魚海藻菘菜生冷粘食以上並主發背

癰疽發背雜療方二十六首

劉涓子療發背發乳口已合皮上急痛生肉摩踠折丹參膏方
丹參　防風　白芷　細辛

芎藭　黄芩　芍藥　牛膝

大黄　槐子　獨活　當歸各一兩

右十二味切以臘月猪脂五升微火煎三上三下膏摩病日三四不須向火古今録驗同出第五卷中

肘後療諸癰疽發背及乳方

熬粢粉令黑雞子白和之以塗練上貼癰小穿練上作小口以泄毒氣令散燥復易之此藥神効文仲備急同

又方

以釜底土擣取散以雞子中黄和塗之加少豉彌良以五月葫及少鹽佳文仲備急同一本無下法

又方

取茱萸一升擣之以苦酒和貼癰上乾易之佳

刪繁療癰疽發背九物大黃薄貼方

大黃 黃芩各三兩 白芷二兩 寒水石三兩

白斂五兩 黃蘗二兩 石膏 赤石脂

黃連各三兩

右藥下篩以三合投粉糜二升中和之薄塗紙貼腫上燥易之

腫下止不下厚傅之忌生冷熱麪大酢

又蝟皮散療諸瘻及浮核壞敗幷主男子發背女子發乳等癰疽

或膿血肉瘤方

蝟皮一具燒 杜仲八分炙 續斷五分 附子炮

地榆各五分 小露蜂房一具燒 厚朴八分 藁本五分

當歸 桂心各五分

右十味擣篩爲散服方寸匕日三服酒進取差止忌猪肉生葱

冷水

又陵鯉甲散療發背乳房癰腫方

陵鯉一頭取甲爪炙　桂心三分　當歸二分

右三味擣篩爲散服方寸匕日三服酒進忌生葱出第九卷中

千金療癰疽發背猪蹄湯方

猪蹄一具治如食法　黄耆　黄連　芍藥各三分

黄芩三兩　薔薇根　狼牙根各八兩

右七味以水三斗煑蹄令熟澄取二斗清切藥煑取一斗洗瘡一食頃以帛拭燥著生肉膏日二差生痂止痛加當歸甘草各二兩

又療癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉方

猪蹄一具　當歸　大黄　芎藭

芍藥　黄芩　獨活　莽草各一兩

右八味蹄取膝下斷治如食法以水二斗煑取八升内藥煑

取四升去滓漬瘡兩食頃拭令燥以麝香膏傅之其方在前發背部中只有四味者是也

又生肉膏主癰疽發背已潰令生肉方

甘草炙　當歸　白芷　蓯蓉

蜀椒　細辛各二兩　烏喙六枚　薤白二十莖

乾地黃三兩　續斷一兩無以蛇銜替之

右十味以好酢半升相和漬二宿猪膏二斤煎令三沸三上三下膏成使用劉涓子同

又癰發腹背陰匿處通身有數十者方

取牛糞乾者燒擣下重絹以雞子白和以塗之乾復易祕之肘後張文仲備急同

又若已結膿使聚長者方

以生栝樓根細擣苦酒和傅上燥復易之末赤小豆亦佳

又凡發背爲癰疽已潰未潰者方

以香豉三升少與水和熟擣成強泥可腫作餅厚三分已有孔勿覆孔可腫上布豉餅艾列其上灸其豉使溫溫熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當減便得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差備急文仲并翼同

又癰腫發背初作及經十日以上腫勢焮熱毒氣猛盛日夜疼痛百藥不治者方

斷雞子一枚　新出狗矢如雞子大

右二味攪令調和微火熬之令稀稠得所捻作餅子腫頭堅處貼之以紙貼上以帛抹之時時看之覺餅子熱即易勿令動轉及歇氣經一夜定其多日患者三日貼一度差止並出第二十三卷中謹按千金論曰此方穢惡不可施於貴勝然其愈疾一切諸方皆不及之自外諸方還復備員作儀注而已學者常當曉斯以備諸急云耳

千金翼諸癰腫發背及癰癤已潰爛疼痛方

蒸糜穀更遞熨之當即愈（一云薔薇殼更炙熨之）

又連翹五香湯主一切惡核瘰腫方

連翹　射干　升麻　獨活（各二兩）

桑寄生（二兩）　通草（二兩）　大黃（三兩）　丁子香（一兩）

青木香（二兩）　沈香（二兩）　薰陸香（二兩）　麝香（二兩）

右十二味㕮咀以水九升煮減半內竹瀝二升煮取三升分三服未差中間常服佳

又五香湯主惡氣毒腫方

沈香　青木香　丁香（各一兩）　薰陸香（一兩）

麝香（半兩）

右五味切以水五升煮取一升半分三服集驗方用雞舌香一兩不用丁香出第二十四卷中

崔氏療發背及諸瘡久不差有効方

先以甘草湯洗瘡裛拭極乾乃嚼胡麻傅上乾即易從旦至日西去胡麻乃取黃連末滑石末中半相和以傅瘡上數數易明日又依前傅胡麻及黃連等末更不須洗瘡不過六七日即差必効備急同

又連翹湯療患瘡腫而渴方

連翹三兩 蜀升麻各二兩 黃芩三兩 枳實二兩炙

乾藍三兩 芍藥二兩 玄參二兩 白歛二兩

甘草二兩炙 羚羊角二兩屑 通草二兩 黃耆二兩

大黃三兩

右十三味切以水八升煮取二升半分三服利一兩行後更服去大黃乾藍即不利忌海藻菘菜

又犀角飲子方

犀角三兩屑 羚羊角三兩屑

右二味以水八升煮取三升渴即飲盡更作之時熱恐壞懸著井底甚妙

又五香連翹湯療惡瘡熱毒腫恐惡毒氣入腹兼取利以洩毒氣方

連翹三兩 蜀升麻二兩 薰陸香二兩 淡竹瀝一升

大黃四兩水一升別漬 朴消二兩熬乾別內 麝香一分研 青木香二兩

丁香一兩 獨活二兩 寄生三兩 射干二兩

甘草二兩 沈香二兩

右十四味切以水一斗煮取二升半絞去滓然後內大黃朴消竹瀝更煮一兩沸去滓內麝香分溫三服服別相去如人行十里久以得利一二行爲度慎雞猪魚蒜生冷酢滑油膩麪食小豆五辛葵菜等備急文仲同並出第五卷中

備急葛氏療始發諸癰疽發背及乳房方

皆灸上百壯肘後文仲同半夏末雞子白和塗良姚云生者神驗以水和塗之肘後文仲古今録驗小品並同

又方

以酢和墓上土茱萸擣薑小蒜薄貼並良肘後文仲同並出第四卷中

救急療熱毒風丹并發背犀角膏方

犀角六分屑　升麻十大分　羚羊角六分　梔子人二七枚
薤白一升切　吴藍八分大藍亦得　玄參六分　續斷
大黃　白斂　射干　白芷各六分
蛇銜一升切　寒水石十二分　黃芩六分　慎火草一升切
麻黃六分去節

右十七味切以竹瀝三升生地黃汁五合漬藥一宿内豬脂

三外微火上煎十上十下候白芷黃膏成去滓塗病上出第五卷中

文仲療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散方

木占斯　厚朴炙　甘草炙　細辛

栝樓　防風　乾薑　人參

桔梗　敗醬草各一兩

右十味爲散酒服方寸匕日七夜四以多爲度病在上當吐病在下當下膿血此謂腸癰之屬其癰腫即服療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療不覺腫去時長服去敗醬多療婦人諸産癥瘕益良是劉涓子方千金范汪刪繁古今録驗同出第五卷中

古今録驗療諸癰瘡發背有膿血當歸貼方

當歸一分　蠐螬一分　丹參一分　附子一分炮

臘蜜一分　梔子十枚　桂心一分　膠一分

右八味合煎以貼貝瘡上出第二十一卷中

外臺祕要方卷第二十四

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟　校勘

外臺秘要方

二十五

痢

外臺祕要方卷第二十五 痢三十三門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

休息痢方五首
腹肚不調痢方一首
洩痢不禁不斷及日數十行方三首
下焦虚寒及遠血近血方二首
下痢食宍出及上入下出方二首
下痢腸滑方三首
大注痢及赤白困篤腸滑方二首
痢兼渴方二首
許仁則痢方七首
水穀痢方一十首

病源水穀痢者由體虚腠理開血氣虚春傷於風邪氣留連在肌肉之内後遇脾胃大腸虚弱而邪氣乘之故爲水穀痢也脾與胃爲表裏胃者脾之府也爲水穀之海脾者胃之藏也其

候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀消其精化爲榮衛以養藏腑充實肌膚大腸肺之腑也爲傳道之官化物出焉水穀之精化爲血氣者行於經脉其糟粕行於大腸也肺與大腸爲表裏而肺主氣其候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處運動勞役血氣虛者則爲風邪所傷客至肌肉之間後因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者不能尅制水穀故糟粕不結聚而變爲痢也又新食竟取風名爲胃風其狀惡風頭多汗膈下塞不通食飲不下腹脹形瘦腹大失衣則䐜滿食寒則洞泄洞泄者痢無度也若胃氣竭者痢絶即死診其脉小手足寒難療也脉大手足温易療也下白沫脉沈則生浮則死身不熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以藏期之也脉絶而手足寒晬時脉還手足温者生脉不還者死脉緩時小結者生洪大數者死懸絶而澀者死細微而濇者生緊大而滑者死

得大絶脉者不死養生方云秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早卧早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺氣清此秋氣之應也收養之道也逆之則傷肺冬爲飧泄又云五月勿食未成核果及桃李發癰節不爾發寒熱變黄疸又爲泄痢出第十七卷中

廣濟療赤白水穀冷熱等痢方

地榆六分　白术五分　赤石脂七分研　厚朴六分炙

乾薑六分　熟艾四分　龍骨七分　甘草四分炙

黄連十分　烏梅六分熬　人參六分　當歸五分

右十二味擣篩爲末蜜丸以米飲汁服二十丸如梧子大日三服加至三十丸出第四卷中忌海藻菘菜猪肉生冷等

集驗論黄帝問曰人若溏泄下痢者何也對曰春傷於風夏生溏泄腸澼久風亦爲溏泄也

又療熱水穀下痢黃連阿膠湯方

黃連　阿膠炙各二兩　梔子三十枚擘　烏梅二十枚碎

黃蘗一兩

右五味切以水七升煑取二升半分爲再服神良備急同忌豬肉冷水肘後名烏梅湯療熱下靨

又方

黃連一升金色者打碎　陳米五合

右二味以水七升煑取二升分再服肘後文仲同忌豬肉冷水並出第四卷中

刪繁療中膲熱水穀下痢藍青丸方

藍青汁三升　黃連八兩　黃蘗四兩　阿膠五兩炙

白朮　地榆　地膚子　烏梅肉熬各三兩

右八味擣篩爲散用藍汁和微火上煎取可爲丸丸如杏子清旨飲進三丸亦不得停留忌豬肉冷水桃李雀肉等出第四卷中

崔氏療水穀痢方

乾薑三分　雞子二枚　小豆二百粒炒令香中食　黃連三分

右四味擣篩三物內雞子黃白中熟攪令相得微火上炒令可丸一服五十丸如小豆大旦以飲服差即停忌食脂膩生冷猪魚蒜葱出第三卷中

文仲療用仲夏熱多令人發水穀痢腸中鳴轉一寫五六升水方

黃連去毛　厚朴各三兩

右二味切以水三升煑取一升頓服之忌猪肉冷水出第三卷中

必効療水穀痢方

小豆一升煑　臘一兩煑

右二味和頓服之即愈

又方

椶櫚皮燒灰

右一味研以水和服三方寸匕並出第二卷中

古今録驗療熱水穀下痢方

黃連　阿膠各二兩　梔子二十枚

右三味切以水七升煮取二升分爲三服忌猪肉冷水

又方

黃連　當歸　甘草炙各二兩　酸石榴皮三兩

右四味切以水三升煮取一升半分爲三服忌海藻菘菜猪肉冷水並出第十卷中

水痢方六首

廣濟療水痢及霍亂崔氏方同云冷痢食不消化及有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之方

白石脂　乾薑各八兩

右二味擣篩爲末以沸湯和少許麫薄糊和藥併手捻作丸如食法下不止加乾薑八兩忌如常法

又療水痢腹中氣方

茯苓八分　白龍骨八分研　訶梨勒皮八分

黃連八分　酸石榴皮八分

右五味擣篩爲末蜜丸空心以飲服如梧子大三十丸日二服差止忌猪肉油膩生冷等出第四卷中

文仲療水痢百起者馬藺散方

馬藺子　乾薑　黃連元無分兩

右三味爲散熟煮湯取一合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常用神效不得輕之忌猪肉冷水

又方

朽骨灰牛骨灰亦得　麴六月六日造熬令黃

右二味等分爲散空腹飲服一方寸匕無六月六日麴時用常麴亦得御傳並出第三卷中

經心録主水痢方

雞子二枚 黃臘一兩

右二味熬熟食之宜空肚食之日三服佳

又方

黃連 倉米各三兩

右二味作散和雞子七枚令熟併捻作丸煑赤豆作漿粥服三十丸日三服若渴但飲豆漿粥並出第二卷中

久水痢不差腸垢方四首

病源腸垢者腸間津液垢膩也由熱痢蘊積腸間虛滑所以因下痢而便腸垢也出第十七卷中

肘後療水下積久不差腸垢已出者方

烏梅二十枚碎

右一味以水二升煑取一升頓服之

又方

石榴一枚

右一味合皮擣絞取汁隨多少服之最良

備急療水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂　桂心　乾薑　附子炮

右四味等分擣篩蜜丸如小豆每服三丸日三服飲下忌猪肉冷水生葱肘後同出第六卷中

文仲治久水痢難斷方

黃連二兩　黃蘗二兩　阿膠二兩炙

右三味擣篩爲散以苦酒蜜各半升煎内阿膠令烊又内諸藥令可丸飲服三丸日四此是古方極要

冷痢方二十二首

病源冷痢者由腸胃虛弱受於寒氣腸虛則泄故爲冷痢也凡

痢色青色白色黑皆爲冷也色黄色赤並是熱也故痢色白食不消謂之寒中也診其脉沉則生浮則死出第十七卷中

廣濟療冷痢青白色腹内常鳴其痢行數甚疎出大多此是冷痢宜服調中散方

龍骨　人參　黄連　阿膠炙

黄蘗各一兩

右五味擣篩爲散煑米飲服兩方寸匕日再服差停忌猪魚冷水蒜炙肉粘食出第四卷中

肘後療水下痢色白食不消者爲寒下方

黄連　乾薑各三兩

右二味擣篩白酒一升半合煎令可丸飲服如梧子大二十丸欲多作依此法也忌猪肉冷水

又方

黄連二兩　甘草炙半兩　附子炮半兩　阿膠炙半兩

右四味切以水三升煑取一升半分再服之忌猪肉冷水

海藻菘菜

又方

半夏洗　烏頭炮　甘草炙各等分

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日再服忌猪羊肉海

藻菘菜

又方

生薑汁二升　白蜜一升半

右二味相和分再服之巳

又方

乾薑二兩

右二味以升半升著米一合煑作糜糜熟内薑一食

令盡不差更作備急同

又方

酸石榴皮燒灰

右一味爲末服方寸匕文仲同

又方

乾薑二兩末　雜麫一升

右二味爲燒餅熟食之盡更作不過三劑差文仲同

又療絶下白如鼻涕者方

龍骨　乾薑　附子炮

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子飲下五丸漸至十丸日再服忌猪肉冷水文仲同

又方

黄連末　臘　阿膠各一兩

右三味先以酒半升令沸下膠臘令烊乃内黃連末頓服之忌猪肉冷水（本云姚氏療辛注下并痢血一日夕數十行）

又方

灸臍下一寸五十壯良文仲同並出第二卷中

千金論曰凡五藏絶於内者下不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一下病體例略如此耳素問曰春傷於風夏爲膿血夏多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋下水者患必是冷也

又療久冷痢下純白者此由積卧冷處經久病發遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍之凡白痢屬冷赤痢屬熱方

上好麴末（五升微熬令香）

右一味温清淳酒令熱和麴末一升空腹一頓服之日三若至食時擣蒜一升令至熟下薑椒末調如常食法唯須稠勿加鹽以水和麪二升作索餅極熟爛煮之乾漉熱内蒜韲中

相和一頓食之少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差來少食餘食以此法療不過兩日必差

又烏梅丸療冷痢久下方

烏梅三百粒 當歸四兩 乾薑十兩 桂心六兩

附子六兩炮 黃連十六兩 蜀椒四兩汗 細辛六兩

人參六兩 黃蘗六兩

右十味異擣篩合治之苦酒漬烏梅一宿去核蒸之如五斗米下擣如泥盤中揉令相得蜜和擣二千杵食前飲服如梧子十丸日三稍增至二十丸忌生冷猪肉冷水生葱生菜此本仲景傷寒論方

又舊療痢於貴勝用建脾丸多効今療積久冷痢先以温脾湯下訖後以建脾丸補之未有不効者貧家難以克辦亦不可將息温脾湯方療積久冷痢赤白者

大黃三兩 桂心三兩 附子炮 乾薑

人參各二兩

右五味切以水七升煮取二升半分爲三服日再忌猪肉冷水生葱並出第十五卷中

備急葛氏療痢色白食不消者爲寒下方

豉一升綿裹　薤白一把

右二味以水三升煮取二升及熱頓服之陶効方云療暴下大去血痢姚療赤白下痢並効肘後同

又方

牛角䚡燒灰

右一味擣篩白飲服方寸匕日三肘後同

又方

好麴炒

右一味擣篩煑米粥內麴方寸匕日四五云此療日百行師

不救者肘後同並出第六卷中
古今録驗白頭翁湯療寒急下及滯下方
白頭翁 乾薑各二兩 甘草一兩炙 當歸一兩
黄連 秦皮各一兩半 石榴皮一兩生者二兩
右七味切以水八升煮取三升分爲四服忌海藻菘菜猪肉
冷水出第十卷中
近效療冷痢方
肉豆蔻五顆合皮碎 甘草二兩炙
右二味切以水三升煮取一升半頓服之戸部李尚書處得
云療冷痢極者有効自用得力
又療久冷痢方
赤石脂擣作末和麪作餺飥空腹服一椀以下不過
兩頓差老人尤佳體中先熱者不可服之以上二方新附

文仲治青下白下薑附散方

乾薑　附子炮　皂莢炙去子

右三味等分擣篩爲散飲服方寸匕不過再服即愈亦可丸

服小品肘後同

又治冷痢薑艾餛飩子方

乾薑末　熟艾

右二味等分作麪餛飩如酸棗大煑熟服四五十枚日二服

腹脹者炙厚朴煑汁服藥此熱服訖即須食飯大效曾有産

婦冷痢加白膏服之立差腹痛亦定

冷痢食不消下方六首

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷及微下痢方

白朮八兩　神麴末五兩熬令香　甘草炙　乾薑

枳實各二兩炙

右五味擣篩蜜和丸空腹以温酒服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸腹中痛者加當歸忌熱麪海藻菘菜桃李雀肉等出第四卷中

文仲華他治老小下痢柴立不能食食不化入口即出命在且夕久痢神驗方

黃連末半雞子殼許 亂髮灰準上 醇苦酒準上

蜜準上 白臘方寸匕 雞子黃一枚

右六味於銅器中炭火上先内苦酒蜜臘雞子黃攪調乃内黃連末髮灰又攪煎視可摶出爲丸久困者一日一夜盡之可可者二日盡之肘後同出第三卷中

延年增損黃連丸主腹内冷食不消及冷痢兼補方

黃連 黃耆各三分 龍骨三分 當歸

甘草炙五分 乾薑 厚朴炙各六分 地榆

白朮　人參各一分

右十味擣篩蜜丸如梧子飲酒任下服十五丸日再服加至二十丸忌猪肉冷水桃李雀肉生葱海藻菘菜蔣孝璋處

又地榆丸主冷痢不消食腹中脹痛氣滿不能食方

地榆六兩炙　赤石脂七分　厚朴六分炙　白朮五分

乾薑六兩　龍骨七分　黃連十分　當歸五分

熟艾五分　烏梅肉六分熬　甘草四分炙

右十一味擣篩蜜和丸如梧子以飲服二十丸日二服加至二十五丸忌猪肉冷水海藻菘菜生冷油膩桃李雀肉等並出第七卷中

吴猍師療冷痢下膿血絞臍痛食不消腹脹方

吴茱萸　乾薑各六分　赤石脂　麴末各八分熬

厚朴炙　當歸各四分

右六味擣篩蜜和丸如梧子空腹以飲下四十丸日再

又療冷氣久痢臍下痛出白膿食不消方

吴茱萸　人參　芎藭　桔梗

甘草炙各四分　枳實炙三枚　乾薑十二分　附子炮八分

麴末二十分熬

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲下七丸日二服漸加之文仲云温脾丸療久寒氣逆脹滿面目痿黃食不消化

白痢方八首

病源白滯痢者腸虛而冷氣客之薄於腸間津液凝滯成白故爲白滯痢出第十七卷中

廣濟療白膿痢方

甘草炙六分　厚朴炙十二分　乾薑　枳實炙

茯苓各八分

右五味切以水五升煑取一升六合絞去滓分爲二服日再

忌生冷油膩小豆粘食海藻菘菜醋物等

又療心腹脹滿不能下食及痢白膿方

厚朴五兩炙　豆蔻五枚　甘草一兩炙　乾薑一兩

右四味切以水五升煑取一升五合絞去滓分爲二服日再

忌生冷油膩海藻菘菜並出第四卷中

千金大桃花湯主冷白滯痢腸痛方

赤石脂八兩　乾薑　當歸　龍骨各三兩

附子炮　牡蠣各二兩熬　芍藥　甘草炙各一兩

人參一兩半　白朮一升

右十味切以水一斗二升煑白朮取九升內藥煑取三升分爲三服膿者加厚朴三兩嘔者加橘皮二兩忌桃李雀肉海藻菘菜猪肉冷水等

又方

龍骨六兩 厚朴三兩炙 赤石脂五兩 當歸一兩

右四味切以水七升煑取二升半分爲三服日再服熱加白頭翁十分牡蠣三兩

延年烏梅肉丸主冷白膿痢食不消方

烏梅肉熬 熟艾 黄蘗 甘草炙各八分

右四味擣篩蜜丸如梧子以飲服十五丸日三服忌海藻菘菜出第七卷中

必効白痢方

麻子汁

右一味以汁煑取菉豆空腹飽服極効

又方

黄連末

右一味以水和每服三匕即愈並出第二卷中

古今録驗療白滯下晝夜無復數龍骨湯方

龍骨　牡蠣各三兩熬　烏梅肉　熟艾

白頭翁　乾薑各一兩　女萎　黃連

當歸各二兩　甘草六兩炙

右十味切以水七升煮取三升二合分服日三夜一斷便止

忌海藻菘菜猪肉冷水出第十卷中

重下方六首

病源此謂今赤白滯下也令人下部疼重故名重下去膿血如雞子白日夜數十行繞臍痛也出第十七卷中

肘後療重下方

黃連切一升

右一味以酒五升煮取一升半分溫再服臍當小絞痛則差

又方

鼠尾草

右一味以濃煑煎如薄飴糖服五合至一升日三赤下用赤花者白下用白花者佳也文仲備急同

文仲隱居効驗方主下部絞痛重下下赤白方

當歸　黃蘗　黃連　乾薑各二兩

右四味擣篩煑取烏梅汁服方寸匕日三若腹中絞痛加當歸下赤加黃連下白加乾薑大効神良祕之備急同忌猪肉出第三卷中

備急療重下方此即赤白痢下也令人下部疼重故名重下葛氏方

豉熬令少焦

右一味擣服一合日再三服無比又熬豉令焦水一升淋取汁服冷則用酒淋日三服之肘後文仲同出第六卷中

古今録驗重下下赤者方

取獺赤糞（下白取白糞燒末）

右一味以飲清旦空腹服一小柸三旦飲之即愈

又療得毒病後得重下赤白絞痛方

石鍾乳（一兩研） 黃連 防風 附子（炮）

黃蘗 蜀椒（汗） 當歸 乾薑（各二兩）

右八味切以水六升煮取二升半分三服適寒溫服忌猪肉冷水並出第十卷中

卒暴冷下部疼悶方二首

千金療卒暴冷下部疼悶方

燒塼令熱大酢沃之三重布覆坐上取差

又方

黍米（二升） 臘 羊脂 膠（炙各二兩）

右四味合煑作粥一頓令盡即差並出第十五卷中

冷熱痢方七首

病源夫冷熱利者由腸胃虛弱宿有寒而爲客熱所傷冷熱相乘其痢乍黃乍白是也若熱搏於血血滲腸間則變爲血痢也而冷伏腸内搏津液則變凝白則成白滯亦變赤白痢也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云泄下有寒者微一作引氣以息内腹徐吹息以鼻引氣氣足復前即愈其有熱者微呼以去之也出第十七卷中

刪繁療下焦冷熱不調暴下赤白痢香豉湯方

香豉一升熬綿裹　白朮六兩　薤白切一升　蜀升麻二兩

右四味切以水七升煑取二升半分爲三服忌桃李雀肉等出第四卷中

古今錄驗生春石榴皮療冷熱不調下或滯或水或赤白青黃者方

酸石榴 五枚

右一味合殼舂絞取二升汁分服五合稍稍服二升盡即斷小兒以意服二三合佳千金同出第十卷中

吴爽師無問冷熱新舊痢方

黄連　黄蘗　乾薑　甘草 炙

艾 三月三日者熬　烏梅肉 熬各八分　附子 三枚　臘 一雞子大

右八味擣篩以蜜和臘於鐺中鎔之其著蜜須候臘鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十九日二漸加至五六十丸忌海藻菘菜猪肉冷水

近効療痢無問冷熱神驗黄連丸方

黄連 一兩大　茯苓 二兩小　阿膠 一兩小炙

右三味先擣黄連茯苓爲末以少許水鎔阿膠和爲丸仍衆手丸之暴乾量患輕重空腹以飲下三四十丸漸漸加至六十丸

不過五六服必差常用之極効

又療若下無問冷熱及膿血痢悉主之方

生犀角屑　黄蘗各二兩　黄連　苦參各三兩

右四味擣篩爲散以糯米煑作飲葓令生毋日空腹服一方寸匕日再服便差勿輕之此方於度支王郎中處得曾用極効肘後有當歸云庚侍郎家方產後彌佳

崔氏治痢無問冷熱赤白久新并痟温劉秘監積年患痢毋服此即愈方

阿膠二兩一兩炙入藥一兩銷作清　吴黄連一兩　乾薑二兩

入黄無食子二枚久痢腸滑甚者量加至三四枚

右四味擣篩爲末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸日再漸加至三十丸老小者以意斟酌禁如常法出第三卷中一云若冷痢以酒下熱痢以粥飲下

文仲治無問冷熱及五色痢入口即定方

黃連四分　黃蘗　當歸　黃芩各二兩

阿膠二兩炙　熟艾一兩

右六味擣篩爲散以醶醋二升煑膠烊下藥煑令可丸如大豆飲服七八十丸日二夜一服特宜老人若産婦痢加蒲黃一兩蜜和爲丸大神驗效出第三卷中

熱毒痢方三首

肘後若下色黃者協毒熱下也療之方

梔子十四枚去皮

右一味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日再服出第二卷中

千金療熱毒痢方

苦參　橘皮　獨活　阿膠炙

藍青　黃連　鬼箭羽一云鬼臼　黃蘗

甘草炙

右九味等分擣篩以蜜烊膠和併手丸如梧子乾以飲服十丸日三稍加之卒下疰痢者大良忌猪肉冷水海藻菘菜出第十五卷中

文仲治熱痢久不差者黃連丸方

黃連末以雞子白和丸如梧子飲服十丸至二十丸日三

熱毒血痢方六首

廣濟療熱毒痢血其痢行數甚數痢出不多腹中刺痛此是熱痢宜生犀角散方

生犀角末　酸石榴皮熬　枳實熬令黃各三兩

右三味各異擣篩爲散以飲服兩方寸匕日再差停忌熱食物

又療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

升麻　地榆　茜根　黃芩各六分

犀角四分 生地黃八分 梔子七枚擘 薤白八分

香豉二合綿裹

右九味切以水六升煑取一升五合絞去滓分温三服日再忌諸熱物並出第四卷中

千金大熱毒純血痢療不可差者方

黃連六兩

右一味切以水七升煑取二升半夜露著星月下旦空腹頓服之卧將息不差加黃連二兩更作服之仍不差者以疳痢法療之佳忌如常法

又療熱毒下黑血五內攪切痛日夜百行氣絶欲死方

黃連一升 龍骨 白朮各二兩 阿膠炙

乾薑 當歸 赤石脂各三兩 附子一兩炮

右八味切以水一斗煑取五升分爲五服余以正觀三年七月

十二日忽得此痢至于五日將絶處此方藥入口即定忌猪肉冷水桃李雀肉並出第十五卷中

古今録驗療熱毒下血及豆汁犀角煎方

犀角屑　人參　當歸各三兩　黄連四兩

蜜一合

右五味切以水五升煑取一升去滓内蜜煎三沸分爲三服日三忌猪肉冷水出第十卷中

文仲治熱毒痢痢血犀角散方

生犀三兩　石榴皮燒三兩　黄連三兩　乾藍二兩

地榆二兩

右五味擣篩爲散以米飲服三方寸匕日二服出第三卷中

赤痢方四首

病源此由腸胃虛弱爲風邪所傷則成痢挾熱熱乘於血則血

流滲入腸與痢相雜下故爲赤痢也出第十七卷中

集驗療下赤痢方

秫米一把　鯽魚鮓二臠細切　薤白一虎口細切

右三味以合煮如作粥法噉之古今録驗同出第四卷中

千金療赤滞下方

成煎猪膏三合　清酒五合

右二味以緩火煎十沸適寒溫頓服之取差止

又論曰凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醤粉鹹食所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也並出第十五卷中

必効療赤痢方

香淡豉半大升　黃連一大兩

右二味以水一升半浸豉一日濾取汁碎黃連薄綿裹豉汁

中煎取強半升空腹頓服即上桑泉蔣尉云効出第二卷中

崔氏治赤痢黄連丸方

陳倉米四分　黄連四分　乾薑四分

右三味擣篩爲末緩火炒令色變以內二顆雞子白中熟和丸如梧子大空腹服五十丸以好無灰酒温一盞下之至晩間痢赤色當變白明旦即差更服如前出第三卷中

久赤痢方二首

病源久赤痢者由體虚熱乘於血血滲腸間故痢赤腸胃虚不平復其熱不退故經久不差胃氣逆則變爲嘔噦也胃虚穀氣衰蟲動侵食則變爲𧏾也出第十七卷中

千金療下赤連年方

地榆　鼠尾草各一兩

右二味切以水二升煑取一升分爲二服如不差取屋塵水盡

去滓服一升日二服古今録驗服屋塵汁一小盃餘同此是徐

平方療下血二十年者若不止重服即愈肘後同

又方

鼠尾草　薔薇根　秦皮（用槲皮亦得）

右三味等分水淹煎去滓以銅器重釜煎成丸如梧子服五

六丸日三稍增差止亦可濃汁服半升出第十五卷中

卒下血方七首

深師治卒下血晝夜七八行方

黃連　黃蘗（各四兩）

右二味切以淳苦酒五升煑取一升半分爲二服亦療下痢

忌猪肉冷水

又療卒下血蒲黃散方

蒲黃（三合）　當歸（一兩）　鹿茸（一枚燒）

右三味擣篩爲散飲服方寸匕先食日三並出第二十六卷中

集驗療卒下血不止方

草龍膽 滿一虎口

右一味切以水五升煮取二升半分爲五服如不差更服出第四卷中

葛氏療卒下血方

小豆 二升

右一味擣碎水三升和絞取汁飲之姚云立止

又方

黃連 半兩　黃蘗 二兩　梔子 二七枚擘

右三味切以酒二升漬一宿去滓煮三沸頓服之忌豬肉冷水

並出第十六卷中

崔氏治卒下血不止方

竈突中塵一升 黃連五兩 地榆三兩

右三味擣篩爲散粥飲服方寸匕日再服重者夜一

近効治卒下血不問丈夫婦人立効牛角䚡灰散方

黃牛角䚡一具燒赤色出火卽青黑

右一味爲細散食前濃煮豉汁和二錢匕重者日三神驗

血痢方六首

病源血痢者熱毒折於血血滲入大腸故也血之隨氣循環經絡通行藏腑常無停積毒熱氣乘之遇腸虛者血滲入於腸腸虛則洩故爲血痢也身熱者死身寒者生診其關上脉芤大便去血暴下血數升也出第十七卷中

廣濟療血痢黃連丸方

黃連 白龍骨炙 禹餘粮 伏龍肝各八分

代赭研 乾薑各六分

右六味擣篩蜜和丸飲服三十丸如梧子漸加至四十丸差止忌猪肉冷水熱食

又療痢鮮血方

蒨根　黄連　地榆各八分　梔子十四枚

薤白切　香豉各八分　犀角六分屑

右七味切以水八升煑取二升分爲三服日再忌猪肉冷水

並出第四卷中

必効療患熱血痢方

粳米二升研

右一味研碎令米盡取汁可一大升於新磁瓶中盛取油絹密閉頭繫內著井水中令至明飲之傳與人無不差者出第二卷中

古今録驗療血痢及膿血方

黄連三兩

右一味切以清水三升漬一宿且煎取一升半去滓分爲二服服令須臾盡忌猪肉冷水文仲同

又療下痢鮮血方

乾地黄 犀角屑 地榆各二兩

右三味擣篩蜜丸如彈子大每服一丸水一升煎取五合去滓温服之

又療下血痢地膚散方

地膚五兩 地榆根 黄芩各二兩

右三味擣篩爲散以水服方寸匕日三並出第二卷中

久血痢方三首

病源此由體虚受熱熱折於血血滲入腸故成血痢熱不歇胃虚不復故痢血久不差多變嘔噦及爲濕䘌出第十七卷中

崔氏療痢血數十年方

石灰三大升熬令黃

右一味以水一斗攪令清澄一服一升日三服止出第三卷中

小品療下血連歲不愈方

黃連㸃

右一味擣末以雞子白和爲餅子微火炙令黃黑復擣篩飲服方寸匕日三有効下清血痿黃失色醫不能療者皆差忌猪肉肘後同

文仲治七八十老人患積痢不斷兼不能飲食方

上黨人參四分　鹿角去上皮取白處作末炒令黃

右二味擣篩爲散平旦以粥清服方寸匕日再並出第三卷中

蠱注痢方三首

病源此由歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨經脉血氣漸至於藏腑大腸虛者毒氣乘之毒氣挾熱與血相搏則成血痢

也毒氣侵食於藏腑如病蠱注之狀痢血雜膿瘀黑有片如雞

肝與血雜下是也出第十七卷中

肘後療苦時歲蠱注毒下者方

礬石熬二兩 乾薑 附子炮 黃連各二兩

右四味擣篩爲散以酒服方寸匕日三不止更服忌猪肉冷水

又方

黃連 黃蘗等分

右二味擣末蜜丸如梧子大飲服十丸日四服忌猪肉冷水並

出第二卷中

古今録驗療純痢血如鵝鴨肝并恊蠱毒方

蒨根 升麻 犀角 桔梗

黃蘗 黃芩各三兩 地榆 蘘荷根各二兩

右八味切以酒三升漬一伏時服一升日一服千金同未差更

作出第六卷中

腸蠱痢方一首

病源腸蠱痢者冷熱之氣入在腸間先下赤後下白連年不愈侵傷於藏腑下血雜白如病蠱之狀名爲腸蠱也出第十七卷中

肘後凡痢下應先下白後下赤若先下赤後下白爲腸蠱方

牛膝三兩擣碎以酒一升漬經宿每服一兩杯日二三服姚同出第二卷中

膿血痢方七首

病源夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流散也其遇大腸虛而血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結血化爲膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏月多苦膿血痢者腸胃虛也秋冬診其脾脉微濇者爲內潰多下血膿又脉懸絶則死滑大則生脉微小者生實

急者死脉沈細虚遲者生數疾大而有熱者死出第十七卷中

肘後療熱病乆下痢膿血蘗皮湯方

黄蘗三兩 梔子二七枚擘 黄連四兩 阿膠二兩炙

右四味切以水六升煮取二升分爲三服又一方加烏梅二十枚文仲同忌猪肉冷水出第二卷中

文仲治熱痢及下黄赤水及黄膿血四肢煩皮上冷者方

黄連八兩去毛 熟艾一兩 黄蘗四兩 黄芩三兩

右四味擣篩爲末以黄臘二兩安一升盌中煑令消及煖和藥白飲服六七十丸如小豆日二夜一即漸大驗

又下乆下痢膿血方

赤石脂一斤綿裹 烏梅二十箇 乾薑四累 粳米一升

右四味切以水七升煑取令熟藥成服七合日三肘後同

並出第三卷中

删繁療下焦熱或痢下膿血煩痛痟惱或不出赤石脂湯方

赤石脂八兩　烏梅二十枚去核　梔子十四枚　白朮

蜀椒汗　升麻各三兩　乾薑二兩　粟米一升

右八味切以水一斗二升煑米熟去滓取七升下諸藥煑取五合服之忌桃李雀肉出第四卷中

備急葛氏云若挾熱者多下赤膿雜血方

黃連　竈突中塵各半兩

右二味末之酒服方寸匕日三服姚氏同忌猪肉冷水出第六卷中肘後云以棗膏和分作三丸日服一丸

古今録驗療腸澼溏便膿血乾薑散方

乾薑　黃連　桂心各一分

右三味擣篩服方寸匕著糜中食日三多膿加薑多血加桂有驗忌猪肉冷水生葱

又療中寒下痢膿血附子散方

蜀附子一枚炮 麴 乾薑各三分

右三味下篩爲散先食以酒服方寸匕日二并療婦人漏下忌如前並出第三卷中

赤白痢方六首

病源凡痢皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛而入客於腸間腸虛則泄故爲痢也然其痢而赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤也冷氣入腸搏於腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血狀如魚腦世謂之魚腦痢也出第十七卷中

文仲鹿茸散治青黃白黑魚腦痢日五十行方

鹿茸二分炙 石榴皮二分 乾薑二分 棗核中人七枚

赤地利一兩燒作灰肘後云赤蜀如三指

右五味擣篩爲散先食飲服方寸匕日三夜一若下數者可五六服肘後同

小品久卒赤白下方

燒馬屎一丸作灰分服酒水隨意服巳試良肘後同

深師療赤白下者黄連湯方

黄連　黄蘗　乾薑　石榴皮

阿膠炙各三兩　甘草一兩炙

右六味切以水七升煑取二升分爲三服日再忌海藻菘菜猪肉冷水出第二十六卷中

延年駐車丸主赤白冷熱痢腹痛方

黄連六兩去毛　乾薑二兩　當歸三兩　阿膠炙三兩

右四味擣篩三年酢八合消膠令鎔和併手丸如大豆以飲服三十丸日再忌生冷滑猪肉冷水肘後同出第七卷中

救急療赤白痢無問新舊入口即斷方

香豉心（豉心謂合豉其中心者熟而且好不是去皮取心勿浪用之）

右一味以取豉爆令乾香擣爲末大者一大升豉心爲四服服別以酒一大升小兒小升豉心還依劑爲四服和之即止下小兒量氣力與之出第九卷中

必効主赤白痢方

黃連（二兩） 阿膠（四片）

右二味以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然後內膠令烊溫分三服忌猪肉冷水出第二卷中

久赤白痢方四首

病源久赤白痢者是冷熱乘於血血滲腸間與津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白連滯久不差也凡痢久不差脾胃虛弱則變嘔噦胃弱氣逆故嘔也氣逆而外有冷折之不

通故嗽亦變爲蠆蟲食人五藏也三尸九蟲常居人腸胃腸
胃虛則動上食於五藏則心懊憹而悶齒齗脣口並生瘡
下食於腸則肛門傷爛而穀道開也輕者可治重者致死出
第十七卷中
崔氏馬藺子散療赤白痢腹內疞痛并久水穀痢色白如泔澱
悉主之極重者不過三四日必差方
馬藺子一升熬 地榆根皮八分 厚朴炙八分 熟艾八分
赤石脂一升 龍骨十分 茯苓十分 當歸十二分
右八味擣篩爲散一服方寸匕加至四五匕日再夜一白飲
服出第三卷中
文仲療赤白痢五六年者方
燒大荆臂許大者
右一味取瀝服五六合即差肘後同

又卒腹痛下赤白數日不絶方

雞子（一枚叩頭取黄去白） 胡粉末（令滿殼燒焦成屑）

右二味以酒服之肘後同並出第三卷中

近効療赤白痢日數十行無問老小方

甘草（二兩炙）

右一味切以漿水四升煮取一升去滓頓服之

疳痢方六首

必効療冷疳痢方

取葈䓘子（熬令黄色）

右一味擣爲末和臘月猪脂更擣令熟爲丸綿裹如棗許大以内下部中因痢出即更内新者不過三度即差出第二卷中

古今録驗療五疳蒸下痢方

苦參（三兩） 青葙 甘草（炙各三兩）

右三味切以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服生地黃汁即差忌海藻菘菜

又方

青黛　丁香　黃連各等分

右三味擣篩用甘淀和爲丸口中有䘌含之若下部有䘌以綿裹内下部日服五六十丸含之令下差

又方

丁香　麝香別研　石黛　石鹽

山榆人　小蘗皮　桂心　乾薑

青礬石燒　頭髮灰

右十味擣爲散著䘌上乾者和臘月猪膏煖著療時行病後食羊肉及肥膩或酒或房而得乆蒸終變爲疳必須攻下部不可輕之忌生葱

又療疳濕痢方

青葙　雄黄研　石硫黄研　蕪荑

雷丸各二兩　苦參　狼牙各三兩　藜蘆一兩炮

右八味擣篩爲散取如杏人大内下部中忌生葱狸肉

又療疳濕痢神効方

黄連三兩　零陵香一兩半　犀角一分屑　丁香三十枚

麝香一大豆　牛黄一大豆

右六味以水洗黄連零陵香丁香澄取清水去滓更以水添滿九升内黄連零陵丁香犀角煑兩沸然後著牛黄麝香煎一沸取一升分作三服如一日服不盡二日服亦得忌生冷酢滑猪肉魚三日内不得食菜並出第十卷中吳昇師以九升先以一升煑添盡九升取一大升分爲三服

又疳痢及久痢成疳方九首

廣濟療久患痔瘻不差兀子礬散方

兀子礬八分燒　麝香二分研　吳白礬六分燒　雲母粉六分

桂心二分　龍骨六分　無食子七顆燒　黃連八分

右八味擣篩爲散空腹以生薑汁和三錢匕服日再煑薑湯下亦得忌生菜熱麪猪魚葵笋灸肉生葱蒜酢冷水

又療積年痔瘻羸瘦面色痿黃方

石硫黃研　黃連各一兩　艾一兩　蜜一升

右四味以水二升先煑黃連艾取半升後內石硫黃末更煑三五沸即絞去滓又內蜜更煑三五沸下分爲三服忌猪魚蒜冷水並出第四卷中

必効療積久痢成痔灌方

樗根一握淨洗剥白皮擣絞取汁三合取時勿令見風日　麻子脂二合燒如車脂

酢泔淀二合　椒四合汗　豉二合

右五味以水六升取椒豉和煎絞取汁二升和㮋汁麻油泔淀等三味分為兩分用一分灌隔一日更取餘者復灌其藥欲用時溫溫即得忌酒肉油麪雞豬魚醬唯食煑飯葱白爛煑蔓菁芥等五六十日外鹿脯多少下飯亦得神効

又療痢初較後膿血或變純白或成魚腦五十日以上或一二年不差變成疳所下如泔淀方

生羊肝一具

右一味取大酢一年以上者米麥並中年深唯佳取羊肝剥去上膜柳葉切朝旦空腹取肝手拈取酢中出吞之覺心悶則止不悶還服之一日之間能不食粥飯盡一具羊肝者大佳不然除飽吞已外料理如生肝以薑虀下飯如常法食之日食一具肝不過二三具即永差後一月不得食熱麪油膩醬豬魚雞肉等

又療疳痢久不差羸瘦著牀欲死方

新出羊糞一升淨揀

右一味以水一升漬經宿明旦絞汁頓服之至日午如得食煑飯極重者不過三服

又療疳法丈夫婦人小兒久痢百方療不能差此方最効

丁香　麝香　黄連各等分

右三味擣篩爲散以杏核大取竹筒吹入下部小兒及孩子量力減之不過三四廻差積年久疳痢不差裴光州云常用奇効備急同並出第三卷中

又療久痢變成疳下部瘃生惡瘡惡寒壯熱者方

桃白皮切一升　槐白皮亦然　苦參切五合　艾三月三日者五合熟

大棗十枚破

右五味以水五升煑取二升半去滓内熊膽棗許大攪令勻

取二升灌下部餘三分服

近効新附療久痢及疳𤻲諸方不差者此方必効

揀樗根白皮不限多少當取時不用見狗及風

右一味細切擣如泥取細麪捻作餛飩如小棗勿令破熟煑吞七枚重者不過七八服皆空腹服之忌油膩熱麪

又疳痢曉夜無度者方

取樗根濃汁一雞子殼許

右一味以和粟米泔一雞子殼許灌下部再度即差其驗若神小孩兒減半用之醫人褚球録上

數十年痢方一十一首

千金療下痢丸主數十年痢下下氣消穀令人能食夏月長將服之令人不霍亂方

黃連　黃蘗　桂心　附子炮

乾薑各三兩 吴茱萸四兩 蜀椒汗半兩 麴一升熬

烏梅二升半 大麥蘖一升半

右十味擣篩蜜和食巳飲服如梧子十九日三服至二十九亦可至三十九忌猪肉冷水生葱等

又療數十年下痢消穀下氣補羸烏梅肉丸方

麴好者一升熬 附子炮二兩 大麥蘖熬一升 當歸三兩

桂心三兩 黄連 吴茱萸 烏梅肉熬令燥

乾薑各四兩 蜀椒一兩汗

右十味擣篩蜜和丸如梧子食巳飲服十九日三忌猪肉冷水生葱等

又四續丸主三十年疰痢骨立萎黄腸滑不瘳方

雲實五合 蠟五兩白者 附子炮二兩 女萎三兩

龍骨二兩

右五味擣篩爲末以臘煎烊以丸藥如梧子飲服五丸日三不過五六服必差其雲實熬令香忌猪肉冷水等（千金名臘煎丸）

又療三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃四肢沈重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦轉筋起止須人扶陰冷無子椒艾丸方

赤石脂（二兩別末） 熟艾（一升） 乾薑（三兩） 蜀椒（三百枚汗）

烏梅（三百枚醋漬剝取肉）

右五味先擣篩薑椒爲末將熟艾梅肉著一斛酒飯下蒸令飯熟内乾薑椒末赤石脂末合擣三千杵蜜和丸如梧子飲服十丸日三不差至二十丸加黃連一升艾一斤忌猪肉冷水等物

又療三十年痢不止方

厚朴（炙） 乾薑 阿膠（炙各二兩） 黃連（五兩）

石榴皮　艾葉各三兩

右六味切以水七升煮取二升分再服忌猪肉冷水

又療積久三十年常下神効方

赤松木皮去上蒼皮二斗

右一味爲散麪粥和一升服之日三即止不過服一斗永差

秘方三十年痢百日服差良並出第十五卷中

古今録驗療三十歲寒下及霍亂諸藥所不能療并腸滑若是蠱疰所中方

蔘子　艾屑各二升　龍膽　續斷

白术各三兩　蜀椒去目汗　附子炮　桂心

苦參　乾薑　甘草炙　鼠尾草各二兩

右十二味擣篩蜜和一歲兒服一丸如梧子三歲兒服二丸五歲兒服三丸大人服五丸飲下療寒熱氣堛堛在胷中卒氣

痛繞臍神良忌桃李雀肉生葱猪肉冷水海藻菘菜

廪丘公療下痢三十年方

茯苓　乾薑　黄連分等

右三味擣篩爲散蜜和丸如梧子飲服之一日漸增至百丸若痢劇者加龍骨附子炮還令分等一服十丸漸增之以知爲度忌猪肉冷水醋物等

又當歸湯療三十年下痢止諸痛方

當歸一兩　生薑八兩　大棗二十枚擘

右三味以水四升煑取一升半分作三服不差復作之

又云吾患痢三十餘年諸療無効唯服此方得愈也安石榴湯療大疰痢及白滯因篤欲死腸已滑醫所不能療方

乾薑二兩生薑倍之　黄蘗一兩細切　石榴一枚小者二枚　阿膠二兩別研漬之

右四味切以水三升煑取一升二合去滓内膠令烊頓服不差復

作療老小亦良人羸者稍稍服之不必頓盡須臾復服石榴須預取之肘後同並出第二卷中一方無黃蘗用黃連

吴爽師療久痢方

龍骨　赤石脂　無食子各六分　地榆三分

熟艾三分三月者良　橡子　黃蘗各五分

右七味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服四十五十丸日二服稍加至六十丸

休息痢方五首

病源休息利者胃管有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動動而腸虛受之故為痢也冷熱氣調其飲則靜而痢亦休也腸胃虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其痢乍發乍止謂之休息痢也出第十七卷中

肘後療休息痢方

黃連切 龍骨如鴨子大一枚 膠如掌大炙 熟艾一把

右四味以水五升煑三物取二升去滓乃內膠膠烊分再服濃煑乾艾葉亦佳又當煑忍冬米和作飲飲之忌猪肉冷水

又方

乾地榆一斤 附子一兩炮

右二味以酒一斗漬五宿飲一升日三服盡更作忌猪肉冷水

又方

龍骨四兩

右一味擣如小豆以水五升煑取二升半冷之分爲五服又以米飲和爲丸服十九文仲同並出第二卷中

文仲葛氏若久下經時不愈者此名爲休息下療之方

取犬骨

右一味炙令黃焦擣篩飲服方寸匕日三愈肘後備急同

胡洽麴蘗丸療數十年休息痢下不能食消穀下氣療虛羸方

麥蘗熬 七月七日麴各一升熬 附子炮 桂心

烏梅肉焙燥各二兩 人參 茯苓各四兩

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子食前飲服十丸日三稍稍增之忌

猪肉冷水生葱大酢肘後備急同並出第三卷中

腹肚不調痢一首

廣濟療冷熱不調痢膿水方

人參 乾薑 枳實炙各四分 厚朴炙

龍骨 赤石脂 黃連 苦參各六分

黃芩五分

右九味擣篩蜜丸空腹以飲服如大豆十五丸日二漸加服者

亦得出第三卷中

洩痢不禁不斷及日數十行方三首

集驗結腸丸療熱毒下不斷不問久新悉療之方

苦參　橘皮　獨活　阿膠炙

芎藭　乾薑　黃蘗　甘草炙

鬼臼各四分

右九味擣篩蜜與膠共烊以和丸併手捻作丸如梧子暴燥以飲服十九日三不知稍加此方亦療諸疰下及卒下悉効忌海藻菘菜等

又建脾丸療脾滑胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛方

附子一兩炮　蜀椒一兩汗　桂心二兩　赤石脂

黃連　人參　乾薑　茯苓

大麥蘖　陳麴熬　石斛　當歸各二兩

鍾乳三兩研

右十三味擣篩蜜和以酒服十丸如梧子日三稍稍加之忌猪

內冷水生葱酢出第四卷中

文仲療五勞及飽食房室傷胃令人大便數至圂而不能便日數十行劇者下血并婦人産後餘疾腹絞痛方

附子一枚炮

右一味以猪脂如雞子黃大煎附子裂爲候削去上黒皮擣篩蜜和丸先食服如大豆三丸日三稍加可至十丸當長服之永不痢忌猪肉范汪同出第三卷中

下膲虛寒及遠血近血方二首

崔氏療下膲寒損或先見血後便轉此爲遠血或痢不痢伏龍肝湯方

伏龍肝五合竈心土是也研　甘草一兩炙　乾地黃五兩

燒髮灰二合　黃芩　牛膝　乾薑

生檞脉　阿膠各二兩炙

右九味切以水七升煑七物取三升去滓下阿膠更煎取烊乃下髮分作三服忌海藻菘菜蕪荑

又療下焦虛寒損或前便轉後見血此爲近血或痢下或不痢好因勞冷而發續斷湯方

續斷 當歸 桔梗 阿膠炙 桂心各三兩 乾薑 乾地黃 芎藭各四兩 蒲黃一升 甘草二兩炙

右十味切以水九升煑八物取三升五合去滓下阿膠更烊膠取沸下蒲黃分爲三服忌猪肉海藻菘菜生葱蕪荑並出第四卷中

下痢食完出及上入下出方一首

范汪温中湯療寒下食完出方

甘草炙 乾薑各三兩 蜀椒八十枚汗去閉口及目 附子一枚炮四破

右四味切以水二升煮取一升分再服若嘔內橘皮半兩小
與老皆取服之良忌海藻菘菜猪肉冷水出第十五卷中

下痢腸滑方三首

范汪苦酒白丸療赤白滯下腸已滑日數十行者方

女萎 半夏洗各二兩 附子炮 藜蘆炙去頭各一兩

右四味擣合下篩和以十年苦酒頓丸如梧子若有下者
飲服三丸日三不知稍稍增之忌猪羊狸肉餳出第十五卷中

集驗療下痢腸滑飲食及服藥皆宁出猪肝丸方

猪肝一斤炙令乾 黃連 阿膠炙 烏梅肉熬各二兩

胡粉七棊子

右五味擣下篩蜜和酒服十五丸如梧子日三稍加亦可散
服葛氏文仲胡洽同忌猪肉出第四卷中肘後云亦可散服

千金療下痢絞痛腸滑不可差方

黄連六兩　阿膠　鼠尾草　當歸

乾薑各三兩

右五味切以酒七升煮取三升去滓温分三服若熱不絞痛去乾薑加當歸以水煮之忌猪肉冷水菘菜海藻出第十五卷中

大注痢及赤白困篤腸滑方二首

深師卒大注痢及赤白滯下困篤欲死腸已滑方

乾薑二兩生者焙　黄蘗　石榴皮各一兩　阿膠二兩半

漬豉一升　前胡四兩

右六味切以水三升煮取三合去滓内膠頓服不差更作無毒宜老小羸人稍稍服之此湯兼療傷寒大下及赤白困篤亦皆主之出第二十六卷中

范汪療得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢膿血日數十行

腹中絞痛身熱如火頭痛如破其脉如濇方

黃連四兩　苦參二兩　阿膠一兩

右三味㕮咀以水一斗煑取二升去滓適寒溫服二合日三少少益至半升服湯盡者復合以愈爲度曾試驗忌猪肉冷水古今録驗同

痢兼渴方二首

病源夫水穀之精化爲血氣津液以養藏腑藏腑虛受風邪邪入於腸胃故痢痢則津液空竭藏腑虛燥故痢而兼渴也渴而引飲即痢不止翻溢水氣脾胃已虛不能剋消水水氣流溢浸漬肌肉則變成腫也出第十七卷中

必効療痢兼渴方

麥門冬三兩去心　烏梅二七枚碎

右二味以水一大升半煑取強半絞去滓待冷細細咽之

即定仍舍之出第二卷中

古今録驗療熱渴痢方

冬瓜一枚

右一味以黄土厚一尺火炮穩約以水爛去土淨洗絞取服之

許仁則痢方七首

許仁則云此病有數種有水痢有穀痢有血痢有膿痢有膿血相和痢有腸澼痢其水痢者本由脾氣熱消穀作水穀氣不停便生此痢穀痢者由脾氣冷穀氣不消而生此痢血痢者由毒熱在腹血流入腸致有此痢膿痢者由積冷所致膿血相和痢者由冷熱相擊便致此痢腸澼痢者由積冷在腸腸間垢洟不能自固便有此痢色數雖多其源是一皆緣飲食不節將息失宜也

又水痢之候心腹甚痛食無妨但食後即痢食皆化盡唯變作水

穀無期度多食多下少食少下有此狀者宜依後黄芩等五味散服之方

黄芩　黄連　黄蘗各五兩　黄耆四兩

龍骨六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日二服稍稍加至三匕服差乃止忌猪肉冷水等

又穀痢之候痢無期度食不消化腹痛每遇冷便發有此疾候者宜依後附子等五味散主之方

附子炮　細辛　白朮各五兩　乾薑四兩

神麴一升熬

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良忌猪肉冷水生菜桃李雀肉等

又血痢之候小腹絞痛無期度食不住如水但兼血而下有此

患者宜依後犀角五味散方

生犀角五兩末　阿膠四兩炙　黃蘗四兩　艾葉

乾薑各三兩一作乾藍

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿痢之候腹亦刺痛食亦不大稀但大便兼膿遇冷而劇有此候者宜依後神麴等五味散服之方

麴末一升　乾薑六兩　丁香　豆蔻子各四兩

高良薑五兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又膿血相和痢候二物正等食不甚稀每出二物與食相兼腹亦小痛有此候者宜依後黃耆等五味散服之方

黃耆六兩 赤石脂八兩 厚朴五兩炙 乾薑

艾葉各三兩炙

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服稍稍加至二三匕良

又腸澼痢候食稀或稠便但似膿每便極滑痢有常期有如此者宜依後豆蔻子等八味散服之方

豆蔻子 丁香各三兩 細辛 附子炮

乾薑各四兩 人參 黃耆各五兩 赤石脂六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再稍稍加至三三匕良忌生葱猪肉冷水

又前件諸痢患無新舊如藥療之蹔差還發此即縱以新藥止之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結必須湯藥滌之以泄病勢痢後更以藥物補助之有此候者宜依後附子

等六味湯以利之後服高良薑十味散以補之方

附子炮 細辛 甘草炙 人參各二兩

乾薑三兩 大黃五兩

右藥切以水七升煑取二升四合去滓分温三服服如人行十里久一服此湯當得快利利中有惡物如魚腦狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四日宜合後高良薑等十味散服之方

高良薑 細辛 黃耆 白朮

苦參各五兩 丁香二兩 人參 乾薑各四兩

豆蔻子三兩 赤石脂六兩

右藥擣篩爲散以飲下之初服一方寸匕日再服之稍稍加至二三匕並出上卷中忌生菜桃李雀肉等吴昇同

外臺祕要方卷第二十五

右迪功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔　校勘

外臺秘要方

二十六

痔病　陰病

九蟲

外臺秘要方卷第二十六 痔病陰病九蟲等三十五門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

崔氏論曰凡痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血

出者名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也若大便難肛良久肯入者名氣痔也此皆坐中寒濕或房室失節或醉飽過度所得當時不爲患久久不差終能困人別有大方今單行亦要便宜依按用之肘後集驗同出第四卷中

廣濟療五痔方

生槐煎五分　皂角二兩炙去皮子　麝香研　鰻鱺魚炙

雄黃研　莨菪熬　丁香各二分　木香二分

右八味擣篩以槐煎和丸分爲五丸取一淨瓶可一升以來掘地埋之著一疊子於瓶上鑽疊子作孔內火瓶中灰蓋之然內藥一丸燒之令安穩以下部著疊孔上坐便通汁甚盡一丸藥即止內痔以藥一丸內下部立効仍不及熏忌魚熱麪等

又療五痔蝟皮散方

蝟皮炙　龜甲炙　當歸各六分　黃耆

槐子　大黃各八分　蛇皮炙五寸　露蜂房熬五分

藁本　桂心各五分　猪後懸蹄甲十四枚炙

右十一味擣爲散空腹以米飲服方寸匕日二漸加一匕半不利忌麪炙肉雞魚葱蒜

又療五痔下血不止方

槐子　五色龍骨　槲葉炙令紫色　乾薑

芎藭　當歸　蒨根　吴茱萸各六分

白斂　附子五分炮　黃耆八分　大黃十分

猪懸蹄甲十四枚炙　髮灰四分

右十四味擣篩蜜丸空腹以飲服如梧子二十丸日二漸加至四十丸若利恐多以意減之忌生冷炙肉猪魚蒜出第四卷中

小品療五痔散主酒客勞及損傷療下部中傍孔起居血縱横出及肉方

赤小豆四分熬　黄耆三分　附子炮　白斂

桂心各一分　芍藥　黄芩各二分

右七味擣爲散以酒服方寸匕日三止血大驗文仲備急集驗同

又方

蘱蘆　大黄　黄連各半兩　練木子十四枚

桃人十四枚去皮　巴豆四枚去皮心　萆麻十四枚一名狗蜱

右七味㕮咀以猪肪一升煎三沸下去滓傅着肉上日三外著此膏内服紫參丸常併行古今録驗同

又療五痔大便肛邊清血出紫參丸療久不差服之無不差方

紫參　秦艽　亂髮灰　紫菀

厚朴各一兩炙已上　藁本二兩　雷丸半升　白芷一兩

䗪蟲半兩熬　石南半兩炙　貫衆三兩去毛　猪後懸蹄甲十四枚炙

䖟蟲半兩去翅足熬

右十三味擣篩以羊脊骨中髓合猪脂各半升煎和丸如梧子未食酒服十五丸日再亦可飲下劇者夜一服四日肛邊痒止八日膿血盡鼠乳悉愈滿六十日終身不復發久服益善有痔病十八年肛出長三寸服此方即愈亦療脫肛有人熱可除羊髓以赤蜜代集驗備急千金同禁生冷魚肉

集驗療五痔有氣痔温寒濕勞即發蛇蜕皮主之牡痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣鼈甲主之牡痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血猬皮主之腸痔更衣挺出久乃縮牡猪左蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之方

右所主藥皆下篩等分隨病倍其所主藥爲三分旦早以井

花水服方寸匕病甚者旦暮服之亦可至四五服忌冷食豬肉生魚菜房室唯得食乾白肉病差之後百日乃通房內又用藥內下部有瘡內中無瘡內孔中千金刪繁文仲同

又方

野葛燒末

右一味以刀圭內藥中服五日知二十日差三十日愈徐安用之良千金同

又方

煮槐根洗之又煮桃根洗之千金備急同並出第九卷中

刪繁療五痔桃葉蒸痔方

桃葉一斛 細糠 胡麻各一斗熬

右三味合為一家蒸之取細糠熟為度內小口甕中將肛門坐桃氣熏入肛門蟲出當死出第十七卷中

千金療五痔方

猬皮方三指大 熏黃如棗大 熟艾鷄子大

右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黄煙氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羹臛將補慎雞猪魚生冷二十日内補之

又方

桑耳

右一味作羹空腹下飰飽食之三日食之待孔卒痛如鳥啄取大豆小豆各一升合擣作兩囊中蒸之及熱更互坐之即差並出第二十四卷中

五痔數年不差方六首

深師療五痔數年不差槐子丸主燥濕痔痔有雌雄爲病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒及作勞色犯之即發方

槐子　乾漆熬　檄木根皮各四兩似茱萸　秦艽

黄芩　白斂　青木香　牡蠣熬

龍骨　附子八銖炮者　雷丸　蒺藜子

白芷　桂心　雞舌香各二兩　黃耆二兩

右十六味擣篩蜜和爲丸一服二十丸日三服忌猪肉冷水雞魚蒜生葱千金翼同千金翼有丁香茱萸根皮無雞舌香檞木根皮

千金小槐實丸主五痔十年方

槐子三斤　龍骨十兩　礬石燒　硫黃各一斤

白糖二斤　大黃十兩　乾漆十兩熬

右七味擣篩石二種及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁以和藥合作丸併手捻之丸如梧子大陰乾一服二十丸日三服深師同

又槐酒主五痔五十年不差方

槐東南枝細剉一石　槐東南根細剉二石　槐白皮剉一石

槐子一石

右四味大釜以水十六石煑取五石澄取清更煎取一石六斗炊兩石黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲日三四適寒溫量性常令小小醉耳合時更煑滓取汁濤米洗器不得用生水此藥忌生水故也深師并翼同

又方

塗熊膽取差乃止但發即塗一切方皆不及此救急并翼同並出第二十四卷中

古今錄驗療三十年痔肛出下血如雞肝此腸痔肛邊生瘗橫肛中此牡痔肛邊生乳此牝痔皆飽勞氣所生方

大黃如金色者十兩　滑石七兩研碎　芒消三兩　桑白皮二兩

棗三十枚擘　黃芩五兩　杏人二兩研

右七味切以酒一斗二升煑取二升盡服之當下以犬骨羮補之

又療十年痔如鼠乳膿出便作血劇白斂散方

赤小豆四分　黃耆三分　芍藥二分　白斂二分

右八味擣篩爲散酒若泔汁服方寸匕日三服忌猪肉生葱
黃芩三分 桂心三分 蜀附子炮 牡蠣各二分熬
並出第三十卷中
五痔脫肛方二首
千金療五痔脫肛槐皮膏止痛痒血出方
槐白皮二兩 薰草 辛夷 甘草
白芷各半兩 冶葛六銖 巴豆七枚去皮 漆子七枚
桃人十枚去皮 猪脂半斤
右十味切以猪脂煎三上三下去滓以綿突膏塞孔中日
四五過蟲死差止痒痛大佳出第二十四卷中薰草肘後作薰陸
必効五痔脫肛方
以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板
覆坑坐上蟲盡出張文仲處出第六卷中

腸痔方一十五首

肘後療患腸痔每大便常有血方

以蒲黄水服方寸匕日三差備急文仲崔氏千金古今録驗並同

又方

礬石熬　附子炮各一兩

右二味擣篩蜜丸如梧子服二丸酒下日三稍增百日永差不發忌猪肉冷水備急文仲崔氏千金同

又方

以鯉魚作鱠薑虀食之任性多少良崔氏用魚

又方

常食鯽魚羹及蒸隨意任之備急文仲同並出第三卷中崔氏用魚

文仲療腸痔方

以槐木上耳擣末飲服方寸匕日三肘後古今録驗千金同

又方

白薔薇根　枸杞根各二八分暴乾

右二味擣篩爲末服方寸匕日三五六日當更小腫是中病

至公傳將服勿止崔氏備急肘後同

又方　生地黃切一斤　酒二斗

右二味以酒漬地黃三日隨意飲多少即差肘後備急同

又方　取枳根皮末飲服方寸匕日三亦可煑汁常飲肘後

備急崔氏同

備急療腸痔方

以榖子燒末傅之深者導之文仲崔氏同

又方　以槐白皮一檐剉水煑令濃脫衣入中坐當如欲大

便狀冷更易不過三蟲出

又方　擣槐白皮作屑粉以導之崔氏文仲千金必効同

又方　以蘩蔞燒灰礬石熬和爲粉粉之崔氏文仲范汪

同出第六卷中

刪繁療肺虛勞寒損至腸中生痔名曰腸痔肛門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而瘡生猪懸蹄青龍五生膏方

猪懸蹄甲三枚炙　生梧桐白皮四兩　生龍膽五分　生桑白皮五分

蛇蜕皮五分　雄黃五分　生青竹皮六分　生柏皮七分炙

露蜂房炙　蜀椒汗各三分　猬皮　附子炮各四分

杏人二十枚去皮

右十三味細切綿裹以苦酒二升浸一宿於火上炙燥擣篩以猪脂三升和微火煎之如薄糖傅井酒服如棗核出第七卷中

崔氏療大便後出血止腸痔之疾宜服薤白湯方

薤白切七合　羊腎脂一升

右二味緩火煎令薤白黃去滓頓盡未差更服即止得膿血與糞相和即差便可服後方

又方

白礬燒汁盡　附子炮去皮　乾薑各一兩

右三味擣篩蜜和飲服二丸至三丸日二服忌猪雞酒麪生冷魚油膩等並出第四卷中

諸痔方二十八首

廣濟療痔下血方

以蛇不問多少煎煑肉消盡去滓用汁和婆羅粥著少鹽食之大効一無所忌

又黃耆丸方

黃耆　枳實炙各三兩　烏蛇炙　當歸

赤石脂各二兩　蝟皮炙二兩

右六味擣篩蜜丸空腹酒下如梧子二十丸日二服更不加減不利忌麪猪肉魚蒜陳臭物並出第四卷中

范汪療痔下血黃連麴散方

黃連二兩　麴一兩用七月七日者

右二味擣篩薄蜜溲先食以飲服五分匕日三不知增至方寸匕

集驗療痔猬皮丸方

猬皮一具細切熬令焦　附子二兩炮　當歸二兩　連翹二兩

乾地黃五兩　乾薑二兩　礬石二兩燒令汁盡　續斷

黃耆各一兩　槐子三兩

右十味擣篩蜜丸飲服十五丸如梧子日再加至三十丸亦主瘻常用大驗忌豬肉冷水肘後備急文仲刪繁千金古今錄驗同

又方

以生槐皮十兩削去黑皮熟擣丸如彈子綿裹內下部中大效備急千金同

又方

以槐赤雞一斤爲散飲服方寸匕千金云槐檽也

千金療痔神方

以七月七日多採槐子熟擣涎取汁重綿絞內銅器中盛庭中高門上暴之二十日以上煎成取如鼠糞大內穀道中日三亦主瘻及百種瘡救急崔氏古今錄驗同

又方

鯉魚腸（三具以火炙令香）

右一味以綿裹內下部中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡數枚當差一方去坐上蟲出古今錄驗同

又方

虎頭骨（炙）　犀角

右二味各爲末如雞子大以不中水猪脂和塗瘡上即差救急深師同並出第二十四卷中

崔氏療痔方

雀林草（一大握麤切）

右一味以水二大升煮取一升頓服盡三日重作一劑無不

差者

又方

取駱駝頷下毛燒作灰可取半雞子大酒和頓服之

並出第四卷中

必効熨痔法痔頭出或疼痛不可堪忍方

取枳實煻灰中煨之及熱熨病上盡七枚立定發即

熨之永除也

又方

以麝香當門子印成鹽相和以手塗痔頭上若令人

著亦佳其痛不可忍者不過兩度永差

又方

以野猪肉炙食十頓即差三方云奇効

又方

取五月五日著耳子陰乾擣末水服三寸匕日三差

乃止

又方　以二十年久鍼綖袋口燒作灰分和水服

又痔正發疼痛方

以葱和鬚濃煑湯置盆中坐浸之湏臾即當痛止

又方　以貍肉作羮食之或作脯食之不過三頓無不差

又方　以肥大棗一顆剥去赤皮取水銀掌中以唾研令

極熟塗棗瓤上内下部中差

又方　以蕌蓄根葉擣汁服一升一兩服差

又方　薑屑二兩小秤

右一味以水三大合煑之取一合去滓煖空腹服隔日再服忌

猪肉蒜等

又方　倚死竹色黑者取之折斷燒爲灰篩和薄飲服之

方寸匕忌牛肉餘無所忌出第三卷中

古今録驗療痔黄耆丸方是直殿中省散騎常侍郎甄立言處

黃耆　青葙子　漏蘆　鼈甲炙
狼牙各五分　黃蘗四分　猪懸蹄甲七枚炙　蝟皮四分炙
白礬十分燒去汁　芫青去足翅　斑猫去足翅熬　地膽去足翅熬
蜈蚣各十枚炙　犀角屑八分
右十四味擣篩爲散蜜和丸如梧子大空腹以飲服二丸日二增
之以知爲度忌一切油膩人莧菜
又方
掘地深一尺圓徑四寸炭火燒令赤去火以簿魚著
口上取莨菪子一合内坑中燒煙出痔人坐上以被
擁當汗出窓屋内作之以煙盡更著一合莨菪子熏
避風如發汗法則差
又療諸痔及下血不止轉虚羸者服之無不効方
黃耆原州者　枳實商州者各二大兩半細剉熬令黃
黃礬石一大兩炭火燒經一復時仍數翻轉令勻著火冷訖細羅去沙磣

右三味先擣黄耆枳實篩訖然和礬石更擣匀蜜和丸空腹以酒下二十丸加至三十丸日再服忌蕎麪猪肉蒜魚勞事唯久服一年半年愈良驗

又療痔方

鯉魚腸（可半升）

右一味擇之令淨仍新鮮取一方板可闊二尺以來厚二寸當中鑿孔深一寸半圓如醬盞口大布魚腸於其內以好麝香碎末摻魚腸取厚氈二三重當心開孔可板孔大小鋪坐以被擁之數進食可至兩炊久覺下部痛者即是蟲出也時且更坐良久取魚腸細擇之恐蟲入於腸中蟲可長二寸許細如綱絲斑作五色每出不過十餘枚不勤度數蟲盡即止

許仁則曰此病有內痔有外痔內但便即有血外有異外痔下部有孔每便血從孔中出內痔每便即有血下血甚者下血擊

地成孔出血過多身體無復血色有痛者有不痛者有此候者宜依後藥方

生槐子一斗候堅硬時

右一味擣令碎絞取汁日暴取稠取地膽暴乾擣篩爲散和槐子煎作丸以飲服十九日再加至三十丸如梧桐子大兼以煎撚作丸如棗核大内下部中日夜三四度亦可擣苦參末代地膽一方地膽作地脉草藥中無地脉惟有地麥

依前生槐子煎不覺可宜合後黃耆十味散服之方

黃耆五兩　苦參　玄參各六兩　附子炮

大黃各三兩　乾薑二兩　蝟皮二兩炙　黃連各四兩

槐子六合　猪懸蹄甲一具炙

右藥擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日再服之漸漸加至二匕忌猪肉冷水出下卷中

痔下部如蟲齧方九首

肘後療痔下部痒痛如蟲齧方

胡粉　水銀

右二味以棗膏調勻綿裹夜卧内穀中導之效崔氏同

又方

以莬絲子熬令黄黑末以雞子黄和塗之集驗文仲備急范汪崔氏等同

又方

以杏人熬令黑擣取膏塗之集驗備急文仲崔氏同

又方

以蝟皮燒灰傅之又獺肝燒擣散服之崔氏備急文仲同

又方

以溫溺令熱内少礬石以洗之良崔氏同並出第二卷中

文仲療痔下部如蟲齧方

擣桃葉一斛蒸之令熱内小口器中以布蓋上坐之蟲死即差肘後崔氏備急同一方有烏梅

又方

掘地作小坈燒令赤以酒沃中擣吳茱萸三升内中

及熱以板覆上開一小孔以下部坐上冷乃下不過三
度即差肘後崔氏備急同

又方

以小豆一升好苦酒五升煮豆令熟出暴乾復内令酒
盡止擣末以酒服方寸匕日三崔氏備急同

又方

以豬椒子一升酒一升漬經五日稍稍飲一日令盡佳
崔氏同出第六卷中

大便血風冷積年變作痔方三首

崔氏療大便急去血或至一升數合面少血色此是内傷風冷
積年多變作痔方

大黃五分　甘遂三分　黃芩二分　乾薑
附子各四分炮　桃人三七枚去皮尖　葱白七莖

右七味以水六升煮取一升半先服半升藥稍安又服半升
須臾血發又服半升未斷候發日再作不過三劑差忌豬

肉等

又方　煑桃皮李皮葍蓄苦參取汁漬之大佳出第四卷中

備急療大便血風冷積年多變作痔方

燒稻藁灰淋汁煎熱漬之三五度佳崔氏肘後文仲同

灸痔法方二首

崔氏灸痔法

以繩圍病者項令兩頭相拄展繩從大椎正中量之垂繩一頭當脊正下以墨點訖又量病者口兩吻頭接繩頭正下復點之又量病者口吻如前便中屈繩接前口吻繩頭正下復點之望使相當所三處並下火重者各五百壯輕者三百壯即愈

又法

令疾者平坐解衣以繩當脊大椎骨中向下量至尾株骨尖頭訖再折繩更從尾株尖頭向上量當繩頭

即下火高號州初灸至二百壯得差後三年復發又灸之便斷兼療腰脚並出第四卷中

雜療痔方五首

廣濟療痔瘻疽瘡方

光明砂(別研) 麝香當門子(別研) 蛇皮(五月五日者熬)

右三味等分研先以鹽湯洗拭乾於瘡上傅少蜜以散傅上差止

小品療穀道中痒痛痔瘡槐皮膏方

槐皮(五兩) 甘草 當歸 白芷(各二兩)

陳豉 桃人(各五十粒去皮) 赤小豆(二合)

右七味㕮以猪脂二升煎候白芷黃膏成去滓以塗之日三度集驗同

删繁療虛勞寒下痢不止肛邊轉生肉如鼠乳在大孔傍時

時膿血出名牡痔鼈甲丸方

鼈甲炙　乾地黃　黃連　連翹各七分

栝樓　黃耆　乾薑各六分　蠐螬五枚炙

猬皮炙　續斷各五分　附子炮　槐子

礬石燒汁盡各四分

右十三味擣篩以蜜丸如梧桐子大飲下二十丸漸加至三十丸日再忌如常

又療腎勞虛或酒醉當風所損腎藏病所爲酒痔肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏方

蜂房三兩炙　生槐白皮十兩　楝實　桃人各五十枚熬

白芷二兩　赤小豆一合碎　猪膏一升半

右七味㕮咀綿裹以苦酒一升漬一宿下膏煎取酒盡膏成去滓取杏子大綿裹內肛門中又酒服一方寸匕出第三卷中

必効療痔及諸蟲方

石榴東引根深者取一握

右一味勿令見風拭去土挫又取鹿脯四指大一片炙兩畔令熟搥細擘以水三升煮取一升適寒温空腹頓服之其患痔盛發者服即定諸蟲無問赤白並出差出第三卷中

脱肛方三首

病源脱肛者肛門脱出也多因久痢後大腸虚冷所爲肛門爲大腸之候大腸虚而傷於寒痢而用氣偃而氣下衝則肛門脱出因謂脱肛也出第十七卷中

小品療脱肛熏方

以女萎一升以器中燒坐上熏肛門即愈范汪集驗千金同出第十卷中

刪繁論曰肛者主大便道肺大腸合也號爲通事令史重十二

兩長一尺二寸廣二寸二分應十二時若藏傷熱即肛閉塞大便不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛寒大便洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之不虛不實依經調之療肛門主肺熱應肛門閉塞大便不通腫縮白蜜兌通之方

以白蜜三升煎令成乾燥投冷水中可得丸長六七寸許兌肛門中到身中向上入頭向下停少時兌烊斯須即通出千金同出第三卷中

千金療肛出方

礠石四兩研　桂心一尺　猬皮一枚炙黃

右三味擣篩爲散服方寸匕一日服十服即縮勿舉重及急帶衣須斷房室周年乃佳出第二十五卷中

肛門凸出方三首

刪繁療肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉凸出猪肝散方

猪肝一斤炙令黃燥　黃連　阿膠炙　芎藭各二兩

烏梅肉五兩熬　艾葉一兩熬

右六味擣篩平旦空腹溫服方寸匕日再若不能酒白飲服亦得千金同出第三卷中

千金肛門凸出壁土散方

故屋東壁土一升碎研　皂莢三挺長一尺二寸者

右擣土爲散以粉肛門頭出處取皂莢炙煖更遞熨之取入則止

又麻履底按入方

麻履底　鼈頭一枚

右二味燒鼈頭爲散傅肛門凸出頭炙履底以按熨之令人永不出矣並出第二十五卷中

卒大便脫肛方六首

肘後療卒大便脫肛方

又方

灸頂上迴髮中百壯

以豆醬清合酒塗之文仲備急同

又方

燒虎骨末水服方寸匕日三即差

范汪療卒大便脫肛方

以緣桑枝螺取燒末猪脂和傅之立縮亦可末以粉

之備急張文仲同出第三卷中

千金療卒大便脫肛方

以猪膏和蒲黃傅之指推內之但以粉粉之亦佳

張文仲備急同

又方

灸鳩尾骨上七壯備急文仲集驗同出第二十五卷中

腸肛俱出方二首

肘後療若腸隨肛出轉廣不可入一尺來者方

擣生栝樓取汁溫服之以猪肉汁洗手隨抑按自得

入効范汪小品張文仲備急千金同

備急若腸隨肛出方

熬石灰令熱布裹熨之隨按令入冷即易小品文仲備急同出第八卷中

脫肛歷年不愈方三首

集驗療脫肛歷年不愈方

以生鐵三斤以水一斗煮取五升以洗之日再范汪千金備急文仲同出第六卷中

千金療脫肛歷年不愈方

以死鱉頭一枚燒令煙盡作屑以傅肛門上手按之令入兼灸横骨一百壯

又方

以鐵精粉上按令入即愈並出第二十五卷中

𤺋氣及癩方六首

廣濟療疝氣核腫疼方

黃耆　桃人去尖皮熬　山茱萸　五加皮

檳榔人各八分　蒺蔾子二十分熬　海藻洗八分　玄參十分

五味子十八分　牛膝六分　茯苓六分　蓯蓉八分

枳實炙　人參　續斷各六分　桂心八分

遠志去心　石南各五分　龍骨八分

右十九味擣篩蜜丸如桐子大酒服三十丸日二漸加至四十丸忌熱麪生葱大酢粘食等物

又療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫痒狐陰丸方

狐陰一枚炙　木香　蒺蔾子　膃肭臍

昆布各六分　牛膝　菟絲子各八分酒漬　桃人去尖皮熬

石斛各十分　檳榔人十枚

右十味擣篩蜜和丸如梧子大空腹以酒下二十丸至三

十九日再服忌熱麪蕎麥猪魚粘食等物並出第二卷中

集驗療癩方

取楊柳如脚大指長三尺二十枚以水煑令極熟以故布乾掩腫處取熱柳枝更互拄之如此取差止文仲備急千金同

千金療癩方

桃人五十枚去皮尖熬 桂心二兩 澤瀉二兩 蒺藜子二兩

蜘蛛五十箇熬 防葵二兩 細辛二兩 橘皮二兩

茯苓二兩 五味子二兩 芍藥二兩 地膚子二兩

牡丹二兩 海藻二兩洗 狐陰一具炙

右十五味下篩蜜和服十丸如梧子大稍加至二十丸忌胡荽生葱生菜酢物出第二十五卷中

備急療癩方

以桃人擣薄之亦療婦人陰腫乾即易集驗同出第五卷中

古今録驗療癩蒺蔾丸方

蒺蔾子　乾地黃各十分　鹿茸炙十分　白斂八分

磁石十分研　礬石十分鍊　鐵精　桂心

續斷各五分　巴戟天　芍藥　玄參

通草　升麻　牛膝　寄生各八分

澤瀉七分　射干八分　蓯蓉十分　海藻八分如髮者

右二十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大飲下十丸日二漸增至二三十丸忌生葱蕪荑生血等物甄立言處出第四十一卷中

卒病癩方五首

肘後療超躍舉重卒得陰㿗方

白朮五分　地膚子十分　桂心一分

右三味擣末以飲服一刀圭日三忌生葱桃李雀肉等物古
今録驗同
又方　狐陰一具炙　海藻　牡丹各三分　桂心二分
右四味擣篩爲散蜜和爲丸如梧子大小兒服五丸大人增
之忌胡荽生葱
集驗灸卒癲法
以蒲横度口折之一倍增之以布著小腹大横理令
度中央上當齊勿使偏僻灸度頭及中央合三處隨年
壯好自養勿舉重大語怒言大笑呼喚千金范汪同
又法
牽陰頭正上行灸莖頭所極又牽下向穀道又灸所
極又牽向左右髀直下行灸所極皆使正直勿偏四
處灶隨年壯佳千金范汪同
又法
灸足厥陰左右各三壯穴在足大指間是也千金范汪

同並出第九卷中

癩卯偏大方三首

千金療癩疝卯偏氣上方

牡丹　防風各一分

右二味擣爲散溫酒服方寸匕日二忌胡荽出第二十五卷中

張文仲小品牡丹散療癩偏大氣脹方

牡丹　桂心　防風　鐵精　豉熬各等分

右五味擣篩酒和方寸匕服之小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁和大豆與之大效忌生葱胡荽肘後同出第七卷中

古今錄驗牡丹五等散療癩疝陰卵偏大有氣上下脹大行走腫大服此良驗方

牡丹皮　防風　黃蘗炙　桂心各一分

桃人一分去皮尖研

右五味擣篩爲散以酒服一刀圭二十日愈少小癩疝最良小兒以乳汁和如一大豆與之長宿人服方寸匕忌生葱胡荽第四十一卷中

灸諸癩法一十四首

千金論曰男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩鍼灸易差

又卵偏大上入腹法

灸三陰交在内踝上八寸隨年壯

又男陰卵偏大癩法

灸肩井解臂接處隨年壯男癩灸手小指端七壯病在左者可灸左在右者灸右良効差止

又法

灸關元百壯

又法

灸玉泉百壯報之穴在臍下四寸

又法　灸泉陰百壯三報之在横骨邊三寸

又㿗病陰卒腫者法

令並足合兩拇指爪相並以一艾丸灸兩爪端方角處

一丸令頓上兩爪角也令丸半上爪上七壯

又兩丸縮入腹法

灸三陰交隨年壯神効

又男陰卵大㿗病法

灸足太陽五十壯三報之

又法　灸足太陰五十壯穴在内踝上一夫

又法　灸大拇指内側去端一寸白肉際隨年壯甚驗雙灸之

又法　灸横骨兩邊二七壯夾莖是也

又法　灸足大指理中十壯隨邊腫灸之

灸小兒㿗法

先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊㿗故灸汝三七二十一灸訖便牽小兒令雀頭下向著囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷帽簪頭大耳

又法　凡男㿗當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯即愈並出第二十五卷中

陰腫方六首

病源此由風熱客於腎經腎經流於陰腎不能宣散故致腫也出第四卷中

集驗療男子陰腫大如斗核痛人所不能療者方

以雄黃一兩研碎綿裹甘草一尺生用切水一斗煑取二升以洗之忌海藻菘菜千金有礬石二兩文仲用礬石

又方　取莧菜根擣薄之范汪千金同

又方　取蔓菁根擣薄之范汪同

又方　擣馬鞭草薄之范汪同並出第九卷中

文仲療陰腫方

取桃人去皮尖熬末酒服彈丸許不過三服即差千金備急同出第七卷中

古今録驗療腫大如斗方

取雞翅燒灰飲服其毛一孔生兩毛者佳腫在左取左翅在右取右翅雙腫取兩邊翅出第四十一卷中千金治小兒外腫

陰疝腫縮方一首

病源疝者氣痛也衆筋會於陰器邪客於厥陰少陽之經與冷氣相搏則陰痛而攣縮也出第四卷中

文仲療陰卒縮入腹急痛欲死名陰疝方

狼毒四兩炙　防葵一兩　附子二兩炮

右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三夜二忌猪肉冷水

古今錄驗范汪同出第七卷中（肘後用防風不用防葵）

陰卒腫痛方三首

文仲葛氏療男子陰卒腫痛方

灸足大指第二節下橫理文正中央五壯姚云足大指本三炷出第七卷中（亦治小兒陰疝發時腫痛隨痛左右灸之）

備急療男子陰卒腫痛方

雞翮（六枚燒）　蛇床（等分）

右二味爲末以飲服少許隨卵左右取雞羽集驗同（姚方無蛇床）

又若有息肉突出方

以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗一日夜三四度差肘後同出第五卷中

陰囊腫痛方五首

千金有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜即痛悶不得眠睡方

取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消爲効乃止

又方
煑大薊根汁服一升日三不過三劑愈

又方
醋和䴬炙令熱熨之

又方
以醋和䴬塗之

又方
釜月下土以雞子白和傅之効肘後同並出第二十五卷中

陰下痒濕方七首

病源大虛勞損腎氣不足故陰汗陰冷液自泄風邪乘之則搔痒也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法去卧令兩手布膝頭取踵置尻下以口內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裏痛膝冷不隨出第四卷中文

仲療陰痒生瘡方

嚼胡麻塗之驗肘後千金同

葛氏療陰囊下濕痒皮剝方

烏梅十四枚 錢四十文 鹽三指撮

右三味以苦酒一升於銅器中浸九日洗之効肘後同

又方

煮槐皮若苦參黃蘗及香薷汁洗之並良肘後同

出第七卷中

救急療陰下濕痒成瘡方

猪蹄兩脚 槐奇裹白皮一升切

右二味㪷酌以水煮洗瘡一日五六遍永差

又方

煮桃皮和黍米汁洗之並出第五卷中

古今錄驗療陰下痒濕湯洗方

甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈

又療陰下濕痒生瘡方

吴茱萸一升水三升煑取三五沸去滓以洗瘡諸瘡亦治之出第四十一卷中

陰痛方三首

病源腎氣虛損爲風邪所侵邪氣流入於腎經與陰氣相擊眞邪交爭故令陰痛但冷者唯痛挾熱者則腫其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩足指向下柱席兩涌泉相拓坐兩足跟頭兩膝頭外扒手亙前向下盡勢七通去勞損陰膝冷出第四卷中

集驗療卒陰痛如刺汗出如雨方

小蒜一斤　韭根一斤　楊柳根一斤

右三味合燒以酒灌之及熱氣熏之即愈千金同出第九卷中

千金療陰腫痛方

灸大敦三壯

又方　車前子末酒服之佳出第二十五卷中

陰瘡方七首

病源腎榮於陰腎氣虛不能制津液則汗濕虛則為風邪所乘邪客腠理而正氣不泄邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡出第四卷中

千金療陰下生瘡洗湯方

地榆　黄蘗各八兩

右二味切以水一斗煑取六升去滓適寒温洗瘡日再

只以黄蘗湯洗亦効

又凡妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門内並似甘瘡作畔𧏮食之大痛甘即不痛方

用銀釵以綿裹用臘月猪脂熏黄火上煖以釵烙瘡上令熟取乾槐枝熱塗之以麝香黄礬青礬

末傅之小便後即傅之不過三兩度差但用甘㴋
方中藥傅之即差出第二十五卷中

葛氏療男子陰瘡方

爛煑黃蘗洗之又用白蜜塗之

又方

黃連黃蘗各等分末之先煑肥猪肉湯洗之然
後以藥粉之

又方

以蜜煎甘草末塗之大良比見有人患塗頭腫坎
下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用前粉粉之又
依陶方即差神驗出第七卷中

必效療陰生瘡膿出作臼方

高昌白礬一兩

右一味擣細研之鍊猪脂一合於瓷器中和攪作膏取槐
白皮切作湯洗瘡上拭令乾即取膏傅上及以楸葉貼上

不過三兩度永差肘後有細麻人等分同研

古今録驗療陰瘡方

黄蘗　黄連各三分　胡粉一合

右三味擣爲末粉上日三婦人綿裹棗核大内之出第四十一卷中

陰邊粟瘡方五首

必効療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒方

以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以水二大升煑取一升洗之日三五遍適寒温用若涉遠恐衝風即以米粉和塗之神効

又療陰瘡有二種一者作臼膿出名曰陰蝕瘡二者但赤作瘡名爲熱瘡若是熱瘡用此方

取黄蘗黄芩各一兩切作湯洗之用黄連黄蘗

末粉云神良

又方

以黃連和胡粉末傅之必効

又方

紫笋茶末一分　荷葉一片燒灰

右二味爲末以鹽漿水洗訖傅之三五度即愈

又方

取停水處乾卷地皮末傅之神効是長安郭承

恩用之得効出第四卷中

著硇砂方四首

救急避逅著硇砂損陰方

猪蹄一具擘破　浮萍草三兩

右二味以水三大升煮取半升去滓以瓶子盛汁内陰瓶中

漬之冷即出拭乾便傅後藥粉之

又粉法

薔薇根皮　黃蘗各三分　朴消　蛇床子各一分

甘草 二分炙

右五味擣爲散用前法浸洗後以粉瘡上亦不甚痛愼

風出第八卷中

必効主著硇砂方

取雞子一枚煑熟剥取肉更用生雞子二箇傾取白

和熟研令細以帛裹之立定李饒州云奇効

又方

甘草 黄蘗 白礬 燒令汁盡

右三味爲末傅之瘡上並出第四卷中

九蟲方一首

病源夫九蟲者一曰伏蟲長四寸二曰蛔蟲長一尺三曰白蟲

長一寸四曰肉蟲狀爛杏五曰肺蟲狀如蠶形六曰胃蟲狀如蝦

蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蟯蟲至細

微形如菜蟲伏蟲群蟲之主也蛔蟲貫心則殺人白蟲相生子

孫轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蟯蟲居胴（徒棟切大腸也）腸多則爲痔劇則爲癩因人瘡處以生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不爲人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無者此諸蟲依腸胃之間若腑藏氣實則不爲害若虛則能侵蝕隨其蟲之動而變成諸患也出第十八卷中（集驗同）

集驗貫衆丸主療九蟲動作諸病方

貫衆（熬）　石蠶（熬五分）　狼牙（四分）　雚蘆（二分作藜蘆）

蜀漆（六分）　殭蠶（三分熬）　雷丸（六分）　蕪荑（四分）

厚朴（三分）　檳榔（六分）

右十味擣篩蜜和爲丸空心煖漿水服三十丸日三不知稍稍加之白蟲用榧子湯服備急文仲古今錄驗范汪同出第九

卷中

五藏蟲方七首

删繁療脾勞有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔而胷中駭駭一作𢄙𢄙嘔而不出前胡湯方

前胡三兩　白术三兩　赤茯苓三兩　枳實二兩炙

細辛三兩　旋復花一兩　常山三兩　松蘿二兩

龍膽三兩　竹葉一升切　杏人三兩去尖皮

右十一味切以水一斗煑取三升去滓分三服若腹中熱滿下芒消三兩梔子三兩黄芩三兩苦參二兩加水二升依方煎忌桃李雀肉大酢生葱生菜等

又療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔茱萸根下蟲湯方

茱萸東引根大者一尺切　大麻子八升　橘皮二兩切

右三味切擣麻子爛並和煎服或下黄汁凡合藥禁聲勿語道

作藥蟲當聞便不下切須忌之甚驗以水煎服臨時量之効

又療肺勞熱損主肺蟲形如蠶在肺為病令人欬逆氣喘或謂憂恚氣膈實熱皆從勞之所生名曰膏肓鍼灸不著麥門冬五膈下氣丸方

麥門冬十兩去心　蜀椒四分汗　遠志皮　附子炮各六分

乾薑五分　甘草十分炙　人參七分　細辛六分

桂心五兩　百部根　白朮　黃耆各五分

杏人四十枚去皮尖雙人者熬　檳榔五分

右十四味擣篩蜜丸如彈子許含一丸稍稍嚥汁忌豬肉冷水海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉等

千金療腎熱四肢腫急蟯蟲如菜中蟲生腎中為病方

貫衆大者三枚熬　乾漆二兩熬　茱萸六分一云五十枚　杏人四十枚去皮尖熬

蕪荑　胡粉　槐白皮各四分

右七味擣散平旦以井花水服方寸匕增之以差止

又肺勞熱生蟲在肺爲病方

東行桑根白皮切一升　東行茱萸根切五兩　狼牙三兩

右三味切以酒七升煮取一升半平旦服盡

又療肝勞生長蟲在肝爲病令人恐畏不安眼中赤方

雞子五枚去黃　東行茱萸根切三升　臘三兩

乾漆四兩熬　粳米粉半升

右五味擣茱萸皮漆爲末和藥銅器中打雞子調火鍊可丸如小豆宿勿食且以飲服一百二十丸小兒五十丸蟲即爛出差

又療心勞熱傷心有長蟲名蠱長一尺貫心爲病方

雷丸熬　橘皮　桃人各五分去皮尖　狼牙六分

貫衆三枚　蕪荑　青葙子　乾漆熬各四分

亂髮如雞子燒　殭蠶二七枚熬

右十味擣篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服之並出第十八卷中

長蟲方二首

集驗療長蟲雞子丸方

雞子白三枚 乾漆四兩熬一本無 臘三兩 粳米粉半斤

右四味內銅器中於微火上煎攪令調內粉令凝可丸下置土上寸溫乃內雞子攪令相得又煎令可丸宿勿食以飲下小豆許大一百二十丸小兒五十丸效驗

又方

取楝實以淳苦酒中漬再宿以綿裹內下部中令入三寸許一日易之千金范汪同並第九卷中

蛔蟲方九首

病源蛔蟲者是九蟲之一也長一尺亦有長五六寸或因腑藏虛弱而動或因食甘肥而動其發動則腹中痛發作種聚行來

上下痛有休息亦攻心痛口中喜涎及吐清水貫傷心者則死診其脉腹中痛其脉法當沈弱弦今反洪而大則蛔蟲也出第十八卷中

廣濟療蛔蟲方

酸石榴根東引入土五寸者切二升　檳榔十枚碎

右二味以水七升煮取二升半絞去滓著少米煮稀粥平旦空肚食之少間蟲並死快利効無忌出第四卷中

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方

取龍膽根多少任用以水煮濃汁去滓宿不食平旦服一二升不過再服下蛔蟲也

又方

取有子楝木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食旦取肥香脯一斤先喫令蟲聞香舉頭稍從一口爲度始少進自後食一匕食半升糜便下蛔秘

不傳千金文仲同

又方　以雞子一枚開頭去黄以好漆少許内中相和仰頭吞之蟲悉出矣文仲集驗備急千金同出第二卷中

集驗蛔蟲攻心腹痛方

取薏苡根二斤剉以水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出千金范汪同出第九卷中

千金療蚘蟲方

雚蘆下篩以餅臛和服方寸匕蟲不覺出之亦主蟯蟲出第十八卷中（肘後云雚蘆一兩末以羊肉作臛和服）

崔氏療蚘蟲方

取繅蠶蛹汁空腹飲之良若非繅絲時即須收蛹暴乾患者擣篩取意斟酌多少和粥飲服之

又方　波斯鶴虱（三兩）

右一味擣散以肥猪羊肉但得一色以葱豉爲臛汁每旦空服以臛汁和一方寸匕頓服稍多飲臛汁佳若不能散服即以蜜和爲丸如梧子一服十丸還以此臛汁下之候令明旦服令日未欲即勿食明旦服藥訖還至巳時爲佳要服此丸散使盡巳後三十日勿雜食永差出第五卷中

必効療蛔蟲方

菉豆三升煑取濃汁麻子一大升研取汁一升以下然後取彊半升和豆汁一升更煖令溫溫正發即炙羊肉脯令熟先含嚥汁三五嚥即服之須臾即吐出或利其蟲已消如帛練帶三二百條如未盡更服即永絶郭叅軍云頻試無不差者一方服麻子汁効出第六卷中

寸白蟲方一十九首

病源寸白者亦九蟲之一也長一寸而色白形小褊因藏腑虛弱而能發動或云飲白酒以桑枝貫牛肉炙食之并生栗所成又食生魚後即飲乳酪亦令生之其發動則損人精氣腰脚疼弱又云此蟲生長一尺則殺人出第十八卷中

廣濟療白蟲如馬藺葉大於下部出不盡以刀截斷者令人漸漸羸瘦石榴湯方

醋石榴根（東引者一大握） 蕪荑（三兩） 牽牛子（半兩熬末）

右三味以水六升煮取二升去滓分三服別和牽牛子末每服如人行五里更服盡快利蟲亦盡死出忌生冷豬魚牛肉白酒葵笋等此方神驗

又方

狼牙 白斂（各四分） 蕪荑（六分）

右三味擣散空肚以大醋和如膏溫頓服之亦不利無所忌

千金同並出第四卷中

肘後療白蟲方

淳漆三合　猪血三合

右二味相和微火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先喫肥香脯一片服如大豆許一百丸日中蟲悉出亦主蚘蟲范汪同

又方

濃煮猪肉汁煎檳榔三十枚取三升服之蟲盡出文仲備急同

又方

熟煮猪脂血宿勿食明旦飽食之蟲當下文仲備急同出第二卷中

范汪療白蟲橘皮丸方

橘皮四分　牙子　蕪荑各六分

右三味擣篩蜜丸如梧子以漿水下三十丸先食日再服

又方

狼牙五兩

右一味擣篩蜜丸如麻子大宿不食明旦空腹以漿水下一合

服盡差

又方　橘實破其上取皮中子擣合蜜丸如梧子宿不食旦以醋漿水若米汁下三百丸然食蟲並死下或以糜爛皮亦可丸服八十九丸忌如常法出第十九卷中

備急療白蟲蕪荑散方

狼牙三分炙　蕪荑二分

右二味擣爲末酒和服之先食脯後頓服盡立差張文仲同出第六卷中

救急療白蟲方

石榴枝東引者一握去蒼皮　檳榔七枚碎

右二味以水二大升煮取強半頓服欲服時先嚼鹿脯嚥汁即進之法月一二三日喫藥必差以蟲頭向上月三以後服藥不効爲其蟲頭向下也今日欲服預前一日莫食其蟲喫藥之後或利

出或內消皆差忌食生鱠白酒諸生肉冷物一月餘日

又方

取榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不能者但啖五十枚亦得經宿蟲消自下無忌崔氏同出第八卷中

崔氏療白蟲諸方不差方

取石榴東引根令患人以手大指與第三指滿握一握兩頭出者揔留之又取乾脯肥者如手大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煑取一升去滓分三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後飲藥并令人以手按所患人腹令藥易宣都服了有頃當日便蟲出服藥以月一至五日以前是蟲頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈

又方

東引茱萸根一大握切　麻子半大升

右二味先擣麻子極碎又盆中熟研以水一大升更和研絞取濃

汁以浸茱萸根一宿明旦煑兩三沸頓服如不頓服分再服至如明旦欲服藥今日午後便不得食仍須先嚼一片肥乾脯嚥汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後一月日勿食脂膩魚肉必効不用脯餘同出第五卷中

千金療白蟲方

取榧子四十九枚去皮以月上旬旦空腹服七枚七日服盡蟲消成水永差

又方

取茱萸北陰根洗去土切以酒一升漬一宿平旦去滓分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若指以上大者皆不佳用之無力范汪同

又方

熬錫令速燥末平旦作羊肉臛以藥方寸匕内汁中服之一方熬胡粉

又方

桑白皮切三升以水七升煑取二升宿不食明旦頓服之

又方　用石榴根如茱萸根法

又方　胡麻一升　胡粉一兩

右二味擣末明旦空腹以豬肉臛汁服盡即差並出第十八卷中

蟯蟲方六首

病源蟯蟲是九蟲之一也形甚小如今之蝸蟲狀亦因腑藏虛弱而致發動甚者則能成痔瘻疥癬癩癰疽瘑諸瘡蟯蟲此是人體虛極重者故蟯蟲因之動作無所不爲也出第十八卷中

范汪療蟯蟲芫花散方

芫花　狼牙　雷丸　桃人去尖皮熬各三分

右四味擣散宿勿食平旦以飲服方寸匕當下蟲也

又巴豆白膏療蟯蟲方

巴豆一枚燒令煙斷去心皮　桃人四枚熬令黑去皮

右二味合擣作三丸大人清旦未食以漿水服盡少小服一丸若

不下明旦更復作服並出第十九卷中

千金療蟯蟲在胃中漸漸羸人方

淳酒　白蜜　好漆各一升

右三味合銅器中微火上煎之令可丸丸如桃核大一枚宿勿食空腹溫酒下蟲不下再服之肘後備急集驗范汪同出第十八卷中

備急葛氏療蟯蟲攻心如刺吐清汁方

擣生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令蟲聞香後飲汁一升當下蟯蟲備急文仲並同肘後云療蚘蟲

陶氏療之方

取七月七日蒺蔾子陰乾燒作灰先食服方寸匕一服三日止范汪千金同

又方

以好鹽末二兩淳酒半升於銅器中煮令數沸宿勿食清旦沸空肚頓服之備急文仲千金范汪等同

並出第七卷中

三蟲方七首

病源三蟲者長蟲赤蟲蟯蟲爲三蟲也猶是九蟲之數也長蟲者蚘蟲也長一尺動則吐清水出則心痛貫心則死赤蟲狀如生肉動則腸鳴蟯蟲細微形如菜蟲也居胴腸之間多則爲痔劇則爲癩因人瘡處即生諸癰疽癬瘻瘑疥齲蟲無所不爲此既是九蟲內之三者而令別立名者當以其三種偏發動成病故謂三蟲也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩手著頭相叉長引氣即吐之坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中痛低頭入兩膝閒兩手交叉頭上十二通愈三蟲又云叩齒二七過輒咽氣二七如是三百通乃止爲之二十日邪氣悉去六十日小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去面體光澤出

第十八卷中

肘後療三蟲方

茱萸根取東引指大者長一尺　栝樓四兩切

右二味細剉茱萸根以酒一升漬之一宿旦絞去滓宿勿食旦空腹先喫脯然後頓服之小兒分再三服亦療寸白蟲

又方

擣桃葉絞取汁飲一升千金集驗同一方云平旦飲三合

又方

眞珠一兩研　亂髮如雞子大燒末

右二味內苦酒中旦空腹頓服之令盡集驗范汪同千金治蟯蟲

又三蟲者謂長蟲赤蟲蟯蟲也乃有九種而蟯蟲及寸白人多病之寸白從食牛肉飲白酒所成相連一尺則殺人服藥下之須結裹潰然出盡乃佳若斷者相生未已更宜速除之蟯蟲多是小兒患之大人亦有其病令人心痛清朝口吐汁煩躁則是也其餘各種種不利人人胃中無不有者宜服九蟲丸以除之

范汪療三蟲白斂丸方

白歛　　狼牙　　雚蘆　　桃花

貫衆各三分　橘皮二分　蕪荑一分

右七味擣篩蜜丸如小豆大宿勿食旦以漿水服一劑日中乃食立下男子病大腹面黃欲食肉服此藥下赤蟲如筭莖者一尺所有頭目百餘枚病愈又九江謝丘病脅下有積大如杯少腹亦堅伏痛上下移嘔逆喜唾心下常痛欲食肉服此藥下蟲無頭足赤身有口尾二百餘枚得愈又九江陳昉病大腹煩滿常欲食生菜服此藥下白蟲大如臂小者百餘枚立差妊身婦人不得服之

又療三蟲竹節丸方

燒竹節　雷丸各三分　錫屑二分　橘皮一分半

右四味擣下篩蜜丸如梧子大一服八丸日三服三日斷口也

又療三蟲芎藭散方

芎藭　雷丸　桔梗　白芷各四分

右四味擣散以蜜飲若酒或米汁服方寸匕日三服又可用蜜丸如梧子吞十三丸當稍稍下不見盡服一劑

出第十九卷中

備急療三蟲方

藋蘆四兩炙　乾漆二兩熬　吴茱萸四兩

右三味爲末依前先嚼脯以粥清服方寸匕日一服秘要法

肘後范汪同

雜療蟲方三首

廣濟療蛔蟲寸白蟲方

檳榔人十二分　當歸　鶴蝨　蕪荑熬

橘皮各六分　貫衆　雷丸各四分

右七味擣散空腹煑大棗湯服方寸匕日二服漸加至三匕微

利無忌出第四卷中

千金療蟯蟲蛔蟲及痔䘌食下部生瘡桃湯方

桃皮一兩　槐子三兩　艾葉一兩　大棗三十枚擘

右四味以水三升煮取半升空腹頓服之出第十八卷中

又療寸白蟲爲水瀉出永除方

榧子　檳榔　蕪荑等分

右三味爲散溫酒服二錢匕先燒牛肉脯喫後服藥也

外臺秘要方卷第二十六

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔　校勘

外臺祕要方

二十七

淋　大小便難病

外臺秘要方卷第二十七 淋并大小便難病二十七門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

許仁則小便數多方四首

尿牀方六首

灸穴雜法一十二首

諸淋方三十五首

病源諸淋者由腎虛而膀胱熱故也膀胱與腎爲表裏俱主水水入小腸下於胞行於陰爲溲便也腎氣通於陰陰津液下流之道也若飲食不節喜怒不時虛實不調則腑藏不和致腎氣虛而膀胱熱也膀胱津液之腑熱則津液內溢而流於睪水道不通水不上不下停積於胞腎虛則小便數膀胱熱則水下澁數而且澁則淋瀝不宣故謂之淋其狀小便出少起數少腹弦急痛引於臍又有石淋勞淋血淋氣淋膏淋諸淋形證各隨名具說於後章而以一方療之者故謂諸淋也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃卧令兩足布膝

頭斜蹥罯鴂口內氣振腹鼻出氣去淋數小便又去石淋莖中痛又云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝內入至足趺上急手握足五指極力一通令內曲以利胥髖療淋也出第十四卷中

廣濟療患淋來積年比醫療不能得損或十日五日一發即有可時今年因病更頻數今二十日來不定方

滑石 冬葵子各八分 瞿麥 石韋各五分去毛

蒲黃六分 陳橘皮四分 芍藥 茯苓

芒消各六分 子芩六分

右十味擣篩爲散空腹煮後飲子服方寸匕日二服漸加至一匕半不利忌熱麪炙肉醋蒜等

又飲子方

桑白皮六分 通草 百合各八分 白茅根十分新者

右四味細剉以水四升煮取二升去滓溫下散藥口乾渴含

之亦得也

又療淋小便不通來六七日方

滑石五兩　通草三兩　瞿麥二兩　冬葵子一兩

茅根一升　石韋三兩去毛　芒消二兩

右七味切以水九升煑取二升八合去滓內芒消分溫三服每服如人行六七里進一服以微利為度忌諸熱食物並出第四卷中

范汪療淋方

取蘩蔞草滿兩手把以水煑服之可常作飲勿不飲也

又方

煑菟絲子服之如蘩蔞法

又方

又方

露蜂房燒飲服之取如椀大者妙

又方

雞子二枚去白黃以鹽内殼中使滿以三升水漬一升豉絞取汁其殼中鹽投汁中攪令調盡服之

又方

滑石 海蛤 雞子殼各等分

右三味擣篩爲散以飲服半錢匕日三服漸加至一錢匕甚良

又方

取地麥草一名地膚草二七把以水二升煎之亦可長服一法旦漬豉汁飲之良

又療淋利小便葵子散方

葵子半升 滑石二兩 石南葉一兩 地榆三兩

石韋一兩去毛 通草一兩

右六味擣篩爲散飲服方寸匕日三服良

又療淋莖中有石方

取雞屎白半升暴乾熬之令香擣篩爲散以酪（一云酢）漿飲方寸匕日三服到一二日當下石便當於器中尿石下爲驗

又療淋師所不能療者神方

取葛上亭長生折斷腹腹中有白子如小米長二三分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小盃中水如棗許内藥盞中半食頃以爪甲研當令扁扁見於水中仰頭令人寫入咽喉中勿令近牙近則著牙齒間不盡得入咽之也藥雖微小下喉自當覺至下焦淋所有頃藥作大煩急不可堪者飲麥乾飯汁

藥勢止也若無麥乾飯汁但水亦可耳老小服三分一耳藥當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黃男女服之皆水道去并療婦人產生後餘疾積聚或成帶下服之皆愈此蟲正月二月爲芫青三月爲王不留行四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑猫九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不攻淋不下以意節度更增服之並出第六十五卷中

小品地膚湯療下焦諸結熱小便赤黃數起出少大痛或便血者溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及步行冒熱冷飲逐熱熱結下焦及散石熱動關格少腹堅胞脹如斗大諸淋服之即通方

地膚草三兩 知母 猪苓去皮 瞿麥

黄芩　升麻　通草各二兩　海藻一兩

葵子一升　枳實二兩炙

右十味切以水九升煑取三升分三服大小行皆閉者加大黄三兩婦人房勞腎中有熱小便難不利腹滿痛脉沈細者加猪腎一具千金同崔氏云若加腎加水一斗半煑取一斗内藥煎

又療淋榆皮湯方

榆皮半斤　滑石二兩一方一兩　黄芩一兩一方二兩　甘草炙

瞿麥各二兩　葵子一升

右六味切以水一斗煑取三升温服一升且服忌海藻菘菜

並出第四卷中

集驗療淋方

以比輪錢三百文以水一斗煑取三升飲之千金不傳神効肘後同千金治氣淋

又方

取牛耳中毛燒灰服半錢匕立愈文仲必效同

又方

燒頭髪灰服之良並出第五卷中文仲同

千金療淋痛方

滑石四兩　貝子三十枚燒　茯苓　白术

通草　芍藥各二兩

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日二服大良忌酢桃李雀肉等

又方

葵子五合　茯苓　白术　當歸各二兩

右四味切以水七升煮取三升分三服忌雀肉桃李酢物等

范汪同

又方

栝樓　滑石　石韋去毛各二兩

右三味爲散以大麥粥飲服方寸匕日三服良

又方

宿葵根八兩　大麻根五兩　甘草一兩炙　石首魚頭石三兩

通草二兩　茅根三斤　貝子五合燒

右七味切以水一斗二升煑取五升分爲五服日三夜二服

亦主石淋忌海藻菘菜神良

又方

取細白沙三升一味熬令極熱以酒三升淋取汁一

合服之一云一頓服

又方

榆皮一斤　車前子一升　冬瓜子一升　鯉魚齒

桃膠　地麥草　通草各二兩　瞿麥四兩

右八味切以水一斗煑取三升分三服日三服

又療卒淋方

灸外踝尖七壯

又方

取石首魚頭石末水服方寸匕日三服

又方

鯉魚齒燒灰末酒服方寸匕日三服並出第二十一卷中

崔氏療淋散方

石韋洗刮去毛 大蟲魄研一兩 滑石一兩半 當歸

芍藥 黃芩 冬葵子 瞿麥各一兩

亂髮三團如雞子大燒灰 茯苓一兩半

右十味擣篩爲散服方寸匕日二服忌酒麪炙肉油膩蒜鱠

酢及熱物等出第四卷中

古今録驗療淋瞿麥散方主簿甄權處

瞿麥　石韋去毛　滑石　車前子

葵子各四兩

右五味擣篩冷水服方寸匕日三服增至三匕忌酒麪愼生冷物也

又方

取生續斷絞汁一升服之

又療淋滑石湯方

滑石二兩　榆白皮二兩　石韋一兩去毛　地麥草二兩

葵子二兩

右五味切以水一斗煑取四升分四服日再服甚良

又療淋榆皮湯方

瞿麥二兩　防葵一兩　榆白皮一兩　葵子一升

滑石二兩一方四兩　甘草二兩一方一兩炙　黃芩一兩一方二兩

右七味切以水一斗煮取三升分二服忌海藻菘菜

又方

取附舡底苔大如鴨子以甌半水煎取一甌頓服日三服並出第二十六卷中千金治氣淋

近効療淋方

葵子一升

右一味以水三升煮取二升去滓分溫再服相去如人行十里無所忌煎茅根飲之亦佳

又方

人參六分　厚朴三分炙　粟米二合

右三味切以水三升煮取七八合以新布絞去滓分溫三服

服別相去如人行七八里久忌食生冷等物

又方

茯苓 地骨皮各三兩 甘草炙 黃芩

前胡 生薑各二兩 麥門冬八兩去心 竹葉切一升

蒲黃二兩

右九味切以水九升煑取二升六合去滓分爲三服服別相去如人行七八里久忌熱麪油膩海藻菘菜酢物等

五淋方三首

集驗論五淋者石淋氣淋膏淋勞淋熱淋也石淋之爲病小便莖中痛尿不得卒出時自出痛引少腹膀胱裏急氣淋之爲病小便難常有餘瀝膏淋之爲病尿似膏自出少腹膀胱裏急勞淋之爲病倦即發痛引氣衝小便不利熱淋之爲病熱即發其尿血後如豆汁狀畜作有時五淋各異療方用雜故不載也

並出第五卷中

范汪療五淋方

䗪蟲五分熬一作䖟蟲　斑猫二分去翅足熬　地膽二分去足熬　猪苓三分

右四味擣篩爲散每服四分匕日進三服夜一服但少腹有熱者去猪苓服藥二日後以器盛小便當有所下肉淋者下碎肉血淋者下如豚短繩若如肉膿氣淋者下如羹上肥石淋下石或下砂劇者十日即愈禁食羹猪肉生魚葱鹽醋以小麥汁服之良

又療五淋神良延命散方

滑石　礜石燒半日　石膏　車前子

露蜂房炙并白子用之　貝子擣著苦酒中二三宿取細者用之　柏子人

魚齒擣令熟　雞矢白　白雞肶胵裏黃皮熬

苦瓠中穰并子熬　特牛陰頭毛燒　芒消熬令盡各一分

婦人陰上毛二分一本無燒

右十四味擣篩爲散每服半錢匕加至一錢匕日三夜一服以葵子飲下之三日愈甚者不過六七日愈小便以器盛之當見石及諸物也並出第十五卷中

必効療五淋方

白茅根四斤剉之以水一斗五升煑取五升去滓分三四服肘後千金同出第三卷中

石淋方一十六首

病源石淋者淋而出石也腎主水水結則化爲石故腎客砂石腎虛爲熱所乘熱則成淋其病之狀小便則莖裏痛溺不能卒出痛引少腹膀胱裏急砂石從小便道出甚者塞痛令悶絕出

第十四卷中

范汪療石淋方

鼈甲燒灰擣篩爲散酒服方寸匕頻服數劑當去
石也肘後同
又方
取人家籬牆上連蔓葎闊掘出見其根挽斷以柸
於坎中承其汁服之一升石自當出若不出更服一升
又方
取車前子二升用絹囊盛之以水八升煑取三升去
滓頓服之移日又服石當下也宿不得食飲之神良
肘後千金同
又方
柏子人　芥子　滑石各等分
右三味擣篩爲散以麥汁飲服方寸匕日三服巳効
又方

牛角燒灰服方寸匕日五六服任意飲酒

又方

瞿麥子擣爲末酒服方寸匕日三服到二日當下石

又香薷擣作屑以酢漿飲服方寸匕日三至二三日當下石小便於器中並出第十五卷中

小品療石淋方

浮石取滿一手擣爲末以水三升苦酒一升煑取二升澄清溫服一升不過再三服石即便出古今錄驗千金崔氏同出第四卷中

集驗療石淋方

鯉魚齒一升貝齒一升擣篩以三歲苦酒和分爲三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分古今錄驗范汪同

文仲石淋方

桃膠如棗大夏月著三合冷水中冬天以湯三合和之一服日三當下石石盡即止千金古今錄驗同

又方

濃煮車前草汁飲之良也古今錄驗同出第四卷中

古今錄驗療石淋及諸淋方

石首魚頭石十四枚　當歸等分

右二味擣篩爲散以水二升煮取一升頓服立愈單用魚頭石亦佳

又石淋石韋散方

石韋去毛　滑石各三分

右二味擣篩爲散用米汁若蜜服一刀圭日二服范汪同

又方

取生葎葉擣絞取汁三升爲三服無苦毒石自出范汪同

又滑石散療石淋莖中疼痛瀝瀝晝夜百餘行內出石溺血方

滑石二十分　石韋去毛　當歸　通草

地膽去足熬　鍾乳研各二分　車前子三分　瞿麥

蛇床子二分　細辛　蜂房炙各一分

右十一味爲散以葵汁麥粥服方寸匕日三忌生葱生菜

又療石淋瀝瀝莖中痛晝夜百行或血出延命散方

滑石　牛角鰓燒灰　芒消各二兩　瞿麥三兩

車前子　露蜂房炙　貝子燒　柏子人

魚齒炙　雞矢白　苦瓠子燒　牛陰頭毛各一兩

婦人陰上毛二分一本無

右十三味擣篩爲散以葵汁服方寸匕日三服

又療石淋方

取雞子陳者一枚用淳苦酒一升以雞子合苦酒置器中以油紙三四重密封頭不令水得入沈井中一宿平旦取剥去皮呑其黃石消去也並出第二十六卷中

血淋方五首

病源血淋者是熱淋之甚者則尿血謂之血淋心主血血之行身通遍經絡循環腑藏勞熱甚者則散失其常經溢滲入胞而成血淋也出第十四卷中

廣濟療血淋不絕雞蘇飲子方

雞蘇一握 竹葉一握切 石膏八分碎 生地黃一升切

蜀葵子四分末湯成下

右五味以水六升煮取二升去滓和葵子末分溫二服如人

行四五里久進一服不利忌蕪荑蒜熱麪炙肉等餘無所忌

古今錄驗范汪同

又療血淋小便磣痛方

雞蘇二兩 滑石五兩碎 生地黃半斤 小蘇根一兩

竹葉二兩 通草五兩 石膏五兩碎

右七味細剉以水九升煎取三升去滓分溫三服如人行四五里進一服不利忌蕪荑熱麪蒜陳臭物並出第四卷中

千金療血淋方

石韋去毛 當歸 芍藥 蒲黃各等分

右四味爲散酒服方寸匕日三服肘後文仲同出第二十一卷中

備急陶氏療淋下血二升者方

取紵麻根十枚以水五升煑取二升一服血止神驗肘

又方

後古今錄驗同

灸足大指前節上十壯良並出第六卷中

小便赤色如紅方三首

延年論曰療小便赤色如浅紅花汁此是憂愁驚恐心氣虚熱客邪氣與熱搏於心所以故小便赤心主南方火王在四月五月六月其色赤驚恐動於心心不受邪邪即傳於小腸滲入胞中所以小便赤此爲微邪其病猶輕令服丸子即得漸差心即是火火惡於淸淸即是水水能滅於火旣損心氣即不得食熱及冷水并勿憂愁如不愼恐小便色赤如血漸即難愈令處乾地黄丸補心神益脾氣散客熱自然調和小便色即自變如常第一不得憂愁在心并勿食熱食及冷水等方

乾地黄　黄耆各六分　防風　遠志皮

茯神　栝樓　子芩各四分　鹿茸炙三分

龍骨四分五色者　人參五分　滑石十二分　石韋湯漬一宿刮去皮

當歸各二分　芍藥　蒲黃　甘草炙

戎鹽各三分　車前子八分

右十八味擣篩爲末以蜜及棗膏各半相和煎令消散和藥爲丸如梧桐子大每食後少時以粥清下十九日二三稍加至十五二十丸以知爲度禁熱食及冷水海藻菘菜蕪荑酢

許孝璋處

又茅根飲子療胞絡中虛熱時小便如血色方

茅根一升　茯苓三兩　人參　乾地黃各二兩

右四味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服中間任食一日令盡忌大蒜蕪荑大酢五辛熱麪等物文仲處

文仲通草飲子主熱氣淋澁小便赤如紅花汁色方

通草三兩 葵子一升 滑石四兩碎 石韋二兩湯浸去毛

右四味切以水六升煎取二升去滓分溫三服每服如人行八九里進之忌食五辛熱麪炙肉出第十卷中

熱淋方三首

病源熱淋者三焦有熱氣搏於腎流入於胞而成淋也其狀小便赤澁亦有宿病淋今得熱而發者其熱甚則變尿血亦有小便後如豆羹汁狀者畜作有時也出第十四卷中

廣濟療熱淋小便澁痛方

車前草切一升 通草三兩切 葵根切一升 芒消六分湯成下

右四味以水七升煑取二升絞去滓內消分溫三服服別相去如人行六七里微利爲度忌熱食出第四卷中

古今録驗療淋小便數病膀胱中熱滑石散方

滑石二兩 栝樓三兩 石韋二分去毛

右三味擣篩爲散以大麥粥清服方寸匕日三並出第二十
六卷中

近効療熱淋日夜數十度喫藥不差方

空腹服井花水一二升必差韋特進鴻臚進用如神
効方喫水了後行六七百步甚良

勞淋方三首

病源勞淋者謂勞傷腎氣而生熱成淋也腎氣通於陰其狀
尿留莖内數起不出引少腹痛小便不利勞倦即發也出第十
四卷中

千金夫勞淋之爲病勞倦即發痛引

氣衝下方灸足太陰百壯在内踝上三寸三報之療

與氣淋同

又療五勞七傷八風十二痺以爲淋勞結爲血淋熱結爲肉淋

小便不通莖中痛及少腹急痛不可忍者方

滑石三分　王不留行　冬葵子　車前子

桂心　甘遂　通草各二分　石韋四分去毛

右八味擣篩爲散以麻子粥五合和服方寸匕日三服尿清差並出第二十一卷中

古今錄驗療石淋勞淋熱淋小便不利胞中滿急痛石韋散方

通草二兩　石韋三兩去毛　王不留行一兩　滑石二兩

甘草炙　當歸各二兩　白朮　瞿麥

芍藥　葵子各三兩

右十味擣篩爲散先食以麥粥清服方寸匕日三服忌海藻菘菜桃李雀肉等出第二十六卷中

氣淋方五首

病源氣淋者腎虛膀胱熱氣脹所爲也膀胱與腎爲表裏膀

胱熱熱氣流入胞熱則生實令胞内氣脹則少腹滿腎氣不能
制其小便故成淋其狀膀胱小便皆滿尿澁常有餘瀝是也亦
曰氣癃診其少陰脉數者男子則氣淋出第十四卷中
千金療氣淋方
灸關元五十壯
又方
夾玉泉相去一寸半灸三十壯
又方
水三升煑豉一升一沸去滓内鹽一合頓服之
又方
擣葵子末湯和服方寸匕
又方
空腹單茹蜀葵一滿口

膏淋方二首

病源膏淋者淋而有肥狀如膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也出第十四卷中

千金療膏淋方

擣葎草汁三升醋二合和空腹頓服當如大豆汁下

一名葛葎也

又膏淋之爲病尿似膏自出療之一如氣淋也並出第二十一卷中

許仁則淋方二首

許仁則療小便淋澁方此病有數種有石淋有熱淋有氣淋淋者氣擁塞小便不通遂成氣淋此病自須依前療氣水氣法石淋者緣先服石石氣不散擁遏生熱故成石淋熱淋者體氣生熱更緣食飲將息傷熱熱氣灼灼遂成熱淋更無餘候但苦

體氣熱小便澁出數酸洒宜依後瞿麥等六味湯蟲鬼等五味散三淋俱服之方

瞿麥穗三兩　冬葵子一升　榆白皮一升切　桑根皮六兩

白茅根一升切　石韋四兩去毛

右藥切以水一斗煑取三升去滓分温三服每服如人行十里久服三五劑後宜合蟲鬼五味散服佳

又方

蟲鬼六兩　石韋三兩去毛　瞿麥穗四兩　冬葵子一升

茯苓六兩

右藥擣篩爲散者煑桑根白皮作飲子初服一方寸匕日再服稍加至三匕吳昇同忌酢物出下卷中

大便難方六首

病源大便難者由五藏不調陰陽偏有冷熱虚實三焦不和則

冷熱并結故也胃爲水穀之海水穀之精化爲榮衛其糟粕行之於大腸以出也五藏三焦既不調和冷熱擁澁結在腸胃之間其腸胃本實而又爲冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令大便難所以爾者腎藏受邪虚而不能制小便則小便利津液枯燥腸胃乾澁故大便難又渇利之家大便亦難所以爾者爲津液枯竭致令腸胃乾燥診其左手寸口人迎以前脉手少陰經也脉沉爲陰陰實者病苦閉悶大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹右手關上脉陰實者脾實也病苦腸中怵怵（一作伏伏）如牢狀大便難脉緊而滑直大便亦難趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虚寒從下向上也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云偃卧直兩手捻左右脅除大便難腹痛腹中寒口內氣鼻出氣温氣咽之數十病愈出第十四卷中

肘後療脾胃不和常患大便堅強難方

大黃　芍藥　厚朴（炙各二兩）　枳實（六枚炙）

麻子（五合別研）

右五味擣篩入麻子蜜和爲丸如梧桐子大每服十丸日三服稍稍增之以通利爲度可常將之集驗備急古今錄驗同出第二卷中

千金療大便難方

灸承筋二穴三炷在腨中央陷中

又方

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁並單灌之立出范汪同

又練中丸主宿食不消大便難方

大黃（八兩）　葶藶（熬）　杏人（去皮尖熬）　芒消（各四兩）

右四味擣篩爲末鍊蜜爲丸如桐子大每服十九日三服稍加之並出第十五卷中

備急不得大便或十日一月方

葵子二升水四升煮取一升去滓一服不愈重作服良姚方出第六卷中古今錄驗文仲范汪同忌蒜灸肉

古今錄驗麻子人丸療大便難小便利而反不渴者脾約方

麻人二升別爲膏　枳實半斤炙　芍藥半斤　杏人一升去皮尖熬別爲脂

大黃一斤　厚朴一尺炙

右六味擣篩爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服飲下十丸漸增至三十丸日三服出第二十六卷中此本仲景傷寒論方

大便不通方一十七首

病源大便不通者猶三焦五藏不和冷熱之氣不調熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕痞結擁塞不通也其湯熨鍼石別

有正方補養宣導今附於後養生方導引法云龜行氣伏衣被中覆口鼻頭面正卧不息九通微鼻出氣療閉塞不通出第十四卷中

肘後療大便不通方

研麻子以米雜爲粥食之

又方

用礬石如指大者導下部並出第六卷中

千金療大便不通方

灸第七椎兩傍各一寸七壯

又方

桃皮三升水五升煑取一升頓服

又方

水一升煑羊蹄根一把取半升頓服

又方

煑麻子取汁飲之

又方

常服蜜煎五合

又方

猪脂和陳葵子末爲丸如梧桐子大每服飲下十丸通即止

又方

常服車前子及苗並通也

又方

擣葵根汁服之良

又方

葵子一升牛酥一升猪脂亦得以水三升煑葵子取

一升內穌煑一沸待冷分二服並出第十五卷中

必效療大便不通方

牛膠一條（廣二寸長四寸） 葱白（一握）

右二味用水三升和煑消盡去滓頓服之千金同

又方

瓜蔕七枚綿裹內下部如非時𤓰亦得並出第三卷中

崔氏療大便不通方（丈夫婦人同）

昌蒲末 石鹽末（各一兩）

右二味相和取半匕和烏麻脂少許綿裹內下部中即通

又方

猪脂一升溫酒一服令盡良並出第四卷中

古今錄驗療心腹脹滿大便不通方

芍藥（六分） 黃芩（五分） 杏人（熬去皮尖八分） 大黃（八分）
芒消（六分）
右五味擣篩為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸粥飲下加至二十丸取通利為度經心錄同出二十六卷中

近效療大便不通方
用猪膽和少蜜於鐺中熬令熟稠丸如棗大內下部中即差

大便秘澀不通方七首

千金療大便秘塞不通神方
猪羊膽無在
右一味以筩灌三合許令深入即出矣不盡須臾更灌一方加葵子汁和之又有椒豉湯五合猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之經心錄同

又三黃湯療下焦熱結不得大便方

大黃三兩　黃芩二兩　甘草一兩炙　梔子二七枚

右四味切以水五升煑取一升八合分三服若祕加芒消二兩忌海藻菘菜並出第十五卷中

備急療卒大便閉澀不通方

葛氏云削瓜葅如指大導下部中即効

又方

燒亂髮灰三指撮投水半升一服

又方

綿裹鹽作三丸如指大內下部中

又方

煎蜜令強加乾薑末和丸如指道寸下部中姚云欲死者蜜三升微火煎如餳投冷水中令凝丸如大指長

三四寸導之良

又方

穿猪膽一枚內下部中倒瀉之姚云療七八日奔氣
湯心欲死者須臾便通良范汪同

大便失禁并關格大小便不通方二十二首

病源大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能温制故使大便失禁

又關格大小便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱不通爲關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣大盛陽氣不得營之曰內關陽氣大盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則陰陽之氣痞結腹內脹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通日不得前後而手足寒者爲三陰俱逆

三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也並出第十四卷中

范汪療下部閉不通方

取烏梅五顆著湯漬須臾出核取熟擣之如彈丸內下部中即通也肘後同

又方

取葫萋根一把擣末水和絞去滓强人服一升數用有効兼療脚氣

又療大小便不通三陽實大便不通方

榆白皮三兩 桂心二兩 滑石六兩 甘草三兩炙

右四味以水一斗煑取三升分三服忌海藻菘菜生葱集驗同並出第十六卷中

集驗療關格之病腸中轉痛不得大小便一日一夜不差欲死方

芒消三兩紙三重裹於炭火内燒令沸安一升水中
盡服之當先飲温湯一二升以來吐出乃飲芒消汁
也肘後同

千金療老人小兒大便失禁方

灸兩脚大拇指去爪甲一寸三壯

又方

灸大指奇間各三壯

又療大小便不通方

灸臍下一寸三壯

又方

灸横文一百壯

又方

葵子一升 竹葉一把青者

右二味以水一升煑一沸頓服之

又方

葵子一升　榆白皮一升切

右二味以水五升煑取二升分二服

又方

水三升煑葵子一升去滓取一升內猪膏一升空肚一服

又方

鹽半升合蜜三合同煎如餳出之著冷水中丸如檳榔形如指大深內下部中立通並出第十五卷中

千金翼濡藏湯主大小便不通六七日腹中有燥糞寒熱煩迫短氣汗出腹滿方

生葛根二斤切　猪膏二升　大黃一兩切

右三味以水七升煑取五升去滓內膏煎取三升澄清強人
頓服之羸人分再服出第七卷中
備急葛氏療卒關格大小便不通支滿欲死二三日則殺人方
　鹽以苦酒和塗中乾又易之必効同
陶氏卒大小便不通方
　紙裹鹽燒投水中服之
姚氏風寒冷氣入腸忽痛堅急如吹狀兼巳大小便不通或小
腸有氣結如升大脹起名爲關格病
又療大小便不利方
　苦參　滑石　貝齒各等分
右三味擣篩爲散每服飲下一匕或煑葵根汁服之彌佳文
仲同出第六卷中
古今錄驗療關格大小便不通方

以水三升煑鹽三合使沸適寒溫以竹筒灌下部立
通行也

又療大小便不通方

通草四兩 郁李人三兩去皮 車前子五合一方一升 黃芩三兩

朴消四兩 瞿麥三兩

右六味切以水八升煑取二升去滓分三服經心錄同

又方

取生土瓜根擣取汁以水解之於筒中吹內下部即

通秘方並出第二十六卷中

經心錄療關格大小便不通方

芒消 烏梅 榆白皮各五兩 芍藥

杏人去皮尖各四兩 麻子人三兩 大黃八兩

右七味切以水七升煑取三升分爲三服一方無烏梅加枳

實乾地黃各二兩

又療大小便不通方

滑石二兩　葵子　榆白皮各一兩

右三味下篩爲散煮麻子汁一升半取二匕和服兩服即通

並出第二卷中

近效療大小便不通方

含消石吐去水

關格脹滿不通方四首

千金療關格脹滿不通方

芍藥六分　芒消六分　黃芩五分　杏人八分去皮尖

大黃八分

右五味末之蜜和丸如桐子飲下十丸日二服良

又方

獨頭蒜燒熟去皮綿裹內下部氣亡通削薑裹塩
導並佳

又方

乾薑　鹽　杏人

右三味等分擣導之

又療脹滿關格不通方

吴茱萸一升熬　乾薑　大黄　桂心
當歸　芍藥　甘草炙　芎藭各二兩
雄黄三分研　人參　細辛各四兩　眞珠一分研
桃白皮一握

右十三味切以水一斗煑取三升去滓內雄黄眞珠末酒一
升微火煎三沸旦服一升得下止不必盡也毎服如人行十
里久進之忌海藻菘菜生葱生菜生血物等並出第十五

卷中

許仁則大便暴閉不通方二首

許仁則論曰此病更無餘候但由飲食將息過熱熱氣蘊積祕塞若緣氣秘自須依前療氣法服巴豆等三味丸及療水氣葶藶等諸方取利若是風秘自依後服大黃等五味丸暴祕之狀骨肉強痛體氣煩熱脣口乾焦大便不通宜依後大黃芒消二味湯取利方

大黃六兩　芒消五兩

右藥先切大黃以水四升煮取二升去滓內芒消頓服之須臾利良久不覺以熱飲投之若服此依前不利宜合後大麻人等五味丸服之取快利矣

五味大黃丸方

大黃五兩　大麻子一升微熬研之　芒消六兩　乾葛

桑根白皮各五兩

右五味先擣四味爲散然後擣人令如膏即投四味散和擣和少蜜擣之丸如梧子大初服十丸日再服稍稍和得大便通爲限吴昇同出下卷中主大便風祕不通

小便不通方一十三首

病源小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱爲津液之府此二經爲表裏而水行於小腸入胞者爲小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣大盛故結澀令小便不通少腹脹氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脉緊而滑直者不得小便也出第十四卷中

廣濟療下冷疼小便不通雞蘇飲子方

雞蘇一握 通草四兩 石韋一兩炙去毛 冬葵子一兩半

杏人二兩去皮尖 滑石二兩 生地黃四兩

右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服如人行四五里進一服不利忌蕪荑熱麪炙肉蕎麥麪蒜陳臭物粘食等

又方

冬葵子五兩 通草三兩 茅根四兩 芒消二兩湯成下

茯苓三兩 滑石五兩

右六味切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服服別相去如人行六七里忌炙肉熱食醋蒜等物

又方

茯苓二分 大黃六分 芍藥 當歸

枳實炙 白朮 人參各二分 大麻人四分

右八味切以水六升煮取二升去滓分溫三服要著芒消亦得忌酢物桃李雀肉等並出第四卷中

崔氏療小便不通方

取熏黃如豆許末之內小孔中神良

又方

桑根白皮　猪苓去皮　通草各二兩

右三味切以水六升煑取二升分三服

又方

雞屎白如彈丸以苦酒和服即下不過三四本云療淋

又方

足大拇指奇間有青脉針挑血出灸三壯愈並出第四卷中

救急主小便不通方

取印成鹽七顆擣篩作末用青葱葉尖盛鹽末開便孔內葉小頭於中吹之令鹽末入孔即通非常之効

又方

取嫩穀木梢濃汁可飲半升以來即愈

必効療小便不通或利不得服滑藥急悶欲絶方

鹽二升大鐺中熬以布帛裹熨臍下挼之小便當

漸通也肘後同

古今録驗療熱結小便不通利方

刮滑石屑水和塗少腹及繞陰際乾復塗之肘後同

又方

取鹽填滿臍中大作艾炷灸令熱爲度良肘後千金

同並出第二十六卷中

近効療小便不通數而微腫方

取陳久筆頭燒作灰和水服之

小便難及不利方九首

病源小便難者此是腎與膀胱熱故也此二經爲表裏俱主水水行於小腸入胞爲小便熱氣在於藏腑水氣則澀其熱勢微故但小便難也診其尺脉浮小便難赤脉濡小便難尺脉緩小便難有餘瀝也出第十四卷中

集驗療小便難淋瀝湯方

滑石八兩 石韋三兩去毛 榆皮一升 葵子一升

通草四兩

右五味切以水一斗煮取三升分三服一方加黄芩三兩

又療淋小便不利陰痛石韋散方

石韋二兩去毛 瞿麥一兩 滑石五兩 車前子三兩

葵子二兩

右五味擣篩爲散服方寸匕日三並出第五卷中

千金療小便不利莖中痛少腹急方

通草二兩　葶藶子三兩熬　茯苓二兩

右三味擣爲散以水服方寸匕日三服忌醋物出第二十一卷中

備急療小便不利莖中痛劇亦療婦人血結腹堅痛牛膝飲方

牛膝一名牛脣掘取根煑服之立差有驗肘後同

陶效方

秦艽二分　冬瓜子二兩

右二味擣爲末酒服一匕日三服神良肘後同

文仲療小便不利方

桑螵蛸三十枚　黃芩一兩

右二味切以水一升煑取四合頓服之良肘後同

又方

蒲黃　滑石各一分

右二味爲散酒服一匕日三大驗肘後同

又療諸淋及小便常不利隂中痛日數十度起此皆勞損虛熱所致長將散服方

石韋去毛　滑石　瞿麥　王不留行　葵子各二兩

右五味擣篩爲散每服方寸匕日三服之姚方加滑石五兩車前子三兩無王不留行備急同出第四卷中

古今録驗療淋胞痛不得小便滑石散方

滑石　葵子　鍾乳各一兩　桂心　通草　王不留行各半兩

右六味擣篩爲散先食訖以酒服方寸匕日三服忌生葱出第二十六卷中

遺尿方六首

病源遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也膀胱爲足太陽腎爲足少陰二經爲表裏腎主水腎氣下通於陰小便者水液之餘也膀胱爲津液之府府既虛冷陽氣衰弱不能約於水故令遺尿也診其脉來過寸口入魚遺尿肝脉微滑亦遺尿左手關上脉沈爲陰絶者無汗脉也苦遺尿尺脉實少腹牢痛小便不禁尺中虛小便不禁腎病小便不禁脉當沈滑而反浮大其色當黑反黄此土之尅水爲逆不治其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蹲踞高一尺許以兩手從外屈膝至趺上急手握足五趾極力一通令内曲以利腰髖療遺尿也出第十四卷中

集驗療遺尿方

取雄雞腸燒灰爲末用三指一撮服之朝暮服當愈

范汪同出第五卷中

千金療遺尿小便澀方

牡蠣熬　鹿茸炙各四兩　桑耳三兩　阿膠二兩炙

右四味切以水七升煑取二升分爲二服作散以飲送之經心錄同

又方

木防已二兩　葵子二兩　防風三兩

右三味切以水五升煎取二升半分温三服作散亦佳古今錄驗同並出第二十一卷中

古今錄驗牡蠣湯療遺尿小便澀方

牡蠣四兩熬　鹿茸炙四兩　阿膠炙各二兩　桑螵蛸二兩

右四味切以水五升煑取二升分再服

又方

桑耳三分　礬石二分熬汁盡　阿膠二分炙　龍骨三分

右四味爲散空心飲服方寸匕日三

又方

桑耳二兩 牡蠣各三兩熬 礬石二兩熬汁盡

右三味擣篩爲散酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

尿血方一十一首

千金療房損傷中尿血方

牡蠣熬 車前子 桂心 黄芩

右四味等分擣篩爲散飲服方寸匕日三服不知加至二匕忌生葱出第二十一卷中

崔氏療卒傷熱行來尿血方

大黄末 芒消末各半匕

右二味冷水和頓服之立止三日内禁如藥法出第四卷中

古今錄驗療尿血鹿茸散方

鹿茸炙　當歸　乾地黃各二兩　葵子五合

蒲黃五合

右五味擣篩爲散酒服方寸匕日三服忌蕪荑出第二十六卷中

蘇澄療尿血方

車前草擣絞取汁五合空腹服之差

又方

水服亂髮灰方寸匕日三服肘後千金同

又方

服益母草汁一升差立止一云葎草

又方

車前三升水五升煑取二升分三服

又方

又方

棘刺二升水五升煑取二升分三服差

又方

膠三兩炙以水二升煑取一升四合分再服

又方

酒服蒲黄二方寸匕日二服水服亦得

又方

擣水筋汁服六七合日一服

胞轉方一十五首

病源胞轉者由是胞屈辟小便不通名爲胞轉其病狀臍下急痛小便不通是也此病或由小便應下便強忍之或爲寒熱所迫此二者俱令水氣上還氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入内溲應出不得出外内相擁塞故令不通此病至四五日乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或

小便急因疾走或忍尿入房亦皆令胞轉或胞落並致死出第十四卷中

肘後療卒小便不通及胞轉方

取雞子中黃一枚服之不過三也備急同

又方

水上浮萍暴乾末服之小便不通利水脹流腫佳千金翼同

又方

灸螵蛸擣爲末水服之方寸匕日三服良効

又療忍小便久致胞轉方

自取爪甲火燒服之備急同

又方

取梁上塵三指撮以水服之神効

又方

服蒲黃方寸匕日三服良

范汪療胞轉不得小便方

用蒲席捲人到立令頭至地三反則通肘後同

又方

雀矢半合　車前子　滑石各四兩　通草

芍藥各二兩

右五味切以水七升煑取三升服五合日三先食便得立愈

又療胞轉欲死及失弱方

取豆醬清和竈突中黑如豆大內陰孔中立愈並出

第十五卷中

備急卒小便不通及胞轉方

車前草一斤水一斗煑取四升分四服小品同出第六

卷中

古今録驗療胞轉小便不通亂髪散方

亂髪（三斤洗去垢燒） 滑石（半斤） 鯉魚齒（一兩）

右三味擣篩爲散以飲服方寸匕日三服良

又療胞轉不得小便方

吸芥眞琥珀（一兩） 葱白（十四莖）

右二味以水四升煮取三升去葱白末琥珀細篩下湯中温服一升日三服大利范汪同

又張苗說士程妻有客忍小便不時起胞轉大小便不得四五日困篤欲死無脉服此差方

滑石（二兩） 亂髪（三兩燒灰）

右二味擣下篩取生桃白皮一斤熟舂以水合絞得汁二升以汁服散方寸匕日三服即愈其但淋者取亂髪三兩燒灰

滑石五兩合擣爲散服方寸匕日三

又説不得小便者爲胞轉成爲寒熱氣所迫胞屈辟不得充張律液不入其中爲尿及在胞中尿不出方

當以葱葉除尖頭内入莖孔中吹之初漸漸以極大吹之令氣入胞中得脹乗律液得入便愈也朱郁用此藥療郭虎將十五歳男用

葵子一升　通草　甘草各二兩炙　石韋一兩半去毛

滑石四兩　榆皮二斤

右六味以水一斗煮取三升令服范汪同並出第二十六卷中

小便血及九竅出血方一十二首

小品療小便血菟絲丸方

菟絲子　蒲黃　乾地黃　白芷

荆實　葵子　敗醬　當歸

茯苓　　芎藭各二兩

右十味合擣爲末以白蜜和丸如梧子大飲服二丸日三服不知加至五六丸劉洪玘方已效常服忌酢物蕪荑古今錄驗范汪同

又斷血諸方所云下血者其從腹裏出者悉爲下血也有痔病血從孔邊出者別尋痔方出第四卷中

千金療小便出血方本云以下治虛勞尿白濁

灸脾俞百壯在第十椎

又方

灸三焦俞百壯在第十三椎

又方

灸腎俞百壯在第十四椎

又方

又方

灸章門百壯在季肋端

又方

榆皮二斤水二斗煑取五升分十服佳

又方

擣乾羊骨下篩水服方寸匕日三服

又治小便血方

生地黃八兩　柏葉一把　黃芩三兩　阿膠二兩炙

右四味切以水七升煑取三升去滓內膠分三服並出第二十一卷中

文仲療小便出血方

生地黃汁一升　生薑汁一合

右二味相和頓服不差更作此法許令公處云極効肘後同

又方

灸足第二指本第一文七壯立愈肘後同

又方

龍骨末二方寸匕溫酒一升服之日三服深師肘後范汪陶氏同

又方

當歸四兩酒三升煮取一升頓服之肘後深師范汪同並出第六卷中

小便不禁方二首

病源小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其水液故小便不禁也出第十四卷中

千金翼小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬去心　乾地黃各八兩　蒺藜子　桂心

續斷各二兩 甘草一兩炙 乾薑四兩

右七味切以水一斗煮取二升五合分三服忌海藻菘菜生葱等物

又久房散主小便多或不禁方

菟絲子二兩酒漬 蒲黃三兩 黃連三兩 消石一兩

肉蓯蓉二兩 五味子三兩 雞肶胵中黃皮三兩炙

右八味擣篩爲散每服方寸匕日三服每服如人行三四里又服並出第十五卷中

小便數及多方五首

病源小便數者膀胱與腎俱虛而有客熱乘之故也腎與膀胱爲表裏俱主水腎氣下通於陰此經既虛致受於客熱虛則不能制水故令數小便熱則水行澀澀則小便不快故令數起也診其脉趺陽脉數胃中有熱即消穀引食大便必鞕小便

則數其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩踵布膝除數尿出第十四卷中

范汪療小便數而多方

黃連二分 苦參二分 麥門冬一兩去心 土瓜根 龍膽各一分

右五味擣篩以蜜丸如梧子每服十九加至二十九良一方無苦參有黃芩

又方

栝樓十分 黃連五分

右二味擣篩爲散每服方寸匕日三良

又方

瞿麥二兩 滑石一兩 葵子一升 黃芩 甘草炙各一兩

右五味切以水六升煮取三升去滓一服六合

又方

桃人一味㕮咀酒一升煮三沸去滓分爲三服強人一服盡之並出第十七卷中

集驗療小便數而多方

羊肺羹內少許羊肉合作之調和鹽如常食之法多少任意不過三具効出第五卷中范汪同

許仁則小便數多方四首

許仁則論此病有兩種一者小便多而渴飲食漸加肌肉漸減乏氣力少顏色此是消渴一者小便雖數而不至多又不渴食飲亦不異常或不至多能食但稍遇天寒冷即小便多更無別候此是虛冷所致大都兩種俱緣腎氣膀胱冷渴不差便能殺人腎虛胃冷無所爲害若候知是消渴小便數宜依後菝葜等

入味湯黃耆等十四味丸并竹根等十味飲小麥麪等十四味煎以次服之方

菝葜 土瓜根各五兩 黃耆 地骨皮

五味子各四兩 人參三兩 石膏八兩碎 牡蠣三兩真爛不雜者熬

右藥切以水一斗煮取三升去滓分溫三服每服如人行十里久服一劑覺可重合服至五六劑佳隔五日服一劑劑數滿宜合後黃耆等十四味丸服之

又方

黃耆 黃連 土瓜根各五兩 苦參三兩

玄參六兩 栝樓 地骨皮 龍骨

菝葜 鹿茸各四兩炙 牡蠣熬 人參

桑螵蛸各三兩炙 五味子一升

右藥擣篩爲末蜜和爲丸用後竹根飲下之初服十五丸日二

服稍加至三十丸如梧桐子大忌猪肉冷水

又竹根飲子方

筋竹根　生茅根　蘆根各切五升　菝葜切二升

石膏一斤杵碎　烏梅五十顆　生薑切一升　小麥三升

竹瀝二升　白蜜一升

右藥以水五斗煑取一斗去滓內竹瀝及蜜著不津瓶貯之用下前丸縱不下丸但覺口乾及渴即飲之不限多少冷煖及前後如熱月即逐日斟酌煎之頓煑恐壞也如不能作此飲且用烏牛乳下丸及解渴日服丸及飲夜中恐虛熱宜合後小麥麨等十四味煎細細含嚥之

又小麥麨五升以水硬溲之別於水中揉挺令麨粉盡麨筋別成一塊即止以此麨粉汁別器澄停瀝却清汁即以稠粉盛於練袋子中濾著令微生燥生葛根五挺徑三寸長二尺碎

撻於水中楺挺令葛根中粉汁盡別器澄停盛貯一如小麥麪法生栝樓五斤擣如上法胡麻三升去皮熬令熟爲散筋竹根切一斤生茅根切一斤生蘆根切一斤烏梅五十顆以上用水五斗緩火煎取一升半去滓澄取清冬瓜汁二升生麥門冬汁三升生薑汁一升牛乳一升白蜜二升先取竹根等汁和冬瓜以下汁微火上煎減半次內牛乳白蜜又煎六七沸投小麥麪粉生葛粉栝樓粉胡麻散於諸汁中煎和熟攪之勿住手候如稠糖即成成訖止火待冷貯別器中每夜含如此初服一棗大稍稍加至一匙亦任性日日含之欲作丸飲服亦得出第十卷中（方中只十三未元欠一味）

尿牀方六首

病源人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則小便多或不禁而遺尿

膀胱足太陽也爲腎之府腎爲足少陰爲藏與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入而陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞爲小便夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不覺尿出也出第十四卷中

千金療尿牀方

羊肚系盛水令滿急繫兩頭熟煑開取水頓服之立差

又方

雞肶胵一具并腸暴乾末酒服之男雌女雄也

又方

羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉晨朝空腹食之不過四五頓差

又療尿牀方

新炊熟饋飯一盞寫尿牀處拌之收取與食之勿令知

又方

垂兩手髀上盡指陷處灸七壯又灸臍橫文七壯並

出第二十一卷中

近効療尿牀方

取麻鞋乳帶及鼻根等唯不用底須七量以水七升

煑取二升分再服

灸穴雜法一十二首

千金翼灸五淋法

灸大敦三十壯

又石淋臍下三十六種疾不得小便法

灸關元三十壯一方云百壯

又血淋法

灸丹田穴隨年壯良

又法

灸復溜穴五十壯一云隨年壯

又尿黃法

灸石門穴五十壯

又遺尿法

灸遺道俠玉泉五寸隨年壯

又法

灸陽陵泉穴隨年壯

又失禁尿不自覺知法

灸陰陵泉穴隨年壯

又莖中痛法

灸行間穴三十壯

又腹滿小便數法

灸屈骨端二七壯

又淋痛法

灸中封穴三十壯亦隨年壯

又小便不利及轉胞法

灸心下八寸七壯以上穴並出第二十七卷中

外臺祕要方卷第二十七

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙子孟校勘

外臺祕要方

二十八

中惡 蠱注

自縊 暍死

外臺祕要卷第二十八 中惡蠱注自縊暍死一十八門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

中惡方一十三首

卒死方二十三首

客忤方一十三首

卒魘方二十一首

鬼擊方一十首

尸厥方一十一首

中蠱毒方二十一首

蠱吐血方一十首

蠱下血方九首

五蠱方一十二首

蝨注方三首

中惡方一十三首

病源中惡者是人精神衰弱爲鬼邪之氣卒中之也夫人陰陽順理榮衛調平神守則強邪不干正若將攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脉緊大而浮者死緊細而微者生又中惡吐血數升脉沈數細者死浮焱如疾者生中惡有差後餘勢停滯發作則

變成注

又中惡死候中鬼邪之氣卒然心腹絞痛悶絕此是客邪暴盛陰陽爲之離絕上下不通故氣暴厥絕如死良乆其眞氣復則生也而有乘年之衰逢月之空失時之和謂之三虚三虚而腑藏衰弱精神微羸中之則眞氣竭絕則死也其得差者若餘勢停滯發作則變成注並出第二十三卷中

廣濟療卒中惡心腹刺痛去惡氣方

麝香一分研　生犀角二分屑　青木香二分

右三味爲散空心熟水服方寸匕日二立効未止更作不利忌如常法出第四卷中

肘後華他療中惡短氣欲絕方

灸兩足大拇指上甲後聚毛中各灸二七壯即愈又法三七壯集驗張文仲備急同

又方

麻黃三兩去節一方四兩　桂心二兩　杏人七十枚去尖皮　甘草一兩炙

右四味切以水八升煮取三升分三服含嚥之通療諸昬客忤良忌生葱海藻菘菜等物

又方

韭根一把　烏梅十四顆　茱萸半升

右三味切以勞水一升煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沈者死煮取三升飲之大効

又方

桂心一兩　生薑三兩　梔子十四枚　豉五合

右四味擣碎以酒二升微煮之去滓頓服之取吐爲度並出第一卷中

集驗療中惡遁尸心腹及身體有痛處甚者短氣不語手摸

按之得其痛處則病色動惡人近則是痛處方

取艾小菜挼令碎著痛上厚寸餘鐺中煑湯和灰作強泥令熱薄艾上冷輒易之不過再著則愈出第七卷中

又療中惡心痛胷脅㽲痛喘急湯方

桃東行枝白皮一虎口 真珠一兩研 梔子人十四枚

生薑二兩 當歸 桂心各三兩 附子一兩炮

香豉五合 吴茱萸五合

右九味切以水八升煑取二升去滓內真珠分二服忌猪肉生葱生血物小品同

又方

仰卧以物塞兩耳以兩箇竹筒內死人鼻中使兩人痛吹之塞口傍無令氣得出半日所死人即噫噫勿復吹也千金同

又方

擣皂莢細辛屑取如胡豆大吹兩鼻孔中單用皂莢

末亦佳千金同並出第四卷中

删繁療中惡痛欲絶方

釜底墨五合　鹽一撮

右二味和研以水一升攪調一服范汪同

又方

牛屎新故並得一物若新絞取五合汁爲一服口不

開扣齒内藥也若無新者乾者即以水和取汁並出

第十卷中

崔氏療卒中惡氣絶方

取眞珠書舌作鬼字額上亦書之大良

又方

灸右肩髙骨上隨年壯良並出第四卷中

卒死方二十三首

病源卒死者由三虛而遇賊風所爲也三虛謂乘年之衰一也乘月之空二也失時之和三也人有此三虛而爲賊風所傷使陰氣偏竭於內則陽氣阻隔於外二氣擁閉故暴絶如死也若腑藏氣未絶者良久乃蘇然亦有挾鬼神之氣而卒死者皆有頃邪退乃活也凡中惡及卒忤卒然氣絶其後得蘇若其邪氣不盡者停滯心腹或心腹痛或身體沉重不能飲食而成宿疢者皆變成疰

又卒忤死候犯卒忤客邪鬼氣卒急傷人入於腑藏使陰陽離絶氣血暴不通流奄然厥絶如死狀也良久陰陽之氣和乃蘇若腑藏虛弱者死亦有雖蘇而毒氣不盡時發即心腹刺痛連滯變成疰也並出第二十三卷中

甲乙經云黃帝問於岐伯有卒死者何邪使然荅曰得三虛者暴疾而死得三實者邪不能傷也黃帝曰願聞三虛荅曰乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷也願聞三實荅曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能傷也有卒死不知人有復生何氣使然陰氣先竭陽氣未入故卒死而不知人氣復則生集驗同出第六卷中

肘後云卒死中惡及尸厥者皆天地及人身自然陰陽之氣有乖離否隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可療而生緣氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以符術護濟者

又卒死或先有病痛或居常倒仆（肘後作寢臥）奄忽而絕皆是中惡之類療方

取葱中央心刺鼻令入七八寸無苦使目中血出乃

佳一云耳中血出佳此扁鵲法同後云吹耳中葛云吹鼻别爲一法肘後集驗備急文仲必効等同（崔氏亦療中惡）

又方

令二人以衣壅口吹其兩耳極則易人亦可以葦筒吹之並捧其肩上側身遠之莫臨死人上肘後同

又方

以葱刺耳耳中鼻中血出者勿怪無血難療之有血者是活候也其欲蘇時當捧兩手莫放之須臾死人自當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻孔令入七寸餘無苦大良立効亦療自縊死此扁鵲法肘後集驗備急同

又方

視其上脣裏弦有青息肉如黍米大以鍼决去之差肘後同

又方

以人小便灌其面數過即能活此扁鵲法肘後集驗

張文仲備急同

又方

以綿漬好酒內鼻中手按令汁入鼻中并持其手足

莫令驚動也肘後同

又方

灸其脣下宛宛中名承漿十壯大良肘後同並出第一卷中

文仲療卒死方

濕牛馬糞絞取汁以灌其口中令入喉若口已噤者以

物強發若不可強發者扣折齒下之若無新者以

若人尿和乾者絞取汁扁鵲法集驗備急肘後同

又方

以細繩圍其人肘腕中男左女右伸繩從背上大椎度以下行脊上灸繩頭五十壯一云 又從此灸橫行各半繩此凡三灸各灸三即起

又方

令人痛爪其人人中取醒不起者捲其手灸下文頭隨年壯

又方

灸鼻下人中三壯

又方

灸臍中百壯

又方

半夏末如大豆許吹鼻中

又方

擣薤若韭取汁以灌口鼻中張文仲集驗范汪同

又方

猪膏如雞子大苦酒一升煮沸煮灌喉中集驗肘後

備急同

又卒死而壯熱者方

礬石半斤煑消以漬脚令没踝肘後范汪同並出第一卷中

備急療卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中末皂莢吹鼻中集驗文仲肘後范汪同

又療卒死而張目反折者方

灸手足兩爪甲後各十四壯飲以五毒諸膏散有巴豆者良肘後張文仲同

又療卒死而四肢不收失便者方

馬矢一升水三斗煑取二斗以洗足又取牛糞一升温酒和灌口中肘後同

又方

灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各百壯良肘後同

又卒死而口噤不開者方

縛兩手大拇指灸兩白肉中二十壯肘後文仲范汪

同並出第一卷中

集驗療卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也方

牽牛臨鼻上二百息又灸熨斗以熨兩脅下鍼兩間

使各百餘息灸人中

又療卒死而有脉形候陰氣先盡陽氣後竭故也方

嚼薤哺灌之肘後張文仲千金范汪同並出第一卷中

古今錄驗司空三物備急散療卒死及感忤口噤不開者方

巴豆去心皮熬　乾薑　大黃各等分

右藥擣篩爲散服如大豆許二枚以水三合和之腹脹煩熱

復飲水能多益佳又療心腹病活死人令得小利便佳如腹常滿痛當令得下差一方服如一刀圭以酒下之不能如刀圭者便丸如大豆許四枚須臾不知復加一豆許不差又加一豆許若病者口噤不能自飲攪口含之藥不預合預合氣力歇卒病者便合之無臼木杵中擣耳不過三服取痢無不差者蜜丸尤良出第四卷中

客忤方一十三首

病源卒忤者亦名客忤謂邪客之氣卒犯忤人精神也此是鬼厲之毒氣中惡之類也人有𩲡魄衰弱者則爲鬼氣所犯忤喜於道間門外得之其狀心腹絞痛脹滿氣衝心胷或即悶絶不復識人肉色變異腑藏虛竭者不療卽乃至於死然其毒氣有輕重輕者微療而差重者侵尅腑藏雖當時救療餘氣停滯久後猶發乃變成疰出第二十三卷中

肘後論曰客者客氣也忤者犯也謂客氣忽犯人也此惡鬼毒厲之氣忽逢觸之其氣有衰歇故不能害人如自然惡氣療之多愈雖是氣未入身而侵剋藏腑經絡差後猶宜更爲療以消其餘勢不爾亟終爲人患今有時輙發

又客忤死者中惡之類也喜於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即療亦殺人救之方

灸鼻下人中三十壯愈備急文仲同

又方

以水漬粳米取汁一升以飲之口已噤者以物強發之

又方

以銅器瓦器盛熱湯器著腹上轉冷者徹去 器襯肉大冷者易以熱湯取愈也

又方

先以衣三重藉腹上以銅器著衣上稍稍少許茅於器中燒之茅盡益之勿頓多也取愈乃止備急文仲同

又方

以繩横其人口以度度臍去四面各一處灸三壯令火俱起也

又方

横度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯也並出第一卷中

又療客忤心腹絞痛脹滿氣衝心胷煩躁壯熱或氣悶又刺此魃魅之氣未散方

麝香一錢　茯神　人參　天門冬去心

鬼臼　昌蒲等分

右六味蜜丸如桐子服十丸日三

文仲扁鵲療客忤有救卒死符并服鹽湯法恐非庸世所能用故不載而此病即令人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類焉療皆參取而用之已死者方

擣生昌蒲根絞取汁含之即愈備急肘後同

又療卒忤停尸不能言者方

燒桔梗二枚末飲服之

又方

細辛　桂心各等分

右二味内口中肘後備急同

又卒忤口噤不開者方

生附子末置管中吹内舌下備急肘後同並出第一卷中

千金療客忤惡氣方

吞麝香如大豆立可出第五卷中

千金翼療客忤方

灸間使七壯又肩井百壯又十指甲下各三壯出第

二十七卷中

卒魘方二十一首

病源卒魘者屈也謂夢裏爲鬼邪之所魘屈也人卧不寤皆是

䰟魄外遊爲他邪所執録欲還未得致成魘也忌火照火照則

䰟魄遂不復入乃至於死而人有於燈光前魘者本由明出所

以不忌火也其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養

生方導引法云拘䰟門制魄户名曰握固法屈大拇指著四小

指内抱之積習不止眠時亦不復開令人不魘魅又云人魘

忽然明喚之魘死宜闇喚之好唯得遠喚亦不得近而急喚亦

喜失䰟魄也又魘不寤候人眠睡則䰟魄外遊爲鬼邪所魘屈其

精神弱者魘則久不得寤乃至氣暴絶所以須傍人助喚并以方

術療之即蘇也並出第二十三卷中

肘後療卒魘昧不寤方

卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齧其脚踵及足拇指甲際而多唾其面則覺也

又方

皂莢末以竹筒吹兩鼻孔中即起三兩日猶可吹之也

又方

以筆毛刺兩鼻孔男左女右展轉進之取起也集驗同

又方

擣薤取汁吹兩鼻孔冬日取韭絞汁灌口集驗仲景文仲備急同

又方

以蘆管吹兩耳并取其人髮二七莖作繩内鼻孔中

割雄雞冠取血以管吹喉咽中大良並出第一卷中

集驗療卒魘方

以鹽湯飲之多少在意并嚙其足大指爪際痛嚙之即起也肘後文仲備急同

又方

以其人置地取利刀畫從肩起男左女右畫地令周遍訖以刀鋒刺病人鼻下人中令入一分急持勿動其人當鬼語求去乃具問阿誰以何故來自當乞去乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得去不可具詰問之矣

又方

雄黃細篩管吹兩鼻孔中佳並出第一卷中

崔氏主卒魘方

以甑帶左索縛其肘後男左女右用餘猶急絞之又縛牀脚乃詰問其故肘後古今錄驗同崔氏云療卒狂鬼語方以甑帶急令縛兩手大指便灸左右脅下屈肘頭尖名七壯須臾鬼語自道姓名乞去徐詰問乃解其手

文仲療卒魘方

令一人坐頭邊守一人於户外呼病人姓名坐人應曰在便甦活也肘後同

又人喜魘及惡夢者方以下並辟魘方

取火死灰著履中令枕之

又方

帶雄黃男左女右也

又方

枕麝香一分於頭邊佳又灌香少許

又方

以虎頭爲枕佳

又方

取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魘也集驗范汪同

又方　作犀角枕佳

又方　青木香内枕中并帶之亦佳並出第一卷中

千金小定心湯療虛羸心氣驚弱多魘忘方

茯神四分本作茯苓　大棗十五枚擘　甘草炙　芍藥

乾薑　遠志去心　人參　桂心各二兩

右八味切以水八升煮取三升分三服日三忌如常法

又大定心湯療心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足方

人參　茯苓　茯神　遠志去心

赤石脂　龍骨　乾薑　當歸

甘草炙　白朮　芍藥　大棗

桂心　防風　紫菀各二兩

右十五味切以水一斗二升煮取三升半分為五服日三服夜

二服忌如常法

千金翼療卒魘不覺方

灸兩足大指聚毛中二十一壯范汪同出第二十七卷中

備急療卒魘不寤方

末竈下黄土若末雄黄若末桂心

右以蘆管吹入兩鼻孔中文仲同出第一卷中

鬼擊一十首

病源鬼擊者謂鬼厲之氣擊著於人也得之無漸卒著如人以刀矛刺狀匈脅腹内絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名爲鬼排言鬼排觸於人也氣血虚弱精魂衰微忽與鬼神遇相觸突致之爲其所排擊輕者困而獲免重者多死也出第二十三卷中

肘後鬼擊之病得之無漸卒著如人以刀矛刺狀匈脅腹内絞急

切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血一名鬼排治之方
灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差千金翼同
又方
熟艾如鴨子大三枚以水五升煑取二升頓服之並出
第一卷中
文仲療鬼擊方
鹽一升以水二升和攪飲之并以冷水潠之湏臾吐
即差備急肘後同
又方
粉一撮於水中攪飲之備急肘後同
又方
以淳苦酒吹令入兩鼻孔中肘後同並出第一卷中
備急療鬼擊方
燒鼠矢末如黍米許水和服不能飲以水和少許內

喉中肘後文仲同

又方

升麻　獨活　桂心各等分

右三味爲末酒服方寸匕立愈肘後同

又有諸丸散並在備急條中令巫覡實見人忽被神鬼所擊刺擺撲先火切擊也者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或愆負所招輕者獲免重者多死猶如周宣燕簡輩事不爲虛也必應死者亦不可療要自不得不救之耳肘後同並出第一卷中

刪繁倉公散方

特生礜石燒半日研　皂莢炙去皮子　雄黃研

藜蘆熬

右四味等分擣爲末主療卒鬼擊鬼排鬼刺心腹痛下血便死不知人及卧魘嚙脚踵不覺者諸惡毒氣病取前散如大

豆許以管吹入鼻中得嚏則氣通便活若未嚏復更吹之得嚏爲度此藥起死人方漢文帝太倉令淳于意方此以療如前源勝餘方所用諸疾別源不若王壺等方崔氏備急范汪等同出第六卷中

千金翼療鬼擊方

灸臍下一寸三壯出第二十七卷中

尸厥方一十一首

病源尸厥者陰氣逆也此由陽脉卒下墜陰脉卒上升陰陽離居榮衛不通眞氣厥亂客邪乘之其狀如死猶微有息而不常脉尚動而形無知也聽其耳内循循有如嘯之聲而股間暖者是也耳内雖無嘯聲而脉動者故當以尸厥療之診其寸口脉沈大而滑沈則爲實滑則爲氣實氣相搏身温而汗此爲入腑雖卒厥不知人氣復則自愈若脣正青身冷此爲入藏亦卒厥不

知人即死訴其左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰足少陽俱虛也
病若恍惚尸厥不知人妄有所見也出第二十三卷中
肘後尸厥之病卒死而脉猶動聽其耳中循循有如嘯聲而股
間暖是也耳中雖無嘯聲而脉動故當以尸厥救之方
以竹筒吹其左耳自極三度復吹其右耳三度即起
也集驗張文仲備急同
又方
擣昌蒲末如棗核大著舌下又内下部中范汪同
又方
灸鼻下人中七壯又灸陰囊下去下部一寸百壯若
婦人灸兩乳中間又以爪刺人中良久以鍼鍼人中
令至齒立起此是魏大夫傳扁鵲法以療趙太子之患
又張仲景云尸厥病脉動而無氣氣閉不通故靜然如死耳方

以昌蒲末吹入兩鼻孔中又以桂末著舌下云扁鵲療楚王法出第一卷中（集驗治卒魘）

集驗療尸厥方

剔左角髮方寸燒灰以酒和灌令入喉中立起肘後千金文仲備急必効同（此本出素問）

又方

以繩圍兩臂腕男左女右伸繩從大椎度下行當脊上灸繩頭五十壯即活云扁鵲灸法肘後同出第一卷中

備急療尸厥方

熨其兩脅下又取竈中墨如彈丸以漿水和飲之須臾三四度也以竹管吹其耳中令三四人更互吹之又取梁上塵如小豆許竹管吹入鼻孔中集驗文仲肘後崔氏范汪同

又方

灸亶中季肋間二七壯也集驗同並出第一卷中肘後惟云灸亶中

千金論曰風寒之氣客於藏間滯而不能發故瘖不能言及喉痺失聲皆風邪所爲也入藏皆能殺人凡尸厥如死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也療方

灸百會百壯鍼入三分補一

又方

鍼足中指頭去甲如韭葉并刺足大指甲下肉側去甲三分

崔氏論曰凡尸厥爲病脉動而形無所知陽脉下墜陰脉上爭榮衛不通其狀如死而猶微有息其息不常人乃不知欲殯斂者療之方

急可以蘆管吹其兩耳極盡以氣吹之立起若人氣

極別可易人吹之出第四卷中

中蠱毒方二十一首

病源凡蠱毒有數種皆是變惑之氣人有故造作之多取蟲蛇之類以器皿盛貯任其自相噉食唯有一物獨在者即謂之爲蠱便能變惑隨逐酒食爲人患禍患禍於佗則蠱主吉利所以不羇之徒而畜事之又有飛蠱去來無由漸狀如鬼氣者得之

凡中蠱病多趨於死以其毒害勢甚故云蠱毒著蠱毒面色青黃者是蛇蠱其脉洪壯病發之時腹內熱悶胷脅支滿舌本脹強不喜言語身體常痛又心腹如似蟲行顏色赤脣口乾燥經年不治肝膈爛而死其面色赤黃者是蜴蜥蠱其脉浮滑而短病發之時腰背微滿手脚脣口悉皆習習而喉脉急舌上主瘡二百日不治噉人心肝盡爛下膿血羸瘦顏色枯黑而死其面色青白又云其脉沉濡病發之時咽喉塞不欲聞人

語腹內鳴唤或下或上天陰雨轉劇皮內如蟲行手脚煩熱嗜醋食欬唾膿血顏色乍白乍青腹內脹滿狀若蝦蟇若成蟲吐出成科斗形是蝦蟇蠱經年不治噉人脾胃盡脣口裂而死其脉緩而散者病發之時身體乍冷乍熱手脚煩疼無時節吐逆小便赤黃腹內悶胷痛顏色多青毒或吐出似蜣蜋有足翅是蜣蜋蠱經年不治噉人血脉枯盡而死欲知是蠱與非當令病人唾水內沉者是蠱浮者非蠱又云旦起取井花水未食前當令病人唾水內唾如柱脚直下沉者是蠱毒沉散不至下者草毒又云含大豆若是蠱豆脹皮脫若非蠱豆不爛脫又云以鵠皮置病人卧下勿令病人知若病劇者是蠱也又云取新生鷄子煑熟去皮留黃白令完全日晚口含以齒微微隱之勿令破作兩炊時夜吐瓦上著霜露內旦看大青是蠱毒也昔有人食新變鱧魚中毒病心腹痛心下鞕發熱煩寃欲得水洗沃身體

搖動如魚得水狀有人診云是蠱其家云野間相承無此毒不作蠱治遂死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手著頭相叉坐地緩舒兩脚以兩手從外抱膝中痛低頭入膝間兩手交叉頭十二通愈蠱毒及三尸毒腰中大氣又云常度日月星辰清淨以雞鳴安身卧漱口三咽之調五藏殺蠱蟲令人長生治心腹病又云治百病邪蠱當正卧閉目閉氣內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐之勿令有聲令入多出少以微爲故存視五藏各如其形色又存胃中令解明　白如素爲之倦極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者亦可止明日復爲之又當存作大雷電隆晃走入腹中爲之不止病自除出第二十五卷中

千金論曰蠱毒千品種種不同或吐下鮮血或好卧闇室不欲見光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節酸疼如此種

種狀貌説不可盡亦有得之三年乃死者急者一月或百日即死其死時皆於九孔中或於脅下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱猫鬼狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須慮此以下亦有灸法初中蠱於心以下捺便大作艾炷灸一百壯并主猫鬼亦灸得差

又論曰世有拙醫見患蠱脹者偏腹腫滿四肢如故小便不甚澀以水病療之近服水藥經五十餘日望漸痊愈日復增加奄致殞歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云爾出第二十五卷中

廣濟療蠱毒方服此升麻散三四日後即服前光砂丸方

升麻　桔梗　栝樓各五兩

右三味擣爲散以熟湯洗所患人陰中不淨濃汁服方寸匕日二服漸加至二匕内消不利忌粘食猪肉出第四卷中

肘後療中蠱毒諸方人有養畜蠱毒以病人凡詐法中蠱狀令人心腹切痛如有物齧或吐下血不即療之食人五藏盡即死矣欲知是蠱與非當令病人唾水沈者是浮者非也小品文仲備急集驗千金并翼同

又欲知蠱主姓名方

取皷皮一片燒灰末以飲服病人須臾自當呼蠱主姓名可語便即去病愈矣亦有以蛇蜒合作蠱毒著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥江南山間人此不可不信之

又方

以蘘荷密著病人卧席下亦能令呼蠱主姓名也文仲備急千金并翼同出第三卷中

小品療蠱方

鼓皮廣五寸長一尺　薔薇根五寸如足拇指大細切本方云茛菪根

右二味以水一升清酒三升煑取一升頓服之當下蠱即愈千金古今録驗同千金治蠱吐下血

又方

土瓜根大如拇指長三寸切以酒半升漬一宿一服當吐下古今録驗同

又方

皂莢三長一尺者炙去皮子美酒一升漬一宿去滓頓服古今録驗范汪同肘後去以酒五升分三服

又方

取蘘荷根擣爲末以飲服方寸匕古今録驗同

千金犀角丸療蠱毒百病腹暴痛飛尸惡氣腫方

犀角末　羚羊角末　鬼臼　桂心各四錢匕量

天雄（炮） 莽草（炙） 眞珠（研） 雄黃（研各一兩）

赤足蜈蚣（五節炙） 麝香（研半兩） 巴豆（五十枚去皮心熬）

貝齒（燒灰五枚） 射肉（如雞子黃三枚）

右十三味各擣合篩之以蜜和爲丸如小豆大服一丸不知增一丸卒得腹中痛飛尸服如大豆二丸若惡氣腫以苦酒和以塗之甚良以絳囊盛藥繫男左女右臂辟惡可以備急療萬病也忌猪雞蘆笋生葱冷水等崔氏古今録驗范汪同出第二十五卷中

千金翼療蠱毒方

槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煎取一升空腹服之即吐蠱出也并療蠱下血出第十五卷中

崔氏療蠱方

黃瓜樓根乾者二兩擣以綿裹酒一升漬且去滓溫

服之少時即吐利蠱即出出後煑粥飲服一兩盞吐利即斷不斷即煑人參甘草炙生薑各一兩服之此根唯山南者好出第三卷中

備急療蠱方

取白鴿身毛糞燒灰以飲和服之良

又療蠱方人家雖藏此方而不知如此効驗

擣生栝樓根取汁一升醬汁少許和温服之須臾吐蠱出試驗並出第十六卷中

必効療蠱毒大神驗方

大戟　桃白皮（東引者以火烘之）　斑猫（去足翅熬等分）

右三味擣篩爲散以冷水服半方寸匕一服其毒即出未出更一服蠱並出李饒州法云奇効若以酒中得則以酒服若食中得以飲服之崔氏千金同（肘後云猫一分桃皮大戟各二分和棗核大米清飲服吐出）

蠱十日不差更一服千金崔氏云服八捻

又方　胡荽根擣取汁半升和酒服之立下

又方

取未鑽相思子二七枚擣碎爲末煖水半盞和攪頓服之令盡即當欲吐抑之勿吐若耐不得即大張口吐之其毒即出出訖服稀粥勿食諸肉輕者但服七枚差無問年月深淺非常神効勿輕之

又試蠱法

取銀匙若筯或釵含之經宿色黒即是不黒者非

出第三卷中

古今録驗療蠱方

巴豆十枚去心皮熬　豉半升熬　釜底墨方寸匕

右三味擣篩爲散清旦以酒服如簮頭大小行蠱主當自至

門勿應之去到家立自知其姓名忌蘆笋猪肉等

又雄黄丸主蠱毒中藥欲死方

雄黄研　朱砂研　藜蘆炙　馬目毒公

巴豆去心皮熬各二分　皂莢炙去皮子二分　莽草二分炙

右七味擣篩以蜜丸如大豆許服三丸當轉下先利清水次出蛇等當煩悶者依常法可用鴨羹補之忌生血猪肉冷水蘆笋狸肉

又療中蠱毒方

取牡丹根擣末服一錢匕日三服至良忌胡荽范汪同

又療中蠱孔合方

以猪膽導下部至良肘後集驗范汪同並出第四十五卷中

蠱吐血方一十首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器皿盛之任其相噉食餘一存者名爲蠱能害人食人腑藏其狀心切痛如被物齧或鞕面目青黃病變無常是先傷於膈上則吐血也不即治之食藏腑盡則死出第二十五卷中

肘後療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方

蒨根（三兩） 蘘荷根（三兩）

右二味㕮咀以水四升煑取二升去滓頓服即愈又當自知蠱主姓名小品崔氏文仲備急古今錄驗同

又方

巴豆（一枚去心皮熬） 豉（三粒） 釜底墨（方寸匕）

右三味擣分作三丸飲下一丸須臾當下蠱毒不下更服一丸小品必効集驗文仲備急范汪同並出第三卷中

范汪療中蠱吐血方

又方

麥麪二升熬以水服之令盡當下蠱

又方

苦瓠一枚以水二升煑取一升分服當吐蠱如蝦蟇科斗之類苦瓠毒可臨時量用之肘後千金小品文仲備急古今録驗同千金云苦瓠一分治下血

又方

生桔梗擣取汁服二三升日三服牛膝根亦得並出第十四卷中

文仲療中蠱吐血方

羖羊皮方三寸得敗鼓皮亦佳　苦參　蘘荷根三兩　黄連二兩　當歸二兩

右五味切以水七升煎取二升分三服忌猪肉冷水備急集驗同一方有苦瓠

又方

取桑木心剉一斛於釜中以水淹之令上有三寸煑取二斗澄取清又微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒崔氏集驗古今録驗同

又方

雄黄研 釜月下黄土 獺肝炙各如棗 斑猫十四枚去足翅熬

右四味擣末以酪漿服之分為三四服則吐蝦蟇小品同古今録驗方有大黄如棗大或吐蝦蟇及蛇等物餘同范汪亦同

崔氏療中蠱吐血方

雄黄研 丹沙研 藜蘆炙各一兩

右三味擣篩為散旦以井花水服一刀圭當吐蠱毒忌生血物狸肉肘後集驗同凡蠱有數種而人養作者最多也郡縣有名章者尤甚今東有句章章安故鄉南有豫章

無村不有餘縣亦有而不能如此之甚耳非唯其餘飲食不可噉乃至目色之已亦人類此輩小易療復有自然飛蠱狀如鬼氣者難療此諸種得眞犀角麝香雄黄爲良藥人可常帶此亦預防之易有蠱卦又子產所說並以器皿中蟲爲蠱今省煩皿上安一虫字或作虫邊大非體也並出第四卷中

小品療中蠱心痛吐血欲死方

鹽一升淳苦酒一升煑令消和一服立吐蠱毒出巳

用良驗肘後文仲備急古今録驗同出第四卷中

蠱下血方九首

病源蠱是合聚蟲蛇之類以器血盛之任其自相食噉餘留一存者爲蠱能變化爲毒害人有事之以毒害多因飲食內行之人中之者心腹懊痛煩毒不可忍食人五藏下血瘀黒如爛雞

肘出第二十五卷中

小品療蠱毒腹痛注下赤血躑躅散方

羊躑躅　乾薑　藜蘆熬　附子炮

巴豆去心皮熬　野葛皮　肉桂　丹沙研

雄黃研　蜈蚣各炙一分

右十味擣爲散以水服一刀圭不知加一粟米忌猪肉蘆笋生血物生葱狸肉古今録驗同

又療蠱下血欲死方

薔薇根剉一升　牛膝五株　連翹子一升　朧一彈子許

右四味切以水四升煮取三升分三服即愈古今録驗同

又療諸蠱大便下血日數十行方

巴豆二十七枚去心皮熬　藜蘆炙　附子炮　芫青去足翅熬

礬石各二分熬汁盡

右五味擣下篩別研巴豆如膏和相得以綿裹一大豆許內下部中日二三愈忌猪肉蘆笋狸肉千金古今錄驗同並出第四卷中

千金凡忽患下血以上件方療更增劇者此是中蠱其下血狀如鴨肝腹中絞痛急者此方主之

蒨根　升麻　犀角屑各三兩　地榆

白蘘荷各四兩　桔梗　黃蘗　黃芩各二兩

右八味切以水九升煑取二升半分三服忌猪肉

又凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢藥處之此大非也

又療中蠱毒吐血下血皆如爛肝令人心腹絞切痛如有物齧若不即療令人五藏盡乃死驗之法欲知是蠱令病人唾水中沈者是蠱浮者非蠱也方

槲木北陰白皮　桃根皮　蝟皮（炙一方寸匕）

亂髮灰（一方寸匕）　生麻子（汁五升）

右五味先煮槲皮桃根取濃汁一升和麻子汁亂髮灰蝟皮末等令病者少食　服一升須臾著盆水以雞翮擿吐水中如牛涎犢胎及諸蠱毒之物出第二十五卷中

千金翼療蠱毒下血方

蝟皮燒灰以水服方寸匕當吐蠱毒出第十五卷中

崔氏療中蠱下血及毒下羖羊皮湯方

羖羊皮（方三寸炙）　蘘荷根（四兩）　苦參　黃連（各二兩）

當歸　升麻　犀角（屑各三兩）

右七味切以水九升煮取三升分三服無蘘荷根以茜根代之忌豬肉冷水等物

又療中蠱毒瀉血日夜無度腹痛不可忍方

取白蘘荷葉四五枚私内著病人眠卧處席下勿令病人知之若爲蠱毒所傷則不肯在上眠即知是蠱毒爲病用皂莢三挺炙去皮子打碎用極醶醋四𣁽於甆器中候日正午時漬皂莢又以新白布三尺蓋上布上又攅一口食刀正對病人眠牀下安之至來日午時取藥用蓋藥布濾去滓分三服每服相去如人行十里久若不肯服可將鍼刺兩手大拇指端甲亦不勞深其鍼且勿拔出病人當自服藥蠱毒或吐或大便中出除其血即斷腹痛亦除此方用皆驗並出第三卷中

古今録驗療卒中蠱下血如雞肝者晝夜下石餘血四藏悉損唯心未毀或乃鼻破待死方

桔梗擣末以酒服方寸匕日三不能下藥以物揭口

開灌之心中當煩須臾自靜有頃下至服七日止當
食猪肝臛以補之忌猪肉出第四卷中

五蠱方二十二首

千金太上五蠱丸主百蠱吐血傷中心腹結氣或堅氣塞咽喉語聲不出短氣欲死飲食吐逆上氣去來無常狀如鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒得心痛上叉胷脅痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主之方

雄黃研　椒目熬　巴豆去心皮熬　鬼臼
莽草炙　芫花熬　眞珠　藜蘆炙
礜石各四分燒　獺肝炙二分　附子炮去皮五分　斑猫三十枚去翅足熬
蜈蚣三枚炙

右十三味擣末蜜和更擣一二千杵每服如小豆一丸餘密封勿泄十丸爲一劑如不中病後日增一丸以下利爲度當下蠱種

種狀貌不可具載下七日後將息服一劑三十年百病盡除忌五辛猪肉冷水生血物狸肉蘆笋等

又方

酒服桔梗犀角末方寸匕日三服不能自服搗口與藥下心中當煩須臾自靜有頃下至七日止當食猪脾以補之並出第二十五卷中

崔氏療五蠱毒方一曰蛇蠱食中得之咽中如有物嚥之不入吐之不出悶亂不得眠心熱不能食方

服馬兜苓根即吐出又服麝香方寸匕亦自消或吐出也

二曰蜣蜋蠱得之胷中忽然或哽入咽怵怵如蟲行欬而有血方

服獾肫脂即下或吐或自消也

三曰蝦蟇蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方

服車脂半升以來即出

四曰科斗蠱同上療法甚驗

五曰草蠱術在西凉以西及嶺南人多行此毒入人咽刺痛求死方

服甘草藍汁即自消

又方

五蠱共一法療之但取產婦胎切之暴乾爲散水和

服半錢匕五毒自消

又方

含升麻𠻳汁

又方

五蠱都服馬莧苓苗似蘿摩草形正上取雞子大擣

爲散服半錢匕或至一匕五蠱毒之病多在喉中常

湏記之或小醫不識此病言謂冷動或浪稱是注灸

刺浪服諸藥枉死也此由醫生未經歷故也宜令好審

別之並出第三卷中

古今錄驗五蠱湯方

犀角三兩屑　蘘荷根　黃連　絳草

當歸各二兩　羚羊皮方二寸炙

右六味切以水七升煑取二升分爲三服忌猪肉冷水

又五蠱下利去膏血赤䍐丸方

芫花一升　巴豆一百枚去心皮熬　赤䍐方圓一寸

右三味擣篩以蜜爲丸更擣丸如胡豆服一丸如下利不止以清粥汁止之不下小增之欲令陰除不令大下忌蘆笋猪肉

范汪同並出第四十五卷中

蠱注方三首

病源蠱注者住也言其病遲滯停住死又注易傍人也蠱者是聚蛇蟲之類以器皿盛之令其自相噉食餘有一箇存者爲蠱也而能變化人有造作欽事之者以毒害於他多於飲食内而

行用之人中之者心悶腹痛其食五藏盡則死有緩有急急者倉卒十數日便死緩者延引歲月遊走腹内常氣力羸備骨節沈重發則心腹煩懊而痛令人所食之物亦變化爲蠱漸侵食腑藏盡而死死則病流注染著傍人故爲蠱注也出第二十四卷中

范汪療蠱注百病癥瘕積聚酸削骨肉大小便不利卒忤遇惡風臚脹腹滿淋水轉相注殫門盡户延及男女外孫醫所不能療更生十七物紫參丸方

紫參　人參　半夏洗　藜蘆

代赭　桔梗　白薇　肉蓯蓉各三分

石膏一分　大黃一分　牡蠣一分熬　丹參一分

蝦蟇炙　烏頭四分炮　狼毒十分　附子五分炮

巴豆七十枚去心皮熬

右藥擣篩蜜和爲丸以飲下如小豆一丸日三服老小以意

減之蜂𧎀所螫以塗其上神良忌猪羊肉冷水出第十四卷中（一方無煆𧎀有乾薑四分）

小品雄黄丸療蠱注四肢浮腫肌膚消索欬逆腹大如水狀漏泄死後注易家人方一名蠱脹方

雄黄（研） 巴豆（去心皮熬） 莽草（炙） 鬼臼（各四分）

蜈蚣（三枚炙）

右五味擣篩爲末蜜和更擣三千杵藥成密器封之勿令泄氣宿勿食服如小豆一丸不知加一丸當先下清水蟲長數寸一尺蛇或如壞雞子或白如膏下訖後作葱豉粥鴨羹補之忌生魚生菜猪肉蘆笋冷水煖食將養也千金同出第十四卷中

集驗療鬼注蠱注毒氣變化無常鮫魚皮散方

鮫魚皮（鱒魚皮是） 犀角（屑） 麝香（研）

龍骨 丹砂（研） 雄黄（研） 蘘荷根

麀角炙各一分 蜈蚣一枚炙 椒一分汗 乾薑一分

貝子十枚 雞舌香一分

右十三味擣篩爲散心酒服一錢匕日三服忌生血物出第一卷中

蠱毒雜療方五首

小品療蠱似蚍方

雄黃研 麝香研

右二味各如大豆許取生羊肺如指大以刀開取雄黃等末以肺裹吞之崔氏集驗古今錄驗同

又療人食菜及果子中蛇毒方

大豆末以酒漬取汁半升服之又以雞血和匕真鐵精吞如梧子大一丸古今錄驗同

又療有人食新變魚取飽中毒病心腹痛心下堅發熱煩寃欲

得水沃身動搖如魚得水狀有人訴病云是蟲家云野中相承無此毒不作蠱療之遂死並出第四卷中

千金療人得藥雜蠱方

斑猫（六枚去足翅熬） 桂心（一片如指大） 釜月下土（如彈丸大） 藜蘆（如指大炙）

右四味擣散水服一錢匕下蟲蛇蝦蟇蜣蜋白蟲忌生葱狸肉

又療有人中蠱毒腹內堅如石面目青黃小便淋瀝變狀無常方

羖羊皮（方廣五寸炙） 犀角（一兩屑） 芍藥（一兩） 黃連（二兩本方一兩）

梔子人（七枚） 蘘荷根（四兩半） 牡丹皮（一兩）

右七味切以水五升煑取一升半去滓分温再服忌猪肉冷水

翼古今録驗同出第二十五卷中

古今録驗療食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方

爐中取鐵精細研別擣烏雞肝和之丸如梧子大以

酒服三九日三服甚者不過十日愈微者便愈肘後
崔氏同出第四十五卷中
猫鬼野道方三首
病源猫鬼者云是老狸野物之類變爲鬼或而依附於人人畜事之猶如事蠱以毒害人其病狀心腹刺痛食人腑藏吐血痢血而死又野道者是無主之蠱也人有畜事蠱以毒害人爲惡既積乃至死滅絶其蠱則無所依止浮游田野道路之間有犯害人者其病發猶是蠱之狀但以其於田野道路得之故謂之野道並出第二十五卷中
千金療猫鬼野道病歌哭不自由方
五月五日取自死赤蛇燒作灰研井花水服方寸匕日一服
又療猫鬼眼見猫狸并耳有雜所聞方

相思子 蘇子 巴豆去皮心熬各一枚 朱砂末

臘各四銖

右五味擣作丸取麻子許含之即以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中沸即盡火上作十字其猫鬼並皆死矣忌猪肉蘆笋生血物出第二十六卷中一方有峭粉

古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼鹿角屑散方

鹿角屑擣散以水服方寸匕病者即言實也出第四十五卷中

自縊死方一十五首

病源人有不得意志者多生忿恨往往自縊以繩物繫頸自懸挂致死呼為自縊若覺早雖已死徐徐捧下其陰陽經絡雖暴擁閉而藏腑眞氣故有未盡所以猶可救療故有得活者若見其懸挂便忽遽截斷其繩舊云則不可救此言氣已擁

閉繩忽暴斷其氣雖　而奔迸運悶則故氣不能還即不復得生又云自縊死旦至暮雖已冷必可活暮至旦則難療此謂其晝則陽盛其氣易通也夜則陰盛其氣難通也又云夏則夜短又熱則易活又云氣雖已斷而心微温一日以上猶可活也出第二十三卷中

肘後葛氏療自縊死心下尚微温久猶可活方

徐徐抱解其繩不得斷之懸其髮令足去地五寸許塞兩鼻孔以蘆管内其口中至咽令人噓之有頃其腹中礱礱轉或是氣通也其舉手撈人當益堅捉持更遞噓之若活了能語乃可置耳若不得懸髮可中分髮繞兩手牽弦耳

又方

皂莢末葱葉吹其兩鼻孔中逆出復内之千金備急

文仲同

又方

以蘆管吹其兩耳極則易入吹取活乃止若氣通者以少桂湯稍稍嚥之徐徐乃以少粥清與之並出第三卷中

仲景云自縊死旦至暮雖已冷必可療暮至旦小難也恐此常言陰氣盛故也然夏時夜短於晝又熱猶應可療又云心下若微温者一日以上猶可活皆徐徐抱解不得截繩上下安被卧之一人以脚踏其兩肩手小挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胷上微重之一人摩捋臂脛屈伸之若已　但漸漸強屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之須令可少桂心湯及粥清含與之裁令濡喉漸漸能嚥乃稍止耳向時兼令兩人各以管吹其兩耳彌好此最善無不活者普

療之肘後備急文仲古今録驗同

備急方

以罽衣若氍氀厚氈物覆其口鼻抑之令兩人極力吹其兩耳一炊頃可活也肘後千金文仲集驗小品同

又方

懸牽其頭髮塞兩耳勿令通氣以葱葉刺鼻中兩人極力痛吹之齧其兩脚踵　即活亦可塞鼻而吹口活也小品古今録驗同

范汪療自縊死方

懸其髮令足裁至地一時許即活

又方

急手掩其口鼻勿令內氣稍出二時許氣猥至即活備急文仲古今録驗肘後同

又方

以絹急絞身體令堅以車牛載行三十里許使人於車上行踏肩引髮如耳

又方

以松子油内口中令得入咽中則便活

千金療自縊死方

以藍青汁灌之又極須安定身心徐徐緩解愼勿割繩抱取心下猶温者刺雞冠血滴口中即活男用雌雞女用雄雞

又方

雞屎白以棗許酒半盞和灌之口鼻中即活

又方

梁上塵如大豆各内一筒中四人各一筒同時吹兩耳鼻中極力吹之即活

又方

尿鼻口眼耳中并捉頭髮一撮如筆管大掣之立活

並出第二十六卷中

删繁療五絶死方

一曰自縊二曰牆壁所迮三曰溺水四曰魘魅五曰産乳皆取半夏一兩擣篩吹一大豆内鼻孔中即活心下温一日者亦可活千金同

熱暍方七首

病源夏月炎熱人多冒涉途路熱毒入内與五藏相并客邪熾盛鬱瘀不宣致隂氣卒絶陽氣暴擁經絡不通故奄然悶絶謂之暍也然此乃外邪所擊眞藏未壞若便遇療救氣宣則蘇也夫熱暍不可得冷得冷便死此謂外卒以冷觸其熱藴積於内不得宣發故也又冒熱困乏候人盛暑之時觸冒大熱熱毒之氣

入藏則悶鬱冐至於困乏也並出第二十三卷中

肘後夏月中熱暍死凡中暍死不可使得冷得冷便死療之方

以屈革帶繞暍人臍使三四人尿其中令溫亦可用泥土屈草亦可扣瓦椀底若脫車釭以著暍人臍上取令尿不得流去而已此謂道路窮急無湯當令人尿其中仲景云欲使多人尿取令溫若有湯便可與之仲景云不用泥及車釭恐此物冷暍既在夏月得熱土泥暖車釭亦可用也備急文仲集驗小品千金同

又方

炙兩乳頭各七壯千金同

又方

取道中熱塵土以積暍人心下多之爲佳少冷即易通氣也千金同

又方　擣昌蒲汁飲之一二升

又凡此療自經溺暍之法並出自張仲景爲之其意理殊絕殆非常情所及本草之所能開悟實極救人之大術矣傷寒家別復有暍病在上仲景論中非此遇熱之暍文仲同出第七卷中

千金療熱暍方

可飲熱湯亦可用少乾薑橘皮甘草煮飲之稍稍嚥勿頓使飽但以熱土及熱灰土擁其上佳古今録驗同

文仲療夏月暍死方

濃煮蓼汁灌三升不差更灌之肘後千金同

古今録驗療熱暍方

令人口噓心前令暖易人爲之肘後同

溺死方九首

病源人爲水所沒溺水從孔竅入灌注腑藏其氣擁閉故死若

早拯救得出即泄瀝其水令氣血得通便得活又云經半日及一日猶可療氣若巳絶心下暖者亦可活出第二十三卷中

肘後療溺死一宿者尚可活方

以皂莢末綿裹内下部中須臾出水則活古今録驗同

又方

倒懸解衣挑去臍中垢極吹兩耳即活集驗千金小品文仲備急同

又方

倒懸死人以好酒灌鼻中立活千金備急文仲古今録驗同

又方

取甕傾之以死者伏甕上令口臨甕口然以蘆火二七把燒甕中當死人心下令煙出小入死者鼻口中

鼻口中水出盡則活蘆盡更益爲之取活而止常以手候死人身及甕勿令甚熱冬天當令火氣能使死人心下足得煖若卒無甕可就岸穿地令如甕燒之令煖乃以死人著上亦可用車轂爲之當勿隱其腹令得低頭使水出并熬灰數斛以粉身濕即易千金同

小品療溺死若身尚暖者方

取竈中灰兩石餘以埋人從頭至足出七孔即活備急千金肘後同

又方

便脱取暖釜覆之取溺人伏上腹中出水便活也肘後同並出第十卷中

千金療落水死方

以竈中灰布地令厚五寸以甑側著灰上合死人於

散上使頭小垂下炒鹽二方寸匕內管中吹下孔中即
當吐水因去甑下以死人著灰中擁身使出鼻口即治矣

又方

掘地作坑中熬灰數斛內坑中下死人覆灰濕徹即
易之勿令灰熱煿人冷即易之半日即活

備急療溺死方

屈死人兩脚著人肩上以死人背向生人背負持走
吐出水便活千金肘後文仲集驗小品古今錄驗同
出第八卷中（肘後云亦治凍死）

凍死方一首

病源人有在途路逢凄風苦雨繁霜大雪衣服霑濡冷氣入藏
致令陰氣閉於內陽氣絕於外榮衛結澀不復流通故致噤絕
而死若早得救療血溫氣通則生又云凍死一日猶可活過此即不

療出第二十三卷中

肘後療冬天墮水凍四肢直口禁裁有微氣出方

以大器中多熬灰使煖囊盛以薄其心上冷即易心暖氣通目則得轉口乃開可溫尿粥清稍稍含之即活若不先溫其心便持火炙其身冷氣與火相搏則死集驗備急文仲千金古今錄驗同

入井塚悶方二首

肘後云此事他方少有其說且人爲之寡不俟別條今於水凍之後尋此是地氣歊蒸蓋亦障霧之例服諸解毒犀角雄黃麝香之屬豉豆竹瀝升麻諸湯亦應爲佳出第三卷中

小品療入井塚悶冒方

凡五月六月井中及深塚中皆有伏氣入中令人鬱悶殺人如其必須入中者先以雞鴨雜鳥毛投之直下至底

則無伏氣毛若徘徊不下則有毒氣也亦可內生六畜等置中若有毒其物即死必須入不得已當先以酒若無以苦酒數升先灑井塚中四邊畔停少時然後可入若覺中有此氣鬱悶奄奄欲死者還取其中水灑人面令飲之又以灌其頭及身體即活若無水取他水用也肘後千金古今録驗同出第十卷中

千金療入井塚毒氣方

取他井中水灑身上至三食頃便活若東井取西井南井取北井中水用之出第二十六卷中

外臺祕要方卷第二十八

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔　校勘

外臺秘要方

二十九

墜墮金瘡等

外臺秘要方卷第二十九 墜墮金瘡等四十七門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

從高墮下方三首

千金療丈夫從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷絕崩中皆主之方

阿膠炙　乾薑各二兩　艾葉　芍藥各三兩

右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服羸人三服女人產後崩中傷下血過多虛喘腹中絞痛下血不止服之悉愈

又療從高墮下瀉血及女人崩中方

當歸二分　大黃一分

右二味擣爲散酒服方寸匕日三范汪同並出第二十六卷中

千金翼膠艾湯主男子傷絶或從高墮下傷五藏微者唾血甚者吐血及金瘡經內絶者方

阿膠炙　艾葉　芍藥　乾地黃各三兩

乾薑　當歸　甘草炙　芎藭各二兩

右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲死腹痛下血

不止者服之良忌海藻菘菜蕪荑出第十九卷中

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

療濟療從高墮下內損瘀血消血散方

蒲黃十分 當歸 乾薑 桂心各八分

虻蟲四分去足翅熬 大黃十二分

右六味擣爲散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一匕半

忌生葱猪犬肉出第四卷中

肘後療卒從高墮下瘀血振心面青短氣欲死方

取胡粉一錢匕以水服之備急文仲同

又方

煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳千金

備急文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以淳酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳

又方

生乾地黃二兩熬末以酒服之

又方

生地黃擣取汁服一升或二升尤佳

又方

烏鴉翅羽二七枚燒末酒和服之即當吐血也如得左羽尤佳

又療從高墮下若為重物所頓笮得瘀血方

豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓内蒲黃三合投中攪調頓服之不過三四服神良刪繁小品文仲備急集驗千金同

又方

烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消文仲備急千金同

又方

取茅連根葉擣絞取汁一二升服之不過三四服愈冬用根

又方

刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黄二三匕日四五服良

又方

末鹿角酒服三方寸匕日三千金同

又方

取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕並出第三卷中

深師療從高墮下傷内血在腹聚不出療下血方

取好大黄二兩 桃人三十枚去尖皮兩人者

右二味擣以水五升煑取三升分爲三服去血後作地黄酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虚極殺人也

又療墮落瘀血桃枝湯方

桃枝（一握中指長剉） 芒消（五分） 大黄（四兩） 當歸

甘草（炙） 桂心（二兩炙） 虻蟲（二十枚去翅足熬）

桃人（五十枚去尖皮熬） 水蛭（二十枚熬）

右九味㕮咀以水八升煑取三升去滓温分三服内消忌海

藻菘菜生葱等

又療墮落積瘀血消血理中膏方

大黄（二兩） 猪脂（二斤） 桂心（一兩） 乾薑（一兩）

當歸（二兩） 通草 亂髮（各兩）

右七味切以膏煎髮令消盡擣藥下篩須令絶細下膏置

地内諸藥攪匀微火煎之三上三下即藥成去滓以好酒服一

兩日二服一方不去滓是生子膏亦佳並出第二十六卷中

千金療從高墮下及被木石所迮或因落馬凡是傷損血瘀凝積

氣急欲絶無不療方

淨土五升蒸之令極熱分半以故布數重裹之熨病上勿令大熱恐破肉俟冷即易之以痛止即已但有損傷並以此法療之神効已死不能言者亦活三十年亦差

又療從高墮下損有瘀血方

蒲黃八兩　附子一兩炮去皮末

右二味爲散以酒服五六錢匕日三不知增之並出第二十六卷中

近効土質汗療折傷内損有瘀血每天陰則疼痛兼療產婦產後諸疾神効方（開寶本草云質汗主金瘡傷折瘀血内損補筋肉惡血下血婦人產後諸血並酒消服之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之今以益母成煎故謂之土質汗也）

三月採益母草一重擔一名夏枯草

右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令

水盡則用手擾斷可長五寸以來勿用刀切即置鑊中量水兩石以來令草水深三二寸則縱火煎候益母草糜爛水又減耗三分減二分以上則漉去草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日以下以綿濾取清汁盆中滓澱並盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服和羮粥喫並得如遠行不能將稀煎去即更鍊令稠硬停作小丸服之七日内則疼痛漸瘳二七日平復或有産婦惡露不盡及血運一兩服即差其藥兼療風益心力無所忌

鄭長史處吏部李郎中服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方

故馬氊兩段其氊欲得故膩者於鐺中以酒五六升著一抄鹽煑令熱即内氊於鐺中看氊熱便用裹所損

處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即止
仍服止痛藥散即漸差
又療男子虛勞墜傷內損吐血不止欲死面目黒如漆者悉主
之方
黃耆　芎藭　當歸　芍藥各三兩
甘草三兩炙　生薑八兩
右六味切以水九升煑取二升五合去滓分溫三服服別相
去六七里不利忌生冷海藻菘菜猪魚並出第四卷中
近効療墜損方
生地黃一斤分爲三分
右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓令
温煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之
墜落車馬方六首

肘後療忽落馬墮車及墜屋坑岸腕傷身體頭面四肢内外切痛煩躁叫喚不得卧方

急覓鼠矢無問多少燒擣末以猪膏和塗封痛處急裹之仍取好大黄如雞子大以亂髪裹上如鴨子大以人所裁白越布衫領巾間餘布以裹髪外乃令火燒煙斷擣末屑薄以酒服日再三無越布餘布可强用常當預備此物爲要備急集驗古今録驗同出第三卷中

千金療凡人墜落車馬心腹積血唾吐血無數方

乾藕根末酒服方寸匕日三如無取新者擣取汁服之尤妙禁口味物

又療墮馬及樹崩血瘀血腹滿短氣方

大豆五升水一斗煑得二升半去豆頓服劇者不過

三服並出第二十六卷中

千金翼療落馬墮車及諸傷腕折臂脚疼痛不止方

黃耆　芍藥（各三兩）　乾地黃　當歸

附子（炮）　通草　續斷　桂心

乾薑（各二兩）　蜀椒（一合汗）　烏頭（半兩炮）

右十一味擣爲散先食酒服五分匕日三忌猪肉冷水生葱蕪荑出第十九卷中（本方有大黃一兩又云服方寸匕）

救急療隊墜馬落車被打傷腕折臂呼喚痛聲不絕服此散呼噏之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸（熬令香）　桂心　甘草（炙）　蜀椒（汗各二分）

芎藭（六分熬）　附子（炮）　澤蘭（熬各一分）

右七味擣爲散酒服方寸匕日三小兒被奔車馬所損裂其膝皮肉决見骨即絕死小蘇啼不可聽聞服之便眠十數日

便行走其神驗如此忌海藻菘菜生葱猪肉冷水千金翼深師同出第六卷中

近效療墮馬內損方

取䕡藥一小兩擣爲末牛乳一盞煎五六沸和服李諫議去䕡藥以羊肉汁和服一日內不用喫菜極效出第一卷中䕡藥見陳藏器本草

折骨方三首

肘後療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風卧濕及多自扇若中風則發痓口噤殺人若已中此覺頸項強身中急束者急服此方

竹瀝飲三二升若口已噤者可以物拗開內之令下禁冷飲食及飲酒竹瀝卒燒難得多可合束十許枚併燒中央兩頭承其汁投之可活小品備急文仲古今録驗同出第三卷中

千金療腕折骨痛不可忍方

取大麻根葉無問多少擣取汁飲一小升無生青者以乾者煑取汁服亦主墮墜打𢶒瘀血心腹脹滿短氣良出第二十六卷中

救急療骨折接令如故不限人畜也方

取鈷鉧上柯魯切下毋郎切溫器也銅錯取末仍擣以絹篩和少酒服之亦可食物和服之不過兩方寸匕以來任意斟酌之出第九卷中

傷筋方三首

千金療被傷筋絕方

取蟹頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

又方

擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血並出第二

十六卷中

救急續斷筋方

取旋復草根淨洗去土擣量瘡大小取多少薄之日一易之以差爲度必効同出第九卷中

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌方

筋骨俱傷方七首

爛擣生地黃熬之以裹折傷處以竹簡編夾裹之令遍病上急縛勿令轉動一日可十度易三日即差千金删繁備急文仲古今録驗同

又方

取生括樓根擣之以塗損上以重布裹之熱除痛止備急同

又方

擣大豆末合猪膏和塗之乾即易之並出第三卷中

深師療折踠傷筋骨槐子膏方

槐子中人　秦艽　白朮　續斷各一兩

桂心六分　巴豆十枚去皮心熬　大附子一枚炮

右七味㕮咀以酢苦酒漬槐子等一宿以成鍊猪脂二斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓温酒服杏子許一枚日三并塗傅忌生葱猪肉冷水蘆笋桃李雀肉等出第二十卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方

生地黃多少熟擣熬以裹傷骨處頻易古今録驗同

又方

豉三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶古今録驗同

又方

鍊

乾地黃　當歸　獨活　苦參各二兩

右四味擣末以酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

折踠方一首

深師卓氏膏療折跌腕蹐方

大附子四枚生用去皮

右一味切以鍊成猪脂一斤以三年苦酒漬之三宿以脂膏煎之三上三下膏成欲傅膏時以木匕摩之亦療卒中風口噤頸項強出第二十六卷中

折踠瘀血方四首

千金療折踠瘀血方

虻蟲去足翅熬　牡丹等分

右二味爲散以酒服方寸匕血化成水

又方

大黃六兩　桂心二兩　桃人六十枚去皮

右三味切以酒六升煑取三升分三服當下血差並出第二十六卷中

千金翼療折踠瘀血方

菴蕳草汁飲之亦可作散服出第十九卷中

古今錄驗療折踠瘀血方

蒲黃一升　當歸二兩

右二味擣散酒服方寸匕日三先食服之千金同出第二十四卷中

蹉跌方三首

深師療蹉跌補絕復傷地黃散方

乾地黃十分　桂心　乾薑　芎藭

甘草炙　當歸各三分　芍藥五分

右七味擣爲散先食以酒服方寸匕日三服忌海藻菘菜生葱蕪荑

又方

大豆熬令黑 大黃各二兩 桂心一兩

右三味擣爲散分爲三劑酒和服忌生葱又大黃一兩生地黃三兩切熬以水酒二升煮取一升頓服之差出第二十六卷中

范汪蹉跌膏兼療金瘡方

當歸 續斷 附子去皮 細辛

甘草炙 通草 芎藭 白芷

牛膝各二兩 蜀椒二合

右十味㕮咀以猪膏二斤煎以白芷色黃膏成絞去滓日再以摩損處忌生菜猪肉冷水海藻菘菜等出第十卷中

肘後療若爲人所打舉身盡有瘀血方

被打有瘀血方一十三首

刮青竹皮二升　亂髮如雞子大四枚燒灰　延胡索二兩

右三味擣散以一合酒一升煎三沸頓服日三四備急范汪同

又療被打擊有瘀血在腹内久不消時時發動方

大黃二兩　乾地黃四兩

右二味擣散爲丸以酒服三十丸日再爲散服亦妙備急文仲小品范汪等同並出第三卷中

范汪療被打有瘀血方

大黃二兩　桃人去尖皮熬　䗪蟲各二十一枚去足翅熬

右三味擣蜜丸四丸即内於酒一升中煎取七合一服之備急肘後同

又方

薑葉一升切　當歸三兩

右二味爲末以酒服方寸匕日三並出第十卷中

備急若久血不除變成膿者宜此方

大黃三兩　桃人三十枚去尖兩人碎

右二味切以水五升煮取三升分三服當下膿血不盡更作文

仲肘後同

又若久宿血在諸骨節及脅肋外不去者方

牡丹　䖟蟲去足熬等分

右二味擣末以酒服方寸匕血化成水忌胡荽小品文仲千

金并翼古今錄驗同

又方

大黃如雞子一枚　蚯蚓矢一合

右二味酒半升煮取三沸服之

又方

鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之小品文仲肘後同出第八卷中

千金療被打傷破腹中有瘀血方

蒲黃一升　當歸　桂心各二兩

右三味擣散以酒服方寸匕日三夜一不能酒飲服之忌生葱劉消子方

又方

擣蒀莙子末以傅瘡上

又夫有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草一兩炙　茯苓二兩　杏人五十枚去皮尖碎

右三味切以水一斗煮取三升分爲三服忌海藻菘菜酢物范汪同

又被毆擊損傷聚血腹滿方

豉一升以水二升煮三沸去滓再服不差重服之范汪同並出第二十六卷中

張文仲劉涓子療被打腹中瘀血白馬蹄散方

白馬蹄燒令烟斷擣末以酒服方寸匕日三夜一亦療婦人瘀血消化爲水肘後備急千金同

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方

用新熱羊肉敷之

又方

大豆黃末和敷之

又方

牆上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

又方

釜月下土細末塗之

又方

羊皮上卧之

又方

炙肥猪肉令熱搨上又炙猪肝貼之亦佳出第二十六卷中

文仲療被打青腫方

以水磨桂塗之赤則以牆中朽骨磨塗之則平復也

梁都督侍中傳効也出第八卷中

許仁則療吐血及墮損方三首

許仁則論曰此病有兩種一者緣墮打損內傷而致此病一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墮墜內損大便血等諸

舊脫今據程本補

方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺心中悄悄似欲取吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七味湯桑白皮八味散療之方

雞蘇五兩 生地黃切 青竹茹各一升 生薑

桑白皮各六兩 小薊根切六合 生葛根切六合

右藥切以水九升煮取三升去滓分溫三服服別相去如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服之

桑白皮散方

桑根白皮六兩 生薑屑六兩 柏葉 雞蘇各四兩

小薊根五兩 乾地黃七兩 青竹茹新者一升 地松三兩

右藥擣散煮桑白皮飲和一方寸匕日再服漸漸加至二三匕以竹瀝下亦得

又此病有兩種一者外損內傷自宜依內陽外損因墜打壓損

或手足肢節肱頭項傷折骨節痛不可忍覺內損者須依前內損法服湯藥如不內損只傷肢節宜依後生地黃一味薄之法及芥子蘇等摩之方

生地黃無問多少淨洗擣碎令爛熬之候水氣盡及熱以薄折處冷即易之如骨蹉跌即依療折傷法縹縛兼薄羊腦生龜生鼠等法爲有所損此不復載如傷損處輕擣芥子和蘇以摩傷處若被打墜壓傷損急卒雖不至昏悶腹內無覺觸然身之中相去非遠外雖無狀內宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸方腹內亦須資藥但不勞大湯如前內損欲死者服湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略出如後小便酒煮生地黃每始王木緩木梓葉蘆藥桍藥猪脂及石蜜白石地菘延胡索赤泥藥

余理

亦

以上十一物並出下卷吴昇同

金瘡禁忌序一首

肘後凡金瘡去血其人若渴然每忍之常勿乾食并肥脂之物以止渴愼勿鹹食若多飲粥輩則血溢出殺人不可救也又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臛輩皆使瘡痛腫發甚者即死瘡差後猶爾出百日半年乃稍復常耳凡金瘡傷天窻眉角腦戶臂裏跳脉髀内陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六腑輸此皆是死處不可療也又破腦出血而不能言語戴眼直視咽中沸聲口急唾出兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無諸候者可療又瘡卒無汁者中風也瘡邊自出黄汁者中水也並欲作痙候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦死之兆又血出不可止前赤後黒或白肌肉腐臭寒、冷堅急者其瘡難愈亦死也並出第三卷中

肘後療金瘡膏散三種宜預備合以防急疾之要續斷膏方

金瘡預備膏散方三首

蜀續斷　蛇銜　防風各三兩

右三味切以猪脂三斤於東向露竈煎之三下三上膏成去滓若深大瘡者但傅四邊未可使合若淺小瘡者但通傅便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又治葛蛇銜膏方

蛇銜　薔薇根　續斷　冶葛各二兩

當歸　附子各一兩半去皮　防風　黄芩

澤蘭各一兩　松脂　柏脂各三兩

右十一味㕮咀以猪脂二斤煎之別以白芷一枚内中候色黄即膏成去滓濾以密器收貯之以塗瘡無問大小皆差不生膿汁也出第七卷中

深師預備金瘡散方

乾薑 甘草炙 桂心一兩 當歸三兩 芎藭四兩 蜀椒三兩汗

右六味擣散以酒服方寸匕日三忌海藻菘菜生葱肘後同出第二十九卷中

金瘡方一十一首

肘後療金瘡方

割氈方一寸燒灰研以傅之差

又方

杏人去皮尖擣如泥石灰分等以猪脂和之淹足合煎令杏人黃絞去滓以塗瘡上日五六過愈

又方

燒故青布作灰傅瘡上裹縛之數日差可解去

又方

以蛇銜草擣傅之差

又方

狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血一方爐草挼傅之

又方

五月五日掘葛根暴乾擣末傅瘡上止血止痛

又方

釣樟根出江南刮取屑傅瘡上有神驗

又方

紫檀末以傅金瘡止痛止血生肌

又方

燒牡蠣末傅之佳凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好並出第七卷中

石

近効金瘡或壓損斷裂方

剥取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑皮裹即差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方

臘如胡桃 杏子一抄爛擣 檳榔人一枚 薰陸香半合

右四味和擣以猪脂煎即以此藥塗帛上貼瘡此方甚効

金瘡續筋骨方三首

千金療金瘡粉散辟風水續筋骨止血方

石灰 地菘苗 旋復根

葛葉 猪膏 青蒿 麥門冬苗

益母苗不限多少切

右九味擣取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以傅傷瘡上止血止痛生肌五月五日合之神効出第二十六卷中

必効療被斫筋斷者續筋方

旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上即封裹之十五日即斷筋便續矣更不須開易此方出蘇景仲家獠奴用効出第四卷中

古今録驗療金瘡中筋骨續斷散方

續斷五兩　乾地黄　蛇銜　地榆

杜蘅各四兩　乾薑　蜀椒汗　細辛

桂心各一兩　當歸　芎藭　蓯蓉

芍藥各三兩　人參　甘草炙　附子炮去皮各二兩

右十六味擣爲散以酒飲和服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜生葱猪肉冷水出第三十四卷中一方無杜蘅有杜蠣

金瘡止痛方五首

范汪療金瘡内塞止痛地榆散方

地榆根　白斂各二分　附子一分炮　當歸四分

芎藭　白芷　芍藥各三分

右七味擣散以酒飲服方寸匕日三服忌猪肉冷水

又金瘡內塞逐痛方

黄芩　當歸各三兩　甘草炙二兩　細辛

烏頭炮各二兩　乾薑一兩　白芷四兩

右七味擣篩以酒飲服一錢匕日三可至二錢匕忌生菜海藻菘菜猪肉冷水等

又金瘡止痛方

馬蹄燒灰三指撮以酒和服之並出第十九卷中

千金凡金瘡若刺瘡痛不可忍者方

葱白一把水三升煮數沸漬洗瘡上痛即止翼深師同出第二十六卷中亦治因水入瘡痛

古今録驗療金瘡上痛牡蠣散方

牡蠣熬二分　石膏一分

右二味下篩以粉瘡痛即止出第三十四卷中

金瘡生肌方四首

廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方

紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煑取一大升不利無忌出第六卷中

范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方

當歸　甘草炙　肉蓯蓉　芎藭

芍藥　蜀椒汗　吴茱萸　乾薑

桂心　白及　黄耆　厚朴炙

人參

右十三味等分擣爲散以酒飲服一方寸匕日三服忌海藻

菘菜生葱等

又療金瘡生肌白膏方

白芷一兩六銖 乾地黄一兩半 芎藭一兩六銖 甘草半兩炙

當歸 白斂 附子各十八銖去皮 蜀椒二合半汗

右八味㕮咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓塗瘡上日再忌海藻菘菜猪肉冷水蕪荑並出第九十五卷中

古今録驗療金瘡生肌散方

甘草一斤炙 黄蘗八兩 當歸四兩

右三味擣末以封瘡上日再出第三十四卷中

金瘡去血多虛竭内補方二首

千金療金瘡去血多虛竭内補方

當歸三兩 芍藥 細辛各五分 乾薑三分

甘草二分炙

右五味爲散以酒服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜生菜出第二十六卷中

古今録驗療金瘡去血多虛竭內補方

蜀椒三分汗去目并合口者　乾薑二分　蓯蓉

甘草炙　芍藥　當歸　芎藭

桂心　黃芩　人參　黃耆

厚朴炙　吳茱萸　桑白皮各一兩

右十四味擣散以酒服方寸匕日三千金翼同出第三十四卷中一方有白及無桑白皮

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方

蜀椒量瘡大小用麪作餛飩煻灰中炮令熟及熱開一

小口當瘡上掩之即引風出可多作取差備急小品同
出第三卷中
必効療金瘡中風角弓反張者方
取杏人碎之蒸令餾擣絞取脂服一小升許兼以摩
瘡上即差
又方
取蒜一大升破去心以無灰酒四升煑蒜令極爛幷
滓服一大升以來須臾汗如雨出則差
又療口噤不能語方
蔓菁子淨洗一升擣令細粘手撮爲炷以灸瘡上一
兩度熱徹即差兼服後方
又療因瘡著風方
雞糞一合烏豆二升擻令淨二味相和於鐺中熬令

焦黑及熱瀉出以酒二大升淋之與服隨多少令盡
取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方
取莨菪根可瘡大小截令平如無大者並縛數根稱
瘡以爲限猪脂一大合鹽末一雞子黄大和膏於火
上温之令膏鹽相得不用過熱熱即傷肉以煖得炷
瘡上冷即易之爲兩炷於垍器中燒之更相用以差止驗

又方
生雞子烏麻油二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今録驗療金瘡得風身體痓強口噤不能語或因破打而得
及斧刀所傷得風臨死捴用此方無有不差瓠𤬪燒麻燭熏之方
取末開瓠𤬪一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡
相當可繞四邊閉塞勿使通氣上復開一孔如盌口取

浮麻子燭兩條並然瓠𤬏向上燭盡更續之不過半日即差若不止亦可經一兩日熏之以差爲度若燭長不得内入瓠𤬏可中折用之出第三十四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水冷毒皆殺人不可輕也療之方

生竹若桑枝兩條課得一物鬱著火中爲推引之令極熱斫斷之正以頭炷瘡口中熱氣盡更易一枚盡此二枚則瘡當爛乃取薤白擣以綿裹著熱灰中使極熱去綿以薤白薄瘡上布帛急裹之肘後千金同

又療若已中水及惡露風寒腫痛方

以鹽數合急抑著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以臘内竹管揷熱灰中令烊以滴入瘡中即便愈若無

臘用薤白但單用臘亦良肘後同出第五卷中

備急療諸瘡中風寒水露腫痛去因瘡而腫者皆中水及中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方

燒黍穰或牛馬乾糞桑條輩多煙之物掘地作坎於中燒之以版掩坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏之令瘡汁出盡乃止又滴熱臘瘡中佳集驗肘後文仲同

又方

以桑灰汁温之以漬瘡大良姚云神驗肘後千金同出第十八卷中

近効療瘡因水入疼痛方

取生葱一束擣以脚踏上須臾更著之差李諫議房給事録試効

被刀箭傷方一十一首

根

劉涓子療金瘡箭在肉中不出方

半夏洗三兩　白歛三兩

右二味下篩以酒服方寸匕日三淺者十日出深者二十日出終不住肉中肘後千金文仲小品同出第三卷中

肘後療卒被毒箭方

擣藍青絞取汁飲之并薄瘡上若無藍取青布漬之絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡中肘後范汪文仲備急千金同

又方

煑藕取汁飲之多多益善肘後文仲備急同

又方

但多食生葛根自愈食無限不能或擣生葛絞取汁飲之乾者煑取飲之小品千金集驗備急文仲同

又方

乾薑鹽等分擣末傅瘡上毒皆自出范汪肘後備急同一作乾葛

又凡毒箭有三種交廣夷俚用焦銅作鏃次嶺北用諸蛇蟲毒螫物汁著管中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪腫沸爛而死唯射猪犬雖困猶得活以其啖人糞故也人若有中之便即飡糞或絞濾取汁飲之并以塗瘡上須臾即定不爾不可救也又一種是今之獵師射麞鹿用射罔以塗箭鏃人中之當時亦困頓著寬處者不死若近胷腹亦宜急療之今葛氏方是射罔者耳

又療箭鏑及諸刃刀在咽喉胷膈諸隱處不出者方

牡丹一分　白斂二分

右二味擣水以溫酒服方寸匕日三服刃自出肘後備急千金同出第九卷中

小品療被毒箭傷方

此方亦 飲

雄黃末傅之當沸汁出即愈肘後千金集驗同（此方亦療蛇毒）

又方

食麻子數升愈擣飲其汁亦佳肘後范汪千金同出第十卷中

集驗療毒箭方

以鹽滿瘡中灸鹽上三十壯肘後同

又方

煮蘆根汁飲一二升范汪小品同（一云煮藍汁飲二三升）

又療刀箭瘡有血不止方

以小兒矢塗封之三日即差並不傷人出第九卷中

竹木刺不出方一十六首

劉涓子竹木刺不出方

鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕集驗文

仲備急肘後范汪古今録驗深師同出第三卷中

肘後療竹木刺不出方

取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出重傅之乃不覺刺出刪繁集驗千金備急深師同一云用乾羊糞末

又方

嚼白梅塗之集驗千金同

又方

王不留行末服之并傅上即出集驗文仲深師千金同

又方

擣烏梅水和塗之刺上立出並出第三卷中千金用白梅

深師療刺不出方

以鹿腦厚傅上燥復易之半日即出出第二十九卷中

集驗療刺壯柱肉中不出方

用牛膝根莖合擣以傅之即出縱瘡合其刺猶自出肘
後備急文仲范汪深師千金同出第九卷中

千金療刺在人肉中不出方

煑瞿麥汁飲之日三立出

又方

温小便漬之

又方

白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫肘後同

又方

薔微燒灰以水服方寸匕日二度十日刺出

又方

燒鼈枘爲灰酒服二方寸匕

又方

又方

酸棗核燒末服之差

頭垢塗之並出第二十六卷中

文仲療竹木刺不出方

刮象牙屑水和塗刺上立出肘後范汪備急深師同

出第八卷中

救急療竹木刺傷方

嚼豉封之立差千金肘後同出第九卷中

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸螳螂之類盛暑之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其疾故曰狐尿刺日夜慘痛不識眠睡百方療不能差方

但取僕翁英莖葉根斷之取白汁塗令厚一分即差神

驗不傳出第二十四卷中

肘後療狐尿棘刺人腫痛欲死方

以熱桑柴灰汁漬之冷復易永差備急崔氏同出第八卷中

狐刺方四首

崔氏療狐刺方

取好豉心以足為限但覺被刺即熟嚼豉以薄之少湏看豉中當見毛不見又速嚼豉數薄之以晝連夜勿絕但以毛盡便愈

又方

熟擣杏人細研煑一兩沸承熱以浸刺處數數易之大良古今録驗同

集驗療狐刺方

熱魚汁灌瘡中

備急療狐刺方

以熱臘灌瘡中又煙熏之令汁出愈此狐所溺之木猶如蛇螫也肘後小品文仲同出第八卷中

必効主狐刺痛如烏叫者方

生栝樓香豉二味等分擣之爲餅傅患處乾即易之効段家方出第六卷中

惡刺方三首

千金翼療惡刺方

五月蔓菁子擣末和烏牛乳封之無烏牛但是牛乳亦得出第二十四卷中（本方云人乳亦得）

古今錄驗療惡刺方

取末煮餅油脂以麪和油調須臾著瘡上即愈（一云蔓菁）

根和粉以麨和油

又方

取麴末和獨頭蒜擣之搦如帽簪頭許內瘡孔中蟲出即差出第三十五卷中

灸瘡方四首

肘後論曰凡灸不依明堂脉穴或是惡日神惡時殺病人年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沈及灸日食毒物方畢或灸觸犯房室等其灸瘡洪腫發作疼痛病人加甚本灸者疾不痊增其火毒日夜楚痛遇其凡愚取次亂灸此皆因火毒傷藏即死矣今用方療之

柏白皮三兩　當歸一兩　薤白一虎口切

右三味切以猪脂一升煎三上三下以薤白黃絞去滓以塗瘡上亦療風水中瘡火瘡出第三卷中

集驗療灸瘡痛腫急方

擣竈中黃土末之以水和煑令熱以漬之深師千金肘後同

又療灸瘡薤白膏生肌肉止痛方

薤白 當歸各二兩 白芷一兩 羊髓一斤

右四味㕮咀以羊髓煎白芷色黃藥成去滓以傅瘡上日二肘後千金文仲同出第八卷中

千金療灸瘡方

甘草灸 當歸各一兩 胡粉六分一作胡麻 羊脂六分

右四味切以猪脂五合煎之去滓以傅瘡上忌海藻菘菜出第二十六卷中

灸瘡膿不差方三首

肘後療灸瘡膿不差方

白蜜一兩 烏賊骨一兩末

右二味相和以塗之千金同

千金療灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂一斤 薤白一把切 胡粉一兩

右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一兩更煎去之入胡粉令調傅之日三

又方

石灰一兩末細絹篩以猪脂和相得微火上煎數沸先以煖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上灸之又擣薤傅之肘後同出第二十六卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物并井下泥火瘡得冷即熱氣更深轉入至骨爛壞人筋攣縮者良由此也

又療卒破火燒苦劇悶絕不識人方

取新熱小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者可拗開灌之其悶差然後療外乃善千金古今錄驗崔氏小品同出第八卷中

千金療火瘡方

末熬麻油和梔子人末塗之唯厚爲佳已成瘡者篩白煻灰粉之即差出第二十六卷中

近効療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似火燒瘡赤色熱翕翕須臾侵淫漸多急速者是也方

芸薹菜不限多少擣絞取汁并消大黃生鐵衣各等分擣大黃末相和并消等以芸薹汁調如稀糊以筆點藥傅瘡上乾即再點頻用極有効閻師云芸薹冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉涓子療火燒人肉爛壞麻子膏方

麻子（一合取人碎） 柏白皮 山梔子（碎） 白芷

甘草（各一兩） 柳白皮（一兩）

右六味㕮咀以猪脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上日三

出第五卷中

集驗療火爛瘡膏方

柏白皮 生地黃（研各四兩） 苦竹葉 甘草（各四兩）

右四味切以猪脂一斤煎三上三下藥成濾去滓以摩瘡上

日再摩深師千金劉涓子范汪同出第八卷中（千金無地黃）

千金墮火灼爛瘡方

榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方

柏白皮切臘月猪膏合淹相和煑四五沸色變去
滓塗瘡范汪同出第二十六卷中

又方

柏白皮　生地黄　黄芩　蛇銜
梔子　苦竹葉各一兩

右六味切以羊髓半升煎之三上三下去滓塗封瘡上差止

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

肘後療湯火所灼未成瘡者方

取煖灰以水和習習爾以傳之亦以灰汁洗之

又方

黍米　女麴等分

右二味各異熬令黒如炭擣下以雞子白和塗之良

又方

火灼瘡方

又方

取菰蔣根洗去土燒灰雞子黃和塗之

又方

取柳白皮細切以猪膏煎以塗之以柏白皮彌佳

凡此以上三方皆能止痛疾仍不成瘡也

又方

以小便漬洗之

又方

以苦酒和雄黃塗之

又若已成瘡者方

以白蜜塗瘡上取竹幕貼之日三出第七卷中

范汪療湯火灼瘡方

破雞子取白塗之肘後同

又方

以豆醬汁塗之肘後文仲同並出第九十一卷中

備急療湯火灼瘡方

又方

柳皮燒灰如粉傅之肘後同

猪膏和米粉塗之日五六過良肘後同此二方既令不痛又使速愈又無瘢痕已試有効出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小秘要方

取狗毛碎剪烊膠和之以遍封瘡上一封之後比至痂落亦不痛救急同出第五卷中

文仲療湯火瘡無問大小秘要方

新熱牛糞塗之良崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小秘要方

取粟熬令焦黑投水中攪之良久濾取汁重煎如糖以傅瘡上并滅瘢崔氏同

又方

取黍米煑粥和雞子白傅瘡良並出第五卷中

湯火爛瘡方五首

肘後療湯火爛瘡方

取石膏擣末以傅之立愈古今録驗同出第三卷中

備急湯火灼爛方

白斂末塗之立有効

又方

以竹中蠹蚛末塗之良

又方

石灰末粉以水和塗之乾即易之並出第八卷中

古今録驗療湯火爛方

取商陸根擣末以粉瘡上出第四十卷中

湯煎膏火所燒方四首

肘後療爲沸湯煎膏所燒火爛瘡方

丹參細切以羊脂煎成膏傅瘡上千金備急文仲
集驗同
又方
熟擣生胡麻如泥以厚塗瘡上並出第七卷中
集驗被湯火熱膏所燒不問大小梔子膏方
梔子三十枚 白斂 黃芩各五兩
右三味切以水五升麻油一升合煎令水氣竭去滓冷之以
淋瘡令溜去火熱毒肌乃得完也作二日任用膏塗湯散治
之千金并翼古今録驗小品同出第八卷中
文仲澆湯煎膏所灼火焰所燒方
牛糞新者和以雞子白塗之比常用之亦不作瘡不
痛神驗出第七卷中
漆瘡方二十七首

廣濟療漆瘡方

煑椒湯洗頻三五度又嚼糯米傅上乾即易之頻四五度即差忌熱麪肉飲酒出第五卷中

肘後療卒得漆瘡方

以雞子黄塗之乾即易之不過三五度文仲同

又方

煑柳葉湯適寒温洗之老柳皮尤妙集驗必効文仲千金同

又方

取生蟹黄塗之

又方

煑香薷以漬洗之深師古今録驗同

又方

濃煑鼠査莖葉洗之亦可擣取汁以塗之集驗千金同赤瓜林也

又方

嚼秫米以塗之

又方

以造酒小麴擣末以粉之乾即以雞子白和塗之良

又方

挼慎火草若雞腸草以塗之柒姑草亦佳深師千金翼同

又方

以羊乳汁塗之千金翼深師同

又咒漆法畏漆人見漆便漆著之

唾之曰漆弈丹陽漆無弟無兄漆自死丹亡二七須鼠傷三唾之又咒三過止則不復生瘡也出第四卷中

删繁療漆瘡方

取蓮葉乾者一斤以水一斗煑取五升洗瘡上日再

肘後崔氏文仲千金同

又方

芒消五兩湯浸洗之肘後千金翼深師同出第九卷中

千金療著漆洗湯方

取磨石下滓泥塗之取差止大驗翼同

又方

礬石著湯中令消以洗之翼肘後同出第二十六卷中

千金翼療漆瘡方

貫衆擣末以塗之良乾以油和塗之集驗文仲肘後同

又方

取猪膏塗之文仲刪繁千金同

又方

宜噉肥肉集驗深師千金同

又方

嚼秫穀塗之出第十九卷中

崔氏療漆瘡方

頻以鹽湯洗之大良

又方　以馬尿洗之差止

備急療漆瘡方

擣韭根如泥塗之煮薤葉洗之佳肘後深師崔氏同

又方

取蟹擣以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦効

救急療漆瘡方

以鐵漿洗之隨手差頻爲之妙出第八卷中

必効療漆瘡方

取七菰草擣汁二分和芒消一分塗之若無芒消即朴消最妙灸韭熨之効

又方

濃煮杉木汁洗之數數用即除小兒尤佳出第四卷中

古今錄驗療漆瘡方

黄櫨木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去滓候冷以洗之即差王長華家神方出第四十三卷中

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癬瀨浮腫生瘡痛痒毛髮脱落心煩恍惚不得眠睡因療之遲遂爲他疾或便成風瀨亦可畏也

侵淫瘡方七首

肘後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方

以雞冠血塗之良

又方

取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙熏之

又方

胡鷰窠末以水和塗之文仲備急同

又方

取鯽魚長三寸者以少豉合擣塗之亦療馬鞍瘡
若先起四肢漸向頭面者難療也又取鯽魚油煎
去魚塗之文仲備急同出第四卷中

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下周匝煩毒
欲死方

取生鯽魚切之如鱠以鹽和擣薄之若通身即多
作遍病上乾復易之此爲侵淫瘡也備急同出第八卷中

古今錄驗療侵淫瘡苦瓠散方

苦瓠一兩 蛇皮半兩燒 露蜂房半兩熬 大豆半升
梁上塵一合

右五味爲散以粉粥和塗紙貼赤處日三甚良

又療侵淫瘡戎鹽散方

戎鹽二分 大黃四分 䕡茹一分

右三味擣散以酒和傅瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟療月蝕瘡方

自死青蛙一枚燒作灰　母猪蹄一枚燒灰　甘草末

救月杖燒灰

右四味等分蜜和塗瘡上日二差止

又方

五月五日乾蝦蟇一枚燒灰　石硫黃一兩研　礬石一兩熬令汁盡

右三味爲散以傅瘡上日二差止並出第五卷中小兒耳後瘡同用

肘後療大人小兒卒得月蝕瘡方

五月五日蝦蟇灰以猪膏和塗之差止文仲備急集驗同

又方

於月望夕取兔矢仍內蝦蟇腹中合燒爲灰末以傅瘡上差止集驗崔氏同（崔氏云兎矢七枚）

又方　取蘿摩草擣末塗之差

又方　燒蚯蚓矢令赤末以豬膏和傅之文仲備急千金古今錄驗同

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所爲實多著小兒也文仲備急同

又方

水銀　黃連（末各二兩）　胡粉（熬）　松脂（各一兩研）

右四味相和合研水銀消以粉瘡瘡如乾以臘月豬脂和先以鹽湯洗拭然後傅之出第十六卷中

集驗療月蝕瘡方

翅

救月蝕皷皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和傅之崔氏同

又方

虎頭骨二兩碎　浮萍一兩㬥

右二味以猪脂一斤煎取骨黃成膏以塗瘡上崔氏同

又方

茱萸根　地榆根　薔薇根

右三味各等分爲散作湯洗瘡取藥粉瘡上日三崔氏同

又方

然燭照瘡使燭熱氣相及瘡即愈崔氏古今録驗同

並出第九卷中

千金翼療月蝕瘡惡肉方

斑猫去足翅熬　石硫黃　薗茹各一兩末

右三味擣篩以粉瘡上如瘡乾以猪脂和塗之日三出第二

十三卷中

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫焮焮熱痛色不黯黮然後緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正由人筋骨中熱盛撮結故耳吳人名遭指野夫名爲土盧即皆是代指疾也療方

單煑甘草汁漬之或用芒消湯漬之擣青菜汁搨之但得一種浸搨之即差千金同

肘後療代指方

以豬膏和白善傅之數易差止深師千金翼同白善一曲蟮土

又方

以指刺炊上熱飯中七過文仲集驗深師千金范汪同

又方

取梅核中人熟擣以淳苦酒和傅之須臾差止文仲同

又指忽掣痛不可忍方

灸指頭痛處七壯愈千金同

又指端忽發瘡方

燒鐵令熱勿令赤以灼之上三方俱主代指並出第五卷中

千金翼療代指方

先刺去膿灸鮓皮令熱以裹縛指令周匝痛即止便愈千金同出第二十三卷中

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脉熱衝手指不還即代指也

當取熱湯急漬之即出使滿七度便以冷水中浸之訖又復浸之如此三度即塗羊膽愈未成膿此方甚効或

以猪膽盛代指纏之差出第四卷中本方云漬訖封桂末便

備急療手指忽腫痛不已者名爲代指方

和泥泥指令遍周帀厚一寸許以差熱灰中炮之令燥觀皮皺即愈不皺者更爲之良文仲深師范汪同

又方

取粱米粉鐵鐺中熬令赤以衆人唾和之塗上令厚一寸即消

又方

小便和鹽作泥厚裹之數易差鑱針刺血出最妙出第五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之爲病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫焮黃水出侵淫相染五指俱爛漸漸引

酥

上脚趺皰漿四邊起如火燒瘡日夜倍增萬醫所不能療之方

緑礬石五兩形色似朴消而緑色

石一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾即沸流出色赤如融金看沸定汁盡去火待冷收取捘爲末色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上唯多爲佳著藥訖以軟帛纏裹當日即汁斷瘡乾若患急痛即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則洗使淨其痂乾處不須近每洗訖傅藥如初似急痛即塗酥五六日即覺瘡上痂漸剥起但依前洗傅藥十日即瘡漸漸總剥痂落軟處或更生白膿疱即㯹破傅藥自然總差神驗無比刑部張侍郎親嬰此病卧經六十餘日困頓不復可言在京衆醫並經造問皆隨意處方了無効驗唯此法得効如神今故録之以貽好事者出第五卷中

救急療甲疽方

屋上馬齒菜　崑崙青木香　印成鹽

右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許於諸藥中拌揔和下篩爲細散以傅瘡上乾即易之以差止當瘡未差以前不宜食雞猪魚肉腥穢酒蒜等差後仍須三十日愼之良出第九卷中

必効療甲疽赤肉生甲邊上裹甲者方

取瓜州礬石燒令沸定末傅之濕即刮却更著日數易即消散竇宣城綽云効亦主雜瘡有蟲有黃水若得吴白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方

黃耆二兩　藺茹三兩

右二味切以苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉即消散出第四卷中

近効療甲疽瘡神妙方

熏黄（堅好者細研如粉）　蛇皮（燒灰）

右二味等分更和研之右先以温泔清浸洗瘡令軟以尖刀子割去甲角入肉處裛乾取藥棗栗許大以傅瘡上用軟帛裹之半日許藥濕即易之一日許即永除其先痛者傅藥訖一口飯頃即直痛定差訖一二日勿著窄靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麪等其効愈速其藥不過三四度易永差第十四郎中有効

肉刺方二首

古今録驗療肉刺方

好薄刮之以新酒酷和羊腦傅之一宿洗去常以綿裹薦之良出第四十一卷中

近効療肉刺方

寒玉

以黑木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸先微刮去上者乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方

蜀椒四大合汗以水一升煑之十沸去滓漬之半食頃出令燥須叟復浸塗羊猪髓腦尤妙范汪同出第二十九卷中

集驗療手足皸裂血出痛方

若涉水霜凍面及手足皸裂瘃（陟玉切又作瘃手足中寒瘡也下同）壞

取麥窠濃煑汁及熱以浸洗之即差

又方

取葱葉萎黃及籜煑以漬洗之范汪同

又療人脚無冬夏常坼裂名曰尸脚此因履踏洗尸水及惡物

故也方

取雞屎一升以水二升煮數沸待小冷以漬脚半日不過三四度差深師千金范汪同出第九卷中

千金療手足皴裂血出疼痛方

猪䏶著熱酒中以洗之即差深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中

手足逆臚及瘃壞方二首

范汪療手足指逆臚方

眞珠一分　乾薑二分

右二味擣末以粉瘡指上日三千金深師同

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱痛欲瘃者方

蜀椒二分　芎藭二分　白芷　防風各一分

薑一分一作鹽

右五味以水四升煎令濃以洗之出第二十九卷中

疣目方一十九首

肘後療疣目方

月晦日夜於厠前取故草二七莖莖別二七過粉疣目上訖呪曰今日月晦疣驚或明日朝乃弃勿反顧之

又方

取亡人枕若席物以二七拭之亡人近彌易去也並出第五卷中

集驗療去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目人種豆著南向屋東頭第二霤中豆生四葉以熱湯沃殺疣目便去矣千金肘後范汪同

又方

取松柏脂合和塗其上一宿即不知處千金同

又方

作艾炷著疣目上炙之三炷即除范汪千金同

又方

以石硫黃𡟒疣目上六七過除千金同

千金去疣目方

取月十五日月正中時望月以禿條帚掃疣目上

三七遍差止

又方

以猪揩痒處揩之令少血出即差神驗不可加也

又方

以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作瘡即落

又方

杏人燒令黑研如膏塗之令差止

又方

以牛涎數塗之自落並出第二十四卷中

崔氏疣目方

取月盡日平旦井花水月生一日煑作湯竈突北面南自洗呪曰日盡水月初湯竈突北千疣死百疣亡凡七度洗及呪甚良

又方

先布紙一張於牀上即以筆點疣一下還點紙一下無問多少皆一一點每點即呪曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方

以蜘蛛網絲繞纏之自落良

又方

盗取一酘酒醅以摩疣上呪曰疣疣不知羞一酘酒醅洗你頭急急如律令呪滿七遍久即自愈並出第四卷中

張文仲療手足忽生疣目方

葫蘿赤子挼使壞疣目上亦令以塗之即去范汪同

又方

以鹽塗疣上令牛舐之不過三度出第五卷中

近効療疣子法

以墨塗之不過五度即差

又方

以屋溜下水塗疣上韋給事方

去黒子方二首

集驗去黒子及贅方

生藜蘆灰五升 生薑灰五升 石灰二升半

右三味合和令調蒸令氣溜取甑下湯一斗從上淋之盡湯取汁於鐵器中煎減半更閙火煎以雞羽摇中即然斷藥成欲去黒子疣贅先小傷其上皮令裁破以藥點之此名三灰煎祕方不傳古今録驗范汪同出第九卷中

揩

救急去黑子方

夜以煖漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白旃檀取濃汁以塗黑子上旦又復以煖漿水洗面仍以鷹屎粉其上出第三卷中

疣贅疵黑子雜療方六首

深師灰煎療瘤贅瘢痕疵痣及癰疽惡肉等方

石灰一斗五升　濕桑灰四斗　柞櫟灰四斗

右三味合九斗五升以沸湯令浥浥調濕內甑中蒸之從平旦至日中還取釜中沸湯七斗合甑三淋之澄清內銅器中煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一斗洗亂髮乾之如雞子大內藥中即消盡又取五色綵翦如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不強藥成以白甖子中貯之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨見之灰煎亦療瘤驗其肉瘤石瘤藥傳

之皆愈其血瘤瘤附左右胡脉及上下懸癰舌本諸險處皆
不可令消消即血出不止殺人不可不詳之

又療疣贅方

取速讀子熟時壞破之以塗其上便落並出第二十
九卷中

千金療皮中紫赤疵痣靨穢方

乾漆 熬　雌黃　礬石 各三兩熬　巴豆 五十枚去皮心
炭皮 一斤　雄黃 五兩

右六味為散以雞子白和塗故帛貼病上日二易之即除
深師加莽草三兩餘同出第二十四卷中

又療疣贅疵痣方

雄黃　硫黃　真珠　礬石 熬
藺茹　巴豆 去皮心　藜蘆 各一兩

右七味爲散以漆和令如泥以塗貼病上須成瘡及去面上黑子點之即去深師同出第二十四卷中

古今錄驗療黑子去疣等五灰煎方

石灰　蒴藋灰　桑灰　炭灰

蕈灰各一斗

右五味以水溲蒸令氣匝仍取釜中湯淋取清汁五升許於銅器中東向竈煎之不得令雞犬小兒女人穢者見之膏成好凝強如細沙糖即堪用量以點封之出第五卷中

廣濟療疣贅赤黑疵痣癅穢瘡疽息肉強結瘤等神效灰煎方

炭灰三升湯拌令濕徹以熱湯漬令半日後則還以湯淋之稍稍點湯不得太速下即灰汁不驗候汁下得三二升即內一小鐺中煎令一兩沸即別取一大兩石灰風化者爲佳恐中濕者須熬令極熱內灰

汁中和煎以杖篳攪之勿住手候如煎餅麪少許細
細取成膏急瀉著一瓷器中攪令冷不然須臾乾燥
不堪用常候此煎十分有一分堪久停但有傷損肉
色須臾變赤黑色痛如火燒狀若灸瘢發炊即肉病
凹爲効候經二十餘日病自然脫落無瘢痕欲衝風
冷遠行貼烏膏亦神効痂亦易落瘡未差間忌小
豆薑外縱有瘢亦不凸出烏膏在二十四卷中

滅瘢痕方一十七首

廣濟療人面瘢痕滅之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日
大肥安雞著版上作籠籠之七日莫與雞食空飼
清水七日取猪脂去脉膜切噉飼如食糞皆凝白
開收煖水取塗瘢上十度平復舊欲用塗以麤葛布

揩微赤離離訖然後塗之男女俱用効也

又療人面及身瘡瘢不滅方

鷹白糞 爛腐骨 豕白鹹（各四分） 麝香（二分）

右四味研令如粉以葛布揩令赤微離離以脂和傅之日二度差止並出第五卷中

劉涓子六物滅瘢膏方

衣中白魚 雞屎白 鷹糞白 芍藥

白斂 白蜂（等分）

右藥研如粉以乳汁和塗瘢上日三良出第五卷中

小品滅瘢方

雞矢白（一兩） 辛夷人（四分） 白附子（二分） 細辛（二分）

右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三下去滓傷瘢以甘草湯洗訖塗之（一方有桂心二分）

又方

鷹屎白一兩研白蜜和塗瘢上日三並出第十卷中

千金翼凡面皰瘡瘢三十年以上并冷瘡蘁瘢金瘡等方

斑猫三枚去足翅熬 巴豆三枚去心皮 蜜陀僧 胡粉三兩

鵝脂三兩 煎金鈋洮沙三兩 高良薑三兩去皮 海蛤三兩取中者

右八味為粉用鵝脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之差止出第五卷中

救急滅瘢方

猪脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢內白芷當歸各一兩煎白芷令黃去滓內鷹矢白二分攪令調塗之旦洗之千金同

又方

蒺藜子 山梔子人各一

右二味爲散醋漿和如泥臨卧時以塗之旦洗之千金同一方有鼓

又方

痕凸出秋冬小麥麩春夏大麥麩下篩令細以酥和封之良千金同

又方

夏以熱瓦熨冬以凍凌熨之千金同

又方

鷹矢白一兩　白魚二七枚

右二味爲散蜜和塗之日三即差千金同

又方

鷹矢白十分　白殭蠶八分

右二味研如粉白蜜和傅之日三差愼五辛肥膩生冷物千金同

又方

臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以

塗之日四五過千金同並出第三卷中

必効滅瘢方

禹餘粮　半夏

右二味等分末以雞子黃和之先以新布拭瘢上令赤以塗之勿令見風二十日滅矣十年瘢無不愈平復如故救急范汪千金同

又療灸瘡及金瘡凡百瘡瘢能令高者平下者起方

雞屎白　鷹屎白各二合　辛夷人四分　白附子

杜若各三分　細辛二分

右六味下篩以赤蜜少少和先以布揩瘢微破塗之日二差後忌五辛小豆油膩及酢飲酒等若愼口味如大小淺深無不差並出第四卷中一本無杜若有桂心

古今錄驗療瘡瘢方

白殭蠶一兩 珊瑚各一兩 白芷一兩 雞矢白一兩

朱砂一兩研

右五味擣蜜和傅之尤良

又方

木蘭香一斤以三歲米醋浸令没百日出暴乾擣末

以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服方寸匕

日再出第三卷中

外臺祕要方卷第二十九

右迪功郎充兩浙東路提舉茶𥂁司幹辦公事張　寔　校勘

外臺秘要方 三十

惡疾大風

癩瘡

外臺祕要方卷第三十 惡疾大風癩瘡等二十三門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

赤丹方五首

白丹方一十二首

丹胗方四首

赤胗白胗方一十一首

肺風冷熱胗方二首

雜丹胗毒腫及諸色雜瘡方五首

瘑瘡方一十二首　瘑瘡久不差方五首

癬瘡方一十一首

乾濕癬方一十五首

疥癬惡瘡方五首

疥風痒方七首

惡疾大風方一十首

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉鬚已

落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背皆
有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大寒而重衣不暖
者有尋常患熱不能暫涼者有身體枯槁者有津汗常不止者
有身體乾痒徹骨搔之白皮如麩卒不作瘡者有瘡痍茶毒重
累而生晝夜痛不已者有直置頑鈍不知痛痒者其色亦有多
種有青黃赤白黑光明枯闇此疾雖種種狀貌不同而難療易
療皆屬在前人不由醫者何此病一著無問賢愚皆難與語口
順心違不受醫教直希望藥力不欲求已故難療易療屬在前
人不關醫藥臣嘗手療六百餘人差者十分有一莫不一一親
撫養所以深細諳委知其情性且共語看覺難共語不受人教
即不須與療縱與療終有觸藥力病既不差乃勞而無功也仁者
易共語故可療也
又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆由割弃心

累懷潁陽之風所以非止差病乃至因禍而取福也故臣所覩病者其中頗有士大夫乃至有異種名人乃遇斯患皆戀愛妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人皆云自作不仁之行久久並爲極猥之業於中仍欲更作云爲雖有悔言而無悔意但能自新受師教命飡進藥餌何有不除臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於己不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痹羞見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒患此皆自誤然斯疾也雖大治之於微亦可即差此疾一得多者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者皆自謂百年不死深可悲悼

又論曰一遇斯疾即須斷鹽常進服松脂一切公私物務釋然皆

弃猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絶乎慶
吊幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房室犯之還發茲疾有吉
凶二義脩善則吉若還同俗類必是凶矣今略述其由致以示
後之學者可覽而思焉

又菵豆療惡疾方

細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月取
天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿
豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每服三枚
漸加至六七枚日一忌房室猪魚雞雉肉畢三十日
毛髮即生犯藥即不差

又岐伯神散療萬病癰疽疥癩風痿骨肉疽敗百節疼眉毛髮
落身體淫淫躍躍痛痒目痛爛眥一作𤸷耳聾齒齲痔瘻等方

天雄炮去皮　附子炮去皮　細辛　烏頭炮去皮

茵芋（炙各一兩） 乾薑（二兩） 石南 昌蒲

防風（各二兩） 白术 獨活（各三兩） 躑躅（一兩）

椒（汗二兩） 防葵（二兩） 枳實（炙二兩）

右十五味擣散以酒服方寸匕日三勿加忌猪肉冷水生菜桃李雀肉青魚鮓餳羊肉等（一方無防葵枳實）

又療惡疾狼毒散方

狼毒（炙） 秦艽

右二味等分爲散酒服方寸匕日二服五十日愈切須忌慎

又方

松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食房室

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方

松脂（成鍊者十斤） 黍米（一石） 上麴（一石二斗） 石灰（一石水拌如濕熬令氣足）

右四味先於大鐺中炒石灰以木札著灰中火出爲度枸杞根剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一如釀法訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及爲度百無所忌不得觸風其泔米水及飯糟一事以上不得使六畜犬鼠食之皆須令深埋却此方九月作至二月止恐膈上熱者服後進三五口冷飯壓之婦人不能食飲黃瘦積年及蓐風不過一石即差其松脂末初酘酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃酘之此酒飯宜傷冷不爾即酢宜知之

又療風身體如蟲行方

鹽一斗水一石煎減半澄清温洗浴三四遍亦療一切風

又方

以淳灰汁洗面不過一月日愈

又方

以大豆漬飯漿中旦溫洗面頭中痒加少麪沐頭勿以水濯之十洗必差

又方

成鍊雄黃松脂等分蜜和丸以飲服十丸丸如桐子大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等神祕不傳出第二十四卷中

近効婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手脚不隨方

消石一大兩　生烏麻油二大升

右二味内鐺中以土墼蓋口以紙泥固際勿令氣出細細進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生油麻油二大升和之更微火煎之以意斟量得所訖内不津器中服法患大風者用火爲使在室中重作小紙屋子屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七

日頭面疱瘡皆滅若服諸藥丹石熱發不得食熱物著厚衣
卧厚牀牀風者即兩人共服一劑服法同前不用火爲使忌風
二七日若丹石發即不用此法但取一匙內口待消咽汁熱除
忌如藥法呂員外處得牀風疑

諸癩方九首

病源凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不仁或淫
淫若痒如蟲行或目前見物如垂絲或隱胗輒赤黑此皆爲疾
之始起便急療之斷米穀肴鮭專食胡麻松朮輩最善也夫病
之生多從風起當時微發不將爲害初入皮膚之裏不能自覺或
流通四肢潛於經脉或在五藏乍寒乍熱縱横脾腎藏諸毛腠
理壅塞難通因兹氣血精髓乖離久而不療令人頑痺或汗不
流泄手足酸疼針灸不痛或在面目習習奕奕或在肩頸狀如
蟲行或身體徧痒搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大

狀如蚝毒或如梳或如手錐刺不痛或青黃赤黒猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或若懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼目流腫内外生瘡小便赤黄尿有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝眉睫墮落若食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人筋脉支節墮落若食人皮肉頑痹不覺痒痛或如針錐所刺名曰刺風若蟲乗風走於皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從於頭面即起爲皰肉如桃核小棗從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如癬疥或如魚鱗或痒或痛黄水流出初起之時或如榆莢或如錢孔或青或白或黒或黄變易無定或起或滅此等皆病之兆又云風起之由皆是冷熱交通流於五藏徹入骨中虚風因濕和合蟲生便即作患論其所犯多

因用力過度飲食相違房室太過毛孔既開冷熱風入五藏積於寒熱寒熱之風交過通徹流行諸脉急者即患緩者稍遠所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食人五藏骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩風若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黒黄白等諸色之蟲與藥療者無不差然癩名不一木癩者 初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急療之愈不療患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七年落眉睫急療可愈八年成疾難可療金癩者是天所爲也負功德祟初得眉落二年食鼻鼻柱倒叵療良醫可能療愈土癩者作病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成大患十五年不可療水癩者先得水病因即留停風觸發動落人眉鬚急療之經年病成蟋蟀癩者如蟋蟀在人身體內百節頭皆欲血出三年叵療麪癩者蟲出如麪舉體艾白難療熏藥可愈

多年亘療白癩者斑駁或白或赤眉鬚墮落亦可療之多年難療疥癩者狀似癬瘙身體狂痒十年成大患可急療之愈風癩者風從體入或手足刺瘡風冷痺癡不療二十年後便成大患急療之愈蚼癩者得之身體沈重狀似風癩可療之至久積歲成大患疾速療之酒癩者酒醉臥黍穰上因汗體虛風從外入落人眉鬚令人惶懼小療大愈養生禁忌云醉酒露臥不幸生癩也又云魚無鰓不可食食之令人五月發癩出第二卷中

肘後凡癩病皆起於惡風及觸犯忌害得之初覺皮膚不仁淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲或隱疹赤黑氣㵻汎此皆爲疾之始便急療之此疾乃有八九種診候知難易取病源大都皆須斷米穀鮭肴專食胡麻松朮最善別有蠻夷酒決疑丸諸大方數首亦有符術今只取小小單方

苦參 乾者五斤剉之

右一味以好酒三斗漬四五日稍稍飲之二三合常將之備

急同本方療一白癩

又方

苦參根皮三斤

右一味麤擣以酒三斗漬二十一日去滓服一合日三若是

癩疾即應覺痺禁雜食

范汪療癩方

取馬薪蒿一名馬矢蒿一名爛石草擣末服方寸匕

日三百日如更赤起一年都差平復肘後同

又方

灸兩手約指中理左右及手足指虎口中隨年壯

深師療癩身體面目有瘡必死方

取白艾蒿十束如升大煑取汁釀米七斗一如釀法酒

又方

熟稍稍飲之

水銀研　藺茹　藜蘆　真珠研

丹砂研　雄黃研

右六味各一斤皆研如粉以三歲苦酒三石五斗於瓮中漬諸藥令耗七日於淨温密室中漬浴始從足漸至胷浸之日一以綿拭面目訖以水洗兩目勿令入目也可七日爲之勿令冷神効忌狸肉生血等芃任同

又療通身癩瘡方

蓮荷二十枚石灰一斗淋取汁合煮令極濃以漬瘡半日許可數爲之

又方

取水中浮萍青者一秤濃煑以漬浴半日用此方多

愈並出第九卷中

集驗療癩方

取葎草一擔以水二石煑取一石以漬洗瘡不過三五度差

烏癩方一首

病源夫癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異或淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉之中或如桃李隱𤺋赤黑手足頑痺針刺不覺痛脚下不得踏地凡食之時開口而鳴語亦如是身體瘡痛兩肘如繩縛此名黑癩出第二卷中

集驗烏癩白癩丸方

猬皮炙　䖳蛤　蝮蛇頭炙　木虻四枚去翅足熬

虻蟲去翅足熬　蠐螬各一枚並炙　陵鯉甲去頭足炙　葛上亭長七枚炙

斑猫去翅足七枚炙　蜈蚣去頭足炙　附子各三枚炮去皮　蜘蛛五枚炙
水蛭一枚　雷丸三十枚　巴豆十五枚去皮心熬　水銀研
大黃　真丹　桂心　射罔各一兩
黃連一分　石膏二兩研　蜀椒三分汗　芒消一分研
龍骨三分　甘遂熬　礜石燒半日　滑石各一分

右二十八味擣篩蜜和丸如胡豆服二丸日三加之以知為度忌豬肉冷水生葱此方分兩多不同為是古方傳寫差錯若臨用時即以意量之范汪同出第八卷中一方有匕蟲無木虻斑猫蜈蚣蝮蛇作蚺蛇

白癩方五首

病源凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺肢節火然一作大熱心中懊熱手脚俱緩背膂至急肉如遭劈身體手足隱𤺋起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當瞳子視無所見此名白癩出第二卷中

集驗療白癩釀酒方

苦參二斤　露蜂房五兩炙

右二味切以水三斗法麴二斤和藥漬經三宿絞去滓炊黍米二斗釀準常法作酒候酒熟壓取先食一飲一雞子日三稍稍增之以差爲度肘後同出第八卷中云亦療鼠瘻惡瘡

范汪療在身白屑瘙搔之或呼作白癩方

苦參五斤　露蜂房五兩熬　猬皮一具炙剉之　麴三斤

右四味切以水三斗五升合藥漬四宿去滓炊米二斗釀如常法酒熟食後飲三五合漸增之以知爲度

千金療白癩大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁注水腫癰疽疥癬惡瘡脚攣手折眼闇血淋淡飲宿澼寒冷方

商陸根二十五斤如馬耳薄切之　麴二十五斤

右二味以水一斛漬之炊黍米一石釀之如家造酒法使麴米相淹三酘之訖封三七日開看麴浮酒熟澄清温服之至三斗稍輕者二斗藥發吐下佳宜食粥飯牛羊鹿肉羹忌生冷酢滑猪肉魚雞犬肉等物出第二十四卷中

文仲療白癩方

乾艾葉濃煮以漬麴作酒如常法飲之令醺醺姚氏范汪同

又方

大蝮蛇一枚乾者并頭尾完勿令欠少炙以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令酒盡稍稍取蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡上忌小麥熱麪肘後范汪同並出第五卷中

十三種丁腫方一十二首

千金論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此之二氣更相擊怒當其時也必有暴氣夫暴氣者每月必有卒然大風大霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚外變經脉遂使腠理擁隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不旋踵若著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡痍無所逃矣

又一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色少烏四邊赤微多痒忌食麻子及衣麻布并入麻田中行二曰石丁其皮肉相連色烏黑如烏豆甚硬刺之不入肉內蔭蔭微疼忌瓦礫塼石之屬三曰雄丁其狀疱頭烏黶四畔仰瘡疱漿起色黃大如錢孔許忌房室四曰雌丁其狀瘡頭少黃向裏黶亦似灸瘡四畔疱漿起色赤大如錢孔忌房室五曰火丁其狀如火瘡頭烏黶四

畔有皰漿漿如赤粟米忌火灸爍食炙煿等物六曰爛丁其狀色少黑有白斑瘡中有膿水形大小如匙面忌熱食爛臭物七曰三十六丁其狀頭烏浮起形如烏豆四畔起大赤今日生一明日生二至三日乃至十若滿三十六藥所不療如未滿者可療俗名黑皰忌瞋喜愁恨八曰蛇眼丁其狀療頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼體大硬忌惡眼人見之及嫉妒人看之九曰鹽膚丁其狀如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑黶汁出中硬忌飲漿水洗渡河十一曰刀鐮丁其狀瘡闊狹如韭葉長一寸側內黑忌燒爍刺及刀鐮切割十二曰浮漚丁其狀如浮漚瘡體曲圓少許不合長狹如薤葉大內黃外黑曲黑曲處刺不痛裏黃處刺痛十三曰牛拘丁其狀肉皰色掐不破

右十三種丁瘡初起必先痒後痛先寒後熱熱定多四肢沉重

頭痛心驚眼花若大重者嘔逆嘔逆者難療其麻子丁一種
始末唯痒所録之忌不得犯觸犯觸者難療其浮漚牛拘兩
種無禁忌縱不治亦不殺人其狀寒熱與諸丁同皆以此方
療之萬不失一欲知犯觸但脊強瘡痛極甚忍不可得則是
犯之狀療之方用枸杞春名天精夏名枸杞秋名却老冬名
地骨春三月上建日採葉夏三月上建日採枝秋三月上建
日採子冬三月上建日採根四味並暴乾若得五月五日午
時合和大良如不得依法採者但得一種亦得緋繒一首以
裹藥爲限亂髮一雞子大牛黃如梧子大反勾棘刺鍼二
七枚末赤小豆七枚末先於緋繒上薄布亂髮以牛黃末等
布髮上即卷緋繒作團亂髮作索十字繫之熨斗中急火熬
令沸以沸定自然乾即刮取擣作末絹下之以方寸一匕取
枸杞根等四味合和擣篩二匕合三匕和令相得又分爲三

分旦空肚酒服一分日三

又凡是丁腫用之齊州滎姥方

白薑石十八兩黃軟者　牡蠣九兩爛者　枸杞白皮二兩

鍾乳二兩下者研　白石英一兩研　桔梗一兩半

右六味各擣篩乃秤之合和攪令相得先取伏龍肝九升末之以清酒一斗二升攪令渾渾澄取清二升和藥捻作餅子大六分厚二分其濁滓仍著盆中布餅子於籠上以一重紙藉盆上以泥酒氣熏之仍數攪令氣發經半日藥餅微乾乃内瓦坩瓶中一重紙一重藥遍布勿令相著密以泥封之三七日乾以紙袋貯乾處舉之用之法一如後方前二家方本是一家智者平論以爲後方最是眞本其病通忌酒肉五辛芸薹胡荽油麪生冷酢滑耳後方如左崔氏同

白薑石二十五兩　牡蠣十兩　枸杞根白皮四兩　茯苓三兩

右四味細篩合和先取新枸杞根切六升以水一斗半煮取五升去滓内狗屎二升攪令調勻澄取清和前藥熟擣捻作餅子陰乾取兩刃針當頭直刺瘡痛徹拔出刮取藥末塞孔中拔針出即内藥勿令歇氣并遍封瘡上頭即脹起針挑根出重者半日以上即出或已消爛挑根不出自差勿憂之其病在内者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如梧子五枚和服之日夜三四服外自消也若須根出服藥後一日以上以雞羽剔吐出根縱不出根亦自消爛在外者亦日夜三遍傅藥根出後常傅勿休生肉易差若犯者取枸杞根切三升以水五升煮取三升去滓研藥一錢匕和枸杞汁一盞服之日二三服并單飲冷枸杞汁一二盞彌佳又以枸杞汁絞狗屎取汁服之最良合訖即用不必待乾依五月五日七月七日臘日合者其用療病尤良但有人卒患喉中痛

乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之腹中無故而痛惡寒發熱者亦是此病前二方同是一方法用一同亦主癰疽𤺋同

又方

以鉞刺四邊及中心塗雄黃立愈

又方

馬齒菜二分　石灰三分

右二味和擣以雞子白和塗之文仲備急等同出第二十三卷中

又療一切丁腫方

取蒼耳根莖子等燒作灰以酢泔澱和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔根出

又論曰臣以正觀四年忽口右角患丁腫造甘子振其子振每爲貼藥十日不差臣以此療之一如方說自是常作此方以救諸人未說有不愈者故特論之以傳後世丁腫方殆有千首皆

不及齊州榮姥方亦不勝此物造次易得也

又方

飲鐵漿一椀即差

又方

蒺藜子一升作灰以酸酢和封頭破塗上一宿差

又方

皂莢子中人末傅之數貼五日愈

又論曰凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血然傅藥藥氣入針孔中佳若不達瘡裏則不相得力也

又論曰其腫好著口邊頰中舌上者看之赤黑如珠子疼痛應心是寒毒久結變作此疾不即療日夜根長流入諸脉數道如箭入身捉人不得動揺若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中火光生心神惛昧不可具論此其狀也並出第二十三卷中

備急療丁腫姚方去丁毒爲瘡肉中突起如魚眼狀赤黑㾓痛是寒毒之結變作此疾始作服湯及如療丹法便差又支太醫

云有一十三種丁瘡其狀在大方中初起皆患寒熱又三十六丁亦是十三種數內或今日生一明日生二或生三或生十滿三十六丁皆療之方

蛇皮炙末和鼠矢以針刺破瘡內中即拔出差正文仲同

又方

取人糞乾者末之挑腫破傅瘡大良若犯瘡未死者開口灌廁清一大外須臾立差

又方

取白馬牙齒燒作灰先以針刺瘡令破以灰封之用甑周匝圍之候腫軟用好酢洗却灰其根即出當便差

又內令消神驗方

反勾棘針（三十二枚一年以上陳者） 生大豆黃（四十枚全者）

緋頭湏巾（三條條闊一寸） 亂髮（三雞子許）

右四味作三分先將緋一片裹棘針豆黃各三七枚用髮一塊纏緋令周帀牢固又取兩段緋各如法裹之訖各於炭火上燒令煙盡且以兩段於瓷器中熟研之和酒半盞空腹服之半日瘡四邊軟內舒適即差半日不覺可更服一段必差若後犯之有三五豆赤黑膿出不經犯者十八日即差此方甚効勿犯之

丁腫方二十首

廣濟療丁腫毒氣傳藥差方

白馬牙（燒令赤內米酢中更燒依前十遍） 附子（生用末）

雄黃（研） 半夏（末）

右四味各等分少減以臘月猪脂和如泥封腫上一兩遍即差

又方

根爛其腫當頭先以針刺至痛處然可封藥即効

爛棘刺三枚反勾者丁香七枚並燒令煙斷末以未滿
月孩子糞和塗腫上頻頻三兩度根爛差

又方

車轄軸脂　白鹽　蕪菁根　釜底墨末等分

右四味等分爲末和以臘月猪脂傅上以酢及水和傅之得

又療丁腫封藥後宜常服散方

亂髮急圍十外許　反勾棘針二七外爛者　露蜂房一外

蛇脫皮一外　絳緋闊十赤

右五味分作五分以緋裹之用麻急纏之於炭火上燒如煙欲
斷即收勿令作白灰末以酒和空肚服方寸匕日二夜一差止
不利忌生麻子小豆蒜猪肉羊肉魚蒜油膩麪等

又方

半夏生用　石灰等分

右二味擣末以傅瘡上並出第五卷中

備急療丁腫方

乾薑　胡椒　龍骨　斑猫（去翅足熬）　皂莢（炙去皮子）

右五味各等分擣篩以酒和封瘡破安孔中日一傅之忌食

麪酒肉油膩等物

又方

以鍼刺破瘡頭取熱人糞塗上乾易之不過十五遍

即出又以硇砂封上若毒入腹以枸杞根切煎服之

如犯觸亦然

又方

露蜂房（二七枚）　曲頭棘刺（二七枚）　蒼耳子（一七枚）　緋（一寸）

亂髮（雞子大）　腐蒿草節（二七枚）

右六味熬令黑末研朱砂少許和酒服方寸匕日三服後加酒

令微有酒色禁食如常療內腫彌佳文仲同

又方

斑猫一枚捻破然後以針畫瘡上作米字以封上即根乃出也

又方

生大豆黃（三十二枚全者） 緋頭頂帛（三條如無用五寸緋代） 亂髮（一雞子許）

右三味以緋裹亂髮牢纏於炭火上燒得黑煙欲盡即出之於瓷器中研如粉以酒空腹服之方寸匕平明至午時覺四體舒適覺瘡輕即差如未依前服之差止若犯之瘡即出膿血未經犯六七日平貼忌如常法

必効療丁瘡方

取舊厠清絞取汁青竹茹燒作灰

右二味研和清攪一百遍稀稠成膏刺瘡四邊令遍先以[illegible]

和麪圍瘡四面寫藥漸漸令滿其中仍三五度換之晬時瘡即爛以針挑之拔去根即差止未出更著之神効

又方

蜂窠七枚露者　真緋大手　亂髮大拳

右三味各燒爲灰作末酒一小升和頓服之差止未差更作之並出第六卷中

古今録驗療丁腫方出徐王

大黃　秦艽　藜蘆　石硫黃研　硇砂各一兩研

右五味擣篩爲散以刀子頭取和冷水量瘡大小封之若腫大悶可作五香湯服之并取麪和塗腫上乾即易之以消可休一方無大黃封之須刺四面麪糊紙貼勿令乾數著也

又方

白馬齒　亂髮　髑髏各一分　枸杞白皮三分

右四味燒作灰以酒和服方寸匕不差至二匕

又方

曲頭棘刺（四百枚） 橘皮（三兩）

右二味以水三升煑取半升服一合四合塗腫上

又方 取礠石擣爲粉釅酢和封之立拔根出

又方 五月五日取壯狗矢燒作灰傅瘡數易之

又方

巴豆二七枚去皮半夏二七枚擣末以寒食餳和之以鍼刺瘡四邊令微到底即以藥塗之立拔出以澤瀉末塡瘡孔中便差侍郎崔世謨送忌羊肉餳笋等物

又方

蛇脫皮（四分燒灰） 露蜂房（一分灰）

小兒十歲以上未塗油髮灰（一分）

右三味並用五月五日採燥之相和以新瓦椀內燒灰白飲服

棗許大令汗出未汗更服以汗爲度即不經日云七日不得食

鹽酒肉五辛房室生冷酢滑等一云出來不得食蛒肉雞肉

食者難差蛇皮不得帶赤色有毒純白者上此高獺奴法邢

長史傳之

又方高僕射送

亂髮急縛一雞子許　緋帛方三寸　曲頭棘刺七七枚東枝白腐者

蒼耳三七枚

右四味合燒作灰研成散每以水半盞許服方寸匕日二三

差止慎風熱餘忌同前慮有犯觸加鹿角一方寸鼈甲三方

寸蜂房三寸三物等分燒灰爲散若有犯者依前方服之甚

効並出第三十卷中

犯丁腫重發方二首

廣濟療丁腫犯之重發方

青羊糞一升

右一味以水二升漬少時煮兩沸絞取汁一升頓服無所忌出第五卷中

古今錄驗療犯丁腫方晉黑公上

枸杞白皮末一方寸匕　麥七粒燒灰　麻子七粒燒灰

緋帛一方寸燒灰　勾頭棘子二七枚燒灰　半夏一七枚大小如羊糞者熬令黃

亂髮灰半匕

右七味藥不問冬夏悪須温酒和服多少任人性能準則令有酒色此方無所忌不宜犯麻子多致死得療者愈也出第三十卷中

悪腫一切毒瘡腫方一十七首

廣濟飛黃散療諸悪瘡腫方

曾青　雌黃　白礜石　磁石

雄黃　丹砂各一兩

右六味各細研依四方色以藥置色處曾青東方丹砂南方白礜石西方磁石北方雄黃中央瓦甕二枚以黃泥下冉三過使厚五六分以雌黃屑著下合篩諸藥著上後以半雌黃屑覆上以泥密塗際勿令氣泄上須厚一宿如常點火點火用二年陳蘆作樵中調火以新布沈水中覆釜上乾復易九十沸止若日暮七十七沸亦足止大熟一斛米飯頃發出藥惡肉青黑乾不復出汗愈無甕以土釜二枚如上法也出第三十一卷中第二十四卷緩疽中有此方更有石英石膏鍾乳雲母礜十味

千金療惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急攣痛牽少腹不可忍一宿殺人方

茴香苗葉

右一味擣取汁飲一升日三四服其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國神方從永嘉以來用之起死神効

又凡風勞毒腫疼攣痛或牽引少腹及腰髀痛方

桃人一升去尖皮兩人熬令黑煙出熱擣研如脂膏以酒三升攪令相和一服覆取汗不過三差甚妙

又大麻子小豆湯主毒腫無定處或嗇嗇惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也方

射干三兩　商陸二兩薄切　赤小豆一升　麻子五升

附子三兩炮　升麻四兩

右六味切以水二斗煮麻子取一斗半去滓研麻子令破以麻子汁煮藥令豆極熟去滓可得六七升一服一升日夜令盡小便當利大下即毒腫氣當減食此豆益佳如湯沃雪也

出第二十三卷中

崔氏五香湯療毒腫方

麝香研　青木香　雞舌香　藿香

薰陸香　當歸　黃芩　升麻

芒消各三分　大黃五分

右十味切以水六升煮取二升去滓入芒消令烊分爲三服相去六七里久亦療諸卒尸注惡氣也

又療惡腫犀角湯方

薰陸香　青木香　雞舌香　藿香

犀角各二分屑　沈香二分　升麻七分

右七味切以水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之毒腫不然者腫殺人也出第五卷中

又烏膏療一切瘡引膿生肌殺瘡中蟲方

烏麻油一升生清者　黃丹二兩羅之　薰陸香一兩乳頭者

末松脂半兩　末臘半兩鍊淨以上並大升大兩

右五味先空煎油三分減一停待冷次內黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次內薰陸香末不冷即恐溢沸出煎候香消盡次下松脂及臘看膏稍稠即以點鐵物上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡是熱即減薰陸及松脂若瘡如久不差此涉於冷依方煎之其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合黃丹二大兩臘一小兩餘準上法此膏不須硬出第二卷中

必効療惡瘡方

熱毒腫以瓷近下鑽孔盛水令水射腫又以雞子清封腫上熱即易之

又方

取茺蔚臭草擣汁服一雞子許滓封腫熱則易之

甚良

又方　擣地松汁服之每日兩三服即差止

又方

大黄　石灰　赤小豆各等分

右三味擣末以苦酢和塗之効出第四巻中

經心録療諸毒腫升麻膏方

升麻三兩　白斂　漏蘆　連翹

芒消各二兩　黄芩　蛇銜各三兩　蒴藋根四兩

山梔子二十枚　枳實二兩

右十味擣碎以酒浸半日以猪膏五升煎之氣竭膏成去滓以器盛有毒熱腫取塗貼上摩之即消散日三小品同

又大滃漬腫毒升麻湯方

升麻一兩　黄芩三兩　梔子二十枚　漏蘆二兩

蒴藋根五兩 芒消二兩

右六味切以水一斗煮取七升候冷分用漬溻腫常令濕潤即消小品集驗同

又漏蘆湯方

漏蘆無用梔子 白斂 黃芩 麻黃

白薇無用知母 枳實炙 升麻無用犀角 芍藥

甘草炙各二兩 大黃三兩無用芒消

右十味切以水一斗煮取三升分三服若無藥處單服大黃一兩取利忌海藻菘菜等並出第五卷中千金云療一切癰小品亦治丹毒

近効療一切熱毒腫驗方并主乳癰

青木香 紫葛 紫檀 朴消各二兩

赤小豆一合 蜀升麻 白斂 生礬石各一兩

右八味擣篩以水和如稀麪糊又以榆皮汁和之亦佳以布

剪可腫大小仍每片剪三兩箇小孔子塗藥貼腫上乾即易之王度支處

又貼毒熱腫消方

蔓菁根三大兩　芸薹苗葉根三大兩

右二味擣以雞子清和貼之乾即易之當日消

又方

商陸根　芸薹苗葉根等分

右二味擣之依上方貼之効

又療一切熱瘡腫消石膏方

消石一斤　生麻油三升

右二味先煎油令黑臭下消石緩火煎令如稠餳膏成以好瓷器中收貯以塗貼瘡腫或熱發服少許妙用好酥煎更良忌生血物

反花瘡及諸惡瘡腫方四首

病源反花瘡者由風毒相搏所爲初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根濃汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不差者亦惡肉反出如反花形也出第三十五卷中

千金療一切久不差諸惡瘡兼反花瘡大神驗方

鼠粘子草根細切熟擣和以臘月猪脂封貼腫瘡上

取差止出第二十三卷中

必効療反花瘡方

柳枝葉以水煎成膏如稠餳塗之良

又方

取馬齒草燒灰傅之頻貼差止千金同

又方

鹽灰傅之神驗並出第四卷中

魚臍瘡方一十首

千金療魚臍瘡似新火針瘡四邊赤中央如欲黑色可針刺之

若不痛即可畏也方亦名魚臍丁

臘月魚頭灰以亂髮灰等分以雞稀溏屎和令相得封瘡上頻貼差止此瘡見不足言而能殺人

又方

以寒食餳封之又硬者燒灰塗貼傅之即差

又療魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡上及四畔作孔擣白芷取汁滴著瘡孔中如無以乾白芷末用傅一云白苣

又方本方去療赤根下

取鼩鼠壤土以水和如泥塗貼上熱則易之差

又方

馬牙齒擣末以臘月猪脂和塗之拔根出即止亦燒灰用

又方本方去療犯下瘡

刺瘡頭及四畔令汁極出生粟黃傅上以麪圍之勿令黃出自旦至午根必出

又方同上

以麪圍瘡如前法以針亂刺瘡上及四畔取銅器煎酢令沸寫著麪圍中令容一盞冷即易之不過三度即拔根出

又方同上

以水四升煑蛇脫皮如雞子大三四沸去滓服之立愈又燒蛇皮灰以雞子清和塗上差並出第二十三卷中

崔氏療魚臍毒瘡腫方

瘡初生之時頭白如黍米許大當中黑如蟻四畔赤至四五日之後疼痛不可忍似潰不潰雖至潰

破膿出迴轉還滿疼痛不止者便是其候取獺屎以
水和封腫處及瘡上即得膿出止痛消腫慎口味
與患丁腫同必至差莫浪雜犯觸千金同

又方

取瞿麥和生油熟擣塗之亦佳並出第五卷中

丹毒方九首

肘後天丹者惡毒之氣五色無常不即療之痛不可堪又待壞
則去膿血數升或發於節解多斷人四肢蓋疽之類療之方

煮栗脥有刺者洗之姚同

又療發足踝方

擣蒜如泥以厚塗乾即易之集驗文仲備急同出
第二卷中

小品說丹毒一名天火也肉中忽有赤如丹塗之色大者如手

掌其劇者亘身體亦有痛痒微腫方

赤小豆二升

右一味末下篩以雞子白和如泥塗之乾復塗之逐手消也亘身者倍合之盡復作删繁千金同

又療丹諸單行方或得一物差

水苔　生蛇銜　生地黃　生松葉

蒴藋葉　五葉藤　慎火草　浮萍草

豆豉和水　大黃和水　梔子和水　黃芩和水

芒消和水

右十三味但得一物擣以貼之即差赤小豆末和雞子白塗之無雞子水和用之千金同

又方

新附淋草半斤　蛇退皮一條　露蜂房三兩

右三味以水一斗煑取四升以帛榻洗之隨手消神妙經用效故附此卷傳之

又方　煑粟取濃汁以洗之妙

又方　取曲蟮糞水和如泥塗之

千金論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗大者如手掌甚者音身痒微腫又白丹肉中起痒痛微虛腫如吹隱𤺋起亦有雞冠丹赤起大者如錢小者如麻豆粒如雞冠上澀一名茱萸火丹有水丹由體熱遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在中喜著腹及陰處此雖小疾不治令人至死療之皆用升麻膏方

升麻　白薇　漏蘆　連翹

芒消各二兩　黃芩　蛇銜　枳實炙各三兩

梔子二十枚　蒴藋四兩

右十味擣碎令細細然以水三升漬半日猪脂五升煎之候水氣竭去滓乾器中收之量取傅丹毒　頻塗傅之以差止上件丹及熱瘡腫皆用之効忌如常內宜服漏蘆湯文仲備急無白薇集驗亦然崔氏同

又療丹神驗方

芸薹菜葉擣令熟厚封之隨手即消散餘熱氣未愈三日以來封使醒醒好止乾則封之勿歇以絕本臣以正觀七年三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四體骨肉並疼比至曉頭痛目眩額左角如彈子大腫痛不可得近至午時近右角至夕諸處皆到眼遂閉合不得暫開幾至殞斃其縣令周公以種種方藥治皆不差經七日自處此方其驗如神故錄記之以傳來世云爾

赤丹方五首

病源赤丹者初發胗起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹出第三十一卷中

肘後療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或痒搔了腫起不即療之日甚殺人方

羚羊角煎以摩之數百遍若無羊角用牛脂及猪脂有毒藥者皆可用摩務令入分散毒氣神妙

又若已遍身赤者方

生魚合皮鱗燒擣末以雞子白和以遍塗之文仲備急同

又新附方

羚羊角無多少即燒之爲灰令極細以雞子清和塗之極神效無雞子以水和塗之亦妙出第二卷中一云亦小豆一升羊角燒之三兩爲末雞子白和傅之無羊角單用赤小豆良備急文仲同

集驗療人面目身體卒亦黑丹起如疥狀不療日劇遍身即殺人方

煎羊脂以摩之青羊脂最良千金文仲肘後删繁同

又方

以猪槽下土泥塗之千金同又以飼猪杓炙熨之即差

並出第八卷中

白丹方一十二首

病源白丹者初發痒痛微虛腫如吹胗起不痛不赤而白色由風冷故然色白也出第三十一卷中

肘後療白丹方

末豉以酒和塗之擣香薷葉若蓼傅之

又方

屋上塵以苦酒和塗之

又方

燒鹿角作灰以猪膏傅之

又方

蜜和乾薑末傅之

又方

酸摸草五葉草煑飲汁又以滓薄丹以帬亦佳備急

文仲同出第二卷中

集驗云有白丹者肉中起痒痛微虛腫如吹癊瘮起者療之亦如赤丹法有雞冠者赤色丹起大者如連錢小者如麻麥豆粒也肉上粟粟如雞冠肌理也方說一名爲茱萸火丹療之如天火法有水丹由體熱過水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在其中喜著腹及陰處療之亦如火丹法其水丹著人足趺及踹脛間者作黃色如火丹狀經久變紫色不療皆成骨瘡也無毒非殺人疾若成骨瘡即難差也經言風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒氣搏皮膚外發腠理開毫毛淫淫氣妄行之則爲痒也所以有風癊風瘙疾皆由於此有赤胗者忽起如蚊蚉咣煩痒劇者連連重沓壟腫起搔之逐手起有白胗者亦如此證也療之皆如療丹法也療之方

又方

擣白瓷器屑豬膏和塗之

又方

燒豬矢灰和雞子白塗之肘後千金備急文仲同

崔氏療丹毒或發背及諸腫方

取馬齒草熟擣傅之數數易勿住若得藍澱和之更良

又方

以生羊牛肉貼數數易之良

又方

鼠粘草根勿使見風及犬見洗去土熟擣以傅腫處兼絞取汁飲之佳

又方

茺蔚草蛇銜草慎火草相和熟擣傅之良數數易之

又方

擣鯽魚傅之數數易之良出第五卷中（本方云起鯽魚傅之）

備急療白丹方

苧根三斤小豆四升水二斗煑以浴日三四遍迠肘後文

仲同出第四卷中

丹胗方四首

病源丹胗者肉色不變又不熱但起癮瘮相連而微痒故謂之

丹胗出第三十一卷中

千金翼療丹癮瘮方

酪和鹽熱煑以摩之手下消也

又方

白芷根葉煑汁洗之効

又方

擣慎火葉封之神良

又方

以一條艾蒿燭竿以兩手極意尋之著壁伸十指當

中指頭以大艾炷灸燭竿上令燭竿斷即止灸十十

差於後重發更依此灸永差
赤胗白胗方一十一首
千金云凡赤胗熱時發冷即止白胗天陰冷即發方
白胗以水煑白礬汁拭之又煑蒴藋著少酒以浴又
以酒煑石南拭之又以水煑雞屎汁拭之又枳實汁
拭之所療一如療丹法集驗同
又方
末白朮酒服方寸匕日三盡五斤忌桃李蘇青魚鮓雀肉
又方
淋石灰汁漬洗之
又方
煎白芷根葉作湯洗之
又方
芥子末以酢漿水服方寸匕日三服差
又療身體赤癮癭胗而痒搔之隨手腫方
莽草二分 當歸 芎藭 躑躅花

大戟　細辛　芍藥　芫花

附子炮　椒各四分　猪脂二升半

右十一味切以猪膏合煎之候附子色黄膏成濾去滓收貯以傅病日三以差爲度

又方

礬石二兩酒三升漬令煬拭上立差

延年療赤白二胗丸方

白朮一斤　蔓荆子四分　防風四分　附子炮三分

桂心二分

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大酒服十丸日二服稍加至十五丸若能作散服一錢匕禁食桃李雀肉青魚鮓猪肉冷水生葱此療風癮正方凡風皆由舊來有風氣所以方中不得不用桂心附子白朮既用一斤附子只有二分復有防風其防風即能斷附子毒所以一物毒亦無所至伏聽進止

又其赤胗心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒消湯拭之方

芒消二兩

右一味用湯一升內芒消令消散以帛子沾取拭胗即漸除湯盡更合以前二件赤白胗方許崇處並出第十三卷中

古今録驗云赤胗者由冷濕折於肌中甚即為熱熱成赤胗也得天熱則劇取冷則減療之方

取生蛇銜草擣極爛以塗之最驗集驗小品同

又白胗者由風氣折於肌中之熱熱與風相搏遂為白胗也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣身暖亦差療之方

水煮枳實拭之佳集驗同又擣末熬之青布裹熨之出第三十卷中

肺風冷熱胗方二首

延年論曰凡風胗有二先受風寒氣其胗色白厚搔之即破應

手下有道佳此是肺家風冷氣宜外洗拭即定方

吴茱萸一兩清酒一升煑取五合以軟帛取汁拭胗處不過三兩度即定如胗處多用盡更合白胗即是肺藏受寒冷氣所發也

又療肺風熱皮膚生風結狀如胗或生風搔如水疥粟粒戢戢然方

天門冬八分去心 枳實十二分炙一六八分 白朮

人參各六分 獨活 苦參各五分有冷不用

右六味擣篩蜜和爲丸梧子大食後以飲下七丸日再服加至十丸忌鯉魚桃李蒜雀肉青魚鮓出第十三卷中

雜丹胗毒腫及諸色雜瘡方五首

刪繁療丹走皮中淫淫名火丹方

取蠐螬末水和傅之出第九卷中

千金療赤流腫方

榆根白皮擣末以雞子白和塗之出第二十三卷中

近效梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒消（四分） 大黃（四分） 梔子 甘草（炙）

黃芩 知母（各六分）

右六味切以水二升煮取九合去滓分温服忌如常法此方甚佳（一方芒消三兩大黃四兩梔子二七枚黃芩知母各三兩甘草二兩右以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒消分三服）

又療諸色瘡腫神驗方（考功韋郎中處）

胡粉（熬令赤） 赤小豆（熬） 糯米 吳茱萸

黃連（各一小兩） 水銀（一分）

右六味擣篩以生麻油和如稀麪糊然後取水銀於手掌中以唾指研熟訖入藥中令勻先椒湯洗瘡乾拭以藥塗之

日再以差爲度療孩子瘡佳一云用泔清洗瘡

又牛蒡粥療瘡腫方

取牛蒡根二莖淨洗煑令爛於盆中研令細去筋脉汁中即下米煑粥鹹淡任性服一椀甚良無忌

瘑瘡方一十二首

病源瘑瘡者由膚腠虚風濕之氣折於血氣結聚所生多著手足間遞相對如新生茱萸子痛癢抓搔成瘡黄汁出侵淫生長拆裂時差時劇變化生蟲故名瘑瘡出第三十五卷中

深師療瘑瘡方

荆木燒取汁塗之差救急同

又方

灸瘑上周帀最良並出第二十九卷中

集驗療瘑瘡方

苦酒一升温令沸以生韭一把内中以薄瘡上即差

范汪同

又方

雄黃一兩 黃芩二兩作屑 松脂二兩 髮灰如彈丸大

右四味以白膏與松脂合擣以傅瘡上范汪文仲備急用黃連餘同

又方

亂髮頭垢分等螺殼二十枚燒以臘月猪脂和如溜泥以傅之范汪同

又方

羊躑躅花三升以水漬之半月去滓以汁洗瘡一方炙鮓以傅瘡上蟲當出也范汪同

又方

桃花鹽等分合熟擣以酢和傅之范汪同

又方

皂莢十枚苦酒四升煑之去滓煎如飴以傅瘡上范汪同

又方

新瓦一口安雞屎熬酒下著火煎之成膏塗之

又方

穀木白汁一合 苦酒二合 小蒜半合 釜月下土一合

右四味和如泥以上塗塗裹之乾復塗之並出第八卷中范汪同

删繁療瘑瘡螺殼膏方

螺殼二七枚爛者 亂髮燒灰 頭垢 龍膽末

右四味各等分合研如粉以三年油淀和傅之加膩粉妙

又療瘑瘡多汁方

水銀八分以唾手掌中研令入藥用 黃連八分 胡粉八分令黃熬

右三味黃連爲末和以粉傅瘡上並出第二十九卷中

瘑瘡久不差方五首

病源瘑瘡積久不差者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間則生長常痒痛故經久不差出第三十五卷中

廣濟療瘑瘡久不差方

豆豉熬令極乾爲末先以泔清洗瘡拭乾以生麻油和之塗傅上差以油單片裹之三日開末差更塗差止

又療諸瘑瘡經年衣手拂疽痒引日生不差瘡久則有疽蟲藜蘆膏方

藜蘆六分　黃連八分　礬石熬汁盡　松脂

雄黃各八分研　苦參六分

右六味擣以厚絹下之用猪脂二升煎之候膏成去滓入雄黃礬石末攪令和調待凝以傅之諸瘡經年或搔之汁出不生痂百藥療不差恐主之瘑疥痔頭瘡亦効熱瘡者起

瘡便生白膿是也黄爛瘡者起瘡淺但出黄汁若肥瘡是也侵淫瘡者淺瘡黄汁出兼搔之漫延長不止是也瘑瘡者喜著手足相對痛痒坼裂春夏隨差集驗同

又方

剉羊桃枝葉

右一味水煮以洗之三四度

劉涓子療久瘑疥癬諸惡瘡毒五黄膏方

雄黄二兩研　亂髮如雞子大燒　黄連一兩　黄蘗二兩

黄芩二兩　青木香二兩　雞舌香一兩　白芷二兩

狼跋子四十枚　雌黄二兩研

右十味㕮咀以苦酒半升漬諸藥一宿以臘月猪膏三升煎取髮三四沸内諸藥又三沸止絞去滓膏成傅瘡日五過出

第五卷中

崔氏療瘡積年不差瘡汁浸四畔好肉復變成瘡瘡色赤黑痒不可耐搔之血汁出者方

黃連　黃蘗　豉心各三分擣爲末一方加蔓菁子亦有加杏人者與黃連等分擣篩之

胡粉　水銀　油脂以上三物和之如泥

右六物若慮水銀不散可內掌中細細和唾研之自當散訖然後攪胡粉等以塗瘡上仍取黃連末粉之此瘡多有黃汁著藥俟汁徹即易之以差爲度出第五卷中

癬瘡方一十一首

病源癬病之狀皮肉隱胗如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣否澀發此疾按九蟲論云蟯蟲在人腸內變化多端發動亦能爲癬而癬內實有蟲也養生方云夏勿露面臥露下墮面皮厚及喜成癬出第三十五卷中

肘後療癬瘡方

獨活根去土乃擣之一把許附子二枚炮擣以好酒和塗之三日乃發欲傳藥先以皂莢湯洗拭令乾然後傳藥便愈出上卷中

深師療癬祕方

雄黃一兩研 硫黃一兩研 羊蹄根一兩 白糖一兩 荷葉一兩

右五味別後三種擣如泥合五種更擣和調以傅之若強以少蜜解之令濡不過三差

又療癬神驗方

用雄黃研以淳苦酒先和以新布拭癬上令傷以藥塗之神効不傳

又方

昌蒲細切取五升以水五斗煑取二斗以釀二斗米如酒法熟極飲令得極醉即愈未差更作無有不愈

一云長服昌蒲末酒調并作丸佳

又方

取乾蟾蜍燒灰末以猪脂和塗之良出第二十卷中

千金翼療癬祕方

擣羊蹄根分著瓷中以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者傅之如炊一石米久拭去更以三年大醋和之以傅癬上燥便差若刮瘡處不傷即不差深師

同出第二十三卷中

救急療癬方

先以針鑲癬上即擣瓜蔕末傅上仍先以泔洗之

又方

烊松脂擣熏黄末和更煎仍以泔清洗癬乃熱傅之

一兩度即差並出第五卷中

必効療癬方

淳甲煎塗之愈好口脂亦得

又方

附子炮一枚　大皂莢炙一枚　九月九日茰茱四合

右三味爲散揩癬上令汁出傅之乾癬苦酒和塗之深師

古今録驗同並出第四卷中

古今録驗療癬方

作麻浮傅癬上裹之差麻浮不差以鹽及鼓和擣

塗之即差止

乾濕癬方一十五首

病源乾癬但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也皆是風濕邪

氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏所生若其風毒氣多濕氣少故風沈入深故無汁爲乾癬其中生蟲

又濕癬者亦有匡郭如蟲行侵淫赤濕痒搔之多汁成瘡是其風毒氣淺濕多風少故爲濕癬也其中亦有蟲出第三十五卷中

肘後療燥癬方

水銀和胡粉研令調以塗之范汪同

又方

以雄雞冠血塗之范汪同

又方

胡粉熬令黃赤色苦酒和塗之乾即易差止

又方

以穀汁塗之

又方

擣桃白皮苦酒和傅之佳千金同

又療濕癬方

刮瘡令坼火炙指摩之以蛇床子末和猪脂傅之差止

深師療乾濕癬神方

取狼毒末以苦酒研之如墨法先洗刮令傷以傅之差

不用大塗壞人肉范汪同

又烏梅煎治燥濕癬方

烏梅十四枚　大蒜十四枚　屋塵三合　鹽三合

大麻子四合

右五味相和熟擣以醶苦酒一升半拌和以傅之日三過差

又香瀝療燥濕癬及瘑疥百瘡方

柏節　杉節　沈香節　松節各一斤

右四味悉碎一如指大以布囊盛之音令囊注麻腴中半食頃出漉先取一枚白坩穿去底令孔如雞鴨大以松葉一小把藉孔上以坩安著白鹽以黃土泥塩坩合際令厚數分畢以藥內坩中以生炭著藥上使然其瀝當流入塩中

須然盡乃開出取堰中汁以薄瘡上日再用之療白秃疽疥惡瘡神効出第二十九卷中

崔氏療乾濕癬方

取楮葉面著癬用匙背打葉葉碎即換可三四度換即差亦可只用一葉唯熟打使極碎即裹之勿令碎葉落即差

又療乾癬積年痂厚搔之黄水出每逢陰雨即痒方

取巴豆肥者一枚炭火上燒之令脂出即於斧上以指研之如杏藝法以塗癬上薄傅之不過一兩度便愈

又療乾癬諸治不差者方

但看癬頭有𤺥瘤子處即以小艾炷灸之差出第五卷中

古今録驗療濕癬方

石硫黄研大醋三年者和數數傅瘡上

又方

蛇床子一兩　黄蘗一兩　黄連一兩　胡粉一兩研

右四味擣篩為散内水銀一棗大和猪膏研入相和以塗瘡

劉公患脚膝巳不可著之旬日間差云是驗方

又方

取肥猪肉薄割之於鏊上若尉底炙之令熱使人體堪之以傅瘡上日三四度出第四十卷中

疥癬惡瘡方五首

廣濟療疥癬惡瘡方

石硫黄六兩白礬十二兩熬並於瓷器中研以烏麻油和稠調如煎餅麪更熟研傅之熱炙疥癬上摩一二百下乾即移摩之取差出第五卷中

劉涓子療疥癬惡瘡膏方

丹砂研 雄黃研 亂髮 白蜜

松脂別入名一兩 蔄茹三兩 巴豆十四枚去皮 猪膏二升

右八味先煎猪膏亂髮消盡內松脂蜜三上三下絞去滓末蔄茹石藥內膏中更一沸以攪令極調以傅瘡上日三差止

神効出第五卷中

救急療癬瘡方

白礬石熬 多年韭根 雄黃研 藜蘆

瓜蔕 胡粉各一分 水銀三分

右七味以柳木杵研水銀使盡用猪脂一升煑藜蘆韭根瓜蔕三沸去滓入石藥等攪令相得以傅瘡上甚妙

近効療熱瘡疥癬痒痛不可忍者方

消石止一物先用泔清洗瘡去痂拭乾看瘡大小研消石末和生麻油如麪糊以塗瘡上三兩度差

又方

水銀蕪荑酥和塗之　薑黃塗之　牛李子塗之

醋煎艾塗之　羊蹄根和乳汁塗之出第三卷中

疥風痒方七首

肘後療疥方

石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾乃以

此汁洗之有効出第六卷中

深師療疥大黃膏方

黃連十四銖　藜蘆十二銖　大黃一兩　乾薑十四銖

䕡茹十銖　莽草十二銖　羊躑躅十銖

右七味擣篩以成煎猪脂二斤微火向東煎之三上三下膏成

去𣏌汁盡付之神効合時勿令婦人雞犬見之出第二十九卷中

集驗療疥方

擣羊蹄根和猪脂塗上或著少鹽佳范汪同

又療疥及風瘙瘡苦痒方

丹參四兩　苦參四兩　蛇床子一升

右三味切以水六升煎之以洗疥瘡以粉粉身日再爲之即差

備急葛氏療疥瘡方

取楝根削去上皮切皂莢去皮子分等熟擣下篩脂膏和搔疥去痂以塗之護風勿使女人小兒雞犬見之范汪同

又療方

石硫黄無多少研粉以麻油或以苦酒和塗摩之以酒漬苦參飲之並出第五卷中

薫疥法

取艾如雞子大先以布裹亂髮於紙上置艾熏黄末

朱砂末杏人末水銀各如杏人許水銀於掌中以唾研塗紙上以卷藥末炙乾燒以熏之一云筒瓦一口用安灰蓋上以繩束之用熏疥於脚頭被內罨之少時火盡上隔日一熏不過再即差無所慎

外臺祕要卷第三十

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙子孟校勘

外臺祕要方

三十一

採藥時節所出土地
諸家丸散酒煎
解諸毒等

外臺秘要方卷第三十一 採藥時節所出土地諸家丸散酒煎解諸毒等二十三門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

五加酒方一首
代茶飲方一首
解飲食相害成病百件
食魚中毒及食鱠不消方五首
食椒菜瓠中毒方四首
解一切食中毒方三首
酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首
飲酒連日醉不醒方九首
飲酒令難醉方一首
飲酒積熱方二首
斷酒方一十五首
服藥過劑及中毒方一十一首
解諸藥草毒方二十九首

解諸蛇蟲毒方六首

辨五大毒方一首

解金鐵等毒方八首

惡毒障氣毒風腫毒方四首

採藥時節一首

千金翼論曰夫藥採取不以時節不知陰乾暴乾雖有藥名終無藥實故不依時採取與朽木不殊徒費人功卒無裨益其法雖具大經學者尋覽造次難得所以甄別即目可知耳

萎蕤立春後採陰乾　藁本暴乾三十日　通草取枝陰乾　烏喙陰乾

烏頭陰乾　絡石陰乾以上並正月採　茯苓陰乾　茯神陰

桂心陰　白朮暴　乾地黃陰　天門冬暴

麥門冬陰　署預暴　甘草暴　人參暴勿見風

石龍芮採皮陰　藁本暴　龍膽陰　杜仲陰

牛膝陰　細辛陰　獨活暴　升麻暴
柴胡暴　榆皮暴　藍葉暴　當歸陰
防風　芍藥　桔梗　秦艽
前胡　知母　栝樓根　沙參
狗脊　茜根　王不留行　萆薢
菝葜　白芷　杜若　百合
白斂　地榆以上暴乾　大黃火乾　虎掌
黃連　秦皮　豬苓　石韋
紫菀　紫葛　狼毒　鬼臼
天雄　防巳　烏喙　烏頭
甘遂　牡丹　巴戟天　石南葉
貫衆　羊桃　黃精　黃耆以上並陰乾二月採
黃芩陰三日採　大青陰　天門冬暴　水萍暴

原朴陰　青葙葉陰　玄參陰　白薇三日採陰
艾葉三日採暴　芫花三日採陰　商陸　白朮暴
麥門冬陰　紫菀陰　躑躅陰　射干三日採陰
茵芋三日採陰　黃環陰　澤蘭三日採陰　蕪荑陰
杜蘅暴　藍葉　王瓜陰　寄生三日採陰
防葵三日採暴　紫草陰　芎藭暴　苦參暴
茜根暴　紫參火炙　澤漆陰三日採　藜蘆陰以上並三月採
赤箭　菥蓂子　蒲黃　玄參
蘼蕪以上暴　遠志陰　景天陰　人參暴
芎藭　大青陰　白頭翁　白鮮
石南葉　鼠尾草以上並四月採陰乾　昌蒲陰
卷柏陰　白鮮陰　澤瀉陰　車前五日採陰
石龍芮子　蜀漆陰　肉蓯蓉陰　菥蓂子暴

覆盆子　乾漆夏至後採　半夏暴　五加採莖陰
杜仲　茵蔯陰　莽草陰　蕤核
葛根暴　丹參暴　蛇床子陰　葶藶子立夏後採陰
芫蔚子　青葙子　莨菪子　蘼蕪暴
松蘿陰　旋復花暴　萹蓄陰　藺茹陰
青蘘巨勝苗也以上五月採
松脂　青葙子　茅根　杜仲
蕘花以上六月採陰　石斛陰　五加皮採莖陰　卷柏陰
海藻七日採暴　腐婢陰　澤漆陰　天門冬暴
鼠尾花以上並七日採陰
瓜蔕七日採　槐子七日採　麻黃立秋採陰　石龍芮暴
景天陰　飛廉陰　薇銜陰　菌桂陰立秋採
水蘇　瞿麥立秋取實陰　桃人陰　續斷陰

蒺藜子暴以上並七月採
白瓜子陰　飛廉陰　女青陰　地榆暴
大黃火乾　桔梗暴　大棗暴　楮實暴
秦皮陰　桂陰　營實陰　鬼臼陰
百合暴　牡丹陰　防巳陰　狼毒陰
萆薢暴　菝葜暴　白芷暴　連翹陰
苦參暴　石龍芮陰　狗脊暴　白斂暴
前胡暴　知母暴　栝樓根暴　巴豆
猪苓陰　茯神陰　蛇含陰　茯苓陰
虎掌陰　薏苡人　天門冬　麥門冬陰
杜若暴　當歸陰　蓍實暴　柴胡暴
升麻暴　獨活暴　細辛陰　牛膝陰
石斛陰　人參暴　署預暴　甘草暴

敗醬暴　恒山陰　半夏暴　雷丸暴
牡荆陰　漏蘆陰　酸棗陰　白朮暴
秦艽暴　龍膽陰　巴戟天陰　蒺藜子暴
黃連　沙參暴　王不留行暴　續斷陰
貫衆陰　乾地黃陰　地膚子陰　五味子陰
蜀椒陰　雚菌陰　鬼箭陰　附子上旬採
秦椒　澤瀉陰　牙子暴　黃耆陰
芍藥暴　石南實陰以上八月採　松實陰　菊花陰
蓍實暴　乾薑　枳實陰　白朮暴
楮實暴　厚朴陰　杜仲　皂莢陰
山茱萸陰　吴茱萸九日採陰　梔子暴　辛夷暴
牡荆陰　秦椒　菟絲子暴　營實陰以上並九月採
麥門冬陰　牛膝陰　地膚子陰　枳實陰

防風暴　決明子　皂莢陰　桂陰

菴䕡子陰　山茱萸陰　五加根陰　厚朴陰

雲實暴　貝母暴以上並十月採

茦子陰　莧實陰　款冬花陰　龍膽陰以上並十一月採

冬葵子　昌蒲　龍膽　忍冬

木蘭　大戟以上並十二月採陰　枸杞子冬採根春夏採葉秋採莖實陰

桑根白皮採無時　柏葉四時各依方面採之神陰　蒴藋春夏採葉秋冬採根莖

論曰凡藥皆須採之有時日陰乾暴乾則有氣力若不依時採之則與凡草不別徒棄功用終無益也學者當要及時採掇以供所用耳

藥所出州土一首

千金翼論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事惟新所以須甄明即[illegible]

土地名號後之學者容易即知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種其餘州土皆有不堪進御故不繁錄耳

關內道

雍州　柏子人　茯苓

華州　覆盆子　杜蘅　茵芋　木防已　黃精　白朮　茯苓　茯神　柏白皮　天門冬　麥門冬　王不留行　署藥　牛膝　細辛　鼈甲　丹參　鬼臼　白芷　款冬花　白斂　狼牙　水蛭　松花　鼈頭　小草　桑螵蛸　松子　松蘿　兔肝　遠志　澤瀉　五味子　菝葜　桔梗　玄參　沙參　續斷　山茱萸　萆薢　白薇　通草　石南　石韋　龜頭

同州　䗪蟲　斑猫　麻黃　寒水石　麻黃根　蕪荑　蒲黃　麻黃子

岐州　㯳雞　麏骨　麏髓　鬼督郵　及巳　漏蘆　秦艽　甘草

寧州　芫青　菴䕡子　萹蓄　荊子　䖟蟲　菴䕡花

鄜州　芎藭　䕡茹　黃芩　秦艽

原州　獸狼牙　楓柳皮　蓯蓉　黃耆　白藥

延州　蕪荑

涇州　澤瀉　秦艽　防風　黃芩

靈州　代赭　蓯蓉　野猪黃　猪脂　　鹽州　青鹽

河南道

洛州　黃魚膽　黃石脂　秦椒　　穀州　半夏　桔梗

鄭州　秦椒　　陝州　栝樓　柏子人

汝州　鹿角　鹿茸　　許州　鹿茸

虢州　茯苓　細辛　茯神　白石英　桔梗　栝樓　桑上寄生

豫州　吳茱萸　鹿茸　　齊州　阿膠　防風　榮婆藥

萊州　牡蠣　文蛤　蔄茹　烏賊魚　七孔決明　牛黃　海藻　海蛤　馬刀

兗州　防風　紫石英　仙靈脾　雲母　羊石　桃花石　　密州　海蛤　牛黃

泗州　麋脂　麋角　　徐州　桑上寄生

淄州　防風　　沂州　紫石英

河東道

蒲州 龍骨 石膽 紫參 龍角 五味子 龍齒 蒲黃　絳州 防風

隰州 當歸 大黃　汾州 石龍芮 石膏

潞州 赤石脂 人參 不灰木 白石脂　澤州 禹餘粮 防風 人參 白石英

并州 白菀 礬石 鬼督郵 礜石 白龍骨 甘草 柏子人　晉州 白堊 紫參

代州 柏子人　蔚州 松子

慈州 白石脂

河北道

懷州 牛膝　相州 知母 磁石

箕州 人參　滄州 雚菌

幽州 人參 蛇膽 知母　檀州 人參

營州 野猪黄　平州 野猪黄

山南西道

梁州 小蘗 野猪黃 芒消 蘇子 理石 狟脂 皂莢 防巳 洋州 野猪黃 狟脂

鳳州 鹿茸 始州 重臺 巴戟天

通州 藥子 渠州 賣子木

商州 香零皮 辛夷 厚朴 恒山 楓香脂 獺肝 楓香木 杜仲 能膽 莽草 龍膽 熊脂 菖蒲 枳實 秦椒 芍藥

金州 獺肝 獺肉 枳茹 枳實 莽草 枳刺 蜀漆 恒山

山南東道

鄧州 射干 蜈蚣 甘菊花 梔子花 蜥蜴 牡荊子 襄州 石龍芮 茗草 藍實 雷丸 蜀水花 陵鯉甲

烏梅 梔子花 牽牛子 乾藍 橙葉 孔公孽 蜥蜴 敗醬 蜈蚣 貝母 鸕鷀頭

均州 萎蕤 荆州 橘皮

夔州 橘皮 硤州 杜仲

房州 野猪黃 狟脂 唐州 鹿茸

淮南道

楊州 白芷 蛇床子 鹿脂 鹿角 壽州 光州 蘄州 黃州 舒州 並出生 石斛 申州 白皮

江南東道

潤州 躑躅 鬼臼 貝母 半夏 卷柏

越州 榧子 劉寄奴

婺州 睦州 歙州 建州 並出黃連

泉州 乾薑

江南西道

宣州 半夏 黃連

饒州 黃連

吉州 陟釐

江州 生石斛

岳州 杉木 楠木 蟬蛻 鼈甲

潭州 生石斛

朗州 牛黃

永州 石鷰

郴州 鈞樟根

辰州 丹砂

隴右道

秦州 防葵 獸狼牙 芎藭 狼毒 鹿茸 鹿角 蘼蕪

成州 防葵 狼牙

蘭州 蓯蓉 鹿角膠

武州 石膽 雌黃 雄黃

廓州 大黃

宕州 藁本 當歸 獨活

河西道

涼州 大黃 鹿茸 白附子 甘州 椒根

肅州 肉蓯蓉 百脉根 伊州 伏翼 葵子

瓜州 甘草 西州 蒲桃

沙州 石膏

劒南道

益州 苧根 梅煎 枇杷 蜀漆 黃環 薏苡人 鬱金 百部根 百兩金 恒山 薑黃 乾薑 木蘭 慎火草 沙糖

眉州 巴豆 綿州 天雄 側子 烏頭 巴戟天 附子 甘皮 烏喙

資州 折傷木 嘉州 巴豆 紫葛

邛州 賣子木 瀘州 蒟醬

茂州 升麻 馬牙消 羗活 朴消 金牙 大黃 馬齒礬 雄黃 芒消 礬石

巂州 高良薑 松州 當州 並出當歸

扶州 芎藭 龍州 側子 烏頭 巴戟天 烏喙 天雄 附子

柘州 黃連

嶺南道

廣州 石斛 白藤花 丁根 決明子 甘椒根　韶州 石斛 牡桂 鍾乳

賀州 梧州 象州 並出蚺蛇膽　春州 封州 瀧州 並出石斛

恩州 蚺蛇膽　桂州 滑石 蚺蛇膽

柳州 桂心 鈞樟根　融州 桂心

潘州 蚺蛇膽　交州 檳榔 三百兩 銀 龍眼 木藍子

峯州 豆蔻

馬牙石一名長石一名太乳一名牛腦石出在齊州歷城縣　空青出蔚州蘭州宣州梓州宜州者佳蔚州者無空塊大色深

曾青鄂州蔚州者佳餘州者惡　白青簡州梓州者並佳

石膽蒲州虞鄉東亭谷及薛集窟塊子雞子大者佳　乳出連廣澧朗柳等州令陝州青溪房三洞出者亞於始興者自餘不可用也

芒消同名爲消石嶺南始安出者佳萊州齊州者惡　赤石脂虢州盧氏縣澤州陵川縣慈州呂鄉縣並有凡石中有石骨如玉

堅潤服之勝乳　桃花石舊出申州鍾山縣似赤石脂但不著舌

石腦一名飴餅出徐州宋里山入土一丈餘得之大如雞子觸著即破　陽起石齊州歷城縣西北五六里齊山西北六七里盧山出之白者佳黑者不堪

凝水石出同州韓城縣色青黃理如雲母者佳澄城斜理文逆白者劣　青琅玕出巂州西烏白蠻中及于闐國一名青珠

礜石漢川武當西遼坂名礜石谷即是其眞者梁州馬道戍澗中有　莙石梁州均州房州金州並出

土陰孽色白如脂出渭州鄣縣三交驛西北坡平地土窟中乳是也有六十餘坎人去服之同鍾乳不發熱

代赭今靈州鳴沙縣者大勝齊代所出者

戎鹽沙州名爲禿登鹽廓州名爲土陰鹽生河岸上坂之陰燒之不鳴　薑石齊州歷城東者良

論曰既知無物非藥及所出土地復採得時須在貯積以供時用不得虛棄光陰臨時忽遽失其機要使風燭不救實可悲哉博學者深可思之用爲備耳

用藥分兩煑湯生熟法則一十六首

千金或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而差病不及古人者何也荅曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味眞實百姓少欲禀氣中和感病輕微

易爲醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以爲
醫故病輕藥味須少痾重用藥即多此則醫之一隅何足怪也
又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所
以療十得九今之醫者但知診脉處方不知採藥時節至於出
處土地新陳虛實一皆不悉所以療十不能得愈五六者寔由
於此處方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤
耳將來學者須詳熟之
凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映澈色理鮮
淨者爲佳不然令人身體乾躁發熱口乾而死
凡草木藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾療病不愈
凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘唯
須精新也
問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何

答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有彊有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經即不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸藥草石彊弱相欺入人腹中不能治病更加鬬爭草石相反使人迷亂力甚刀劒若調和得所雖未能治病猶得利安五藏於病無所增劇例日諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚下注之令方不然此篇具條之更不煩別注也

凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤

凡石藥及玉皆碎如米豆以綿裹內湯酒中煑之

凡鍾乳及諸石以玉鎚著水研之三日三夜漂練務令極細乾研即七日七夜

凡銀屑以水銀和成泥

凡礜石以黃土泥團之火燒半日乃熟可用仍不得過之

凡朴消礬石燒令汁盡乃入丸散芒消朴消皆絞湯訖乃內汁中更上火兩三沸令烊盡乃服

凡湯中用丹砂雄黃細熟研如粉臨服乃投湯中攪令調和服之

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子蕤核決明子之類是也細花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之

凡橘皮吴茱萸椒等入湯不㕮咀

凡諸果子人皆去尖皮及兩人者湯柔撻去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黃者湯成下

凡生麥門冬生薑入湯皆切三擣三絞取汁湯成去滓下之煑五六沸依如升數不可共藥煑一法薄切用之

凡麥門冬皆微潤抽去心
凡麻黃去節別煑兩三沸掠去沫更益水如本數乃內諸藥煑之不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛白前三分斬之膏中細切用之
凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以碪搥極打令碎乃入臼不爾擣不熟
凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭皮輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓猪苓削去黑皮秤牡丹天門冬巴戟天遠志冶葛等皆搥破去心紫菀洗去土戟乾乃秤之薤白葱白除青令盡莽草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼臼黃連皆除根毛石韋辛夷拭去毛又去心蜀椒去目及閉口者用大棗烏梅皆去核用鬼箭削取羽皮
凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥唯赤者

凡菟絲子湯洮汰去土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白擣之不盡者更以酒漬之三五日乃出暴微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子

凡椒雲實微熬令汗出則有勢力凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆塘灰炮令微坼削去黑皮乃秤之唯薑附湯及膏酒中即生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片半夏熱湯浸洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散皆塘灰炮之用

凡巴豆去心皮膜熬令紫色杏人桃人葶藶胡麻諸有膏脂藥皆熬黃別擣令如膏脂攪視之泯泯爾乃以向成散稍稍下臼中合研擣令消散乃復都以輕絹篩之須盡又内臼中依法研治數百杵也湯膏中亦有熬者雖有生用者並擣破

凡麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆熬令煙斷烏梅入

丸散熬之用熟艾者先炒和諸藥擣之令細散不可篩者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鯪鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑猫諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣熬令黃色殭蠶蜂房微熬之

凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黃須末如粉臨服內湯中攪令調和服之

凡丸散用膠先炙令通體沸起燥乃可擣有不沸處更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火令烊盡

凡用蜜先以火煎掠沫令色紫黃即丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用蠟烊之投少蜜中攪調以和藥

凡湯中用飴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

又云古秤唯有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分爲一兩十六兩爲一斤此則神農之秤也吳人以二兩爲一兩隋人以三兩爲一兩今依四分爲一兩爲定方家有云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種或五種皆悉分兩同等爾

凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸匕須差止是三五兩藥爾

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落爲度錢匕者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄一邊爾並用五銖錢也錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落爲度一撮者四刀圭也十撮爲一

勺十勺爲一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩即以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍爲一大豆也如大麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今之青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸匕散蜜和得如梧桐子十丸爲度如彈丸及雞子黃者以十梧子準之

凡方云巴豆若干枚者當先去心皮畢乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去核畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩乾薑一累者以半兩爲正本草云以一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正椒一升三兩爲正吴茱萸一升五兩爲正兎絲子一升九兩爲正菴䕡子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩半爲正地膚子一升四兩爲正此其不同也云某子一升者其子各有大小虛實輕重不可通以秤準皆取平升爲正

凡方云桂一尺者削去皮重半兩爲正甘草一尺者重二兩爲正云某草一束者重三兩爲正云一把者重二兩爲正

凡方云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂擣篩如法也

凡丸散先細切暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其濕潤藥如天門冬乾地黄輩皆先切暴乾獨擣令偏碎更出細擘暴乾

若值陰雨可微火烘之小停冷乃擣之
凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之爲正其湯酒不須
如此
凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹
於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者
凡篩丸散藥畢皆更合於臼中以杵擣之數百過視其色理和
同爲佳
凡煑湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水
一斗煑取四升以此爲率皆絞去滓而後酌量也然則利湯欲
生少水而多取汁者爲病須快利所以少水而多取汁補湯欲熟
多水而少取汁者爲病須補益是以多水而少取汁好詳視之不
得令水數多少湯熟可用新布兩人以尺木絞去滓澄去垽魚靳切
濁分再服三服者第二第三服以紙覆令密勿令洩氣欲服以

銅器於熱湯上煖之若於鐺中勿令有水氣方云再服三服者要令力勢相及并視人之暴羸病之輕重以爲進退增減之不必悉依方說也

古今諸家丸方一十七首

廣濟療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癎鬼忤中小兒吐乳大人狐狸等病吃力伽丸方

吃力伽（白朮是也） 光明砂 麝香當門子 訶梨勒皮

香附子 丁子香 沉香 蓽撥

檀香 青木香 安悉香 犀角（各一兩）

薰陸香 蘇合香 龍腦（各半兩）

右十五味擣篩白蜜和爲丸每朝取井花水服如梧子四丸於淨器中研破服之老小一丸以蠟裹一丸如彈丸緋絹袋盛當心

帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時量之忌五
辛生血物以臘月合神前藏之密器中勿令洩藥氣神驗
千金耆婆萬病丸療七種澼塊五種癲病十種注忤七種飛尸
十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種水病八種大風十二種
㾦痺并風入頭眼暗膜膜及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得臥
飲食不作肌膚五藏滯氣積聚不消擁閉不通心腹脹滿連
及胷背鼓脹氣堅結流入四肢或復叉心膈氣滿時定時發十
年二十年不差五種下痢疳蟲蚘蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱
久積淡飲令人多睡眠消瘦無力蔭入骨髓便成滯疾身體氣
腫飲食嘔逆署脚酸疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷
入子藏藏中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時
疹痛爲患或因此斷產并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞
等病服此藥以三丸爲一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮

盡故稱萬病丸以其牛黃爲主故一名牛黃丸以耆婆良醫故

名耆婆丸方

牛黃　麝香　犀角　朱砂

雄黃研　芫青去翅足熬本方七枚　黃連　人參

禹餘粮　大戟炙　芫花熬　茯苓

乾薑　桂心　桑白皮　當歸

芎藭　芍藥　甘遂熬　黃芩

蜀椒汗　細辛　巴豆去皮心别熬擣　前胡

桔梗　紫菀　蒲黃　葶藶子熬

防風各一分　蜈蚣三節炙　石蜥蜴一寸炙

右三十一味並令精細上牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘粮

巴豆别研餘者合擣篩之以白蜜和更擣三千杵極熟密封之

除破日平旦空腹以酒服三丸如梧子微下三五升惡物爲良若

卒暴病不要待平旦無問早晚即服以吐利爲度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利爲度不得限以丸數病彊藥少即不利吐更非他若其發遲以熱稀粥一杯發之若吐利不止即以酸飯兩三口止之服藥忌陳臭生冷酢滑粘食大蒜猪魚雞狗馬驢肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新米韭骨汁作羮粥臛飲食之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服之吐利以後常須閇口少語於無風處溫牀暖室將息若旅行卒暴無飲以小便送之若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利爲疾近病及卒病皆用多積久疾病即少服常取微溏利爲度（崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風）卒病欲死（服三丸如小豆取吐利即差）卒得中惡口噤（服二丸如小豆和煖水一合灌入口令下令微利即差）五注鬼刺客忤（服二丸如小豆不差後日更服三丸）男女邪病歌哭腹大如妊身（服二丸如小豆日三夜一服間食服之）猫鬼病（服小豆三丸不差更服）蠱毒吐血腹痛如刺（服小豆二

丸不差更服以差止瘧病未發前服三丸未差更服諸痰飲者服三丸如小豆不差更服冷癖服三丸如小豆日三服皆間食常令微溏利爲度宿食不消服二丸如小豆取利癥瘕積聚服二丸如小豆日三服皆間食以利差拘急心腹脹滿心痛服三丸如小豆未差更服上氣嘔逆胷中滿不得卧服二丸不差更服大痢服小豆一丸日三疳濕以一丸如杏人和酢二合灌下部中服小豆二丸差水病服三丸如小豆日再間食服之差止人弱隔日服頭痛惡寒服小豆二丸覆取汗傷寒天行病服二丸小豆大日三間食服小便不通服小豆二丸不差明日更服之大便不通服三丸如小豆大又內一丸下部中則通耳聾亭耳以綿裹如棗核塞耳中差鼻衄服二丸如小豆無不差癰腫丁腫破腫內一丸如麻子日一傅之根自出亦服二丸差犯丁腫血出以猪脂和塗有孔內孔中差止癘瘡以酢泔洗訖取藥和猪脂塗之漏瘡有孔以一丸如小麥內孔中和猪脂傅上痔瘡以藥塗綿內孔中別易差止瘰癧以酢和塗上差癬瘡以布揩令汁出以酢和塗上日一易差止胷背胥脅腫以醋和傅腫上日一易之服二丸如小豆諸瘑瘡積年不差者以酢和塗之亦餅貼之惡刺以一丸內瘡孔中即差蝮蛇螫以少許內螫處若毒入腹心煩悶欲絶者服三丸如小豆大蠍螫以少許塗之蜂螫以少許傅之差婦人諸疾胞衣不下服二丸如小豆大小兒驚癇服一丸如米許以塗乳令嗍之看兒大小量之小兒客忤服一丸如米如塗乳頭與嗍之以意量之小兒乳不消心腹脹滿服一丸如米許塗乳頭令嗍之取差

又大麝香丸療鬼注飛尸等萬病皆療之方

麝香（三分） 牛黄 真珠（並研） 附子（炮）

鬼臼 莽草（炙） 犀角（屑） 礬石（熬令汁盡）

細辛 桂心 獺肝（炙） 藜蘆（各二分）

蜈蚣（炙） 蜥蜴（炙各一枚） 地膽（熬） 斑猫（熬）

芫青（熬） 亭長（熬各七枚並去足翅） 巴豆（去心皮熬）

杏人（去尖皮熬各五十枚） 丹沙（二兩研） 雄黄（一兩研） 礜石（八分泥裹燒半日）

右二十三味合擣別擣巴豆杏人如泥蜜和更擣三千杵丸如小豆每有病以飲服一丸日再漸至三丸尤妙毒蟲毒所螫以摩之以知爲度若欲入毒疫癘鄉死喪家及鬼神廟塚墓處以絳囊盛之男左女右肘後繫之又以少許塗人中卧不魘魅神驗忌如常法

又小麝香丸主療與大麝香丸同方

麝香三分　雄黃研　丹砂研各四分　細辛
乾薑　桂心　芍藥各五分　甘草炙
犀角屑　梔子人各三分　附子炮　烏頭炮各五枚去皮
巴豆五十枚去心皮熬　蜈蚣一枚去頭足炙

右十四味並擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆每服三丸至五丸日三一切尸注心痛皆主之忌生血物生葱生菜蘆笋豬肉冷水神驗一方有當歸一兩

崔氏温白丸療癥癖塊等一切病並治之方

紫菀　吳茱萸　昌蒲　柴胡
厚朴炙　桔梗　皂莢去皮炙　茯苓
桂心　乾薑　黃連　蜀椒汗
巴豆去心皮熬　人參各三分本方各二分　烏頭炮十分

右十五味合擣篩以白蜜和更擣二千杵丸如梧子大有病服一丸

至二丸不知稍增至三丸五丸以知爲度主心腹積聚久癥癖塊
大如盃椀黄疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來
搶心傍攻兩脅徹背連肾痛無常處繞臍攪痛狀如蟲咬又療十
種水病八種痞塞反胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積年食不
消化或婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝或痃瘧連年不差又療一
切諸風身體頑痺不知痛痒或半身不遂或疼痛或眉髮墮落
又療七十二種風三十六種遁尸注或癲癇或婦人五邪失心夢與
鬼神交通四肢沉重不能食飲昏昏默默只欲取死終日憂愁
情中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不調真似懷孕連年累
月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭爲鬼所亂莫之知也但服此
藥者莫不除愈臣知方驗便合藥與婦人服之十日下出癥癖蟲
長二尺五寸三十枚下膿二升黒血一升青黄汁五升所苦悉除當
月有子臣兄墮馬被傷腹内有積血天陰即發羸瘦著牀命在旦

夕與藥服下如雞肝黑血如手者二百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣知方驗敢不獻上忌生冷酢滑猪雞魚犬牛馬鵝肉五辛油麪豆糯米陳臭等物

仲景三物備急丸司空裴秀爲散用療心腹諸卒暴百病方

大黃　乾薑　巴豆各一兩去皮心熬別擣如脂

右藥各須精新好藥擣篩蜜和更擣一千擣丸如梧子或小豆服三丸老小量之爲散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之或不下捧頭起灌令下咽須臾差如未更與三丸以腹中當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之令入尤妙神驗忌蘆笋猪肉冷水肥膩

又理中丸療三焦不通嘔吐不食并霍亂吐痢不止者並主之方

人參　乾薑　白朮　甘草各三兩炙

右四味擣篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五丸忌桃李雀肉海

藻菘菜

延年駐車丸主赤白冷熱血痢腹痛者方

黃連六兩 乾薑 當歸 阿膠各三兩

右四味擣篩以三年米醋煮膠令消和藥衆手撚丸如梧子每以飲下三十丸日再服亦療産婦下痢不止者服之甚驗忌猪肉冷水粘膩等物

救急五香丸療諸毒疰氣心腹脹滿大小便不通鬼疰心痛不可忍方

牛黃研 犀角屑各三分 升麻 沈香

薰陸香 當歸 桂心 青木香

麝香研 雄黃研如粉 鬼箭羽 巴豆去心皮熬

訶梨勒皮 朱砂研 檳榔人 乾薑

吴茱萸 甘草炙 豆蔻各四分 桃人去尖皮熬

附子（炮各五分）

右二十一味擣篩蜜和丸如梧子以煖水服三丸至五丸如不利更服以利爲度此方甚驗人久不傳忌海藻菘菜猪肉冷水生葱蘆笋生血物等

必効玉壺丸主萬病與麝香丸同効方

雄黄（研） 朱砂（研） 特生礜石（燒半日研） 巴豆（去心皮熬）

附子（炮去皮） 藜蘆（各三兩炙）

右六味擣篩蜜和丸如小豆以飲服二丸得利病差小兒黍粟一丸以意量之

又青木香丸療一切氣腹脹滿心痛氣冷食不消方

青木香 檳榔人（各六分） 芍藥 枳實（炙）

訶梨勒皮（各五分） 桂心（四分） 大黄（十二分）

右七味擣篩蜜和丸如梧子飲下十五丸以意增減之常令溏利

甚效

又五補七宣者麗正殿脩書學士李公所傳之公名子昭字雲卿趙郡人幼志道法以捿名山往來茅嵩山經三十載云五補七宣丸方

人參　茯苓　地骨皮　乾地黃

牛膝等分

右五味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒飲下三十丸稍稍增至五十丸日再此是五補丸服至五日十日及半月日覺氣擁即服七宣丸服經二三日覺氣散還服五補丸若病候未退即稍稍增之常自審以取調適終須五補及七宣丸並須合服之夫人所疾皆因風不宣散即成擁緩熱風若氣不流行即成痃癖冷氣轉生衆病皆因此由尋其本源都爲不閑將理覺虛則補覺風氣擁即利利即贏脊更虛且凡是利藥皆急服便透過未

能蓄洩諸病凡是補藥皆滯服未見效先覺風氣發動明知宣補必藉兼行故其人授余二法名曰五補七宣所以安七魄鎮五藏堅骨髓養神明久服長生百病日去髮黑行及奔馬

又七宣丸方

大黃十五兩　枳實炙　青木香　柴胡

訶梨勒皮各五兩　桃人六兩去尖皮熬　甘草四兩炙

右七味擣篩蜜和丸如梧子以酒服二十丸稍加至五十丸病在下空腹服病在上食後服之以宣利爲度增減以意量之若風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹中服經七八日乃盡出下似牛涎魚腦等若病深痼則須半月或一月專服之不用五補丸若積年腰膝疼痛寒冷如水石脚氣衝心憒悶將死頭旋暗倒肩背重悶心腹脹滿胷膈閉塞風毒腫氣連及頭面及大小便或利濇脾胃氣不理不能飲食夜卧脚轉筋脉掣痛恍惚

然眠寢不安等疾以飲服之盡差此藥功效不可盡說如前十數種病攻擊則須服七宣丸令除自外輕病不妨與五補丸兼服循環不輟補養無限不問男女老小並可服餌但須量氣力細察候之加減服若是初生孩子可與三丸五丸稍稍加之取通利其二方當須經久常服不限春秋冬夏朝夕行止間藥性甚善禁如常法

近効大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癥癖氣承心肋下有塊溫瘴毒氣精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等螫方

麝香研　牛黃研　藜蘆炙　朱砂研

芍藥　當歸　茯苓　桔梗

鬼箭羽　金牙研　烏頭炮　桂心

吳茱萸　貫衆各一分　雄黃一分半研　乾薑

人參　大蟲骨各二分炙　蜈蚣二寸去足炙　巴豆二十枚去心皮熬

蜥蜴 半枚去手炙

右二十一味擣篩蜜和丸如梧桐子飲下三丸以利下如未下以熱飲投之即利三行後以酢飯止之即定然後煑飯葱薤食之忌冷水猪肉如蛇蠍蜂螫取一丸研和塗之即差精魅狐狸之屬抛塼瓦或如兵馬行夜發者是鬼魅無早晚每日服二丸只三兩日即定仍每日燒一丸熏身體衣服無忌以三五丸用緋繒袋子盛帶左臂上辟大蟲毒蛇精魅鬼氣等病

又犀角丸療癰腫腸癰乳癰發背一切毒熱腫服之膿化爲水神方

犀角 屑十二分　川升麻　黃芩　防風

人參　當歸　黃耆　乾薑 一作乾藍

蓼實 一方無　黃連　甘草 炙　梔子 各四分

大黃 五分　巴豆 二十四枚去心皮熬

右十四味如法擣篩蜜和更擣三千杵丸如梧子以飲服三丸

至五丸以利爲度或不利投以熱飲如利以冷漿水粥止之未差每日服一丸以意量之腫消散爲度若下黃水或腫輕皮皺色變即是消候忌如藥法効驗不可論之

又黃連丸療痢無問冷熱並主之方

黃連一大兩 茯苓二小兩 阿膠一小兩

右三味擣篩以水消膠和衆手丸暴乾有痢空腹以飲下十五丸日再以差止甚效

又加減麻人丸療積年患氣不能食飲兼食不消化風氣冷氣熱氣衝上痃癖氣并乳石氣發動並療之服經三四日自覺有效方

蜀大黃錦文者四兩 訶黎勒皮四兩 人參二兩 大麻人二兩

右四味擣篩依法以蜜和丸每服十丸二十丸增減以意量之以溏利病除亦不損人雍州王長史常服三十餘年八十歲萬病皆無百無所忌補理腰脚服經七八日腰腎先冷者即下膿水腰脚

輕健以酒飲下之並得

又三黃丸療五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱主一切熱六

春三月用　黃芩四兩　大黃二兩　黃連四兩

夏三月用　黃芩三兩　大黃一兩　黃連四兩

秋三月用　黃芩六兩　大黃一兩　黃連二兩

冬三月用　黃芩六兩　大黃一兩　黃連三兩

右三味隨時月擣篩蜜和丸如梧子日服七丸諸病悉除

古今諸家散方六首

千金小金牙散療南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼疰方

金牙五分研　牛黃一分研　天雄炮　萆薢

黃芩　蜀椒汗　由跋　雄黃研

朱砂研　烏頭　桂心　莽草炙

麝香各二分研　萎蕤　細辛　犀角屑

乾薑各三分　蜈蚣一枚長六寸者炙　黃連四分

右十九味治下篩爲散合牛黃麝香擣三千擣以温酒服五錢匕日三夜二以知爲度以絳袋盛男左女右帶一方寸匕省病問孝不避夜行塗鼻人中辟鬼惡毒氣晨昏霧露亦塗之佳

崔氏五香散療疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似差似劇兼主百病方

沈香　丁香　麝香　薰陸香

鬼箭羽　當歸　豆蔻人各四分　牛黃

鬼臼　橘皮　金牙各三分燒　犀角屑

羖羊角屑　大黃各六分　升麻　桔梗

桃人去尖皮熬　光明砂研　安悉香各五分研

右十九味擣篩爲散以湯飲酒隨病服一方寸匕日再服病差即停亦可蜜丸如梧子服十丸

又備急散療卒中惡心痛脹滿欲吐短氣方

大黃二兩　桂心四分　巴豆一分去心皮熬兩

右三味擣篩爲散取一錢匕以湯七合和服當吐下即愈甚妙

紫雪散療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草藥毒發邪熱卒黃等瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾絞刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病方

黃金一百兩左側　寒水石　石膏各三斤李用滑石　玄參一斤

羚羊角屑　犀角屑　沈香　青木香各五兩

丁香一兩　甘草八兩炙

右十味切以水三斗煮取一斗去滓取消石四升芒消亦可用朴消十斤投汁中微火煎以柳木篦攪勿住手候欲凝入盆中內朱砂三兩麝香一兩急攪即成霜雪紫色以水和一二分服之量性多少熱毒病老小以意加減一劑十年用之神妙脚氣乳石

天行熱病等服之若神（千金翼有磁石三斤滑石一斤升麻一斤丁香用四兩朴消用四升麝香用二分）

仙人鍊絳雪療一切病肺氣積聚欬逆嘔吐膿血丹石毒發天行時氣一切熱病諸黃疸等心風昏亂心怯健忘四肢煩熱頭痛眼赤大小便不通煩悶不安骨節疼痛赤白痢血痢熱毒痢宿食不消化心腹脹滿出氣不得下一切諸毒藥脚氣等飲酒多醉困久痢不差孩子驚癇等以上和水服之産後一切諸病墮胎和酒服之方

朴消（十斤）　升麻（三兩）　大青　桑白皮

槐花（各二兩）　犀角（屑）　羚羊角（屑各一兩）　蘇方木（六兩）

竹葉（兩握）　訶黎勒　山梔子（三十枚）　檳榔人（二十顆）

朱砂（半大兩研）

右十三味以水二斗漬一宿煎取一斗去滓入鍋內朴消鍊烊攪勿住手候欲凝出於盆中攪入朱砂麝香訖雪成收於垍器中密封有疾量取之和水服之以利病除身輕目明四肢調適療

一切病神驗老小量之上云入朱砂麝香末見分兩

近效腎瀝湯煑散主除風下氣彊膂脚明耳目除淡飲理榮衛永不染時氣諸風疾方

黃耆　芎藭　茯苓　五味子

防風　澤瀉　獨活　玄參

人參　牛膝各六兩　麥門冬去心　地骨皮各八兩

桂心　甘草三兩炙　丹參五兩

右十五味切如大豆分作二十四貼貼著生薑一兩切杏人十四枚去尖碎以水三升煑一貼取一升去滓澄清取九合頓服每日一貼晚間以氣下心胷空妙十服以後身力不可當常須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋冬服一劑勝服腎氣丸二十劑永不患風氣先有諸病自然除差張中丞自服以來神效不可言以為乳石力不可比今服不闕效驗妙方云腎瀝湯恐須用煑腎湯煎

古今諸家膏方四首

廣濟神明膏主諸風頑痺筋脉不利疥癬諸瘡痒方

前胡　白朮　白芷　芎藭（並切）

椒（去目）　吴茱萸（各一升）　附子（三十枚去皮切）　當歸

細辛　桂心（各二兩切）

右十味以苦酒漬一宿令浥浥然以成鍊猪膏一斗微火煎三沸以來九上九下候附子白芷色黃絞去滓膏成病在外摩之在內以酒服棗核大疥癬等瘡皆療之并去諸風病亦摩折傷被打等（崔氏云藥滓酒浸服之亦大療諸病）

崔氏陳元膏會稽太守恩胡昧死再拜上書

皇帝陛下恩幸得典郡視事六年處地下濕身病苦痺飲食衰少醫療不差命在旦暮蒼梧道士陳元賣藥於市恩諸生出見從取藥對火隨病摩之日至再再十五日平復恩男嘗墮馬苦為腰痛天陰

雨轉發恚取元膏摩之復愈恚妻年四十五苦心腹積聚得病三年恚復從元取膏摩之六日下宿食即愈恚銓下郭少苦頭眩恚取膏摩三日阜中下水二升所病即愈恚知元藥驗謹取元本方奉上

當歸三兩一方隴西者　生地黃二斤擣取汁　附子三兩十二銖　細辛二兩

桂心一兩一銖　天雄三兩二銖去皮　乾薑二兩十七銖　丹砂一兩研

芎藭二兩　雄黃二兩半研　烏頭三兩七銖去皮　苦酒三升

白芷一兩　松脂半斤　不中水豬脂十斤鍊去滓

右十五味㕮咀以地黃汁苦酒漬一宿取豬脂內諸藥微火煎之令十五沸膏成去滓內朱砂等末熟攪勿令婦人雞犬孝子惡疾不具足人小兒等見有人苦肩膂背痛服之七日所下狀如雞子汁者二升即愈又有人苦膂下積聚如杯摩藥十五日即愈又有人苦臍傍氣如手藥摩之去瓜中黃穰者升許即愈有人患[illegible]切痛時引背痛數年以膏摩之下如蟲者三十枚即愈又

有婦人苦月經内塞無子數年膏摩少腹并服如杏子一枚十日下崩血二升即愈其年便有子又療風搔腫起累累如大豆以膏摩之五日即愈老少患脚膝冷痛摩之五日便愈又有人苦頭項痛寒熱瘰癧摩頭及病上即愈又有人患面目黎黑消瘦是心腹中病服藥下如酒糟者一升餘即愈内外諸風及腹中積聚可服之百病無不愈所療人無數不可悉記

又烏膏療一切瘡引膿生肌兼殺瘡中蟲方

烏麻油（一升生清者） 黃丹（上好者二兩羅之） 薰陸香（一乳頭者一兩末）

蠟（一兩銖淨濾） 松脂（半兩末以上並大升兩）

右五味緩火煎油三分減一下鐺待冷乃内黃丹更上煎之又三分減一又停待冷次内薰陸香末上火煎候銷盡又内蠟及松脂看膏稍稠即點於鐵上試斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡如熱即除薰陸及松脂瘡如久不差此涉於冷即依方合其貼杖瘡者

油若一升地黃汁半合和煎黃丹二大兩蠟一小兩餘準上法此膏不須硬也

近効蓮子草膏療一切風耳聾眼闇生髮變白堅齒延年本是婆羅門方

蓮子草汁三升 生巨勝油一升 生乳一升下食糟者 甘草一大兩末

右四味和於鍋中煎之緩火才令魚眼沸數攪之勿住手看上沫盡清澄濾不津垍器中貯之一云本方有青蓮蕊六分龍腦花三分鬱金香二分並末先煎諸藥三分減一次下汁及油等膏成每欲點即仰卧垂頭牀下一孔中各點如小豆許久乃起有唾唾却勿咽之起訖即啜少熱湯飲點經一年白髮盡黑禿處並出韓庶子處得每用驗

古今諸家煎方六首

廣濟阿魏藥煎方

阿魏四分　豆蔻人七顆細研　生薑十二分　人參八分

甘草八分炙　鼈甲十二分炙　藕汁二升　訶黎勒七枚去核

牛膝半斤　白蜜一升　地黃汁二升

右十一味下地黃等汁煎次下藥末微火煎攪勿住攪候如餳於不津器盛每取一匙酒和服之

又鹿角膠煎療五勞七傷四肢沉重百事不任恊恊無力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痺脚弱不便不能久立胸脅脹滿腹中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷疼心健忘腎氣不理五藏風虛並悉療之方

鹿角膠二大斤擣碎作四分於鐺中熬令色黃　生地黃一斤取汁　紫蘇子二升以酒一升研濾取汁

生薑汁一斤　猫牛酥一升　白蜜三斤

右六味先煎地黃汁蘇子汁生薑汁等三十餘沸次下酥蜜又煎三五沸次以蜜并膠末下之攪令相得膠消盡煎即成矣以

器成之空腹以酒調一合服之日再此藥補五藏益心力實骨髓生肌肉理風補虛耳聰目明膂脚甚效驗一兩劑彊健人於拔覽十倍勝於常時忌羊血蕪荑

又主冷氣益氣力溫中下氣蒜煎方

剝了蒜二升　牛乳五升　牛膝一大斤末

右三味以蒜內牛乳中煎之候蒜消盡攪勿住手下牛膝末煎成於器中貯之食前以酒和兩匙服忌羊血

又地黃煎主婦人丈夫血氣勞骨熱日漸瘦悴方

生地黃汁二升　甘草三兩炙末　豉心一升　葱白一升切

牛酥半斤　藕汁二升　白蜜一升

右七味以小便六升煑葱豉等取二升絞去滓次下地黃藕汁更煎取三五沸下酥蜜攪勿住手候似稀餳以器貯之每服一匙漸至三匙成煎桑枝熬煎湯調和服之尤妙桃人湯亦良

小品單地黃煎主補虛除熱散乳石癰疽瘡癤等熱方

生地黃隨多少取汁於銅鉢中重湯上煮勿蓋釜令氣得泄煎去半更以新布濾絞去麤滓穢又煎令如餳成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美東南地黃堅細味薄作煎鹹不美

近效地黃煎療肺氣欬嗽補心肺令髭髮不白方

生地黃汁二升　麥門冬汁五升　生薑汁五合　紫菀三兩

貝母　款冬花　甘草炙各三兩

右七味切以水七升煮取三大升去滓却入鍋中下地黃汁麥門冬薑汁等三十沸下蜜一升煎如餳成矣盛不津器中冷含如棗許增加量之一方有人參三兩

古今諸家酒一十二首并代茶飲列於下

千金天門冬酒療五藏六腑大風洞虛五勞七傷癥結滯氣冷熱諸

風㾓惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮

天門冬（與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利）

右一味擣取汁一斗漬麴二升以糯米二斗候麴發準家醞法釀之春夏極冷下飯秋冬稍溫如人肌下飯酒熟取清飲一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞猪魚蒜特忌鯉魚亦忌油膩此是一斗法餘一石二石亦準此以為大率服藥酒十日覺身體隱疹大痒二十日更大痒三十日乃漸止此是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐臥覺風不著人身中諸風悉盡用米法先淨淘暴炕令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾灑炊餘汁拌飯甚宜密封取天門冬汁法淨洗暴去水寸切擣押各三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作夏泔

漬氣但依式服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳
凡八九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十日以來
相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒若得散服得力
倍速散方如左
天門冬去心及皮暴乾擣篩以上件酒服方寸匕日三加至三
匕久服長生凡酒亦得服
又大金牙酒療瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不隨
手足拘攣歷節腫痛甚者少腹不仁名曰脚氣無所不療方
金牙燒一斤　白朮　附子　側子
天雄　茯苓　茯神　當歸
防風　芎藭　黃耆　署預
細辛　桂心　茵芋　地骨皮
五加皮　杜仲　萆薢　狗脊

萎蕤　白芷　厚朴　枳實炙

桔梗　黄芩　遠志去心　蔓荆子各三兩

人參二兩　獨活半斤　石南二兩　磁石十兩燒

丹參　牛膝各五兩　薏苡人一升　麥門冬一升去心

生石斛八兩　生地黄切二升　蒴藋四兩

右三十九味並切用絹袋盛以酒八斗漬七日溫服一合日四五夜一石藥細研如粉别絹袋盛共藥同浸藥力安和主治極多凡是風虛四體小覺有風痾者皆須將服無不治者服者一依方合之不得輙信諛人大言浪有加減忌如常法

又鍾乳酒療虛損通順血脉極補益下氣方

鍾乳五兩碎綿裹　附子三兩炮　石斛五兩　甘菊花三兩

蓯蓉五兩

右五味㕮以生絹袋盛用酒三斗漬經五日每服二合日

再稍加至一升

千金翼五精酒主萬病髮白反黑齒落更生方

黄精四斤　天門冬三斤去心　松葉六斤　白朮四斤

枸杞五斤洗

右五味皆生者內釜中以水三石煑之一日去滓取汁漬麴如家釀法酒熟取清任性飲之一劑長年補養忌鯉魚桃李雀肉等

又白朮酒方

白朮二十五斤

右一味㕮咀以東流水兩石五斗於不津器中漬之二十日去滓內汁於大盆中夜候流星過時抄已姓名置盆中如是五夜汁當變如血取以漬麴如家醞法造酒熟取清任性飲之十日萬病除百日白髮反黑齒落更生面有光澤久服長年

忌桃李雀肉等此酒至誠有靈風病服之百神衛人

又枸杞酒方

枸杞一百斤

右一味切以東流水四石煑之一日一夜去滓令得一石汁漬麴釀之如家醖法酒熟取清置不津器中取乾地黃桂心乾薑商陸澤瀉蜀椒末各一升六味以絹袋盛內酒中漬密封口埋入地三尺堅牢覆上二十日沐浴整衣冠向仙人拜訖開之其酒當赤如金色平旦空腹服一盞或半升爲度十日萬病皆愈二十日瘢痕皆滅惡疾人以一升水和半升酒分爲五服服之即愈若欲食石者取河中青白石如棗杏人大者半升以水三升煑一沸以酒半合置中須臾即熱可食也

崔氏蒼耳酒療大風惡疾及一切諸風乃至骨髓中毒風令人充悅方

蒼耳和莖葉花實剉取一石八月收　牛膝根切一升　松葉切二斗五粒者

商陸根切一斗白色者　昌粘根切一斗

右五物皆剉訖量之以水兩石五斗煑取六斗汁如釜小可分煑之即分三斗汁將浸麴一斗二升高量其麴加於常法五分爲藥力貴麴故也餘三斗汁留將拌饙料糯米一石二斗分作五酘淨淘乾漉以上並大斗第一酘一日炊四斗米取藥汁九升拌饙熟細切生地黃三斗和米下之第二酘三日炊三斗米取藥汁七升拌饙熟與杏人一斗去皮尖碎和擣如泥下之第三酘五日炊二斗米取藥汁六升半拌饙熟取大麻子一斗擣碎和下之第四酘七日炊二斗米取藥汁四升半拌饙熟取胡麻一斗擣碎和下之第五酘九日炊一斗米取藥汁三升拌饙下之

右以前五酘法須候米消盡即炊酘之未必要須隔日其酒如米少味薄更炊一二斗米下之使味足然後去糟取清依常

法飲半升不能者可量性多少常使有酒氣逼夜飲最是所宜此酒縱非風疾飲之補養益精神令人充健

又烏麻地黃酒療風虛補不足除百病已試大効方

六月六日麴（四升淨刷刮剉之如棗許大） 王斯油麻（六斗五升出□州赤色者是如無別用巨勝替之以脫去皮乾暴脫烏麻法以冷水浸經一宿出之置筲箕中漉水令盡舂之即皮自脫去耳） 生地黃（四斗冷熟湯洗待水氣盡便切之更取生地黃一石以水一石和煮麤布絞去滓即取汁六升又以蠟及麻子塗瓮內蒸之令乾前三味並用大斗大升適寒溫得所總內瓮中浸之） 丹參 生石斛 牛膝 杜仲 萆薢 生薑（各二斤） 人參（八兩以上並藥秤秤之）

右七味切以生絹袋盛同內前件熟地黃汁瓮中浸封閉七日外更取烏豆四大斗摩使光淨分作四度微熬令香取無灰重醞酒二斗八升三度淋豆豆一熬三淋淋訖並去豆總計十二度淋豆取淋酒別器中盛然後更寫麴汁等物及諸藥並

出在大瓮中以物閉頭及更將此酒先重蒸瓮看冷暖還内麴汁及藥等安在瓮中其日即用八斗精糯米炊作飯如常釀酒法酘酒即以淋豆酒投在瓮中封閉經一兩宿看米消盡又炊四斗糯米飯酘之此後更封閉經七日其酒即熟任性飲多少量之不限時候常微微覺身潤夜中稍加少許或汗出佳避風及忌房室特禁毛桃芥生菜熱麪并酢蒜牛肉冷物醞初酒法待此酒熟即將此酒更重醞

右麴依當家常用法每一斗麴用熟水一斗一升浸炊酒飯即量熟湯多少用沾飯如凡釀酒法更不得加生水每一斗米酒爲佳釀重醞酒法待此酒熟即將酒二斗八升淋豆

右每一斗麴以熟水一斗浸其酒米每一斗饋料以料以四斗清酒淋其饋然後炊飯使熟更不得加水其所洗甑洗手盆瓮等皆須用此酒還投釀瓮中釀藥酒法右欲和藥酒時先置五

斗許藥在甕底然後加五斗許飯每次如此斟酌至半即内藥袋其藥袋上亦使藥飯相參以至於盡然始閉封封閉藥酒甕法

右封閉甕頭用紙七重布一重其釀酒室唯造酒得入自外猫犬婦人不得輙入室中

又枸杞酒療五内邪氣消渴風濕下骨脅氣頭風(本方作痛)堅筋骨彊陰利大小便塡骨髓長肌肉破除結氣五勞七傷去胃中宿食利耳目衂血吐血風　補中逐水破積瘀膿血石淋長髮傷寒瘴癘毒氣煩躁滿悶虛勞喘吸逐熱破血及脚氣腫痺悉主之方

糯米(一石黍米亦得)　麴(計常釀酒米一石用麴一斗此藥加五升彌佳末用之唯上好者)

枸杞根(二十斤刮去赤皮半寸剉之以水一石漬經三日煑取汁五斗)　生地黃(二十斤洗去土細切和米炊之)

秋麻子(三斗微蒸細粉蒸氣出以枸杞湯淋取汁)　香豉(二斗以枸杞湯煑取汁)

右四味地黃和米蒸之三物藥汁揔合得五斗地黃濕即四斗分半漬米饙半及麴和釀飯如人肌即揔和一酘密盖甕

口經二七日壓取封泥復經七日初一度一釀用麻子二斗多即恐令人頭痛服酒忌生冷酢滑雞魚麪蒜油膩白酒房室等服訖一二七日将息深病盡久服即少忌之

又地黃酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方雍州高長史服用効

生地黃肥大者一石二斗擣絞取汁四斗　杏人一斗去尖皮兩人者熬令黃擣末　大麻子一斗熬擣末

糯米一石暴乾　上麴一斗五升淨刮暴乾細剉

右五味先以地黃汁四斗漬麴待發炊米二斗作飯冷暖如人肌酘麴汁中和之候飯消更炊米一斗酘之如前法又取杏人麻子末各一升二合半和飯攪之酘麴汁中待飯消還炊米一斗杏人麻子末各一升二合半一依前法酘之如此凡八酘訖待酒沸定封泥二七日取清温服一升漸加至二升日再服之令人頓能食久服去萬病婦人服之更佳令人有子

近効五加酒方

五加根莖細剉五斗　六月六日麴末三斗　黍米一石糯米亦得

右三味以水五斗共五加同下於大釜中以木度深淺與水平剋之即更添水一石五斗并前計兩石即下火煎旋旋急火取藥汁減下至木剋處即得以大盆安淨筐筐中安淨布單兼滓漉著筐中其汁在盆中唯有五斗且別盛密封蓋之又重取所漉者五加滓以水煑之如別有五加添和同煑更佳取此汁用洮米拌飯炊之如常炊法用前五加濃汁漬麴且炊米五斗釀之餘五斗分爲兩酘如常造酒法酒熟壓漉密封頭每服一盞煖飲之漸加勿令醉又遠志十兩末之下釀中益妙玄參及蛇皮肉亦得其糟與巳下食之尤佳

又代茶新飲方

黄耆　通草各二斤　茯苓　乾薑

乾葛各一斤　桑根白皮一斤　鼠粘根三斤　生乾地黄加一斤爆

枸杞根洗 忍冬十二月採枝莖葉陰乾濕加五兩 薏苡人各十兩

菝葜八兩 麥門冬去心 萎蕤各五兩

右十四味並揀擇取州土堅實上者刮削如法然後秤大斤兩各各別擣以馬尾羅篩之不用細攪令勻調重篩務令相入不令偏併別取黃白楮皮白皮根相兼細切煮取濃汁和溲令硬軟得所更於臼中擣別作一竹棬子圍闊二寸半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定衆手依模捻成餅子中心穿孔日暴乾百餘餅爲一穿即以葛蔓爲繩貫之竹作篾亦得陽挂之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙令香熟勿令焦臼中擣末任隨時取足煎以代茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之即滑美著鹽橘皮蓽撥亦佳除風破氣理丹石補腎脚聰耳明目堅肌長肉緩筋骨通腠理頭腦閑悶眼睛疼痛心虛脚弱不能行步其效不可言若患脚氣肺氣

疝氣欬嗽入口即愈患消中消渴者驗主療既多不復一一具說但服之立取其驗禪居高士特宜多飲暢腑藏調適血脉少服益多心力無勞飢飽飲之甚良若臘月臘日合之十年不敗

解飲食相害成病百件

肘後凡飲食雜味有相害相得得則益體害則成病以此致疾例皆難療所以病有不受藥療必至於死也今略疏其不可噉物不須各題病名想知者善加慎之諸鳥獸陸地肉物忌法

白犬血腎（不可雜白雞肝白鵝肝）白羊肉（不可雜雞肉）犬肝（不可雜烏雞狗兔肉）猪肉（不可合烏梅食一去不可合羊肝）兔肉（不可雜獺肉及白雞心食）白馬（黑頭者不可食）麋肉（不可合蝦蟆及獺生菜食）麋脂（不可合梅李食）麋肉（不可雜鵠肉食）羊肝（不可合烏梅白梅及椒）牛腸（不可合犬血肉等食）白馬（青蹄肉不可食）白猪（白蹄青爪斑斑不可食）雞（有六翮不可食）烏雞（白頭不可食之殺人）鹿（白膽不可悮食）食猪肉（不可卧稻穰草中）雄雞肉（不可合生葱芥菜食）雞鴨子（不可合蒜及李子鼈肉山雞肉）雀肉（不可雜生肝落地塵不著不可食）暴脯（不肯燥及火炙不動見水）

而動者不可食祭肉自動及酒自竭並不可飲食也鳥獸自死口不開翼不合不可食鳥獸被燒死不可食病人不可

食熊肉及猴肉山羊肉不可合雞子食之半夏菖蒲忌食羊肉雞子不合魚巴豆忌猪肉蘆笋商陸

忌白犬肉細辛桔梗忌菜白朮忌食桃李甘草忌食菘菜牡丹忌胡荽常山忌葱茯苓忌酢

天門冬忌食鯉魚黃連桔梗忌食猪肉藜蘆忌食狸肉凡蝙蝠及螻蟻集食上而食之致瘻病也凡飲水漿及

酒不見影者不可飲之丙午日勿食雉肉壬子日勿食猪五藏及黑獸肉等甲子日勿食龜鼈鱗物水族之類

又療卒得食病似傷寒其人但欲臥七日不療殺人

按其脊兩邊當有陷處正灸陷處兩頭各七壯則愈

又療中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦四肢尩弱百病因此而生方

薤白一斤　枳實三兩炙　大棗十二枚擘　粳米二合

豉七合

右五味以水七升煮薤餘五升內諸藥煮取一升半分三服差止

又方

豉心一升末　麥蘗　麴各一升熬　蜀椒一升汗

乾薑一升末

右五味擣篩以蜜拌食後酒服之方寸匕

又方

麴半斤熬　麥蘖五升半熬　杏人一升去尖皮熬

右三味擣篩蜜和末食後服如彈丸一枚漸增之

又方

大黃　芍藥　芒消各半斤

右三味末之以蜜三斤於銅器中湯上煎可丸服如梧子十九日再服

又方

麴一斤熬　吳茱萸一升　乾薑十兩

右三味擣爲末服方寸匕

又療脾胃氣弱穀不消兼不復受食方

大麻人三升　大豆黃二升並熬香

右二味擣篩以飲服一方寸匕漸加匕服

又療飽食訖便卧得病令人四肢煩重嘿嘿欲卧方

大麥蘖一升熬　乾薑二兩

右二味擣爲末服方寸匕日三良

又療食生冷雜物或寒時衣薄當風夜食便卧不消心腹煩滿痛脹急或連日不化方

燒地令極熱即激薄覆取汗愈

深師療食飽煩悶但欲卧而腹痛方

麴熬令香黃

右一味擣爲末服方寸匕大麥蘖亦佳

千金翼凡六畜五藏著草自動搖及得酢鹹不變色又墮地不汚又與犬犬不食皆有毒殺人也　凡食飲有毒澆地地墳起皆殺人

凡肉在器中蓋密氣不泄者皆殺人　凡脯肉熟肉不用深藏密氣不泄殺人　若中此毒者皆大糞灰水服方寸匕良

古今錄驗療新中雜食瘀實不消心腹堅痛方

取水三升煑白鹽一升令消分服取吐必差

備急㢈辯刺史云嶺南俚人毒藥皆因食得之多不即覺漸不能食或更心中漕脹并背急悶先寒似瘴微覺即急取一片白銀含一宿銀變色即是藥也銀色青是藍藥銀色黄赤是菌藥久久者入眼眼或青或黄赤若青是藍藥若黄赤是菌藥俚人有解療者畏人得法在外預合或言三百頭牛藥或言三百兩銀藥余住久與首領親狎知其藥並是常用俚人不識本草乃妄言之其方如後

初得俚人毒藥未得餘藥且令定方

生薑四兩　甘草三兩炙

右二味以水六升煑取二升平旦分二服訖然别方療之

又療之方

常山四兩　白鹽二匕

右二味以水一斗漬之一宿以月盡日漬之月一日五更以土釜煎勿令奴婢雞犬見之煮取二升平旦分再服服訖少時即吐以銅盆盛之看若色青以杖舉得五尺不斷者即藥未盡一二日後更進一劑

又方

都惏藤十二兩此藥嶺南有土人識俚人呼為三百兩銀藥甚細長有高三尺微藤生切

右一味以水一升酒二升和煮取二升分三服服訖藥毒逐大小便出十日慎毒食不差更服以差為度肘後云黃藤

又療腹內諸毒方

都惏藤　黃藤各二虎口長三寸並細剉

右二味以酒三升合甖中密封以糠火圍四邊燒令三沸待冷出之溫常服令有酒色無禁忌若不獲已欲食俚人食者先取

甘草一寸炙令熟爵咽汁若食著毒藥即吐便是藥也依前法療之若經含甘草而不吐非也宜常收甘草十數片隨身帶之自防也嶺南將熟食米及生食甘蔗巴蕉之屬自更於火上炮炙燒食之永無慮也若被席上散藥卧著因汁入肉最難主療可常自將淨席隨身及匙筯甘草解毒藥行甚妙肘後無黃藤

張文仲白黍不可合飴糖蜜共食黍米不可合葵共食白蜜不可合菰首食菰首不可合生菜食病人不可食胡荽芹菜及青花黃花菜妊身勿食桑椹并鴨子五月勿食韭十月勿食椒三月三日四月八日勿食百草二月勿食小蒜四月勿食胡荽謹按仲景方云正月勿食生葱二月勿食蓼三月勿食小蒜四月八月勿食胡五月勿食韭五月五日勿食生菜七月勿食茱萸八月九月勿食薑十月勿食椒食駿馬肉不飲酒殺人也馬鞍下肉不可食馬黑脊而斑臂亦勿食

食馬肝中毒方

取牡鼠矢二七枚兩頭尖者是水和研飲之仲景同

又食諸六畜鳥獸肝中毒方

取髮𩯭之長半寸授土作溏沼二升合和所剉髮飲之須臾髮皆貫所食肝出也謹按髮誤食之令人成髮癥爲病不可療令和髮土飲之豈得有此理否可詳審之別有方法也

又方
服頭垢一錢匕立差千金同

又方
清水投豉絞取汁飲數升差止仲景同

又凡物肝藏自不可輕噉自死者彌勿食之

諸心皆勿食之爲神識所舍使人來生獲報對又食生肝中毒方
服附子末方寸匕日三須以生薑湯服之不然自生其毒

又禽獸有中毒箭死者其肉有毒可以藍汁大豆解射罔也仲景同

又食鬱肉及漏脯中毒方
取犬矢燒末以酒服方寸匕仲景同

又方

擣生韭絞取汁服一二升冬月連根取和水洗絞之
用薤亦佳凡肉閉在密器中經宿者爲鬱肉茅屋
溜下沾脯爲漏脯並有大毒
又食黍米中藏乾脯中毒方
濃煑大豆汁飲數升即解兼療諸肉及漏脯毒
又食自死六畜諸肉中毒方
擣黃蘗末以水和方寸匕服未覺再服差又角屑日
再服
又凡六畜自死皆是遭疫則有毒人有食疫死牛肉令病洞下
亦致堅積者並宜以利藥下之良
又食諸菜肉脯中毒方
燒猪骨擣下篩水服方寸匕日三四差千金同
又方
燒笠子末服方寸匕日三

又食馬肉洞下欲死者方

豉二百粒　杏人二十枚

右二味合於炊飯中蒸之擣丸服之至差

又甘豆湯冷飲之諸毒悉解諸不可及也

辨魚鱉龜蟹毒不可食及不得共食

肘後云凡魚頭有正白連珠至脊上不可食也　魚無腸膽不可食　魚非黑點不可食　魚頭似有角不可食　魚無鰓不可食　鯷魚赤目鬚不可食　魚不可合鳥雞肉食　生魚目赤不可作膾食　魚不可合鸕鶿肉食　鯷魚不可合鹿肉食之　鯽魚不可合猪肝及猴肉　青魚不可合小豆藿食　魚汁不可合自死六畜肉食　青魚鮓不可合胡荽及生葵麥醬食　鯉魚鮓不可合小豆藿　鰕不可合雞肉食　鰕無鬚及腹下通黑及煮之反白皆不可食　鯉魚不可合白犬肉　鯉魚不可合繁蔞菜作蒸　鱉目凹不可食　鱉厭下有如王字不可食之　鱉不可合雞鴨子食之　鼈肉不可合莧菜食之亦不可合龜共煑之　龜肉不可合瓜及飲酒及秋果實　蟹目相向及足斑目赤者不可食之　病人不可食鯷魚鮪魚䱇魚等　姙身不可食鼈及䱇魚鱠　桂天門冬忌食鯉魚

又療食蟹及諸肴膳中毒方

濃煮香蘇飲汁一升解

又人有食蟹中毒煩亂欲死服五蠱黃丸得吐下皆差夫蟹未被霜多毒熟煮乃可食之或云是水莨所爲彭蜞亦有毒蔡謨食之幾死

又療食諸麫臛百物毒方

取貝齒一枚含之須臾吐所食物差千金同

又方

擣韭汁服一升冬以水煮根服千金云服數升

又方

掘厠傍地作坎深一尺以水滿坎中取故厠籌十四枚燒令然以投坎中乃取汁飲四五升即愈千金同

又諸饌食直爾何容有毒皆是以投之耳既不知是何處毒便應煎甘草薺苨湯療之漢質帝食麫魏任城王噉棗皆致死即其事也

食魚中毒及食鱠不消方五首

古今録驗療食鯸鮧傷毒欲死方

取鮫魚皮燒之無鮫皮取一枚燒飲服之鮨倉合切魚

皮也食諸鮑魚中毒亦用之千金同

千金療食魚中毒方

煮橘皮停冷飲之

又療食魚鱠及生肉住胷膈中不化吐不出便成癥瘕方

厚朴炙　大黄各二兩

右二味以酒二升煮取一升頓服立消人彊者倍大黄用三兩

酒取二升再服

肘後療食鱠過多冷不消不療必成蟲瘕方

馬鞭草擣絞取汁飲一升即消去千金同亦宜服諸

吐藥吐之

删繁療食魚鱠不消生瘕常欲須鱠者方

獺骨　肝肺　乾葫　大黃各分　蘆根

鶴骨各七分　桔梗五分　乾薑四分　桂心四分

班猫二十枚炙

右九味擣篩蜜丸酒服十丸至十五丸日再差

食椒菜瓠中毒方四首

肘後蜀椒閉口者有毒食之戟人咽使不得出氣便欲絶又令人吐白沫并吐下身體冷痺療方

煑桂飲汁多益佳又飲冷水一二升又多食蒜又土漿飲一升又濃煑豉汁冷飲之一二升又急飲酢又食椒不可飲熱飲熱殺人

又療中苦瓠毒方

煑黍穰濃汁飲之數升此物苦則不可食恐作藥中毒也

千金療菌毒方

掘地作坎以水沃中攪令濁名地漿飲之

又療食菜中毒發狂煩悶吐下欲死方

取雞毛燒末以飲服方寸匕差

解一切食中毒方三首

千金論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉横也然而大聖人設其法以救養之正為貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心終不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

又論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒葱湯下咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可嘆息方稱大豆汁解百藥毒自試之大懸絕不及

甘草又能加之爲甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸吐嘔不已以百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此即成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

又療諸食中毒方

飲黄龍湯及犀角汁百無不治也若飲馬尿亦良

又療食飲中毒方

苦參三兩

右一味切以酒二升半煮取一升頓服之取愈

古今録驗療諸食毒方

取桑黄心破作一斷者釜中令水出三寸煮取二斗漉澄清微火煎得五升宿不食服之日三合則吐瘕未差更作羸者減之

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

千金療卒大醉恐腸爛方

作湯著大器中漬之冷復易之酒自消夏月亦用之佳肘後同

又方

絞茅根汁飲二升

又療連月飲酒喉咽爛舌上生瘡方

大麻子一升　黃蘗二兩

右二味擣末以蜜和丸含之

飲酒連日醉不醒方九首

肘後療飲酒連日醉不醒方

蕪菁菜并少米熟煮去滓冷之內雞子三枚或七枚調勺飲之二三升無雞子亦可單飲之

又方

取水中螺螄（胡對切）若螺蚌輩以著葱豉椒薑煑如常食法飲汁數升即解

又方

擣生葛根汁及葛藤餅和絞汁飲之無濕者乾葛煎服佳乾蒲煎服之亦佳

又方

粳米一升水五升煑使極爛漉去滓飲之尤良

千金療酒醉不醒方

葛根汁飲一二升無多少取醒止

又方（本云治飲酒不醉）

九月九日菊花末飲服方寸匕

又方

小豆葉陰乾一百日末服之日方寸匕良

又方

五月五日取井中倒生草陰乾末酒服方寸匕佳

又病酒方

取豉葱各一升以水四升煮取二升飲之差止

飲酒令難醉方一首

千金飲酒令無酒氣方

乾蕪菁根二七枚三遍蒸乾末之取兩錢匕飲酒後水服之

飲酒積熱方二首

肘後飲酒積熱遂發黃病方

雞子七枚苦酒漬之器中密封內井底宿出當軟取吞之二三枚漸至盡驗

千金治飲酒房勞虛受熱積日不食四體中虛熱飲酒不已入百脉心氣虛令人錯謬失常方

酸棗人炒　人參　白薇　枳實炙

知母　栝樓　芍藥各二兩　茯苓三兩一云茯神

甘草一兩炙　生地黃八兩

右十味切以水一斗煑取三升分三服

斷酒方一十五首

千金斷酒方

酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安猪圈中任猪㹠動經七日取飲之永斷

又方

臘月鼠頭灰柳花等分黃昏時酒服一杯

又方

正月一日酒五升淋碓頭擣一下取飲

又方

故氊中葈耳子七枚燒作灰黃昏時煖一杯酒口言與病狂人飲勿令知之後不喜飲酒

又方　白猪乳汁一升飲之永不用酒

又方　刮馬汗和酒與飲之終身不飲酒

又方　大蟲屎中骨燒末和酒與飲

又方　鸕鷀矢灰水服方寸匕永斷

又方　故紡車絃燒灰和酒與飲之

又方　驢駒衣燒灰酒服之

又方　自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔吐神驗

又方　酒客吐中肉七枚陰乾燒灰服之

又方　酒漬汗鞋替一宿旦空腹與飲即吐不喜見酒

又方　白狗乳汁酒服之

又方　臘月烏腦酒服之

服藥過劑及中毒方一十一首

肘後服藥過劑及中毒多煩悶欲死方

又方　刮東壁土少少以水一二升和飲之良
又方　水和胡粉稍稍飲之
又方　青粳米取其瀋汁五升飲之
又方　擣蘘荷取汁飲一二升冬月用根夏月用莖葉
又方　屋霤下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中攪揚之令沫出取沫一升飲之未解更作
又方　擣藍青絞汁數升飲之無藍以青布水漬飲之
又方　燒犀角末服一方寸

備急服藥失度腹中苦煩方

飲生葛汁良或乾葛煎湯服之肘後同
又方　雞子黃三枚吞之良又雞子清飲之又服猪膏良
又方　服諸石藥過劑者白鴨矢水和服之差肘後同

又方　大黃三兩芒消二兩以水五升煑取三升分三服得下便與（肘後用地黃汁五升煑不用水）

解諸藥草中毒方二十九首

肘後療食野葛已死者方

以物開口取雞子三枚和以灌之須臾吐野葛出

又方

取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽則活若口不開取大竹筒以一頭注其脅脅取冷水注筒中數易注之須臾口開則可與妄若甚者兩脅及臍各筒注之甚佳

又方

飲甘草汁但唯多唯善

又鉤吻與食芹相似而其所生之地傍無他草莖有毛誤食之殺人方

薺苨八兩㕮咀以水六升煑取三升服之

又此多生籬援水瀆邊絕似茶人識之無敢食但不知之必是鉤

吻按本草鈎吻一名野葛又云秦鈎吻乃並入藥用非此又一種
葉似黄精唯花黄莖紫亦呼爲鈎吻不可食故經方引與黄精
爲比言其形色相似也

備急療諸藥各各有相解者然難常儲今但取一種而兼解衆
毒求之易得者方

甘草濃煮汁多飲之無不主也又食少蜜佳

又方　煮桂多飲之又服葱涕佳

又方　煮大豆汁服𢿧亦解

又方　煮薺苨濃汁飲之秘方卒不及煮便嚼食之亦可散
服此藥在諸藥中並解衆毒

又方　藍青皮子亦通諸毒可預畜之急則便用之
凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲之待冷
則解毒熱則不解毒也

集驗療中諸毒藥及葛未死但聞腹中煩寃剝裂作聲如腸
胃破斷狀目視一人成兩人或五色光起須臾不救方
取新小便和清邊久屎一升絞取汁一升頓服氣已絶
但絞口與之入腹便活也已死萬一冀活但數與屎汁也
又療中藥毒方
取竈中當釜月下土末服方寸匕
千金中百藥毒方
甘草薺苨大小豆汁藍汁及實汁根汁並解之
又中狼毒毒方
白斂鹽藍汁並解之
又中藜蘆毒方
雄黃葱汁並解之
又中巴豆毒方

黃連昌蒲小豆藿汁大豆汁並解之

又中躑躅花毒方

梔子汁解之

又中芫花毒方

防風防已甘草桂枝汁並解之

又中射罔毒方

藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁六畜血貝齒屑蚯蚓屎

藕芰汁並解之

又中半夏毒方

以生薑汁乾薑解之

又中大戟毒方

昌蒲汁解之

又中烏頭天雄附子毒方

用大豆汁遠志防風棗肌飴糖解之

又中杏人毒方

用藍子汁解之

又中莨菪毒方

薺苨甘草升麻犀角蟹汁並解之

又解諸毒雞腸草散方

雞腸草三分 藍子一合 芍藥二分 甘草四分炙

薺苨四分 墳土一分 升麻四分 當歸二分

右八味爲散以水服方寸匕多飲水佳若爲蜂蛇等衆毒蟲螫以鍼刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕差爲射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏澆水沾令濕取藥内瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即差若服毒藥水服毒解痛止愈

又解一切藥發不問草石始覺惡即服方

生麥門冬八兩去心　葱白八兩切　豉三升

右三味以水七升煮取三升半分三服

又療一切諸藥毒方

甘草三兩炙以水五升煮取二升内粉一合更煎三兩沸内蜜半兩分服以定止

又解毒藥散方

薺苨一分　藍葉花二分七月七日取葉并花陰乾

右二味擣末以水和服方寸匕日三

又中毒方

取秦鶻毛二枚燒灰以水服之

千金翼療藥毒不止解煩悶方

甘草二兩炙切　白粱粉一升　蜜四兩

右三味以水三升煑甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令調下蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲一升千金同

解諸蛇蟲毒方六首

千金蛇虺百蟲毒方

並用雄黃巴豆并麝香乾薑解之

又蜈蚣毒方

桑汁及葉根汁解之

又蜘蛛毒方

藍青解之

又蜂毒方

蜂房及藍青解之

又斑猫芫青毒方

猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煑猪膏巴豆並解之

又馬刀毒方

清水解之

辨五大毒一首

古今録驗辨藥有五大毒不可入口方經曰夫藥有大毒不可入口鼻耳目即殺人一曰鈎吻生崖二曰鴆狀黑雄雞生山谷中一名雉三曰除命赤色著木懸其子生山海中四曰海䖧狀如龍赤色生海中五曰鴆羽狀如鸛雀黑頭赤足遇其毒解之則活卒無藥可飲小便

解金鐵等毒方八首

肘後療金毒已死方

雞矢半升淋取一升飲之可再三千金云雞子汁并屎白燒猪脂和服

又方 呑水銀二兩即金出

又方 鴨血雞子並解之千金云及屎汁

又中雄黃毒方

防巳解之

又礜石毒方

大豆汁解之（千金又云白鵝膏）

集驗療服金屑死未絶者知是金毒方

以水銀一兩寫口中摇動令下咽喉入腹金則消滅成泥即出可三與服則活

千金解金銀銅鐵毒方

取鴨屎汁解之

又鐵毒方

磁石解之

惡毒瘴氣毒風腫毒方四首

千金療惡氣瘴毒百毒方

用犀角羚羊角雄黃麝香解之

又主喉腫邪氣惡毒入腹方

升麻射干並解之

又主咽腫毒方

用五香紫檀解之

又甘草湯主天下毒氣及山水露霧毒氣去地風氣瘴癘等毒方

甘草 二兩

右一味以水二升煮取一升分服

外臺秘要方卷第三十一

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔 校勘

外臺秘要方

三十二

面部面脂藥
頭膏髮鬢
衣香澡豆等

外臺秘要方卷第三十二 面部面脂藥頭膏髮鬢衣香澡豆等三十四門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

鬼舐頭方二首

澡豆方八首

手膏方三首

口脂方三首

燒甲煎法六首

造烟脂法一首

造水銀霜法二首

鹿角桃花粉方二首

熏衣濕香方五首

裛衣乾香方五首

面膏面脂兼療面病方一十三首

千金翼論曰面脂手膏衣香澡豆士人貴勝皆是所要然今之醫門極爲秘惜不許子弟洩漏一法至於父子之間亦不傳示

然聖人立法欲使家家悉解人人自知豈使愚於天下令至道
不行壅蔽聖人之意甚可怪也
又面脂方主面及皺皺黶黑皯凡是面上之病皆悉主之
丁香十一分　零陵香　桃人去皮　土瓜根
白斂　白及　防風　當歸
沉香　辛夷　商陸　麝香研
梔子花　芎藭各十二分　蜀水花　青木香各八分
白芷　萎蕤　菟絲子　藿香
甘松香各十五分　木蘭皮　白殭蠶　藁本各十分
茯苓十八分　冬瓜人十六分　鵝脂　羊髓各一升半
羊腎脂一升　豬胰六具　清酒五升　生豬肪脂三大升
右三十二味挼生豬胰汁漬藥一宿於脂中煎三上三下以
白芷色黄去滓以上件酒五升挼豬胰以炭火微微煎膏成

□濾之貯器中以塗面

又面膏方

杜蘅 杜若 防風 藁本
細辛 白附子 木蘭皮 當歸
白朮 獨活 白茯苓 萎蕤
白芷 天□ 王屑各一兩 菟絲子
防巳 商陸 梔子花 橘人
冬瓜人 蘼蕪花各三兩 藿香 丁香
零陵香 甘松香 青木香各二兩 麝香半兩
白鵝脂如無□□羊髓□□ 白羊脂 牛髓各一升
羊胰三具

右三十二味先以水浸膏髓等五日日滿別再易水又五日日別一易水又五日二日一易水凡二十日止以酒一升挼羊

膒令消盡去脉乃細切香於埴器中浸之密封一宿曉以諸脂等合煎三上三下以酒水氣盡爲候即以綿布絞去滓研之千遍待凝乃止使白如雪每夜塗面晝則洗却更塗新有十日以後色等桃花（本方有白斂人參各三兩無蘼蕪花冬瓜人此皆是面膏藥疑更有此二味）

又方

香附子（十枚大者） 白芷（二兩） 零陵香（二兩） 茯苓（一兩並以大兩）

蔓菁油（二升無以猪膏充） 牛髓 羊髓（各一斗）

水漬白臘（八兩） 麝香（二分）

右九味以油髓微火煎五物令色變去滓內麝香研千遍凝用澡豆洗面然塗傅之

又方

杏人（二升去皮） 白附子（三兩） 蜜陀僧（二兩研如粉） 白羊髓（二升半）

真珠（十四枚擣研如粉） 白鮮皮（一兩） 雞子白（七枚） 胡粉（二兩以帛四重裹於一石米下蒸之熟下陰乾）

白朮八分

木蘭皮　栝樓

藁本　桃花　蜀水花

蜜陀僧　白殭蠶　零陵香

杜蘅　鷹屎　白蒺藜　土瓜根各三分

麝香　丁香各二兩　白附子　玉屑各四分

鵝脂三合　鹿髓一升　羊髓一升　白臘四兩

豬膏二升

右二十九味細切酢漬密封一宿明旦以豬膏煎三上三下白芷色黃爲藥成去滓攪數萬遍令色白以傅面慎風日良

又方

防風　芎藭　白芷　白殭蠶

蜀水花　白斂　細辛　茯苓

藁本　萎蕤　青木香　辛夷人

當歸　土瓜根　栝樓人各三分　桃人去皮尖

豬脂二升　鵝脂一升　羊腎脂一升

右十九味細切綿裹酒二升浸一日一夜便內脂中急火煎之三上三下然後緩火一夜藥成去滓以寒水石粉三分內脂中以柳木篦熟攪任用之並出第五卷中

千金面膏去風寒令面光悅耐老去皺方

青木香　白附子　芎藭　白蠟

苓陵香　白芷　香附子各二兩　茯苓

甘松各一兩　羊髓一升半鍊之

右十味以酒水各半升漬經宿煎三上三下候酒水氣盡膏成去滓收貯任用塗面作粧皯䵟皆落

又方

玉屑　芎藭　土瓜根　白芷

冬瓜人　木蘭皮　萎蕤　桃人去皮

白附子各四分　商陸根五分　辛夷　菟絲子

藁本　白殭蠶　當歸　黃耆

藿香　細辛　防風　麝香

青木香各三　猪胆三具　蜀水花一合　鷹屎白一合

白狗脂一升　鵝脂一升　熊脂二升

右二十七味細切以清酒漬一宿微火煎一日以新布絞去滓

以塗面切愼風任用之出第六卷中

崔氏臘脂方

白鱲十兩煉令白　桃花　菟絲子　白芷

木蘭皮　細辛　辛夷人　白茯苓

土瓜根　栝樓根　白附子　杜蘅

桃人去皮　杏人去皮各三分　蔓菁子油一升半　羊髓

牛髓　鹿髓脂各一合

右十八味並細切以苦酒漬一宿用上件臘油髓脂等煎如面脂法其蔓菁油酒在前煎令煙出然始下臘髓訖內諸藥候白芷色黃膏成任用每以澡豆洗面然以塗之

又常用臘脂方

蔓菁油三升　甘松香一兩　零陵香一兩　辛夷人五分

白朮二分　細辛五分　竹茹一升　竹葉切五合

白茯苓三分 蘼蕪花三分 羊髓半升以水浸一云赤脉鍊之 麝香口口

右十二味切以綿裹酒浸經再宿絞去酒以脂中煎緩火令微似沸三日許香氣極盛膏成乃鍊臘令白[illegible]臨熟下臘調軟硬得所貯用之出第九卷中

文仲療人面無光潤黑及皺常傅面脂方

細辛 萎蕤 黃耆 白附子

署預 辛夷 芎藭 白芷各一分

栝樓 木蘭皮各二分 猪脂二升練成

右十一味切以綿裹用少酒漬一宿內脂膏煎之七上七下別出一斤白芷煎色黃藥成去滓攪凝以傅面任用之亦主金瘡止血良

延年面脂方

白朮 茯苓 杜蘅各六分 萎蕤

藁本　芎藭　土瓜根　栝樓各五分
木蘭皮　白殭蠶　蜀水花　辛夷人
零陵香　藿香各四兩　菟絲子八分　梔子花
麝香酒浸綿裹　鷹屎白各三分　冬瓜人五分　桃人五合並令碎
白臘三兩　羊脂腎邊者一升　猪脂三升水浸七日日別易水　猪䐗一具
白附子四分

右二十五味並細切酒二升取猪䐗桃人冬瓜人綿裹內酒中挼令消絞取汁用漬藥一宿別煎猪脂令消去滓以鵝脂羊脂白臘於鐺中用綿裹內鐺微火煎三上三下藥黃色去滓待澄候凝內鷹屎末攪令勻以塗面妙

又方

防風　萎蕤　芎藭　白芷
藁本　桃人去皮　白附子各六分　茯苓八分

細辛　甘松香　零陵香各二分　當歸

栝樓各研四分　蜀椒五十粒　鸕鷀屎　冬瓜人各研三分

麝香一分

右十七味酒浸淹潤一夕明日以綿薄寬裹之以白鵝脂三升羊脂二升並鍊成者以煎之於銅器中微火上煎使之然沸勿使焦也乃下之三上看白附子色黃膏成去滓又入鐺中上火内麝香氣出仍麝香更以綿濾度之乃内栝樓人桃人冬瓜人等脂并鷹屎鸕鷀屎粉等攪令調膏成待凝以瓷器貯柳木作槌子於鉢中研使輕虛得所生光研之無度數二三日研之方始好唯多則光滑任用

洗面藥方二首

千金翼面藥方

朱砂研　雄黃　水銀霜各半兩　胡粉二兩

黃鷹屎一升

右五味合和洗淨面夜塗以一兩霜和面脂令稠如泥先於夜欲卧時以澡豆淨極洗面并手乾拭以藥塗面厚薄如尋常塗面厚薄乃以指細細熟摩之令藥與肉相入乃卧一上經五日五夜勿洗面止就上作粉即得要不洗面至第六夜洗面塗一如前法滿三度塗洗更不塗也一如常洗面也其色光淨與未塗時百倍佳出第五卷中

延年洗面藥方

萎蕤　商陸根　栝樓　杜若

滑石各八兩　土瓜根　芎藭　辛夷人

甘松香各五兩　黃瓜樓五枚去皮　白茯苓　白芷一斤

木蘭皮　零陵香各三兩　麝香二兩　蓽豆二升

冬瓜人二升去皮　豬蹄三具

右十八味擣爲散和蓽豆以水桃人冬瓜人黃瓜樓子令碎以猪蹄汁中挼令散和蘗作餅子暴乾擣篩更和猪蹄汁又捻作餅更暴乾汁盡乃止擣篩爲散稍稍以洗手面妙

面色光悅方五首

千金療人令面悅澤好顏色方

猪胰五具 蕪菁子二兩 栝樓子五兩 桃人三兩去皮

右四味以酒和之擣如膏以傅面慎風日妙

又方

酒漬三月三日桃花服之好顏色治百病

又方

採三株桃花陰乾爲散以酒飲服方寸匕日三令面光悅如紅出第六卷中

千金翼令面生光方

蜜陀僧以乳煎塗面即生光出第五卷中

延年去風令光潤桃人洗面方

桃人（五合去皮）

右一味用粳米飯漿水研之令細以漿水擣取汁令桃人盡即休微温用洗面時長用極妙

令面色白方四首

千金療面黑不白淨方

白鮮皮　白殭蠶　芎藭　白附子

鷹屎白　白芷　青木香　甘松香

白朮　白檀香　丁子香（各三分）　冬瓜人（五合）

白梅（二七枚去核）　瓜子（一兩）　杏人（三十枚去皮）　雞子白（七枚）

大棗（三十枚去核）　豬胆（三具）　麪（三升）　麝香（二分研）

右二十味先以豬胆和麪暴令乾然後合諸藥擣篩又以白

豆屑二升爲散旦用洗面手十日以上大白神驗出第六卷中

文仲令人面白似玉色光潤方

羊脂 狗脂各一升 白芷半升 烏喙十四枚

大棗十枚 麝香少許 桃人十四枚 甘草一尺炙

半夏半兩洗

右九味合煎以白芷色黃去滓塗面二十日即變五十日如玉光潤妙

又隱居効驗面黑令白去黯方

烏賊魚骨 細辛 栝樓

乾薑 蜀椒各三兩

右五味切以苦酒漬三日以成鍊牛髓二斤煎之以酒氣盡藥成作粉以塗面醜人亦變鮮妙光華

近効則天大聖皇后鍊益母草留顏方

用此草每朝將以洗手面如用澡豆法面上皯䵳及
老人皮膚兼皺等並展落浮皮皮落著手上如白垢
再洗再有効淳用此藥已後欲和澡豆洗亦得以意
斟酌用之初將此藥洗面覺面皮手滑潤顏色光
澤經十日許特異於女面經月餘生血色紅鮮光澤
異於尋常如經年久用之朝暮不絕年四五十婦人
如十五女子俗名鬱臭此方仙人秘之千金不傳即
用藥一無不效世人亦有聞說此草者為之皆不得
真法今錄真法如後可勿傳之五月五日收取益母
草暴令乾燒作灰收草時勿令根上有土有土即無
効燒之時預以水灑一所地或泥一爐燒益母草良
久燼無取汁羅篩此灰乾以水熟攪和溲之令極熟
團之如雞子大作丸於日裏暴令極乾訖取黃土作

泥泥作小鑪子於地四邊各開一小孔子生剛炭上下俱著炭中央著藥丸多火經一炊久即微微著火燒之勿令火氣絶絶即不好經一復時藥熟切不得猛火若藥鎔變爲瓷色黄用之無驗火微即藥白色細𦡁一復時出之於白瓷器中以玉搥研絹篩又研三日不絶收取藥以乾器中盛深藏旋旋取洗手面令白如玉女項頸上黑但用此藥揩洗並如玉色祕之不可傳如無玉搥以鹿角搥亦得神驗

面皯方一十三首

廣濟療面皯方

雄黄七分 雌黄五分並以綿裹於漿水中煑一日 光明砂

蜜陀僧五分內猪脂中煑數沸煑訖洗用 真珠三分末研 峭粉三分

白殭蠶三分 白及三分 茯苓五分 水銀五分和藥末研令消盡

右十味各研如粉訖相和又研之令勻少減取和猪脂面脂攪令調每夜用澡豆漿水洗去粧勿衝風及火

千金療面皯方

李子人和雞子白塗上則落

又方

真白羊乳三升 羊胆兩具以水漬去皮細擘 甘草二兩炙末

右三味相和一宿先以酢漿水洗面以生布拭之夜塗藥明旦以猪蹄湯洗却又依前爲之即盡

又方

白附子末以水和塗上頻頻用即落盡

又方

桂心石薑末蜜和塗之

又方

又方

杏人酒浸皮脫擣如泥以絹囊裹夜則拭之効

又方

水和丹砂末服方寸匕男女七日皆色白也

又方

美酒浸雞子三枚密封四七日成塗面淨好無比

又方

枸杞根一百斤　生地黃三十斤

右二味先下篩枸杞又擣碎地黃暴乾合下篩空腹服方寸匕日三効

文仲療皯令人面皮薄如蕣華方

鹿角尖取實白處於平石上以水磨之稍濃取一升二合　乾薑一兩

右二味擣篩乾薑以和鹿角汁攪使調每夜先以煖漿水洗面軟帛拭乾取上白蜜塗面以手摩使蜜盡手指不粘

爲候然塗藥平明還以煖漿水洗之二三日顏色驚人塗藥不用過見風日妙

救急療面皯方

芍藥　茯苓　杏人去皮　防風

細辛　白芷各一兩　白蜜一合

右七味擣爲散先以水銀霜傅面三日方始取前件白蜜以和散藥傅面夜中傅之不得見風日向曉任意作粉能常用大佳每夜先須漿水洗面後傅藥

古今録驗療面皯方

取白蜜和茯苓粉傅面七日愈

又療面皯黯蘇合煎方

蘇合香　麝香　白附子炮　女菀

蜀水花各二兩　青木香三兩　雞舌香　鸕鷀屎各一兩

右八味先取糯米二升折硬炊一斗生用一斗合淳酢用水一斛五斗稍稍澄取汁合得一斛煮並令沸以綿裹諸藥內著沸漿中煎得三升藥熟以澡豆洗皯處令燥以藥傅皯上日再欲傅藥常以酢漿水洗面然塗藥塗藥至三四合皯處當小急痛皯處微微剥去便白以漿三洗三傅玉屑膏訖白粉之若急痛勿怪痒勿搔之但以粉粉上而按抑痒處滿百日可用脂胡粉取差

面皯䵟方二十一首

肘後療面多皯䵟如雀卵色者方

又方

以苦酒漬白朮以拭面上即漸漸除之

又方

以羚羊膽酒二升合煮三沸以塗拭之日三差

羊膽猪頭細辛末煎三沸塗面平旦以醋漿水洗之

又方

茯苓白石脂等分末和蜜塗之日三除去

文仲療皯黷方

杏人去皮擣末雞子白和塗經宿然拭之

又方

桃花瓜子各等分擣以傅面

又方

茯苓末以蜜和傅之

備急療皯黷方

雞子一枚去黃 朱砂末一兩

右二味朱砂末內雞子中封固口與雞同令伏鴉候雞鶵出即取之以塗面立去也

又方

七月七日取露蜂房子於漆椀中漬取汁重濾絞之

以和胡粉塗

又去黯痣方

桑灰　艾灰各三升

右二味以水三升淋之又重淋三遍以五色帛內中合煎令

可丸以傅黯上則爛脫乃以膏塗之并滅瘢痕甚妙

小品療面黯滅瘢瘕除皯去黑點方

薔薇二分　桂心一分

右二味擣篩以酢漿水服方寸匕日一止即脫又服梔子散

差千金治面皰

千金療面皯黯令悅白潤好及手方

猪蹄二具治如食法　白粱米一升太令淨　白茯苓

以水五升煮蹄爛澄取清汁三升

商陸各五兩　萎蕤　藁本　白芷各三兩

右六味以猪蹄汁井桃人一升合煮取二升去滓以白瓷器中貯之內甘松零陵香各一兩以綿裹漬以傅之

又澡豆方

猪胆五具乾之　白茯苓　藁本　白芷各四兩

甘松香　零陵香各二兩　白商陸五兩　大豆末二升絹篩

藋灰一斗火鍊

右九味擣篩調和訖收貯稍稍取前瓷中汁和以洗手面只用煖酢漿洗淨後任意水洗如常八月九月則合冷處貯之至三月已後勿用神良

又鼆皯面方

沉香　牛黃　薰陸香　雌黃

鷹屎各二分　丁香末一分　水銀一兩　玉屑二分

右八味作粉以蜜和塗之

又䵟面內外療方

以成鍊松脂爲末溫酒服二合日三服盡二升即差

又方

白芷　白殭蠶各八兩　白附子　辛夷

烏頭炮　防風　藿香　商陸各二分

藁本　萎蕤各四分　零陵香三分　麝香一分

牛脂一升　鵝脂一升　羊脂五合　麻油二合

右十六味細剉以酢漬浹浹然一宿以諸脂油煎白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三差

又療面䵟方

白礬燒汁盡　硇黃　白附子各一分

右三味擣篩以酢一盞漬之一宿夜淨洗面塗之勿見風白

如雪也翼同

又方

雞子三枚　丁香一兩　醋一升

右三味漬七日取雞子白研丁香胡粉一兩和之洗面夜以藥塗之甚妙

又方

羖羊膽　牛膽

右二味以醋二升合煑三沸塗之差

千金翼面藥方療皯黯及瘖瘰并皮膚皴劈方

防風　藁本　辛夷　芍藥

商陸根　白芷　牛膝　當歸

細辛　蜜陀僧　芎藭　獨活

萎蕤　木蘭皮　零陵香　雞舌香

丁香　麝香　真珠各一兩　蕤人

杏人二兩去皮　臘月猪脂三升練　油一升　麞鹿腦各一具無以羊腦充

牛髓五升

右二十六味先以浸腦髓使白藿香已上㕮咀如麥豆乃於腦髓脂油中煎三上三下以綿絞濾去滓入麝香及真珠末等研攪千遍凝即塗面上（謹按千金翼去二十九味遂以諸本並千金翼校之但二十六味右去藿香以上㕮咀恐并藿香更有三味）

必効療䵟皯令面白悅澤白附子膏方

白附子　青木香　丁香各一兩　商陸根一兩

細辛三兩　酥半升　羊脂三兩　蜜陀僧一兩研

金牙三兩

右九味以酒三升漬一宿煮取一升去滓內酥煎一升膏成夜塗面上旦起溫水洗不得見大風日差

面皯皰方一十五首

劉涓子療面皯皰麝香膏方

麝香二分　附子一兩炮　當歸　芎藭

細辛　杜蘅　白芷　芍藥各四分

右八味切以臘月猪膏一升半煎三上三下去滓下香膏成以傅皰上日三差

肘後療年少氣盛面生皯皰方

冬瓜子　冬葵子　柏子人　茯苓各等分

右四味爲散食後服方寸匕日三服

又方

黃連一斤　木蘭皮十兩　猪肚一具治如食法

右三味㕮咀二味內肚中蒸於二斗米下以熟切暴乾擣散食前以水服方寸匕日再

又方

麻黃三兩 甘草二兩炙 杏人二兩去尖皮熬別擣

右三味擣篩酒下一錢匕日三服

又方

黃連二兩 蛇牀子四合

右二味擣末以面脂和塗面日再差

文仲療面皯皰方

胡粉水銀以臘月豬脂和傅之

又方

熟研水銀向夜塗之平明拭却三四度差

又方

土瓜根擣以胡粉水銀青羊脂合塗面皯處當差

備急療面皯皰方

又方

麋脂塗拭面上日再

鷹矢白二分　胡粉一分

右二味以蜜和傅面上差

又主少年面上起細皰方

捼上浮萍擒之可飲少許汁良

又方

以三年苦酒漬雞子三宿當軟破取塗之差

古今錄驗療面皯皰及產婦黑䵟如雀卵色羊膽膏方

羊膽一枚　猪脂一合　細辛一分

右三味以羊膽煎三上三下膏成夜塗傅早起洗以漿水

洗去驗

又療面䵟皰皯玉屑膏方

玉屑　珊瑚　木蘭皮各三兩　辛夷去毛

白附子　芎藭　白芷各二兩　牛脂五兩

冬瓜人□合　桃人一升　豬脂五合　白狗脂二斤

商陸一升

右十三味切煎三上三下白芷色黄其膏成洗面塗膏神驗

又療面黑似土皯皰白藍脂方

白藍一分　白礬一分燒　石脂一分　杏人半分去尖皮

右四味擣篩雞子和夜塗面明旦以井花水洗之白藍即白

斂也甚妙老與少同

面皻皰方一十三首

劉消子療面皻皰木蘭膏方

木蘭皮　防風　白芷　青木香

牛膝　獨活　藁本　芍藥

白附子　杜蘅　當歸　細辛
芎藭各一兩　麝香二分

右十四味剉以臘月猪脂二升微火煎三上三下絞去滓入麝香調以傅面上妙出第五卷中

附後療面及鼻病酒皶方

木蘭皮一斤漬酒用三年者百日出暴乾　梔子人一斤

右二味合擣為散食前以漿水服方寸匕日三良千金翼木蘭皮五兩梔子人六兩

又方

鸕鷀矢末以臘月猪膏和塗之千金同

又方

真珠　胡粉　水銀等分

右三味以猪膏研令相和塗之佳

又方

馬藺子花擣封之佳

集驗療面上皻皰䵟䵳方

蒺蔾子　梔子人　豉各一升

右三味擣合如泥以酸漿和如泥臨卧以塗面上日未出便洗差千金有木蘭皮一斤翼去半斤

又木蘭散方

木蘭皮一斤

右一味以三年酢漿漬之百日出於日中暴之擣末服方寸匕日三

古今録驗主皰方

雄黃　峭粉末　水銀並等分

右三味以臘月猪脂和以傅面皰上差止

又卒得面皰方

土瓜根　水銀　胡粉　青羊脂（等分）

右四味爲粉和傅面皰上差止

又方

胡粉（二兩）　水銀（二分）

右二味和猪脂研勻以傅之千金同

又男女皰面生瘡方

黃連（二兩）　牡蠣（三兩熬）

右二味擣篩以粉瘡上頻傅之即差

又療面皰痒腫白附子散方

白附子　青木香　由跋（各二兩）　麝香（二分）

右四味爲散以水和塗面（千金翼有細辛二兩）

又療面皰氣甚如麻豆瘡痛搔之黃汁出及面黑色黯䵟不可去之葵子散方

冬葵子　柏子　茯苓等分

右三味爲散以酒服方寸匕日三差千金翼有冬瓜子

面粉滓方四首

千金療面粉滓方

礬石熬汁盡

右一味以酒和塗之三數度佳甚妙

備急療婦人面上粉滓赤膏方

光明砂四分研　麝香二分　牛黃半分　水銀四分以面脂和研

雄黃三分

右五味並精好藥擣篩研如粉以面脂一升內藥中和攪令極調一如傅面脂法以香漿水洗傅藥避風經宿粉滓落如蔓菁子狀此方祕不傳

又主去粉滓皯䵳方

白斂　白石脂　杏人各一分

右三味擣散以雞子白和以井花水洗傅之三五遍即差

又方

黃耆　白朮　白斂　萎蕤各十一分

商陸　蜀水花　鷹矢白各一兩　防風

芎藭　白芷　細辛　白附子炮

杏人去皮尖　青木香各六分

右十四味擣爲粉以雞子白和之作挺子暴乾研之以漿水和塗夜傅朝洗差出第六卷中

化面方二首

張文仲療化面方

真珠研　光明砂研　冬瓜人各二分　水銀四分

右四味以四五重綃袋盛於銅鐺中以酢漿水微火煑一宿一

日始堪用取水銀和面脂熟研使消合珠冬瓜子末更和調以傅面取差爲度

備急面上皯𪒠子化面仍令光潤皮急方

土瓜根

右一味擣末以漿水和令調入夜以漿水洗面塗藥旦挑却即差

雜療面方六首

肘後療面生㿔瘰如麻子中有粟核方

石灰以水漬之才淹以米一把置上令米釋淘取一一置㿔瘰上當漸拭之軟乃爪出粟以膏藥傅之即差

千金療面上風方

玉屑研 蜜陀僧研令如粉 珊瑚研各二大兩 白附子三兩

右四味細研如粉用酥和夜塗面上且洗差出第六卷中

千金翼芎藭湯主面上及身體風搔痒方

麻黄十分去節　芎藭　白朮　吴茱萸
防風　枳實炙　羌活各三兩　署預四兩
蒺藜子六兩　烏喙二兩炮　甘草二兩炙　生薑六分
右十二味切以水九升七合煑取二升五合去滓分服甚妙驗

又洗方

蒴藋根　蒺藜　景天葉各一兩　蛇牀子五兩
玉屑二兩

右五味以水一斗煑取三升稍稍洗之慎風日差止

又急面皮方

大猪蹄一具治如食法

右一味以水二升清漿水一升煎成膠以洗面又和澡豆塗面以漿水洗令面皮急矣出第五卷中

蘇澄去面皯及粉皶方

取三年大酢二升漬雞子五枚七日雞子當軟如泥去酢瀉著瓷器中以胡粉兩雞子許和研如膏蓋口蒸之於五斗米下熟藥成封之勿泄氣夜欲卧時研塗面皰粉刺上旦以漿水洗面日别如此百日差勿見風効

頭風白屑方四首

廣濟療頭風白屑痒髮落生髮主頭腫旋悶蔓荆子膏方

蔓荆子一升 生附子三十枚 羊躑躅花四兩 葶藶子四兩

零陵香二兩 蓮子草一握

右六味切以綿裹用油二升漬七日每梳頭常用之若髮稀及禿處即以鐵精一兩以此膏油於瓷器中研之摩禿處其髮即生也

延年松葉膏療頭風鼻塞頭旋髮落白屑風痒並主之方

松葉（一升切）　天雄（去皮）　松脂　杏人（去皮）
白芷（各四兩）　莽草　甘松香　零陵香
甘菊花（各一兩）　秦艽　獨活　辛夷人
香附子　藿香（各二兩）　烏頭（去皮）　蜀椒（汗）
芎藭　沉香　青木香　牛膝（各三兩）
躑躅花（一兩半並剉）

右二十一味㕮咀以苦酒三升漬一宿以生麻油一斗微火煎三上三下苦酒氣盡膏成去滓濾盛貯以塗髮根日三度摩之

又療頭痒搔之白屑起方

大麻人（三升擣碎）　秦椒（二升）

右二味擣內泔汁中漬之一宿明旦濾去滓溫以沐髮訖用後方白芷一斤雞子三枚芒消一升三味以水四升煮取三升去滓停小冷內雞子清及消攪令調更溫令熱分爲三度澤頭覺

頭痒即作洗之不過三度永除

又療頭風髮落或頭痒腫白屑方

蔓荆子一升碎　防風三兩　寄生三兩　秦椒一兩

大麻人一升　白芷四兩

右六味切以水一斗五升煑取一斗去滓以洗頭三四度差加

芒消一升亦妙

沐頭去風方五首

集驗療頭風方

甘菊花　獨活　茵芋　防風

細辛　蜀椒　皂荚　桂心

杜蘅　莽草

右十味分等水煑以沐頭必効

又主風頭沐湯方

豬椒根三兩　麻黃根　茵芋　防風各二兩

細辛一兩

右五味切以水二斗煮取一斗以沐頭甚妙

又主頭風搔之白屑起雞子沐湯方

新生烏雞子三枚

右一味以五升沸湯揚之使温温破雞子内中攪令匀分爲三度沐令髮生去白屑風痒差

必効沐髮方

取生柏葉細剉一斗煮取湯沐髮妙

又方

取杏人烏麻子二味擣以水投濾取汁並擣用甚妙

頭風白屑兼生髮方八首

廣濟療頭風白屑生髮白令黒方

淨木子五升未識以九月九日已前採臨時擣末去子　鐵精四兩　零陵香三兩

丁香子二兩

右四味細切以絹袋盛用生麻油二升漬經二七日洗頭訖每日塗之方驗

集驗療頭風痒白屑風頭長髮膏方

蔓荊子　附子炮　細辛　石南草

續斷　皂莢　澤蘭　防風

杏人去皮　白芷　零陵香　藿香

馬鬐膏　熊脂　豬脂各二兩　松葉切半升

莽草一兩

右十七味㕮咀以苦酒漬一宿明旦以脂膏等煎微微火三上三下以白芷色黃膏成用以塗頭中甚妙

又療頭氣痒白屑生髮膏方

烏喙　莽草　石南草　細辛

皂莢　續斷　澤蘭　白朮

辛夷　白芷　防風各二兩　柏葉切二升

松葉切二升　猪脂四升

右十四味以苦酒浸一宿以脂煎三上三下膏成去滓濾收沐髮了以塗之妙千金同

崔氏松脂膏療頭風鼻塞頭旋髮落復生長髮去白屑方

松脂　白芷各四兩　天雄　莽草

躑躅花各一兩　秦艽　獨活　烏頭

辛夷人　甘松香　零陵香　香附子

藿香　甘菊花各二兩　蜀椒　芎藭

沉香　牛膝　青木香各三兩　松葉切一升

杏人四兩去皮碎

右二十一味切以苦酒二升半漬一宿用生麻油九升微火煎令酒氣盡不咤去滓以摩頂上髮根下一摩之每摩時初夜臥摩時不用當風晝日依常檢校東西不廢以差爲度

又蓮子草膏療頭風白屑長髮令黑方

蓮子草汁二升 松葉 青桐白皮各四兩 棗根白皮三兩

防風 芎藭 白芷 辛夷人

藁本 沉香 秦艽 商陸根

犀角屑 青竹皮 細辛 杜若

蔓荊子各二兩 零陵香 甘松香 白朮

天雄 柏白皮 楓香各一兩 生地黃汁五升

生麻油四升 猪鬃脂一升 馬鬐膏一升 熊脂二升

蔓菁子油一升

右三十味細切以蓮子草汁并生地黃汁浸藥再宿如無蓮子

草汁加地黃汁五小升浸藥於微火上内油脂等和煎九上九下以白芷色黃膏成布絞去滓欲塗頭先以好泔沐髮然以傅頭髮摩至肌又洗髮取桑根白皮剉一升以水三升煑取一升去滓以沐頭髮塗膏驗出第二卷中

延年療頭風白屑風痒長髮膏方

蔓荆子　附子去皮　澤蘭　防風
杏人去皮　零陵香　藿香　芎藭
天雄　辛夷各二兩　沉香二兩　松脂
白芷各三兩　馬髻膏　松葉切　熊脂各一兩
生麻油四升

右十七味以苦酒漬一宿以脂等煎緩火三上三下白芷色黃膏成去滓濾收貯塗髮及肌中摩之日三兩度差

又療熱風衝髮髮落生髮膏方

松葉切 蓮子草切 鍊成馬鬐膏 棗根皮各一升切
韭根切 蔓荆子各三合碎 竹瀝 猪脂各二升
防風 白芷各二兩 辛夷人 吴藍
升麻 芎藭 獨活 寄生
藿香 沉香 零陵香各一兩
右十九味以棗根煮汁竹瀝等浸一宿以脂等煎之候白芷色黄膏成以塗頭髪及頂上日三五度妙
古今録驗生髪及療頭風癢白屑膏方
烏喙 莽草 細辛 續斷
石南草 辛夷人 皂莢 澤蘭
白术 防風 白芷各二兩 柏葉
竹葉一升切 猪脂五升 生麻油七升
右十五味以苦酒漬一宿以油脂煎候白芷色黄膏成濾搌

收以塗頭髮先沐洗然用之妙

生髮膏方二十一首

廣濟生髮方

蓮子草汁一大升 熊白脂一大合 豬鬐膏一合 生麻油一合

柏白皮切三合 山韭根切三合 瓦衣切三合

右七味以銅器煎之候膏成去滓收貯每欲梳頭塗膏令頭肌中髮生又黑

又生髮膏方

細辛 防風 續斷 芎藭

皂莢 柏葉 辛夷人各一兩八銖 寄生二兩九銖

澤蘭 零陵香各二兩十六銖 蔓荊子四兩 桑根汁一升

韭根汁三合三勺 竹葉切三合 松葉切六合 烏麻油四大升

白芷六兩十六銖

右十七味以苦酒韭根汁漬一宿以綿裹煎微火三上三下白芷色黃去滓濾以器盛之用塗摩頭髮日三兩度

深師療頭風烏喙膏生髮令速長而黑光潤方

烏喙　莽草　石南草　續斷

皂莢去皮子熬　澤蘭　白朮各二兩　辛夷人一兩

柏葉切半升　猪脂三升

右十味以苦酒漬一宿以脂煎於東向竈釜中以葦薪煎之先致三堆土每三沸即下致一堆土候沸定却上至三沸又置土堆上三畢成膏訖去滓置銅器中數北向屋溜從西端至第七溜下埋之三十日藥成小兒當剃頭日三塗大人數沐沐巳塗之甚驗

千金療脈極虛寒髮墮落安髮潤方

桑根白皮切二升

右一味淹漬煮五六沸去滓以洗沐髮數數爲之不復落也

又方

麻子三升碎　白桐葉一把切

右二味以泔汁二升煮取八九沸去滓洗沐頭髮不落而長也翼同

又生髮膏方

胡麻油一升　鴈脂一合　丁子香　甘松香各一兩半

吴藿香　細辛　椒各二兩　澤蘭

白芷　牡荆子　苜蓿香　大麻子各一兩

芎藭　防風　莽草　杏人各三兩去皮

竹葉五合切

右十七味切以酢漬一宿煎之以微火三上三下白芷色黃膏成去滓以塗髮及頂尤妙出第十三卷中

千金翼生髮膏令髮速長黑傳藥時特忌風方

烏喙　莽草　續斷　皁莢去皮子

澤蘭　竹葉　細辛　白朮各二兩

辛夷　防風各一兩　柏葉切四兩　杏人別擣

松葉各三兩　猪脂三升

右十四味先以米酢漬一宿以脂煎三下三上膏成去滓塗

髮及頂上

又長髮方

蔓荆子三升　大附子二枚

右二味以酒一斗二升漬之以瓷器盛之封頭二十日取雞脂

煎以塗之澤以汁櫛髮十日長一尺勿近面塗驗

又生髮附子松脂膏方

附子　松脂各二兩　蔓荆子四兩擣篩

右三味以烏雞脂和瓷器盛密縛頭於屋北陰乾百日藥成馬鬐膏和以傅頭如澤勿近面驗

又生髮牆衣散方

牆衣五合暴乾擣末　鐵精一合　合歡木灰二合　水萍末三合

右四味擣研末以生油和少許如膏以塗髮不生處日夜再即生髮効此妙並出第五卷中

近効生髮方

蔓荊子　青箱子　蓮子草各一分　附子二枚

碎頭髮灰二七

右五味以酒漬內瓷器中封閉經二七日藥成以烏雞脂和塗之先以泔洗然傅之數日生長一尺也

生眉毛方二首

千金生眉毛方

鑪上青衣　鐵生等分

右二味以水和塗之即生甚妙

又方

七月烏麻花陰乾末烏麻油二味和塗眉即生妙

令髮黑方八首

深師療生髮黑不白澤蘭膏方

細辛　續斷　皂莢　石南草

澤蘭　厚朴　烏頭　莽草

白朮各二兩　蜀椒二升　杏人半升去皮

右十一味切以酒漬一宿以鍊成猪脂四斤銅器中向東炊竈中煎三上三下膏成絞去滓拔白者以辰日塗藥皆出黑髮十日効

又生長髮令黑有黃白者皆黑魏文帝用効秘之方

黄耆 當歸 獨活 芎藭
白芷 芍藥 莽草 防風
辛夷人 乾地黄 藁本 蛇銜各一兩
薤白切半升 烏麻油四升半 馬鬐膏二升
右十五味切以微火煎三上三下白芷黄膏成去滓洗髮訖然塗之

千金令白髮還黑方
隴西白芷一升 旋復花一升 秦椒一升 桂一尺
右四味下篩以井華水服方寸匕日三無二十日候還黑禁房

又方
烏麻九蒸九暴擣末以棗膏和丸久服之翼同

又方
取黑椹水漬之頻沐髮即黑効可塗傅之

又方

取生麻油浸烏梅塗髮良

又方

以鹽湯洗沐以生麻油和蒲葦灰傅之常用効出第十三卷中

千金翼瓜子散主頭髮早白又虛勞腦髓空竭胃氣不和諸藏虛絶血氣不足故令人髮早白少而生蒜髮及憂愁早白遠視䀮䀮得風淚出手足煩熱恍惚忘誤連年下痢服之一年後大驗方

瓜子一升　白芷　松子去皮　當歸

芎藭　甘草炙各二兩

右六味擣散食後服方寸匕日三酒漿湯飲任性服之忌如常法出第五卷中

拔白髮良日并方三首

千金翼白髮令黒方

八角附子一枚　大酢半升

右二味於銅器中煎兩沸内好礬石大如棊子許一枚消盡内香脂三兩和令相得攪至凝内竹筒内拔白髮以膏塗拔根即生黒髮也出第五卷中

備急拔白毛令黒毛生方

拔去白毛以好白蜜傅拔處即生黒毛眉中無毛以鍼挑傷傅蜜亦生眉毛此見諸人以石子研丁香汁拔白毛訖急手以傅孔中即生黒毛此法神驗

延年拔白髮良日

正月四日二月八日三月十二十三日兩日並得四月十六日五月二十日六月二十四日七月二十八日八月

十九日九月十五日十月十日十一月十日十二月

十日右並以日正午時拔當日不得飲酒食肉五辛

經一拔巳後黒者更不變千金同

變白髮滐髮方五首

范汪王子喬服菊增年變白方

菊以三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生者根莖也陰乾百日取等分以成日合擣千杵下篩和以蜜丸如梧桐子日三服七丸百日身體潤一年白髮變黒二年齒落復生三年八十者變童兒

又滐髮方

胡粉一分　白灰一分

右二味以雞子白和先以泔漿洗令淨然塗之即急以油

帛裹之一宿以澡豆洗却黑軟不絕甚妙

必效染白髮方

揀細粒烏豆四升

右一味以醋漿水四斗煮取四升去却豆以好灰汁淨洗髮待乾以豆汁熱塗之以油帛裹之經宿開之待乾即以熊脂塗揩還以油帛裹即黑如漆一塗三年不變妙驗

又方

擣木槿葉以熱湯和汁洗之亦佳

近效換白髮及髭方嚴中書處得云驗

熊脂二大兩臘月者佳　白馬鬐脂一兩細切熬之以綿濾絞汁

婆羅勒十顆其狀似美齊子去皮取汁但以指甲掐之即有汁

生薑一兩亦鐺中熬之　母丁香半大兩

右五味二味擣爲末其脂鍊濾之以藥末相和令勻取一小

槐枝左攪數千遍少傾即凝或似膏即拔白髮以辰日良以槐枝點藥[illegible]一條即以藥令人髮根孔中以措頭熟措之令藥入十餘日便黑髮生此方妙

髮黃方三首

肘後髮黃方

臘月猪脂膏和羊矢灰蒲灰等分傅黑也千金翼同

千金髮黃方

大豆五升　醋漿水二斗

右二味煑取五升汁淋之頻爲之黑翼同

千金翼療髮黃方

熊脂塗髮梳之散頭入牀底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

頭髮禿落方一十九首

深師療髮白及禿落茯苓朮散方

白朮一斤 茯苓 澤瀉 豬苓各四兩

桂心半斤

右五味擣散服一刀圭日三食後服之三十日髮黑

又療禿頭方

蕪菁子末和酢傅之日一兩度

又方

麻子二升熬焦末

右一味以豬脂和塗之髮生爲度

又方

東行棗根長三尺以中央

右一味以甑中心蒸之以器承兩邊汁以傅頭即生髮良

又方

右一味擣末研内泔中一宿去滓以沐髮便生　麻子三升

又方

取爛熟黑椹二升

右一味於瓷瓶中三七日化爲水以塗洗之髮生妙

又療髮禿落生髮膏方

馬鬐膏　驢鬐膏　猪脂　熊脂

狗脂鍊成各半合　升麻　防風　薺苨各二兩

蜣蜋四枚　莽草　白芷各一兩

右十一味以脂煎諸藥三上三下膏成去滓收以塗之千金并翼同

又主髮落生髮方

大黄六分　蔓荆子一升　白芷　防風

附子　芎藭　莽草　辛夷

細辛　椒　當歸　黃芩各一兩

馬鬐膏五合　豬膏三升

右十四味煎之以白芷色黃先洗然傅之驗

又主風頭毛髮落不生方

取鐵上生衣研以臘月豬脂塗之并主眉毛落惡生

千金六合煎三沸

又長髮方

麻子一升熬令黑押取油以傅頭長髮鷹脂尤妙

又方

多取烏麻花瓷甕盛密蓋封之深埋之百日出以

塗髮易長而黑妙

千金療髮落不生方

取羊糞灰淋汁洗之三日一洗不過十洗大生翼異同

千金翼療髮落方

拍葉 一升　附子 二兩

右二味擣以猪脂和作三十丸每洗頭時即内一丸於泔中洗髮即不落其藥以布裹密器貯勿令漏泄之

又療髮落不生方

取石灰三升水拌並令濕炒令極熱以絹袋盛之取好酒三升漬之密封冬二七日春秋七日取酒溫服一合常令酒氣相接七日落止百日服終身不落新髮旋生

又方

取桑根白皮一石水一石煮五沸以沐頭三遍即落止並出第五卷中

必効療頭一切風髮禿落更不生主頭中二十種病頭眩面中風以膏摩之方

藺茹三兩半去皮　細辛　附子各二兩　桂心半兩

右四味擣篩以猪膏勿令中水去上膜及赤脉二十兩擣令脂銷盡藥成擣訖仍研恐其中有脂膜不盡以生布絞掠取以瓷器貯之先用桑柴灰汁洗髮令淨方云桑灰兩日洗待乾以藥摩須令入肉每日須摩如非十二月合則用生烏麻油和極効

近効韋慈氏療頭風髮落并眼暗方

蔓荊實三兩研　桑上寄生　桑根白皮各二兩

韭根切三合　白芷二兩　甘松香

零陵香各一兩　馬鬐膏三合　烏麻油一升

甘棗根白皮汁三升　松葉切二合五粒者

右十一味細切諸藥内棗根汁中侵一宿數數攪令調溫匝已然旦内油脂中緩火煎之勿令火熱三五日候棗汁竭白芷色黃膏成去滓每日揩摩鬢髪及梳洗其藥浸經宿臨時以綿寛裹煎之膏成去滓綿濾以新瓷瓶盛稠濁者即先用却不堪久停特勿近手麼壞也

又宜服防風蔓荆子丸方

防風　黃連　乾地黃各十六分　蔓荆子二十分

甘皮六分　萎蕤十分　甘草八分炙　茯神十二分

大黃八分錦文者

右九味擣篩蜜和丸如桐子飲下二十丸稍稍加之以大腸暢爲度盡更合服除眼中黒花令眼目明以差爲度

劉尚書療頭中二十種風髪禿落摩之即此療頂如剥似銅盆者若小髪落不足爲難方

蜀椒三兩半　莽草二兩　乾薑　半夏
桂心　藺茹　附子　細辛各一兩並生用

右八味細擣篩以生猪脂剥去筋膜秤取二十兩和前件藥合擣令消盡脂其藥成矣先以白米泔沐髮令極淨每夜摩之經四五日即毛孔漸漸日生軟細白皮毛十五日後漸漸變作黑髮至一月四十日待髮生五寸以上任止若至五日不停彌佳好穌及生油和藥亦得又傷寒鼻塞但以摩之差

白禿方一十二首

集驗療白禿方

以羊肉如作脯炙令香及熱以搨上不過三五度即差千金同

又方

以大豆髑髏骨二味各燒末等分以臘月猪脂和

如泥塗之立差

千金松瀝煎療頭瘡及白禿方

松瀝七合 丹砂二兩研 雄黃二兩研取精 水銀研

黃連各一兩 礬石一兩燒本方無礬有峭粉一兩燒

右六味擣散內瀝中攪令調以塗之先以泔洗髮令淨及瘡令無痂然傅藥日三後當作膿膿訖更洗塗藥如此三度作膿訖以甘草湯去藥毒可十度許洗即差

又療白禿髮落生白痂終年不差方

五味子三分 蓯蓉二分 松脂二分 蛇床子一分

遠志三分 菟絲子五分 雄黃研 雌黃各一分研

白蜜一分 雞屎白半分

右十味擣篩以豬膏一升合煎先入雄黃雌黃次雞屎白次蜜次松脂次入諸藥末並先各各別末之候膏成先以桑柴

灰洗頭然傅之

又療白禿方

煮桃皮汁飲幷洗頭訖以麪豉二味和以傅之妙

又方

炒大豆令焦黑擣末和臘月猪脂熱煖之以塗傅上可裹勿令見風日並出第六卷中

千金翼王不留行湯主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方

王不留行 東引桃枝各五兩 蛇牀子三升 東引茱萸根五兩 苦竹葉三升 牡荊實 蒺藜子各三升 大麻子人一升

右八味以水二斗煑取一斗洗瘡日再幷療疽乳月蝕瘡

又方

以桃花末和猪脂傅上差爲度

又松脂膏主白禿及癰疽百種瘡惡治方

杜蘅　雄黃研　木蘭皮　礬石燒研

附子　大黃　石南　秦艽

真珠　苦參　水銀各一兩　松脂六兩

右十二味細切諸藥以酢漬一宿猪脂一斤半煎之以附子色黃去滓乃內礬石雄黃水銀更煎三兩沸待凝以傅之並出第五卷中

必効主禿瘡方

以童子小便煖用洗之揩令血出取白鴿糞五合熬末和醶醋令稠塗之即差

又主禿方

取三月三日桃花開口者陰乾與桑椹等分擣末以猪脂和以灰汁洗然塗藥差

又方

柳細枝一握取皮　水銀大如三豆　皂莢一挺碎

右三味以醋煎如餳以塗之

赤秃方三首

千金療赤秃方

擣黑椹三升如泥先灰汁洗然以塗之又服之甚妙

又方

燒牛羊角灰和猪脂傅之

又方

馬蹄灰和臘月猪脂塗之

令髮不生方三首

千金令毛髮不生方

蚌灰以鼈亀脂和拔却毛髮即塗永不生

又方

取狗乳塗之

又方

拔毛髮以蟹脂塗之永不復生

鬼舐頭方二首

千金療鬼舐頭方

燒猫矢灰以臘月猪脂和傅之

又方

取赤塼末以蒜擣和傅之

澡豆方八首

廣濟藥澡豆洗面去皯䵟風痒令光色悅澤方

白术　白芷　白及　白斂

茯苓　藁本　萎蕤　署預

土瓜根　天門冬　百部根　辛夷人

括樓　藿香　零陵香　雞舌香各三兩

香附子　阿膠各四兩炒　白薟三斤　楝子三百枚

澡豆五升　皂莢十枚去皮子

右二十二味擣篩以洗面令人光澤若婦人每夜以水和搨塗面至明溫漿水洗之甚去面上諸疾

千金翼澡豆方

丁香　沉香　桃花　青木香

木瓜花　鍾乳粉各三兩　麝香半兩　柰花

櫻桃花　白蜀葵花　白蓮花　紅蓮花各四兩

李花　梨花　旋復花各六兩　玉屑

真珠各二兩　蜀水花一兩

右十八味擣末乳等並研以絹下之合和大豆末七合研之

千遍密貯勿洩常以洗手面然作粧百日面如玉光潤悅澤

去臭氣粉滓咽喉臂膊皆用洗之悉得如意

又澡豆方

猪脏一具去脂　豆末四升　細辛　土瓜根

白朮　藁本　防風　白芷

茯苓　商陸根　白附子　杏人

桃人各四兩去皮尖　括樓三枚　皂莢五挺炙去皮子　冬瓜人半升

雀矢半合　菟絲子一合擣末

右十八味擣末以麪一斗用漿水和猪脏研令爛和諸藥及麪作餅子暴乾擣絹篩收貯勿令遇風洗手面極妙

又澡豆令人洗面光潤方

白鮮皮　鷹屎白　白芷　青木香

甘松香　白朮　桂心　麝香

白檀香　丁子香各三兩　冬瓜子五合　白梅三七枚

雞子白七枚　豬胰三具　麪五升　土瓜根一兩

杏人二兩去皮

右十七味以豬胰和麪暴令乾然後諸藥擣散和白豆末三升以洗手面十日如雪三十日如凝脂妙無比

崔氏澡豆悅面色如桃花光潤如玉急面皮去皯黯粉刺方

白芷七兩　芎藭五兩　皂莢末四合　萎蕤五兩

白朮各五兩　蔓荊子二合　冬瓜人五兩　梔子人三合

栝樓人三合　蓽豆三升　豬腦一合　桃人一升去皮

鷹屎三枚　商陸三兩細剉

右十四味諸藥擣末其冬瓜人桃人梔子人栝樓人別擣如泥其豬腦鷹屎合擣令相得然後下諸藥更擣令調以冬瓜瓤汁和爲丸每洗面用漿水以此丸當澡豆用訖傅面脂如常粧

飾朝夕用之亦不避風日

備急葦豆香澡豆方

葦豆一升　白附子　芎藭　芍藥

白术　栝樓　商陸根　桃人去皮

冬瓜人各二兩

右九味擣末以洗面如常法此方甚妙

延年澡豆洗手面藥豆屑方

白茯苓　土瓜根　商陸根　萎蕤

白术　芎藭　白芷　栝樓

藁本　桃人各六兩去皮　皂莢五挺去皮子　豆屑二升

猪肥三具暴乾　猪蹄四具治如食法爛煮取汁　麫一斗

右十五味取猪蹄汁拌諸藥等暴乾擣散以作澡豆洗手面妙

蘇澄藥澡豆方

白芷　芎藭　栝樓子各五兩　青木香
雞舌香各三兩　皂莢十兩去皮子炙　蓽豆　赤小豆各二升
右八味擣末和散任用洗手面去皯皰妙
手膏方三首
千金翼手膏方
桃人　杏人各二兩去皮　橘人一合　赤麨十枚
辛夷人　芎藭　當歸各一兩　大棗三十枚
牛腦　羊腦　白狗腦各二兩無白狗名狗亦得
右十一味擣先以酒漬腦又別以酒六升煑赤麨以上藥令沸待冷乃和諸腦等勻然後碎辛夷等三味以綿裹之棗去皮核合內酒中以瓷器貯之五日以後光洗手訖取塗手甚光潤而忌火炙手
備急作手脂法

猪胆一具 白芷 桃人去皮 細辛各一兩

辛夷 冬瓜人 黄瓜樓人各二兩末 酒二升

右八味煑白芷沸去滓膏成以塗手面光潤妙

古今録驗手膏方

白芷四兩 芎藭 藁本 萎蕤

冬瓜人 楝人各三兩 桃人一升去皮 棗肉二十枚

猪胆四具 冬瓜瓤汁一升 橘肉十枚 栝樓子十枚

右十二味以水六升煑取二升酒三升挼猪胆取汁桃人研入以洗手面

口脂方三首

千金翼口脂方

熟朱二兩 紫草末五兩 丁香二兩末 麝香一兩

右四味以甲煎和爲膏盛於匣内即是甲煎口脂如無甲

煎即名脣脂非口脂也

備急作脣脂法

臘二分　羊脂二分　甲煎一合須別作自有方　紫草半分

朱砂二分

右五味於銅鍋中微火煎臘一沸下羊脂一沸又下甲煎一沸又內紫草一沸次朱砂一沸瀉著筒內候凝任用之

古今錄驗合口脂法

好熟朱砂三兩　紫草五兩　丁香末二兩　麝香末一兩

口脂五十挺武德六年十月內供奉尚藥直長蔣合進　沉香三斤　五藥

上蘇合四兩半　麝香二兩　甲香五兩　白膠香七兩

雀頭香五兩　丁香一兩　蜜一升

右十四味並大秤大兩麤𢷏碎以蜜揔和分爲兩分一分內瓷器瓶內其瓶受大四升內訖以薄綿幕口以竹篾交絡蔽

甁口

藿香二兩 苜蓿香一兩 零陵香四兩 茅香一兩

甘松香一兩半

右五味以水一升酒一升漬一宿於胡麻油一斗二升內煎之緩火煎令水氣盡去滓均分著二坩各受一斗掘地著坩令坩口與地平土塞坩四畔令實即以上甲煎瓶器覆坩上四畔間一尺以糠火燒之常令著火糠作火即散著糠三日三夜燒十石糠即好冷出之綿濾即成甲煎臘七斤上朱砂一斤五兩研令精細紫草十一兩於臘內煎紫草令色好綿濾出停冷先於灰火上消臘內甲煎及攪看色好以甲煎調硬即加煎軟即加臘取點刀子刃上看硬軟著紫草於銅鐺內消之取竹筒合兩口脂法紙裹繩纏以鎔脂注滿停冷即成於口脂摸法取乾竹徑頭一寸半一尺二寸鋸截下兩頭並不得節堅頭

三分破之去中分前兩相者合令密先以冷甲煎塗摸中合之以四重紙裹筒底又以紙裹筒令縫上不得漏以繩子牢纏消口脂瀉中令滿停冷解開就擣出四分以竹刀子約筒截割令齊整所以約筒者筒口齊故也前有麝香末一兩後又有麝二兩未詳

燒甲煎法六首

千金翼甲煎法

甲香三兩 沉香六兩 丁香 藿香各四兩

薰陸香 楓香膏 麝香各二兩 大棗十枚取肉

右七味㕮咀如豆片又以蜜二合和攪內瓷坩中以綿裹口將竹篾交絡蔽之又油六升零陵香四兩甘松二兩綿裹內油中銅鐺緩火煎四五沸止去滓更內酒一升半并內煎坩中亦以竹篾蔽之然後剜地為坑置坩於上使出半腹乃將前小香坩合此口上以濕紙纏兩口仍以泥塗上使厚一寸

訖竈下煖坩火起從旦至暮煖至四更止明發待冷看上坩香汁半流遷入下坩内成矣

崔氏燒甲煎香澤合口脂方

蘭澤香半斤 零陵香一斤 甘松香五兩 吴藿香六兩

新壓烏麻油一升

右五味並大斤兩揀擇精細煖水淨洗以酒水漬使調匀經一日一夜並著銅鐺中緩火煑之經一宿通前滿兩日兩宿唯須緩火煎訖漉去香滓澄取清以綿濾揔訖内著瓷坩中勿令香氣洩出封閉使如法

沉香一斤 丁香 甲香各二兩 麝香

薰陸香 艾納各半小兩 白膠香 蘇合香各一兩

右八味並大斤兩令别擣如麻子大先錬白蜜去上沫盡即取沈香等於漆盤中和之使調匀若香乾取前件香澤和使

匀散内著瓷器中使實看瓶大小取香多少別以綿裹以塞瓶口緩急量之仍用青竹篾三條棧之即覆瓶口於前件所燒香澤瓶口上仍使兩口上下相合然後穿地埋著香澤瓶口共地平覆合香瓷瓶令露乃以濕紙纒瓶口相合處然後以麻擣泥瓶口邊厚三寸盛香瓶上亦令遍厚一寸以炭火繞瓶四邊緩炙使薄乾然後始用糠火馬糞火亦佳燒經三宿四日勿得斷火看之必使調匀不得有多少之處香汁即下不匀三宿四日燒訖即住火其香澤火傷多即焦令帶少生氣佳仍停經兩日使香餅冷訖然始開其上瓶揔除却更取別瓶内一分香於瓶中燒之一依前法若無別瓶還取舊瓶亦得其三分者香並燒訖未得即開仍經三日三夜停除火訖又經兩日其甲煎成訖澄清斟量取依色鑄瀉其沉香少即少著香澤只一遍燒上香瓶亦得好味五升銅鐺一

口銅鉢一口黃臘一大斤右件臘置於鐺中緩火煎之使沫銷盡然後傾鉢中停經少時使臘冷凝還取其臘依前銷之即擇紫草一大斤用長竹著挾取一握置於臘中煎取紫色然後擢出更著一握紫草以此爲度煎紫草盡一斤臘色即足若作紫口脂不加餘色若造肉色口脂著黃臘紫臘各少許若朱色口脂凡一兩臘色中和兩大豆許朱砂即得但鑄前件三色口脂法一兩色臘中著半合甲煎相和著頭點置竹上看堅柔得所瀉著竹筒中斟酌凝冷即解看之

又煎甲煎先須造香油方

零陵香 藿香各一兩並剉之以酒拌微濕用綿裹內烏麻生油二升緩火一宿絞去滓將油安三外瓶中搽地作坈埋瓶於中瓶口向地面平 沉香一斤 小甲香八兩

麝香三兩 蘇合香一兩

右六味並擣如大豆粒以蜜拌內一小角瓶中用竹篾封其口勿令香漏將此角倒埵土中瓶口內以紙泥泥兩瓶接口處不令土入用泥泥香瓶上厚六七分用糠火一石燒上瓶其火微微不得烈使糠盡煎乃成矣並出第九卷中

古今錄驗甲煎方

沉香　甲香各五兩　檀香一兩半　麝香一分

香附子　甘松香　蘇合香　白膠香各二兩

右八味擣碎以蜜和內小瓷瓶中令滿綿冪口以竹篾十字絡之又生麻油二升零陵香一分半藿香二分茅香二分右相和水一升漬香一宿著油內微火上煎之半日許滓成去滓別一瓷瓶中盛將小香瓶覆著口入下瓶口中以麻泥封并泥瓶厚五分埋土中口與地平泥上瓶訖以糠火微微半日許著瓶上放火燒之欲盡糠勿令絕三日三夜煎成停

二日許得冷取澤用之云停二十日轉好云燒不熟即不香須熟燒此方妙

又方

臘　蜜各十兩　紫草一兩半

右三味和臘煎令調紫草和朱砂併澤瀉筒中

蔡尼甲煎方

沉香六兩　丁香　䉵香四兩　楓香

青木香各二兩　麝香一具　大棗十枚　肉甲香三兩

右八味剉以蜜一合和拌著坩內綿裹竹篾絡之油六升零陵香四兩甘松香二兩綿裹著油中煎之緩火可四五沸即止去香草著坩中埋出口將小香坩合大坩濕紙纏口泥封可七分須多著火從旦至午即須緩火至四更即去火至明待冷發看成甲煎矣

造燕脂法一首

崔氏造燕脂法

準紫鉚一斤別擣 白皮八錢別擣碎 胡桐淚半兩 波斯白石蜜兩碟

右四味於銅鐵鐺器中著水八升急火煑水令魚眼沸內紫鉚又沸內白皮訖攪令調又沸內胡桐淚及石蜜總經十餘沸紫鉚並沈向下即熟以生絹濾之漸漸浸疊絮上好淨綿亦得其番餅小大隨情每浸訖以竹夾如乾脯獵於炭火上炙之燥復更浸浸經六七遍即成若得十遍以上益濃美好出第九卷中

造水銀霜法二首

千金翼飛水銀霜法

水銀一斤 朴消八兩 大醋半升 黃礬十兩

錫二十兩成鍊三遍者 玄精六兩 鹽花三斤

右七味先錬錫訖又温水銀令熱乃投錫中又擣玄精黃礬令細以絹下之又擣錫令碎以鹽花并玄精等合和以醋拌令濕以鹽花一斤藉底乃布藥令平以朴消蓋上訖以盆蓋合以鹽灰爲泥泥縫際乾之微火三日武火四日凡七日去火一日開之掃取極須勤心守勿使須臾間解慢則大失矣出

第五卷中

崔氏造水銀霜法

水銀　石硫黃　伏龍肝各十兩細研　鹽花一兩鹽末是也

右四味以水銀別鐺熬石硫黃碎如豆並別鐺熬之良久水銀當熱石硫黃消成水即併於一鐺中和之宜急傾併併不急即兩物不相入併訖下火急攪不得停手若停手即水銀別在一邊石硫黃如灰死亦別在一處攪之良久硫黃成灰不見水銀即與伏龍肝和攪令調并和鹽末攪之令相得別取鹽

末羅於鐺中令遍底厚一分許乃羅硫黃伏龍肝鹽末等於鐺中如覆蒸餅勿令全遍底羅訖乃更別羅鹽末覆之亦厚一分許即以盆覆鐺以灰鹽和土作泥塗其縫勿令乾裂裂即塗之唯令勿洩炭火氣飛之一復時開之用火先緩後急開訖以老雞羽掃取皆在盆上凡一轉後即分舊土爲四分以一分和成霜研之令調又加二兩鹽末准前法飛之訖弃其土又以餘一分土和飛之四分凡得四轉及初飛與五轉每一轉則弃其土五轉而土盡矣若須多轉更用新土依前法飛之七轉而可用之出第九卷中

鹿角桃花粉方二首

崔氏鹿角粉方

取角三四寸截之乃向炊竈底燒一遍去中心虛惡者幷除黒皮訖擣作末以絹篩下水和帛練四五重

置角末於中絞作團大小任意於炭火中熟燒即將出火令冷又擣碎作末還以水和更以帛練四五重絞作團如此四五遍燒擣碎皆用水和巳後更三遍用牛乳和燒擣一依前法更擣碎於瓷器中用玉鎚研作末將和桃花粉佳

又桃花粉方

光明砂　雄黃　熏黃並研末　真珠末

鷹糞　珊瑚　雲母粉　麝香用當門子

鹿角粉無問多少各等分

右九味研以細爲佳就中鹿角粉多少許無妨

薫衣濕香方五首

千金濕香方

沉香三分　零陵香　棧香　麝香各六分

薰陸香一分 丁子香二分 甲香半分以水洗熬 甘松香二分

檀香一分 藿香二分

右十味麤擣下篩蜜和爲丸燒之爲濕香薰衣出第六卷中

千金翼薰衣濕香方

薰陸香八兩 詹糖香五兩 覽探 藿香各三兩

甲香二兩 青桂皮五兩

右六味先取硬者黏濕難碎者各別擣或細切㕮咀使如黍粟然後一一薄布於盤上自餘別擣亦別於其上有頓篩下者以紗不得太細別煎蜜就盤上以手搜搦令匀然乃擣之燥濕必須調適不得過度太燥則難丸太濕則難燒易盡則香氣不發難盡則煙多煙多則唯有焦臭無後芬芳是故香須麤細燥濕合度蜜與香相稱火又須微使香與綠煙共盡出

第五卷中

備急六味薰衣香方

沉香一斤 麝香一兩 蘇合香一兩半 丁香二兩

甲香一兩酒洗蜜塗微炙 白膠香一兩

右藥擣沉香令碎如大豆粒丁香亦擣餘香訖蜜丸燒之若薰衣加艾納香半兩佳

又方

沉香九兩 白檀香一兩 麝香二兩並和擣 丁香一兩二銖

蘇合香一兩 甲香二兩酒洗準前 薰陸香一兩二銖和擣 甘松香一兩別擣

右八味蜜和用瓶盛埋地底二十日出丸以薰衣

又薰衣香方

沉水香一斤剉酒漬一宿 箋香五兩雞骨者 甲香二兩酒洗 蘇合香一兩如無亦得

麝香一兩 丁香一兩半 白檀香一兩別研

右七味擣如小豆大小相和以細羅羅麝香內中令調以蜜

器盛封三日用之七日更佳欲薰衣先於潤地陳令邑邑上籠頻燒三兩大佳火炷籠下安水一椀燒訖止衣於大箱中裛之經三兩宿然後上所經過處去後猶得半日以來香氣不歇

正觀年中勑賜此方

裛衣乾香方五首

千金乾香方

麝香 沉香 甘松香各二兩 丁香

籛香各一兩 藿香四兩

右六味合擣下篩用裛衣大佳出第六卷中

千金翼裛衣乾香方

沉香 苜蓿香各五兩 白檀香三兩 丁香

藿香 青木香一兩 甘松香各一兩 雞舌香一兩

零陵香十兩 艾納香二兩 雀頭香一兩 麝香半兩

右十二味各擣如黍粟麩糠勿令細末乃和相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著盛熱暑之時香速絕凡諸草香不須及時乃佳若欲少作者準此爲大率也出第五卷中

備急裛衣香方

藿香　零陵香　甘松香各一兩　丁香二兩

右四味細剉如米粒微擣以絹袋盛衣箱中南平公主方

又方

澤蘭香　甘松香　麝香各二兩　沉香

檀香各四兩　苜蓿香五兩　零陵香六兩　丁香十兩

右八味麤擣絹袋盛衣箱中貯之

又方

麝香研　蘇合香　鬱金香各一兩　沉香十兩

甲香四兩酒洗熬　丁香四兩　吴白膠香三兩　詹糖香六兩

右八味擣以絹袋盛裛衣中香妙

外臺祕要方卷第三十二

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙　子孟　校勘

外臺秘要方 三十三

婦人上

外臺祕要方卷第三十三 婦人上三十七門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

求子法及方二十二首

千金論曰夫婦人之别有方者以其血氣不調胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四歲已上陰氣浮溢百想經心内傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絶其中傷墮不可具論生熟二藏虛實交錯惡肉内漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或胎瘡未愈而合陰陽或行步風來便利於懸廁之上風從下入便成十二痼疾所以婦人别立方也若是四時節氣爲病虛實冷熱爲患者故與丈夫同也唯懷胎妊孕而挾病者避其毒藥耳其雜病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜欲多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妬憂恚深著堅牢情不自抑所以爲病根深療之難差故養生之家特須教子女學此三卷婦人方令其精曉即於倉卒之秋何

憂畐長也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務

若不通明於此則何以免其夭橫者哉故傅母之徒亦不可不

學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不意也

又論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐

物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰沒齒無益夫

婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫

能精曉臨事之日昬爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬

也斯實不達賢已之趣而妄徇虛聲以終無用今具述求子之

法以貽後嗣同志之士或可覽焉

又論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并

本命不在子休廢死墓中生者則求子必得若其本命五行相

剋及與刑煞衝破并在子休廢死墓中生者則求子了不可得

愼無措意縱或得者於後終亦累人若其相生并遇福德者仍

須依法如方避諸禁忌則所誕兒子盡善盡美難以具陳矣禁

忌法

凡欲要兒子生吉良者交會之日常避丙丁及弦望朔晦大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動日月薄蝕此時受胎非止百倍損於父母生子或瘖瘂聾聵頑愚癲狂攣跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月火光星辰之下神廟佛寺之中井竈圊厠之側塚墓屍柩之傍皆悉不可夫交會如法則有福德大智善人降託胎中仍令父母性行調順所作和合家道日隆祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中則令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之驗有如影響此乃必然之理何不再思之

男女受胎時日法

凡男女受胎皆以婦人經絶一日三日五日爲男仍遇月宿在貴宿日又以夜半後生氣時寫精者有子皆男必壽而賢明高爵也若以經絶後二日四日六日寫精者有子皆女過六日皆不成子又遇王相日尤吉

推王相日法

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

推貴宿日法

正月一日六日九日十日十一日十二日十四日二十一日二十四日二十九日

二月四日七日八日九日十日十二日十四日十九日二十二日二十七日

三月一日六日七日八日十日十七日二十日二十五日

四月三日四日五日六日八日十日十五日十八日二十二日二十八日

五月一日二日三日四日五日六日十二日十三日十五日
十六日二十日二十五日二十八日二十九日三十日
六月一日三日十日十三日十八日二十三日二十六日二十
七日二十八日二十九日
七月一日十一日十六日二十一日二十四日二十五日二十六
日二十七日二十九日
八月五日八日十三日十八日二十一日二十二日二十三日
二十四日二十五日二十六日
九月三日六日十一日十六日十九日二十日二十一日二十
二日二十四日
十月一日四日九日十四日十七日十八日十九日二十日二
十二日二十九日
十一月一日六日十一日十四日十五日十六日十七日十九

日二十六日二十九日

十二月四日九日十二日十三日十四日十五日十七日二十四日

二十七日

若春合甲寅乙卯　夏合丙午丁巳　秋合庚申辛酉

冬合壬子癸亥

與上件月宿日合者尤佳出第二卷中

千金翼論曰夫求子者服藥須有次第不得不知其次第謂男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得効矣不知此者得力鮮焉出第五卷中其七子散盪胞湯紫石門冬丸在次下千金并翼方中

廣濟療無子令子宮内炙丸方

麝香二分研　皂莢十分塗酥炙削去黑皮子　蜀椒六分汗

右三味擣篩蜜丸酸棗人大以綿裹内産宮中留少綿線出

覺憎寒不淨下多即抽綿線出却丸藥一日一度換之無問晝夜皆内無所忌

又方

蛇牀子　石鹽　細辛　乾薑

土瓜根各四兩

右五味擣散取如棗核大以綿裹内子宮中以指進之依準前法中間病未可必不得近丈夫餘無所忌並出第二卷中

又療婦人百病斷絶緒産白薇丸方

白薇　細辛　厚朴炙　椒汗

桔梗　鼈甲炙各五分　防風　大黄

附子炮　石硫黄各六分研　牡蒙二分　人參

桑上寄生各四分　半夏洗　白殭蚕　續斷

秦艽　紫菀　杜蘅　牛膝

䖟蟲去翅足熬　水蛭各三分　紫石英研　朴消

桂心　鍾乳　當歸各八分

右二十七味擣篩蜜丸空腹温酒服如梧桐子十五丸日二漸加至三十丸不吐不利忌生冷油膩餳生血物人莧生葱生菜猪肉冷水粘食陳臭出第二卷中

千金七子散療丈夫風虚目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　牡荆子　菟絲子　車前子

乾地黄　署預　石斛　杜仲

鹿茸炙　遠志去心　菥蓂子各八分　附子炮

蛇牀子　芎藭各六分　山茱萸　天雄炮

黄耆　人參　茯苓　牛膝各五分

桂心十分　巴戟天十二分　蓯蓉七分　鍾乳八分無亦得

右二十四味擣篩爲散酒服方寸匕日二服不知增至二匕

以知爲度忌生冷酢滑猪雞魚蒜油膩不能酒者蜜和丸服亦佳行房法一依素女經女人月信斷一日爲男二日爲女三日爲男四日爲女巳外無子仍每日午時前半夜後陽時爲男下精欲得去玉門入半寸不爾過子宮一方加覆盆子八分翼經心録并翼同忌蕪荑生葱

又朴消盪胞湯療婦人立身已來全不生及斷緒久不產三十年者方

朴消　牡丹　當歸　大黃

桃人（去皮炙生用各三兩）　細辛　厚朴（炙）　桔梗

芍藥　人參　茯苓　桂心

甘草（炙）　牛膝　橘皮（各二兩）　虻蟲（去翅足微熬）

水蛭（炙各六十枚）　附子（一兩半炮）

右十八味切以清酒五升水六升合煑取三升分四服日三夜

一每服相去三辰少時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮内有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥翼方無桔梗甘草並出第二卷中

千金翼坐導藥方

皂莢（一兩炙去皮子）　大黄　戎鹽　礬石（燒）

當歸（各二兩）　五味子　乾薑（各三兩）　細辛（三兩）

蜀椒（汗二兩）　葶藶子　苦瓠（各三分千金作山茱萸）

右十一味擣篩内輕絹袋子如中指許大長三寸盛之令滿内子門中坐任意勿行走急小便時即出之仍易新者一日

當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可

至十日安之千金無葶藶一方又有砒霜三分廣濟同著藥

後一日乃服紫石門冬丸其方如左

紫石英（七日研之） 天門冬（各三兩去心） 紫葳 甘草（炙）

桂心 牡荆子（千金作牡蒙） 烏頭（炮） 乾地黃

辛夷人 石斛 卷栢 禹餘糧

當歸 芎藭（各三兩） 烏賊魚骨 牛膝

署預（各六分） 桑寄生 人參 牡丹

乾薑 厚朴（炙） 續斷 食茱萸

細辛（各五分） 柏子人（一兩）

右二十六味擣篩蜜和酒服十丸如梧桐子日三稍加至三十丸慎如藥法經心錄同並出第五卷中

延年療婦人子藏偏僻冷結無子坐藥方

蛇牀子三兩　芫花三兩

右二味擣篩取棗大紗袋盛內產門中令没指袋少長作須去任意卧著愼風冷出第四卷中

久無子方五首

廣濟療久無子白薇丸方

白薇　牡蒙　藁本各五分　當歸

乾地黃各七分　芎藭　人參　柏子人

石斛　桂心　附子炮　五味子

防風　吴茱萸　甘草炙　牛膝

桑寄生各六分　薑黃七分　禹餘糧八分　秦椒二分汗

右二十味擣篩蜜丸如梧桐子空腹酒下二十丸加至三十丸日再服不利忌生葱生菜熱麪蕎麥猪肉葵菜蕪荑菘菜海藻粘食陳臭物等

又療久無子斷緒少腹冷疼氣不調地黃湯方

乾地黃　牛膝　當歸各八兩　芎藭

卷柏　防風各六分　桂心　牽牛子末各三分

右八味切以水六升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛子末服如人行四五里更進一服以快利止忌熱麪蕎麥炙肉生葱蕪荑蒜粘食等物出第三卷中

千金療月水不利閉塞絕産十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸方

白薇　細辛各五分　人參　杜蘅

厚朴炙　牡蒙　半夏洗　白殭蚕

秦艽　當歸　紫菀各三分　牛膝

沙參　乾薑各二分　蜀椒汗　附子炮

防風各六分　古今錄驗不用杜蘅用牡蠣三分熬

右十七味末之蜜和丸先食服如梧桐子三丸不知稍增至四五丸此藥不長將服覺有身則止用大驗忌餳猪羊肉冷水生葱生菜延年同崔氏有桔梗丹參各三分出第二卷中

千金翼白薇丸主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療之方

白薇　車前子各三分　當歸　芎藭

蛇牀子各四分　紫石英　菴藺子　石膏

藁本　卷柏各五分　澤蘭　太一禹餘糧

覆盆子　桃人熬　白芷　麥門冬去心

人參各六分　桂心　蒲黃各十分　細辛

乾薑　乾地黃　椒汗各十二分　茯苓

赤石脂　遠志去心　白龍骨各八分　橘皮二分

右二十八味擣篩爲末蜜和酒服十五丸如梧桐子日再增至四十丸以知爲度亦可至五十丸愼猪雞魚蒜生冷酢滑生葱

生菜蕪荑驢馬等肉覺有身則止藥祕之勿妄傳也出第五卷中

經心録茱萸丸療婦人隂寒十年無子方

吴茱萸一升　蜀椒一升去目汗末

右二味蜜丸如彈子丸綿裹導子腸中日再易無所下但開子藏令隂温即有子也出第六卷中

養胎法并禁忌一十三首

千金論曰舊說凡受胎三月逐物變化禀質未定故姙娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和性情節嗜慾庶事清靜生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

又論曰兒在胎日月未滿隂陽未備府藏骨節皆未成足故自初訖于將產飲食居處皆有禁忌

又姙娠食雞子及乾鯉魚令子多瘡
又姙娠食雞肉糯米令子多寸白蟲
又姙娠食雀肉幷豆醬令子滿面皯黯黑子
又姙娠食山羊肉令子多病
又姙娠食兎犬肉令子無音聲幷缺脣
又姙娠食驢馬肉延月
又姙娠食騾肉難產
又姙娠食椹幷鴨子令子倒出心寒
又姙娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥
又姙娠勿向非常之地大小便必半產殺人
又姙娠勿食羊肝令子多厄
又姙娠勿食鼈令兒短項
又姙娠食冰漿絶產並出第二卷中

姙娠隨月數服藥及將息法一十九首

千金姙娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥無食腥辛是謂才正

又姙娠一月足厥陰脉養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之血行否澀不爲力事寢必安靜無令恐畏

又姙娠一月陰陽新合爲胎寒多爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服烏雌雞湯方

烏雌雞一隻治如食法　茯苓二兩　吳茱萸一升

芍藥　白朮各三兩　麥門冬五合去心　人參三兩

阿膠二兩　甘草一兩炙　生薑一兩切

右十味切以水一斗二升煑雞取汁六升去雞下藥煑取三升內酒三升并膠烊盡取三升去滓溫服一升日三服

又若曾傷一月胎者當預服補胎湯方

細辛一兩　防風二兩　烏梅一升　吴茱萸五合

乾地黄　白朮各一兩　大麥五合　生薑四兩

右八味切以水七升煮取二升半去滓分温三服若寒多者倍細辛茱萸若熱多渴者去細辛茱萸加括樓根二兩若有所思去大麥加柏子人三合忌生菜蕪荑桃李雀肉等物一方人參一兩

又妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是謂胎始結

又妊娠二月足少陽脉養不可鍼灸其經足少陽内屬於膽膽主精二月之時兒精成於胞裏當愼護驚動

又妊娠二月始隂陽踞經有寒多壞不成有熱即萎卒中風寒有所動摇心滿臍下懸急腰背强痛卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

丹參三兩 當歸 人參 麻黃去節
艾葉 阿膠各二兩炙 甘草一兩炙 大棗十二枚擘
生薑六兩
右九味切以酒三升水一斗內藥煮減半去滓內膠煎取三升分溫三服忌海藻菘菜
又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方
黃連 人參各一兩 吳茱萸五合 生地黃五兩
生薑三兩
右五味切以醋漿七升煮取三升分四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌猪肉冷水蕪荑一方當歸半兩
又妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐

清虛是謂外象而內感者也

又妊娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀無思慮驚動

又妊娠三月爲定形有寒大便青有熱小便難不赤即黄卒驚恐憂愁瞋恚喜頓仆動於經脉腹滿繞臍苦痛腰背痛卒有所下雄雞湯方

雄雞一隻治如食法　甘草炙　人參　茯苓

阿膠各二兩　黄芩　白术各一兩　麥門冬去心五合

芍藥四兩　大棗十二枚擘　生薑一兩切

右十一味切以水一斗五升煮雞減半內藥煮取半內清酒三升并膠再煎取三升分三服一日盡之當溫卧忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等一方當歸芎藭二兩不用黄芩生薑

又若曾傷三月胎者當預服茯神湯方

茯神 丹參 龍骨各一兩 阿膠
當歸 甘草炙 人參各二兩 赤小豆二十一粒
大棗十二枚擘
右九味切酢漿一斗煑取三升分四服七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩忌海藻菘菜深師有薤白二兩麻子一升
又妊娠四月始受水精以成血脉其食稻粳其羹魚鴈是謂成血氣以通耳目而行經絡
又妊娠四月手少陽脉養不可鍼灸其經手少陽内輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食
又妊娠四月爲離經有寒心下温温欲嘔胷膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項强痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷煩不得安卒有所下菊花湯方

菊花如雞子大一枚　麥門冬一升去心　麻黃三兩去節　阿膠三兩炙
甘草二兩炙　當歸二兩　人參一兩半　生薑五兩
半夏二兩洗　大棗十二枚擘
右十味以水八升煑減半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服溫卧當汗以粉粉之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜餳等
又若曾傷四月胎者當預服調中湯方
芍藥四兩　甘草炙　芎藭　續斷各一兩
生李根白皮　柴胡　白朮各三兩　烏梅一升
當歸一兩半　生薑四兩　厚朴炙　枳實炙各二兩
右十二味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一八日復服一劑一方半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀肉等物
又姙娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其

衣裳朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和茱萸調以五味是謂養氣以定五藏

又姙娠五月足太陰脉養不可鍼灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢成無大肌無甚飽無食乾燥無自炙熱無大勞倦

又姙娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下阿膠湯方 又方旋覆花湯

阿膠四兩炙　人參一兩　麥門冬一升去心　生薑六兩

吴茱萸七合　旋覆花　當歸　芍藥

甘草炙　黃芩各二兩

右十味切以清酒三升以水九升煮減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三服夜一先食再服便愈不差更服忌海藻菘菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草炙 芍藥各三兩 當歸 人參

乾地黃 芎藭各二兩 五味子五合 麥門冬一升去心

大麻人五合 生薑六兩 大棗三十五枚擘 黃芩一兩

右十二味切以水七升清酒五升煑取三升半分四服日三夜一七日復服一劑忌菘菜海藻蕪荑

又姙娠六月始受金精以成筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬馬食宜鷙鳥猛獸之肉是謂變腠理紐筋以養其力以堅背膂

又姙娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無大飽

又姙娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼麥門冬湯方

麥門冬一升去心 甘草炙 人參各一兩 乾地黃三兩

黃芩二兩 阿膠四兩 生薑六兩 大棗十五枚擘

右八味切以水七升煑減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每服如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘菜蕪荑

又若曾傷六月胎當預服柴胡湯方

柴胡四兩 芍藥一兩一方作紫葳 白朮 甘草炙各二兩

麥門冬三兩去心 茯苓一兩 芎藭二兩 乾地黃五兩

生薑六兩 大棗三十枚擘

右十味切以水一斗煑取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食生冷及堅强之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等一方有黃芩二兩

又姙娠七月始受木精以成骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以密腠理是

謂養骨而堅齒

又姙娠七月手太陰脉養不可鍼灸其經手太陰內屬於肺肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

又姙娠七月忽驚恐摇動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項腰背強葱白湯方

葱白長三四寸十四枚　半夏洗　麥門冬去心各一升　生薑八兩

甘草炙　當歸　黃耆各三兩　阿膠四兩

人參一兩半　黃芩一兩　旋復花一把

右十一味切以水八升煑減半內清酒三升并膠煎取四升溫服一升日三夜一溫卧當汗出若不出者加麻黃二兩煑服如前法若秋後勿強責汗忌羊肉餳海藻菘菜等

又若曾傷七月胎者當預服杏人湯方

杏人（去雙人皮尖碎） 甘草（炙） 鍾乳（研各二兩） 麥門冬（去心）
吳茱萸（各一升） 乾薑（二兩） 五味子 粳米（各五合）
紫菀（一兩）

右九味切以水八升煑取三升半分四服日三夜一中間進食七日服一劑忌海藻菘菜

又姙娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理光澤顏色

又姙娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明内屬於大腸大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無忍大起

又姙娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷痛而目視茫茫芍藥湯方

芍藥（四分） 人參 當歸 甘草（各三兩炙）

白朮一兩　厚朴二兩炙　薤白一升切　生薑四兩切

右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻菘菜桃李雀肉等

又若曾傷八月胎者當預服葵子湯方

甘草三兩炙　芍藥二兩一方四兩　柴胡三兩　葵子二升

白朮三兩　生薑六兩　大棗二十枚擘　厚朴二兩

右八味切以水九升煮取三升分三服日三十日服一劑忌海藻菘菜桃李雀肉等

又妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮多才力

又妊娠九月足少陰脉養不可鍼灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處溫冷無著炙衣

又妊娠九月若卒下痢腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉側短

氣半夏湯方

半夏(洗) 麥門冬(去心各五合) 乾薑(一兩) 當歸

吴茱萸 阿膠(炙各三兩) 大棗(十二枚擘)

右七味切以水九升煑取三升去滓内白蜜八合微火上温分四服痢即止忌生血物餳

又若曾傷九月胎者當預服猪腎湯方

猪腎(一具) 茯苓 桑寄生 乾薑

乾地黄 芎藭(各三兩) 白朮(四兩) 麥門冬(一升去心)

附子(中者一枚炮) 大豆(三合)

右十味切以水一斗煑腎令熟去腎内諸藥煎取三升半分四服日三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等

又姙娠十月五藏俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生集驗延年同並出第二卷中

小品療姙娠五月日舉動驚愕動胎不安下在小腹痛引腰胳公洛切腋下也小便疼下血安胎當歸湯方

當歸　阿膠炙　芎藭　人參各一兩

大棗十二枚擘　艾一虎口

右六味切以酒水各三升合煮取三升去滓內膠令烊分三服腹中當小便緩差也古今錄驗救急同出第七卷中

姙娠嘔吐及惡食方九首

集驗療婦人姙娠惡阻嘔吐不下食湯方

青竹茹　橘皮各三兩　生薑　茯苓各四兩

半夏五兩湯洗十遍

右五味切以水六升煑取二升半分三服不差頻作忌羊肉餳酢物等千金經心錄同

又療姙娠嘔吐不下食橘皮湯方

橘皮　竹茹　人參　白朮各三兩

生薑四兩　厚朴炙二兩

右六味切以水七升煮取二升半分三服不差重作忌桃李雀肉等千金救急經心錄同出第十一卷中

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服柴胡湯方

甘草炙　柴胡各二兩　麻黃一兩去節煎去沫　大棗十二枚擘

食茱萸一升

右五味切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三療食噫醋除熱下氣多所宜與上同但春秋冬夏去茱萸加枸杞一斤六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾薑一兩十月加芎藭三分忌海藻菘菜

又療惡食人參湯方

人參四兩　厚朴炙　生薑　枳實炙

甘草炙各二兩

右五味切以水六升煑取三升分三服忌海藻菘菜並出

第三十四卷中

崔氏半夏茯苓湯療姙娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食氣頭眩重四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出疲極黃瘦方

半夏洗　生薑各五兩　旋復花一兩　橘皮二兩

茯苓三兩　細辛　芎藭　人參

桔梗　甘草炙各二兩　芍藥二兩　乾地黃三兩

右十二味切以水一斗煑取三升分三服忌猪羊肉餳菘菜海藻生菜蕪荑

千金云若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者除橘皮細辛用前胡知母各二兩若變冷下痢者除乾地黃用桂心二兩若食少胃中虚生熱大便閟塞小便赤

少者加大黃三兩除地黃加黃芩一兩餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱更增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便強健也

又茯苓丸療妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂重不自勝持服之即効要先服半夏茯苓湯兩劑後可將服茯苓丸方

茯苓 人參各一兩 桂心熬 橘皮

白朮 甘草炙 葛根熬 乾薑

半夏洗 枳實炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧桐子大飲服二十丸漸至三十丸日三千金同忌海藻菘菜羊肉餳桃李雀肉酢等肘後只五味又云妊娠忌桂後熬

又療妊娠常苦煩悶此子煩也竹瀝湯方

竹瀝三兩 防風 黃芩 麥門冬去心三兩

茯苓四兩

右五味切以水四升合竹瀝煑取二升半分三服不差重作忌酢物

又方 時時服竹瀝隨多少出第十卷中

近効療妊娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐方

青竹茹 麥門冬去心各三兩 前胡二兩

陳橘皮一兩炙令黃焦香氣出佳 蘆根一握取肥白嫩者

右五味切以水二大升煑取半大升去滓分再服食後一服無麥門冬用小麥三合煑之勿令裂即熱四肢煩熱者加地骨皮 醫人夏侯拯錄

妊娠胎動方九首

廣濟主安胎胎病漏肚痛方

當歸 芎藭 阿膠炙 人參各一兩

大棗十二枚擘

右五味切以水三升酒四升合煮取二升半分三服五日一劑頻服三四劑無所忌出第三卷中

小品療姙娠重下痛引腰背安胎止痛湯方

當歸 膠炙 乾地黃 黃連

芍藥各一兩 雞子一枚 秫米一升

右七味切以水七升攪雞子令相得煮秫米令如蟹目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑經心錄同

又膠艾湯療損動毋去血腹痛方

膠一斤炙 艾葉一筥

右二味以水五升煮取二升半分三服出第七卷中經心錄同

集驗療姙娠胎動不安腹痛葱白湯方

葱白切一升 阿膠炙 當歸 續斷

芎藭各三兩　銀隨多少

右六味切以水一斗先煮銀取七升去銀內餘藥煎取二升半內膠令烊分三服不差更作千金同

又療姙娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉　阿膠炙　芎藭　當歸各三兩

甘草一兩炙

右五味切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三服日三千金文仲備急同

又療姙娠六七月胎不安常處旋復花湯方

旋復花一兩　厚朴炙　白朮　枳實炙

黃芩　茯苓各三兩　半夏洗十　芍藥

生薑各二兩

右九味切以水一升煮取二升半先食分五服日三夜二忌羊

肉餳醋桃李雀肉等千金同出第十一卷中

删繁療女人懷姙胎動不安葱豉安胎湯方

香豉一升熬　葱白一升切　阿膠二兩炙

右三味切以水三升煑二物取一升去滓下阿膠更煎膠烊服一日一夕可服三四劑出第七卷中經心錄同

文仲徐王効神驗胎動方

當歸六分　芎藭四分

右二味切以水四升酒三升半煑取三升分三服若胎死即出比用神驗血上心腹滿者如湯沃雪救急經心錄同崔氏用米醋二升煎二十沸服

又安胎寄生湯療流下方

桑上寄生五分　白术五分　茯苓四分　甘草十分炙

右四味切以水五升煑取二升半分三服若人壯者可加芍

藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾薑四分即安忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等崔氏小品經心同出第七卷中

動胎腰腹痛方三首

廣濟療婦人妊娠動胎腰腹痛及血下方

當歸三兩 葱白一升切 芎藭三兩 艾葉二兩

鹿角膠二兩炙 苧根三兩

右六味切以銀汁一斗煮取三升絞取滓內膠上火膠烊分三服服別相去如人行六七里未好差停一日更進一劑無所忌出第三卷中

小品苧根湯療勞損動胎腹痛去血胎動向下方

苧根 乾地黃各二兩 當歸 芍藥

阿膠炙 甘草各一兩炙

右六味切以水六升煮取二升去滓内膠烊分三服忌海藻菘菜蕪荑出第七卷中

救急療姙娠動胎去血腰腹痛方

芎藭　阿膠炙　當歸　青竹茹各三兩

右四味切以水一斗半煮銀二斤取六升去銀内藥煎取二升半分三服日再夜一不差更作一劑集驗千金文仲古今録驗備急經心録同出第四卷中

集驗療姙娠二三月上至七八月頓仆失踞胎動不安傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣膠艾湯方

頓仆胎動方四首

當歸　芎藭　甘草炙　阿膠炙

芍藥各二兩　艾葉三兩　乾地黄四兩

右七味切以水五升好酒三升合煮取三升去滓内膠更上

火令膠烊分三服日三不差更作忌海藻菘菜蕪荑文仲同出第十一卷中

文仲葛氏若由頓仆及舉重致胎動去血者方

擣黃連下篩酒服方寸匕日三愈血乃止忌豬肉冷水等物

又方

赤小豆二升熬令香著雞子十四枚破內小豆中更熬令黃黑末和酒服一匕日三服

又方

膠三兩炙　當歸二兩　甘草一兩炙

右三味切以水五升煮取二升分再服忌菘菜海藻並第七卷中

胎數傷及不長方三首

廣濟療婦人懷姙數傷胎方

鯉魚二斤 粳米一升

右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良一月中頓三過作効安穩無忌集驗文仲備急崔氏延年同出第三卷中

集驗療婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者水漬沒內鹽如棗煮令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當汗如阜狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安出第十一卷中

古今録驗療妊娠養胎白朮散方

白朮 芎藭各四分 蜀椒三分汗 牡蠣二分

右四味擣下篩酒服滿一錢匕日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭吐唾不能食飲加細辛一兩半夏大錢二十枚服之復更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之已後其人若渴大麥粥服之病雖愈盡服

之勿置裴伏張仲景方忌桃李雀肉等出第十一卷中

姙娠傷寒方四首

廣濟療姙娠傷寒頭痛壯熱支節煩疼方

前胡各三兩 知母各三兩 石膏五兩 大青

黄芩 梔子各一兩 葱白切一升

右七味切以水七升煑取二升三合絞去滓分三服服別相去如人行七八里再服不利忌熱麪羊肉集驗文仲備急救急同出第三卷中

千金療姙娠傷寒方

葱白十莖 生薑二兩切

右二味以水三升煑取二升半頓服取汗

又方

鯽魚一頭燒作灰擣大酒服方寸匕取汗出並第二卷中

救急療婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變爲黒斑溺血氣方

升麻　梔子人各四兩　大青　杏人去皮尖

黄芩各三分　葱白切一升

右六味切以水六升煮取半分三服出第四卷中

姙娠患瘧方二首

集驗療姙娠患瘧湯方

常山二兩　甘草一兩炙　黄芩三兩　烏梅十四枚碎

石膏八兩

右五味切以水一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服忌海藻菘菜生葱千金救急古今録驗同

千金姙娠患瘧方

常山　竹葉各三兩　石膏八兩碎　糯米一百粒

右四味切以水六升煑取二升半去滓分三服第一服未發前一食久服之第二服取臨欲發餘一服用塗頭額及胷前五心藥滓置頭邊當一日勿進水及進飲食過發後乃進飲粥忌生葱菜集驗文仲備急同出第二卷中

妊娠下痢方四首

千金療妊娠下痢方

白楊皮一斤以水一大升煑取二小升分三服

又妊娠及產已寒熱下痢方

黃連一升　梔子二十枚擘　黃蘗一斤

右三味切以水五升漬一宿煑三沸服一升一日一夜令盡嘔者加橘皮一把生薑二兩翼同並出第二卷中

文仲療妊娠下痢不止方

黃蘗　乾薑　赤石脂各二兩　石榴皮一具

右四味切以水八升煮取二升分三服出第七卷中

古今録驗療姙娠下痢方

酸石榴皮　黄芩　人參各三兩　櫸皮四兩

粳米三合

右五味切以水七升煮取二升半分三服千金經心録同

出第三十四卷中

姙娠心痛方九首

千金療姙娠心痛方

青竹茹一升　羊脂八兩　白蜜三兩

右三味合煎食前頓服如棗核大三枚日三服

又方

蜜一升和井底泥泥心

又方

青竹皮一升酒二升煮三沸頓服之

又方

破雞子一枚和酒服之

又方　麻子三升水八升煑取五升分五服

又方

橘皮三兩　豉二兩

右二味擣爲丸如梧桐子服二七丸

又方

燒牛屎焦末水服方寸匕日三並出第二卷中

文仲葛氏療姙娠卒胎上迫心痛方

取弩弦急帶之立愈出第七卷中

古今録驗療姙娠卒得心痛欲死朮湯方

白朮六兩　黄芩三兩　芍藥四兩

右三味切以水六升煑取二升半分三服半日令盡微下水令易生忌桃李雀肉出第三十四卷中

姙娠腹痛方三首

千金療姙娠腹中痛方

生地黃三斤擣絞取汁酒一升合煎減半頓服

又方

燒車釭脂末內酒中服又服一升蜜良並出第二卷中

古今錄驗療姙娠腹痛或是冷痛或是胎動葱白當歸湯方

葱白一虎口 當歸三兩

右二味切以水酒共五升煮取二升分再服亦將小便服相去一炊頃出第二十四卷中

姙娠漏胞方五首

小品療姙娠數月日猶經水時時來者名曰漏胞若因房室勞有所去名曰傷胎視說要知如此小豆散療數傷胎將用之方

赤小豆五升濕地種之令生牙乾之

右一物下篩懷身數月日經水尚來以溫酒服方寸匕日三得

效便傳千金救急經心録同出第七卷中

集驗姙娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

雞子十四枚取黄以好酒二升煑使如餳一服之

又方

生地黄汁一升酒四合合煑三四沸頓服之不止頻服救急千金文仲備急古今録驗經心録同並出第十一卷中

崔氏療姙娠漏胞方

乾地黄四兩　乾薑二兩

右二味擣篩酒服方寸匕日再服集驗文仲經心録同

又方

乾地黄擣末以三指撮酒服之不過三服甚良千金同並出第十卷中

妊娠下血及尿血方五首

千金療妊娠卒下血方

葵子一升

右一味以水五升煑取二升分三服差

又方

生艾葉一斤

右一味以酒五升煑取二升分三服冬用莖

又方

生地黄切一升

右一味以酒四升煑取二升分三服亦療落身後血

又方

燒秤錘令赤內酒中沸定取出飲之

又方

葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三並出第二卷中

文仲療姙娠下血方

取黍膏燒末服一匕日三出第七卷中千金云黍莖

古今録驗療姙娠下血豆醬散方

一豆醬二升漉去汁熬令燥末酒服方寸匕日五六

服出第三十四卷中

姙娠小便不通利方五首

千金療姙娠小便不通方

蕪青子七合擣爲末水和方寸匕服日三出第二卷中

千金翼療姙娠小便不利方

葵子一升　榆白皮一把

右二味以水五升煮五沸服一升日三服千金同

又方

葵子　茯苓各一兩

右二味爲散水服方寸匕日三小便利止千金同並出第五卷中

古今錄驗療姙娠卒不得小便方

杏人（二十枚去皮尖熬令變色）

右一味擣服如大豆大七枚立得利

又療姙娠不得小便方

滑石水和泥臍二寸並出第三十四卷中

姙娠子淋方五首

小品療姙娠患子淋宜下地膚大黃湯

地膚草　大黃（各三兩）　知母　黃芩

茯苓（一作猪苓）　芍藥　枳實（炙）　升麻

通草　甘草（炙各二兩）

右十味切以水八升煮取三升分三服得下後淋不好差還飲

地膚葵根汁忌海藻菘菜酢物

又方

猪苓五兩

右一味擣篩以白湯三合和方寸匕為一服漸至二匕日三夜二盡不差宜轉下之服甘遂散出第七卷中甘遂散在後大小便不利中

千金療姙娠患子淋方

葵子一升以水三升煑取二升分再服經心録同

又方

葵根一把水三升煑取二升分再服出第二卷中

經心録療姙娠患子淋小便數出少或熱痛酸疼及足煩地膚飲方

地膚草三兩以水四升煑取二升半分三服日三日一劑文仲小品同出第六卷中

姙娠大小便不利方五首

小品療姙娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服甘遂散下之方

太山赤皮甘遂二兩

右一味擣篩以白蜜二合和服如大豆粒多覺心下煩得微下者日一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半錢匕以微下為度中間將猪苓散黃蘗寄生湯在療子淋方中經心録同出第七卷中子淋方中唯有猪苓散無黃蘗寄生湯

古今録驗療姙娠得病六七日以上身熱入藏大小便不利安胎除熱葵子湯方

葵子二升　滑石四兩碎

右二味以水五升煮取一升盡服須臾當下便愈出第二十四卷中

姙娠子癇方二首

小品療妊娠忽悶眼不識人須臾醒醒復發亦仍不醒者名爲痓病亦號子癇病亦號子冒葛根湯若有竹近可速辦者當先作瀝汁辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯此二療會得其一種其竹瀝偏療諸痓絕起死也非但偏療妊娠產婦絕死者有効小兒忽癇痓金瘡療之亦驗作竹瀝法

取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片以塼並側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出以器承之取服

又主痓冒葛根湯療妊娠臨月因發風痓忽悶憒不識人吐逆眩倒小醒復發名爲子癇病方

貝母 葛根 牡丹去心 木防巳

防風 當歸 芎藭 桂肉切熬

茯苓 澤瀉 甘草炙各二兩 獨活

石膏碎 人參各三兩

右十四味切以水九升煮取三升分二服貝毋令人易産若未臨月者升麻代之忌海藻菘菜酢物並出第七卷中

姙娠水氣方三首

集驗療婦人姙娠手脚皆水腫攣急方

赤豆五升 商陸根一斤切 一方加澤漆一斤

右三味以水三斗煮取一斗常稍稍飲之盡更作千金同出第十一卷中

千金療姙娠腹大胎間有水氣生魚湯方

生鯉魚二斤 生薑五兩 白朮三兩 芍藥

當歸各三兩 茯苓四兩

右六味切以水一斗二升煮魚熟澄清取八升内藥取三升分三服忌桃李雀肉酢物等集驗同出第二卷中

崔氏療姙娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓 白朮各四兩 旋復花二兩 杏人去皮尖

黃芩各三兩

右五味切以水七升煮取二升半分二服服別溫飲之忌桃李雀肉酢物等千金救急古今錄驗集驗同出第十卷中

損娠方六首

廣濟療婦人因損娠下血不止方

當歸 白龍骨 乾地黃各八分 地榆

阿膠 芍藥 乾薑各六分 熟艾四分

牛角鰓十八分炙令黃 蒲黃五分

右十味擣篩爲散空腹以飲服方寸匕日二服漸加至二匕差止不吐利忌生冷油膩猪魚蒜蕪荑出第三卷中

千金落娠胎墮下血不止方

丹參十二兩

右一味切以酒五升煑取三升分三服集驗文仲備急同出第二卷中

又方

地黄汁和代赭末服方寸匕

又方

桑蝎蟲屎燒酒服方寸匕並出第四卷中

救急療損娠方

取朱砂末一錢匕生雞子三顆打取白和朱砂頓服胎若死即出如未死即安出第五卷中

古今録驗療婦人墮娠血不盡來去喜煩滿鹿角屑豉湯方

鹿角屑熬一兩　香豉一升半

右二味以水三升煑令三沸漉去滓然後內鹿角屑攪令

調頓服須臾血下出第三十七卷中

數墮胎方四首

刪繁療婦人懷胎數落而不結實或寒冷熱百病之源黄耆散方

黄耆　吴茱萸　乾薑　人參

甘草炙　芎藭　白术　當歸

乾地黄各二兩

右九味擣散清酒服一匕半日再服加至兩匕爲劑忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等經心録同出第七卷中

千金療妊娠數墮胎方

妊娠三月灸膝下一寸七壯

又方

赤小豆末酒服方寸匕日二亦主妊娠數月月水上

來者並出第三卷中

經心録紫石門冬丸主風冷在子宮有子常落或始爲婦便患心痛乃成心疾月水都未曾來服之肥悦令人有子方

紫石英　天門冬去心　五味子三兩　禹餘粮

蜀椒汗　烏頭炮　卷柏　烏賊骨

寄生　石南　當歸各一兩　杜仲

澤瀉　遠志去心　蓯蓉　桂心

甘草炙　石斛　柏子人　辛夷

人參各二兩　雲母一兩燒

右二十二味末之以蜜丸酒服二十丸如梧桐子稍加至三十四十丸日三忌海藻菘菜猪肉冷水生葱鯉魚千金同出第六卷中

姙娠得病欲去子方三首

小品療姙娠得病事須去胎方

又方

麥蘖一升末和煑二升服之即下神効

又方

七月七日法麴三升煑兩沸宿不食旦頓服即下並出第二卷中

文仲療姙娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽置雞子中服之立出此與阮河南療産難同出第七卷中 肘後千金經心録同

落胎去胎方四首

廣濟療落胎方

栝樓四兩　桂心五兩　牛膝三兩　瞿麥二兩

右四味切以水七升煎取二升三合去滓分三服服別如人行八九里進之無忌

又方

取牛膝六七莖綿纏搥頭令碎深內至子宮頭忌生葱
豬牛肉並出第三卷中

小品療羸人欲去胎方

甘草炙 乾薑 人參 芎藭

生薑 桂心 蟹爪 黃芩各一兩

右八味切以水七升煑取二升分三服忌海藻菘菜生葱

出第七卷中

千金欲去胎方

大麴五升清酒一升煑三沸去滓令盡分五服當宿
勿食旦再服其子如糜令母肥盛無疾若千金不傳

出第三卷中

産乳序論三首

崔氏夫人生壽夭雖有定分中間枉橫豈能全免若調攝會理

或可致長生若將護乖方乃胎乳傷促且中人之性識異弘遠
言及產育情多鄙之都未知此道幽深博施處廣僕褰帷之
暇頗敦經史逮乎藥術彌復關懷今歷選群方兼申短思苟
非切要詎能載錄脫述職孤戍空莊四絕尋醫訪道理闕多疑
豈得坐而相守以俟其斃此書所記故緣於此蓋擬備諸私室
未敢貽厥將來必有以爲要亦所不隱也余因披閱鑾公調氣
方中見鑾公北平陽道慶者其一妹二女並皆產死有兒婦臨
月情用憂慮入山尋余請覓滑胎方余報言少來多遊山林未
經料理此事然當爲思量或應可解慶停一宿余輒憶想畜生
之類緣何不聞有產死者婬女偷生賤婢獨產亦未聞有產死者
此當由無人逼佐得盡其分理耳其產死者多是富貴家聚居
女婦輩當由兒始轉時覺痛便相告報傍人擾擾令其驚怖驚
怖畜結生理不和和氣一亂痛切唯甚傍人見其痛甚便謂至

時或有約髻者或有力腹者或有冷水潠面者努力強推兒便暴出畜聚之氣一時奔下不止便致運絶更非佗縁至旦以此意語慶慶領受無所聞然猶苦見邀向家乃更與相隨停其家十餘日日晡時見報去兒婦腹痛似是產候余便教屏除牀案遍一房地布草三四處懸繩繫木作桁度高下令得蹲當腋得憑當桁下敷慢氈恐兒落草悞傷之如此布置訖令產者入位語之坐卧任意爲其說方法各有分理順之則全逆之則死安心氣勿怖強此產亦解人語語訖閉户户外安牀余共慶坐不令一人得入時時隔户問之何似荅言小痛可忍至一更令爛煑自死牝雞取汁作粳米粥粥熟急手攪使渾渾適寒温勸令食三升許至五更將末便自產聞兒啼聲始聽人入產者自若安穩不異去小小痛來便放體長吐氣痛即止盖任分和氣之効也慶問何故須食雞肉汁粥荅去牝雞性滑而濡庶使氣滑故耳

問何不與肉荅云氣將下恐肉不卒消爲妨問何故與粥荅云若飢則氣上氣下則速産理不欲令氣上故耳慶以此爲産術之妙所傳之處無不安也故知巒公隱思妙符神理然則日遊反支之類復何豫哉但以婦人怯弱臨産驚遽若不導以諸法多恐志氣不安所以檢諸家方法備題如左其間取捨各任量裁凡婦人有難必須先檢此書推所投月日知犯忌各須豫慎不得犯之其應次須帳幕皮醋藏衣等物之類並早經營入月即須使足若不豫備臨急周遮事必致闕唯舊經事者始達此言豫備不虞古之善教也

又凡産者雖是穢惡然將痛之時及未産已産皆不得令死喪汚穢家人來視之必産難若已産者則傷子

又凡産法唯須熟忍不得逼迫要須兒痛欲出然後抱腰傍人不得驚擾浪作形勢但此事巒公法中已經商略無用師

巫妄述已能橫相牽挽失其本性令故重述特宜防也

崔氏年立成圖法一首

女人年十三行年在庚申反支在正月七月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在辰戌日閑肚在辛八肚在甲

女人年十四行年在巳未反支在八月二月禍害在西南坤絕命在西南兊生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產產婦著赤衣卧南首懸尸在卯酉日閑肚在壬八肚在癸

女人年十五行年在戊午反支在三月九月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在寅申日閑肚在癸八肚在壬

女人年十六行年在丁巳反支在四月十月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產婦宜著青衣卧東首懸尸在丑未日閑肚在申八肚在辛

女人年十七行年在丙辰反支在五月十一月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在子午日閑肚在乙八肚在庚

女人年十八行年在乙卯反支在六月十二月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方黑衣師看

產產婦宜著黑衣卧西北首懸尸在巳亥日閉肚在丙八壯在丁

女人年十九行年在甲寅反支在正月七月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產產婦宜著白衣卧西首懸尸在辰戌日閉肚在丁八壯在丙

女人年二十行年在癸丑反支在二月八月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在卯酉日閉肚在庚八壯在乙

女人年二十一行年在壬子反支在三月九月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在寅申日閉肚在辛八壯在甲

女人年二十二行年在辛亥反支在四月十月禍害在西南坤絕命在西方兌生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產產婦宜著赤衣卧南首懸尸在丑未日閉肚在壬八壯在癸

女人年二十三行年在庚戌反支在五月十一月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看產產婦宜著黑衣卧北首懸尸在子午日閉肚在癸八壯在壬

女人年二十四行年在巳酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產產婦宜著青衣卧東首懸尸在巳亥日閉肚在甲八壯在辛

女人年二十五行年在戊甲反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北黃衣師看産産婦著黃衣卧東北首懸尸在辰戊日開肚在乙八壯在庚

女人年二十六行年在丁未反支在二月八月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方白衣師看産産婦宜著白衣卧西北首懸尸在卯酉日開肚在丙八壯在丁

女人年二十七行年在丙午反支在三月九月禍害在東南巽絕命在南方离生氣在西方兑宜喚西方白衣師看産産婦宜著白衣卧西首懸尸在寅甲日開肚在丁八壯在丙

女人年二十八行年在乙巳反支在四月十月禍害在西方兑絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南青衣師看産産婦宜著青衣卧東南首懸尸在丑未日開肚在庚八壯在乙

女人年二十九行年在甲辰反支在五月十一月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南黃衣師看産産婦宜著黃衣卧西南首懸尸在子午日開肚在辛八壯在甲

女人年三十行年在癸卯反支在六月十二月禍害在西南坤絕命在西方兑生氣在南方离宜喚南方赤衣師看産産婦宜著赤衣卧南首懸尸在巳亥日開肚在壬八壯在癸

女人年三十一行年在壬寅反支在正月七月禍害在西北乾絕命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看産産婦宜著黑

衣卧北首懸尸在辰戌日開肚在癸八壯在壬

女人年三十二行年在辛丑反支在二月八月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產

產婦宜著青衣卧東首懸尸在卯酉日開肚在甲八壯在辛

女人年三十三行年在庚子反支在三月九月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產

產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在寅申日開肚在乙八壯在庚

女人年三十四行年在乙亥反支在四月十月禍害在北方坎絕命在東方震生氣在西北乾宜喚西北白衣師看產

婦宜著白衣卧西北首懸尸在丑未日日肚開在丙八壯在丁

女人年三十五行年在戊戌反支在五月十一月禍害在東南巽絕命在南方離生氣在西方兌宜喚西方白衣師看產

產婦宜著白衣卧西首懸尸在子午日開肚在丁八壯在丙

女人年三十六行年在丁酉反支在六月十二月禍害在西方兌絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看

產產婦宜著青衣卧東南首懸尸在巳亥日開肚在庚八壯在乙

女人年三十七行年在丙申反支在正月七月禍害在南方離絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產

產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在辰戌日開肚在辛八壯在甲

女人年三十八行年在乙未反支在二月八月禍害在西南坤絶命在西方兌生氣右南方离宜喚南方赤衣師看産産

婦宜著赤衣卧南首懸尸在卯酉日開肚在壬八壯在癸

女人年三十九行年在甲午反支在三月九月禍害在西北乾絶命在東北艮生氣在北方坎宜喚北方黑衣師看産産

婦宜著黑衣卧北首懸尸在寅申日開肚在癸八壯在壬

女人年四十行年在癸巳反支在四月十月禍害在東北艮絶命在西北乾生氣右東方震宜喚東方青衣師看産産

婦宜著青衣臥東首懸尸在丑未日開肚在甲八壯在辛

女人年四十一行年在壬辰反支在五月十一月禍害在東北艮絶命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看産

産婦宜著青衣臥東首懸尸在子午日開肚在乙八壯在庚

女人年四十二行年在辛卯反支在六月十二月禍害在東方震絶命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北黃衣師看産

産婦宜著黃衣卧東北首懸尸在巳亥日開肚在丙八壯在丁

女人年四十三行年在庚寅反支在正月七月禍害在北方坎絶命在東方震生氣在西北乾宜喚西北方白衣師看産

産婦宜著白衣卧西北首懸尸在辰戌日開肚在丁八壯在丙

女人年四十四行年在己丑反支在二月八月禍害在東南巽絶命在南方离生氣在西方兌宜喚西方白衣師看産産

婦宜著白衣卧西首懸尸在夘酉日開肚在庚八壯在乙

女人年四十五行年在戊子反支在三月九月禍害在西方兑絕命在西南坤生氣在東南巽宜喚東南方青衣師看產

產婦宜著青衣卧東南首懸尸在寅申日開肚在辛八壯在甲

女人年四十六行年在丁亥反支在四月十月禍害在南方离絕命在東南巽生氣在西南坤宜喚西南方黃衣師看產

產婦宜著黃衣卧西南首懸尸在丑未日開肚在壬八壯在癸

女人年四十七行年在丙戌反支在五月十一月禍害在西南坤絕命在西方兑生氣在南方离宜喚南方赤衣師看產

產婦宜著赤衣卧南首懸尸在子午日開肚在癸八壯在壬

女人年四十八行年在乙酉反支在六月十二月禍害在東北艮絕命在西北乾生氣在東方震宜喚東方青衣師看產

產婦宜著青衣卧東首懸尸在巳亥日開壯在甲八壯在辛

女人年四十九行年在甲申反支在正月七月禍害在東方震絕命在北方坎生氣在東北艮宜喚東北方黃衣師看產

產婦宜著黃衣卧東北首懸尸在辰戌日開壯在乙八壯在庚

凡禍害絕命上產婦不可向之大小便又不得向產犯者凶產後血不止

凡生氣之上宜産婦向之坐令兒長壽母子俱吉

凡閉肚之上臨月及已産未滿月皆不得向其處大小便及棄不淨水犯者令人閉塞難産失顔色腹痛面痿黃令臍絞痛咽喉不利凶

凡八壯之地産婦廬帳門不得向之開又不得於其處産令閉塞難産大凶

凡運鬼力士犯者令産婦運悶至欲産日宜解袋口即易産吉


凡反支月不得使血露汚地或令子死腹中或産不順皆須先布灰草然後敷馬驢牛皮於其上産吉

凡懸尸之日不可攀繩宜懸馬轡攀之吉


凡行年本命相俱坐攀轡吉


十二月立成法一首 并圖


正月三月五月七月九月十一月福德在丙壬
二月四月六月八月十月十二月福德在甲庚
夫人臨產必須避諸凶神逐月空福德之地若神在外於舍
內產若在內於舍外產令於　福德及空地爲產帳其舍內
福德處亦依帳法




正月空在丙壬
北
東
南
西
亥
壬地藏衣吉
子
癸
丑
艮運鬼力士
寅雷公招摇
甲
卯軒轅大時
乙
辰咸池豐隆吴時天狗
巽
巳
丙
午狂虎
丁
未
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾


南
二月空
在甲庚
東
西
北
坤 天德兼水吉
未 吉時豐隆
丁
午
丙
巳 天候天狗
巽
辰
乙
卯 招搖
甲 一云安產帳
寅
艮
丑 咸池
癸
子 軒轅大時
壬
亥 雷公月白虎
乾 運鬼力士
戌 天夫
辛
酉 狂虎
庚 安產婦帳吉
申



三月空
在丙壬
東
北
乾
亥大夫
壬安産婦帳
子月白虎狂虎
癸
丑
艮
寅天候
甲
卯
乙
辰招搖



南
四月空
在甲庚
西
東
北
坤
未
丁
午
丙
巳
巽
辰
乙
卯
甲
寅
艮
丑
癸
子
壬
亥
乾
戌
辛
酉
庚
申
亥天候
子大夫
丑豐隆吳時月白虎
午軒轅大將
未咸池天狗
巳招搖雷公
酉狂虎
辛天德吉



南
西
北
東
五月空
在丙子
坤
申天侯天狗
庚
酉
辛
戌
乾天德可藏衣
亥
壬地安產婦帳
子狂虎
癸
丑大夫
艮運鬼力士
寅雷公月白虎
甲
卯軒轅大時
乙
辰咸池吳時豐隆
巽
巳
丙地藏衣
午招搖
丁
未


六月空
在甲庚
北
東
南
西
亥雷公
壬
子軒轅大時
癸
丑咸池
艮
寅大夫
甲天德地安產婦帳
卯白虎任虎
乙
辰
巽
巳天侯
丙
午
丁
未招搖豐隆吳時
坤
申
庚
酉
辛
戌

七月空在丙壬

南

東

北

西

巳天候

丙安產婦帳一云藏衣吉

午

丁

未招搖

坤一云運鬼力士

申一云招搖雷公

庚

酉大癸一云軒轅大時

辛

戌一云咸池吴時豐隆

乾

亥雷公

壬藏衣吉一云安產婦帳

子軒轅大時一云狂虎

癸

丑豐隆吴時

艮運鬼力士

寅大夫一云天狗


甲


卯月白虎一云大夫


乙


辰一云月白虎


巽


八月空
在甲庚
南
東
北
壬
子
癸
亥天狗天候
丑豐隆吳時
寅
甲安產婦帳
卯
乙
辰
丙
丁


九月空
在丙壬
北
東
南
西
亥
壬地藏衣吉
子天狗
癸
丑
艮運鬼力士
寅雷公
甲
卯軒轅大時
乙
辰咸池豐隆吳時
巽
巳天夫
丙地安產婦帳
午月白虎狂虎
丁
未
坤
申天怪
庚
酉
辛
戌招搖
乾


十月空
在甲寅
北
東
亥招搖雷公
壬
子軒轅大時
癸
丑咸池天狗
寅
甲
卯狂虎
乙天德
辰



十二月空
在丙壬
南
東
北
西
子招摇
壬藏衣吉
寅天猴天狗
亥
癸
丑
甲
卯
乙
辰
巳
丙
午
丁
未
申
庚
酉
辛


十二月空
在甲庚
南
北
東
西
亥
壬
子
癸
丑招搖吳時豐隆
艮
寅
甲地安產婦帳
卯天狗
乙
辰

大時招搖咸池吴時雷公豐隆軒轅月白虎大夫狂虎天侯
天狗運鬼力士等十三神月別具注如圖産婦犯之大凶宜依
月空處坐吉其兒衣亦依天德月空之處藏之吉但臨産及
未滿月皆不得在懸尸閉肚之上小便亦不得棄浣衣不
淨水慎之仍不得以雜物弊其上

推日遊法一首

日遊圖



常以癸巳日入內宮一十六日至已酉日出癸巳甲午乙未丙申丁酉在紫微北宮

戊戌已亥庚子辛丑壬寅在南宮

癸卯一日在天廟西宮

甲辰乙已丙午丁未戊申在御女東宮

右日遊在內產婦宜在外別於月空處安帳產吉

己酉庚戌辛亥壬子癸丑甲寅在外東北維

乙卯丙辰丁巳戊午己未在外東方

庚申辛酉壬戌癸亥甲子乙丑在外東南維

丙寅丁卯戊辰己巳庚午在外南方

辛未壬申癸酉甲戌乙亥丙子在外西南維

丁丑戊寅己卯庚辰辛巳在外西方

壬午癸未甲申乙酉丙戌丁亥在外西北維

戊子己丑庚寅辛夘壬辰在外北方

右日遊在外宜在内產吉凡日遊所在内外方不可向之産凶

體玄子爲產婦借地法一首

東借十步　西借十步　南借十步

北借十步　上借十步　下借十步

辟方之中摠借四十餘步此中產婦安居無所妨礙無所畏忌

諸神擁護百鬼速去急急如律令

右件法入所投月即寫一本貼著產婦所居正中北壁上

吏不須避日遊反支及諸神等此頻用有驗故録耳

日暦法二首

甲子日在内面向東北面南二角吉　乙丑日在内面向西南西北東南三角吉

丙寅日在内面向西南西北二角吉　丁夘日在内面向西南西北二角吉

戊辰日在内面向西南西北二角吉　己巳日在内面向西北東北二角吉

庚午日 在内面向西北 東北二角吉
壬申日 在内面向東南 東北二角吉
甲戌日 在内面向東南 西南二角吉
丙子日 在内面向西南 東北二角吉
戊寅日 在外面向西北 西南二角吉
庚辰日 在内面向東北 西北二角吉
壬午日 在内面向西南 東北二角吉
甲申日 在内面向東南 西北二角吉
丙戌日 在内面向東北 西南二角吉
戊子日 在内面向西南 東北二角吉
庚寅日 在内面向東南 西北二角吉
壬辰日 在内面向西南 東北二角吉
甲午日 在外面向西南 西北二角吉

辛未日 在内面向西北東 南東北三角吉
癸酉日 在内面向西北東 北東南三角吉
乙亥日 在内面向東北 西南二角吉
丁丑日 在内面向西南西 北東南三角吉
己卯日 在外面向東南西 南西北三角吉
辛巳日 在内面向西北西 南東北三角吉
癸未日 在内面向東南 東北二角吉
乙酉日 在内面向東南西 北東北三角吉
丁亥日 在内面向東北西 南東南三角吉
己丑日 在内面向東南西 南西北三角吉
辛卯日 在内面向東南 西北二角吉
癸巳日 在外面向西南東 北西北三角吉
乙未日 在外面向東南西 北東北三角吉

丙申日在外面向西北東北二角吉　丁酉日在外面向西北東南東北三角吉

戊戌日在外面向東北西南二角吉　己亥日在外面向東北東西南南三角吉

庚子日在外面向東南東北二角吉　辛丑日在外面向東南西北西南三角吉

壬寅日在外面向東南西南二角吉　癸卯日在外面向東南西南西北三角吉

甲辰日在外面向西南西北二角吉　乙巳日在外面向西北西南東北三角吉

丙午日在外面向西南東北西北三角吉　丁未日在外面向西北東南東北三角吉

戊申日在外面向西北東北二角吉　己酉日在外面向東南西北東北三角吉

庚戌日在外面向東北東南二角吉　辛亥日在內面向東南西南二角吉

壬子日在內面向東南東北西南三角吉　癸丑日在內面向東南西南二角吉

甲寅日在內面向東南西北二角吉　乙卯日在內面向東南西南西北三角吉

丙辰日在內面向西南西北東北三角吉　丁巳日在內面向西南西北東北三角吉

戊午日在外面向西南西北東北三角吉　己未日在外面向西北東南東北三角吉

庚申日在內面向西北東南東北三角吉　辛酉日在內面向西北東南東北三角吉

壬戌日在內面向東南西北二角吉　癸亥日在內面向西南東北二角吉

凡日曆十二辰並有神殺禁忌不可向產日別須檢看

凡甲乙日生子勿著白衣宜著黑衣吉臥無西首勿庚辛日起　丙丁日生子勿著黑衣宜著青衣臥無北首勿壬癸日起

戊己日生子勿著青衣宜著赤衣臥無東首勿甲乙日起　庚辛日生子勿著赤衣宜著黃衣臥無南首勿丙丁日起

壬癸日生子勿著黃衣宜著白衣臥無四角首勿戊己日起

安置產婦法二首

凡欲產時先以朱砂點產婦項後宛宛中又點鼻孔間柱兩傍宛宛中牛穿据處即向產處呪之曰此地空閑安居產婦某姓就此吉處諸神擁護百鬼速去莫相觸忤三呪之訖即燒火於產處四方以井華水四器亦置產處四方各橫刀於水上其刀淨磨拭之

又法捉一刀子先向產處呪曰一尺刀子七寸刃拒以反支而治運如此三呪訖釘刀子著產處地上然後坐產已上並出第十上卷中

產難方二十四首

崔氏凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母面赤舌青口中沫出者母死兒活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死文仲同出第十上卷中

廣濟療難產三日不出者方

取死鼠頭燒作屑并花水服千金崔氏救急同

又方

槐子十四枚蒲黃一合內酒中溫服須臾不生更服之千金集驗崔氏同

又方

吞生雞子黃三枚并少苦酒崔氏集驗備急文仲同

又方

吞皂莢子二枚亦効千金崔氏小品同並出第三卷中

小品療產難歷日氣力乏盡不能得生此是宿有病方

赤小豆二升　膠二兩

右二味以水九升煑豆令熟取汁內膠令烊一服五合不覺

不過再即產崔氏千金同

又方　取馬銜一枚覺痛即令左手持之崔氏同

又方　取槐東引枝手把之崔氏同

又方　手捉鸕鷀頭甚驗崔氏同並出第七卷中

集驗若日月未至而欲產者方

末知母蜜和兎屎大服一丸痛不止更一丸千金崔氏小品同

又方　取夫衣帶五寸燒作灰酒服立下崔氏廣濟文仲同並出第七卷中

備急療難產方

取槐子吞三枚崔氏同

又方　取鑿柄入孔裏者燒末酒服之立下崔氏同

又方　弓弦三寸箭簳一寸各燒末酒服之崔氏同

又方　取羖羊角屑燒末酒服之千金崔氏同

又若母巳死兒子不出方

但以水銀如彈丸格口内喉中捧起令下食頃又捧令起子便落崔氏同

又方

擣蒲根絞取汁一二升灌口中此亦治母生子死驗崔氏同

又療母子俱死者産難及胎不動轉者方

榆白皮三兩　葵子五合　甘草炙　桂心各一兩

右四味切以水四升煑取二升服一升須臾不産更服一升忌海藻菘菜生葱崔氏小品同

又産難數日欲絶秘方

書奏作兩行字凡二十字文曰帝乙生子司命勿止即出其胞及其子無病其母封其中央以朱印之令

産婦持之崔氏小品同

又產難六七日母困方

取好膠二兩清酒一升半微火烊膠內新雞卵一枚鹽一寸匕相和頓服即產不產更服崔氏同

又產難母如死不知人事方

用陳葵子末三指撮酒服口噤者去齒下藥即愈立驗崔氏同

又療婦人產難方

書紙曰坐爲蒲卧爲魚女屬母兒屬夫急急如律令即產婦吞之又書兩道兩手各執一凡書三本崔氏同並出第一卷中

救急療產難方

取廁前用草二七枚燒作屑服之千金崔氏同崔氏云日用籌

又方　取牛屎中大豆書一片作入字一片作出字還合吞之良崔氏同並出第四卷中

千金療難產方

令夫唾婦口中二七過立下集驗崔氏同出第十卷中

逆產一十二首

小品療逆產方

鹽塗兒足底又可急搔爪之并以鹽摩產婦腹上即愈崔氏千金集驗同

又方

鹽和粉塗兒兩足下即順矣千金崔氏同

又方

又彈丸二枚擣末三指撮溫酒服集驗千金崔氏同

並出第七卷中

集驗療逆產方

燒錢令赤內酒中飲之崔氏同

又方　夫陰毛二七枚燒以豬膏和丸如大豆吞兒手即持丸出神驗千金崔氏同

又方　朱書左足下作千字右足下作黒字崔氏同

又方　生不出手足先見燒蛇脫皮末服刀圭亦云三指撮面向東酒服即順崔氏千金同

又方　真丹刀圭塗兒腋下崔氏同

又方　以手中指取釜底黒煤交畫兒足下順出千金文仲崔氏備急同並出第十一卷中

删繁療逆産難産數日不出者方

取桃人中破書一片作可字一片作出字還合吞之崔氏同

又療逆産方

取車肛中膏畫腋下及掌心崔氏文仲備急小品千

金集驗同

又療逆產胞衣不出方

取竈屋上黑塵酒服之千金崔氏同並出第七卷中

橫產方四首

小品療橫產及側或手足先出方

可持麤鍼刺兒手足入二分許兒得痛驚轉即縮當迴順文仲備急千金崔氏集驗同

集驗療橫生方

取梁上塵三指撮酒服之千金文仲崔氏同出第十一卷中

文仲療縱橫不可出

用菟絲子末酒若米汁服方寸匕即出車前子亦好服如上法千金崔氏同

又方　服水銀如大豆一枚備急崔氏同

右以前橫產逆產二條條流雖別療法盖同可以意量逐善參用也

子死腹中欲令出方一十五首

集驗療子死腹中方

眞珠二兩酒服盡立出崔氏同

又方

取竈下黃土三指撮酒服之立出當著兒頭上千金崔氏文仲同

又療胎死在腹方

取三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煑令產婦面東向飲之立出千金備急崔氏同

又方

取瞿麥一斤以水八升煑取二升分再服不出更服文仲千金崔氏同

又方

葵子一升膠五兩水五升煑取二升頓服出間日又服崔氏千金文仲備急同並出第十一卷中

崔氏療子胎在腹中恐死不下方

當歸 芎藭各二兩

右二味以好釅醋二升煑藥二十沸頓服之若胎已死即下如胎未死即便安穩也

又療子死腹中又妊兩兒一兒活一兒死令腹中死者出生者安此方神驗萬不失一

蟹爪一升 甘草二尺炙切 阿膠三兩炙

右三味以東流水一斗先煑二味取三升去滓內膠令烊頓服不能頓服分再服若人困挍口下藥入即汗煎藥宜東向竈以茅葦薪煑之集驗廣濟千金備急文仲同

又療妊身熱病子死腹中欲出之方

烏頭一枚

右一味細擣水三升煑取大二升稍稍摩臍下至陰下胎當立出

又方

以苦酒濃煑大豆一服一升死兒立下不能頓服再服之亦得千金同

又療子胎在腹内已死方

甘草一尺炙　蒲黃一合　筒桂四寸　香豉二升

雞子一枚

右五味切以水六升煑取一升頓服胎胞穢惡盡去大良千金集驗同並出第十卷中

文仲療或半生胎不下或子死腹中或半著脊又在草不產血氣上瑒心毋面無顏色氣欲絕方

豬膏一升煎　白蜜一升　淳酒二升

右三味合煎取二升分再服不能隨所能服之備急删繁
千金崔氏同
又子死腹中不出方
以牛屎塗母腹上立出備急崔氏千金同
又方
榆皮切一升 熟朱一兩
右二味以苦酒三升煮取一升頓服死兒立出集驗千金備
急崔氏同並出第二卷中
救急療子死腹中方
服水銀三兩立出集驗千金備急文仲小品同
又方
取夫尿二升煮令沸飲之集驗千金崔氏同並出第
四卷中
胞衣不出方二十首
廣濟療胞衣不出方

末竈突中土三指撮以水服之集驗千金備急文仲同

又方

取夫單衣蓋井上立出千金集驗救急崔氏小品同

又療胞衣不出方

取苦酒服赤朱一兩千金集驗崔氏同

又方

雞子一枚苦酒一合和飲之即出集驗千金崔氏同

又方

當戶燒黍穰即出崔氏同並出第二卷中

小品療胞衣不出方

取皂莢擣末著鼻孔中嚏即出崔氏同

又方

鹿角末三指撮酒服之崔氏同

又方

䰟兒衣不出吞此符吉

延年療婦人傷娠及胎死腹中胞衣不出產後疾病及諸困竭欲死方

刺取羊血及熱飲之不能者人含吐與之能多益善若

不能咽噉少鹽又水潠其面此方神驗崔氏文仲備急同

又胞衣不出方

以洗兒水服半柸即出崔氏同

又療胞衣不出腹中滿則殺人方

但多服猪膏又大豆一升苦酒一斗煮取三升分三服崔氏同

又方

吞雞子黄兩三枚解髮刺喉中令得嘔即出若困極死者以水一升煮栝樓一枚三兩沸寫口中汁下即出出第十四卷中崔氏云水一升煮螻蛄一枚三沸服

救急療胞衣不出并兒横到死腹中母氣欲絶方

半夏二兩洗　白斂二兩

右二味擣篩服方寸匕小難一服横生二服到生三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩廣濟集驗小品千金備急文仲

崔氏同

又方　小豆小麥相和濃煑汁飲之立出小品千金備急崔氏同

又療胞衣不出方

取炊箄當户前燒之廣濟集驗千金崔氏同出第四卷中

必効療胞衣不出令胞爛牛膝湯方

牛膝四兩　滑石八兩　當歸三兩　通草六兩

葵子一升　瞿麥四兩

右六味切以水九升煑取三升分三服忌牛狗肉廣濟集驗千金崔氏同通草一方作莽草

又方　服蒲黃如棗大良集驗千金崔氏同

又方　生男吞小豆七枚生女吞二七枚千金崔氏並同



又方　生地黃汁一升苦酒三合煖服之不能頓服再服之集

驗千金崔氏同

又方

澤蘭葉三兩 滑石五兩屑 生麻油二合

右三味以水一升半煑澤蘭取七合去滓內滑石生麻油頓服之廣濟集驗千金崔氏同並出第四卷中




已上三符主產難產婦吞之吉


產難燒此符水和服之吉


逆產橫產吞此符

右出崔氏產書

外臺祕要方卷第三十三

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

外臺祕要方

三十四

婦人下

外臺秘要方卷第三十四 婦人下四十八門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

千金論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得令

死喪汚穢家人來視之則生難若已産者則傷兒也
又凡婦人産乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血惡物著地則殺人又浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止
又凡産不依産圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死即母子俱病庶事皆不稱心能依圖無犯觸母子即得無疾子即易養
又凡欲産時特忌多人瞻視唯得三二人在傍待摠産訖即告語衆人也若人衆令人難産
又凡産婦第一不得忽忽忙怕傍人極須少靜皆不得預緩預急憂悒憂悒則難産若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒生訖一切人及母皆忌問是男是女兒胎落地即急取口中惡物與新汲井水五合咽忌與煖湯物也勿令母看視穢汚耳
又産婦慎熱食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌也並出第二卷中

令易產方六首

千金令易產方

凡欲臨產時先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口

令至蜜即易生神驗

又方

生地黃汁半升生薑汁半合煎熟頓服

又方

燒藥杵令赤內酒中飲之小品同並出第二卷中

小品預服散令易生母無疾病未生一月日前預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺甘草散方

甘草八分炙　黃芩　大豆卷　粳米

麻子人　乾薑　桂心各二分　吴茱萸二分

右八味擣散酒服方寸匕日三忌海藻菘菜生葱千金同

又療婦人易生産飛生丸方

飛生一枚　槐子　故弩箭羽各十四枚

右三味擣末蜜丸桐子大覺便以酒服二丸即易産

又方

取蛇脫皮著衣帶中鑑阜繫衣帶臨欲産時左手持馬銜右手持飛生毛令易産並出第七卷中

下乳汁方一十五首

廣濟療婦人乳無汁方

以母猪蹄四枚治如食法以水二斗煑取一斗去蹄土瓜根通草漏蘆各三兩以汁煑取六升去滓内葱白豉如常法著少米煑作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少許汗佳乳未下更三兩劑甚驗崔氏同出第三卷中

千金療乳無汁漏蘆湯方

漏蘆　通草各八分　鍾乳四分　黍米一升

右四味切將米宿漬研取汁三升煮藥三四沸去滓作飲服經心録同

又方

土瓜根末酒服半錢匕乳日下如流水崔氏同

又療乳無汁單行石膏湯方

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日盡良

又療乳無汁單行鬼箭湯方

鬼箭五兩水六升煮取四升去滓一服八合日三服亦可燒灰作末水服方寸匕日三

又下乳汁通草散方

通草　鍾乳研

右二味等分爲散麪粥服方寸匕日三百日後可兼養兩兒

又麥門冬散方

麥門冬去心 鍾乳研 通草 理石各等分研

右四味擣散食前後酒服方寸匕日三

又下乳汁漏蘆散方

漏蘆二分 鍾乳五分研 栝樓五分 蠐螬三分熬

右四味擣散食後粆糖水下方寸匕日三

又方

母猪蹄一具麤切以水二斗煑令熟餘五六升汁飲之甚良崔氏同

又方

猪蹄二枚炙槌碎 通草八兩切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作崔氏同

又方

栝樓根切一升酒四升煮三沸去滓服半升日三良

崔氏同

又方

栝樓青色大者一枚熟擣以白酒一升煮取四升去滓溫飲一升日三若無大者用小者兩枚無青色者黃色者亦好崔氏同

又方

燒鯉魚頭末酒服三指撮

又方

燒死鼠酒服灰方寸匕日三立下並出第二卷中

崔氏療乳汁不下方

鼠肉五兩　羊肉六兩　麞肉八兩

右三物合作臛噉之勿令食者知出第十卷中

妬乳瘡痛方一十四首

集驗論療婦人妬乳乳癰諸產生後宜勤濟乳不宜令汁畜積不去便不須復出惡汁於內熱溫壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也方

始妬乳急灸兩手魚際各二七壯斷癰脉也不復惡手近乳汁亦自出便可令小兒手助捫之則乳汁大出皆如膿狀內服連翹湯自下外以小豆薄塗之癰處當差千金同

又產後不自飲兒及失兒無兒飲乳乳畜喜結癰不飲兒令乳上腫者方

以雞子白和小豆散塗之乳房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大者子含水使漱口中冷爲嗍取乳汁吐去之不含水漱熱去喜令乳頭作瘡乳孔塞也千金同

又療妬乳乳癰連翹湯方

連翹　升麻　杏人去皮尖　射干

防巳　黄芩　大黄　芒消

柴胡各三兩　芍藥　甘草炙各四兩

右十一味切以水九升煑取三升分服忌海藻菘菜千金同

又方

取葵莖燒灰擣散服方寸匕日三即愈千金同

又療妬乳生瘡方

蜂房猪甲中土車轍中土各等分末苦酒和塗之良

千金同一方又有車轂上脂一味

又療婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黄汁出侵淫爲長百種

療不差者動經年月名爲妬乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論

苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二物飛烏膏及

飛烏散佳始作者可傅以黄芩漏蘆散及黄連胡粉散並佳

方如左赤龍皮湯方

槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之秋冬温之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散千金同

又天麻草湯方

天麻草切五升以水一斗半煎取一斗隨寒温分洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如鼠尾花亦以洗侵淫黄爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金同

又飛烏膏散方

用燒朱砂作水銀上黑煙名緋粉者三兩熬令焦燥　礬石三兩燒粉

右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三作散者不須和有汁自著可用散亦傅諸熱瘡黄爛侵淫汁瘡蜜瘡丈

夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疳蝕口邊肥瘡蝸瘡等並以此傅之

千金同

又黃連胡粉膏散方

黃連二兩 胡粉十分 水銀一兩同研令消散

右三味擣黃連爲末三物相和合皮裹熟挼之自和合也縱不成一家且得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡若著甲煎爲膏千金同

備急小品妬乳方

黃芩 白斂 芍藥各等分

右三味下篩漿水服一錢五七日三若右乳結將去左乳汁左乳結即將去右乳汁服即消千金同

又方

柳白皮酒煑令熱以熨上即消

又方

苦酒磨升麻若青木香或紫檀香以摩上並良一味即得佳

又方

巳入腹者麝香薰陸香青水香雞舌香各一兩㕮

四升煑取二升分再服忌蒜麫酒牛馬猪肉

必効療婦人妬乳癰瘡遲愈五物雄黃䕡茹膏方

雄黃 白斂 雌黃 䕡茹各一分並切

亂髮如雞子一枚

右以猪脂半斤合煎三沸去滓乃內亂髮髮盡燋成以塗瘡不過十日差

乳癰腫方一十八首

廣濟療乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍方

大黃 芍藥 楝實 馬蹄

右四味擣散酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消百無失一明晨更服一匕忌衝風熱食

深師療乳癰腫消核芍藥散方

芍藥　通草　桂心　昆布

白斂　附子炮　黃耆　人參

海藻　木占斯各一兩

右十味擣散以清酒服一錢匕日三當先食并療頸下氣結瘰癧

又乳癰衆醫不能療柏皮膏方

猪膏年多者佳柏皮三斤去黑皮以猪膏煎之當稍稍煎柏皮熟黑便漉出更煎餘柏皮如初盡以塗瘡

蔓柏勿取餘者膏令淹没柏皮而已甚驗

集驗療乳癰方

大黃二兩　莽草二分　伏龍肝十二分　乾薑二分

右四味擣末以酢和塗乳上痛即止一方生薑極驗可用也千金同

又方

取鹿角下篩散以豬頷下清汁服方寸匕不過再服亦以醋漿服之良千金云豬脂銷上清汁

又療乳癰四物膠薄貼方

膠炙　大黃　莽草　細辛

右各等分擣末以雞子白和塗紙上貼腫頻易晝夜貼之割紙穿如錢大出腫頭

又療乳癰三物桂心貼方

桂心三分　烏頭二分　甘草二分

右擣散以苦酒和塗腫上以小紙覆濡其上將乳君其中以乾布置乳下須臾布當濡有膿水也佳范汪同

千金翼排膿散主乳癰方

鐵粉　蓯蓉　桂心　細辛

芎藭　人參　防風　乾薑

黄芩　芍藥各四分　當歸　甘草炙各五分

右十二味擣散酒服方寸匕日三夜一加至一匕半服藥十日血出多勿恠是惡物除甚良出第五卷中

備急葛氏療婦人乳癰妬腫者或以經二三日衆療不差方

堅硬紫色削柳根皮擣熟熬令温帛囊盛熨乳上冷更易甚良一宿即愈千金同

又方

研米槌二枚煑令熱以絮及巾覆乳上用二槌更互熨腫數十過差止已用大驗千金云炙熱

又乳癰方

大黃　竈下黃土各一分末　生薑二分

右三味擣末醋和塗乳痛即止極驗劉消子不用生薑用生魚三味等分余比用鯽魚妙

又療乳癰方

大黃　鼠屎　黃連各一分

右三味擣末合鼠屎更擣以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米並可用千金同

救急療乳癰腫痛如升椀大痛不可忍方

取白薑石擣末一二升用雞子白和如稀泥傅腫乾更易之此方頻試驗如雞子處罪取榆白皮和擣傅即差

又療乳癰堅硬痛不可忍方

葚若子半大匙當年新者服時不得嚼破以清水一

大盞和頓服痛即止

又療乳癰腫方

以驗醋研地黃塗上乾即易不過三五遍服以酒研之

必効療婦人乳癰方

覺痛色未變時以飼豬米研汁飲之即差仍取豬槽木厚如匙面火炙數數熨上

又療婦人乳癰丹參膏方

丹參　白芷　芍藥各二兩

右三味㕮咀以苦酒淹經宿又取豬脂半斤微火上煎之白芷黃膏成去滓以膏塗上甚良

又療瘡上須貼膏方

黃耆八分　白芷　大黃各五分　當歸

續斷各四分　薤白切二合　松脂十二分　薰陸香

臘各十分　猪脂一升　生地黄汁七合

右十一味切内地黄汁中漬半日内猪脂中微火上煎三上三下白芷色黄膏成布絞去滓翦帛如瘡大小塗帛貼瘡上日四五度易之終身無苦極効

產後血暈心悶方一十首

廣濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絶方

荷葉二枚炙　蒲黄一兩　甘草二兩炙　白蜜一匙

地黄汁半升

右五味切以水三升煑取一升絞去滓下蒲黄蜜地黄汁煖服立差止

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方

取羚羊角一枚燒成灰末以東流水服方寸匕若未差更服差

救急産暈心悶大困方

鯽魚剥皮作鱠以韲食三兩口止

文仲暈絶方

蘇方木三兩碎以水五升煎取二升分再服或無

蘇木煑緋色衣取汁服甚驗

又方

取牆上青衣一抄以水四小升煑取二升分服又生薑汁一小升地黄汁一小升酒一大升相和煎五六沸分再服每劑和大黄末一匙此方甚良

崔氏凡暈者皆是虚熱血氣奔迸腹中空所致欲分免者第一須先取釅醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞其氣兼細細飲之此爲上法如覺暈即以醋噴面蘇來即飲醋仍少與解之一云仍少與水解之

又凡産後忽悶冒汗出不識人者是暴虚故也方

取破雞子吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚

驗丈夫小便亦得切不得用病人者
又若久不識人或時復發者此爲有風因產血氣暴虛風行脉
中故也若産後去血多者尤增此疾與雞子不醒者可急與竹
瀝汁一服五合須臾不定復與五合頻得三五服立差並出第
十上卷中

近効療血暈絶不識人煩悶方

紅藍花三兩新者佳以無灰清酒半升童子小便半
大升煑取一大盞去滓候稍冷服之新汲水一大升
煑之亦良

又方

赤父馬糞絞取汁一大盞濕者良若乾者取新汲水
半大盞和研絞取汁頓服亦主人血不止神驗夏侯拯録

産乳暈絶方五首

崔氏療産乳暈絶方

又方

以惡血服少許良

又方

以服洗兒水三合良

覺暈即用三股麻繩長五六尺繫產婦右脚膝上令人捉兩頭急挽得醒徐徐解之並出第十上卷中

文仲療產乳暈絕方

半夏一兩洗擣篩丸如大豆內鼻中即愈崔氏同

救急療產乳暈絕方

生赤小豆擣爲散取東流水和方寸匕服之不差再服崔氏同

產後餘血不盡腰脚疼及惡露不下方七首

廣濟療產後三日患腰疼腹中餘血未盡并手脚疼不下食

地黃湯方

生地黃汁一升 芍藥 甘草各二兩炙 丹參四兩

蜜一合　生薑汁半合

右六味切以水三升煮取一升去滓内地黃汁蜜薑汁微火煎一兩沸一服三合日二夜三利一兩行中間進食良與藥更進服

又療產後惡露不多下方

牛膝　大黃各八分　牡丹皮　當歸各六分

芍藥　蒲黃　桂心各四分

右七味擣散以生地黃酒服方寸匕日二血下止

救急療婦人產後餘血不盡血流入腰脚疼痛胷急氣滿兩脅痛方

生薑一斤　淡竹葉一升並切

右二味以水二升煮取一升去滓分再服

又療產後血不盡血痛悶方

取荷葉燒作灰煖水和服煮取汁亦良

又惡露不盡腹脹痛方

取亂髮如雞子大灰汁洗淨燒末酒服

又方

取百斤秤錘一枚燒赤投酒五升中用此秤錘酒煑

當歸三兩取二升去滓分再服千金同

又療一切宿血及損傷瘀血在腹內不問新久幷婦人月經不通産後惡血不下皆良方

大黃　芒消各三兩　桃人四十枚去尖皮

右三味芒消桃人合擣四五百杵以酢漿二升半漬一宿空腹攪調頓服之不能頓服者分作兩服良久先下糞次下如豆泥汁或黑血爲驗強人日別服一劑弱人兩日服之下血盡便止不過三兩劑忌生冷茶蒜並出第四卷中

産後惡露不絶方四首

廣濟療婦人産後血露不絶崩血不可禁止腹中絞痛氣息急

療蓐病三十六疾方

亂髮燒灰研　阿膠各二兩炙　代赭　乾薑各三兩

馬蹄一枚燒　乾地黃四兩　牛角鰓五兩炙

右七味擣篩蜜和爲丸如梧桐子空腹以飲下二十五丸日二至四十丸良

深師療産後虚冷下血及水穀下痢晝夜無數兼療惡露不絶龍骨丸方

乾薑　甘草炙　桂心各二兩　龍骨四兩

右四味擣篩蜜丸如梧桐子以酒下二十丸日三忌如常法

此方甚良

文仲葛氏療血露不絶方

以鋸截桑木取屑五指撮酒服日三差

又隱居効方澤蘭湯療産後惡露不盡腹痛往來兼滿少氣

澤蘭八分熬 當歸三分 生地黃三分 芍藥十分
甘草六分炙 生薑十分 大棗十四枚擘
右七味切以水九升煮取三升分爲三服欲死塗身得差

產後血氣煩悶方四首

廣濟療產後心胷中煩悶血氣澀肋下妨不能食方
生地黃汁一升 當歸一兩末 生薑汁三合 酒五合
童子小便二升
右五味和煎三四沸去滓分服一日令盡間食服

又血氣煩悶方
取生藕擣絞取汁飲一升未定更飲差止竹瀝亦得千金同

集驗療產後血氣煩悶方
取生地黃汁一升酒三合相和微溫頓服之千金同

千金療婦人產後氣欲絕心中煩悶不解必効方

竹葉切　麥門冬去心　小麥各一升　甘草一兩炙

生薑二兩　大棗十四枚

右六味切以水一斗煮竹葉小麥取八升去滓內餘藥煮取三升去滓分服心虛悸加人參二兩少氣力加粳米五合一方用竹皮若胷中氣逆加半夏二兩忌如常法出第三卷中

產後心痛方三首

集驗大巖蜜湯療產後心痛方

乾地黃　當歸　獨活　甘草炙

芍藥　桂心　小草　細辛各一兩

吴茱萸一升　乾薑三兩

右十味切以水九升煮取三升分三服忌千金同

經心錄蜀椒湯療產後心痛此大寒冷所爲方

蜀椒二合汗　芍藥三兩　半夏洗　當歸
桂心　人參　甘草炙各二兩　生薑汁五合
蜜一升　茯苓二兩
右十味切以水九升煮椒令沸下諸藥煮取二升半去滓下薑汁蜜等更煎取三升一服五合漸至六合盡勿冷飡千金同

千金羊肉湯療產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力方
羊肉三斤　當歸　黃芩　甘草炙
芎藭　防風各二兩　芍藥三兩　生薑四分
右八味切以水一斗二升煮羊肉減半煮藥取三升分溫三服忌如常法崔氏同出第三卷中

產後腹中絞刺痛方九首

廣濟療產後腹中絞刺痛不可忍方

當歸　芍藥　乾薑　芎藭各六分
右四味擣散以酒服方寸匕日二服
又療產後內虛寒入腹腹中絞痛下赤煩毒譫語見鬼羊肉湯方
肥羊肉一斤　當歸　甘草炙　芍藥各一分
右四味切以水一斗煮羊肉取七升煑藥取二升分服
又療新產後腹中如弦常堅絞痛無聊方
蜜一升　當歸一兩
右二味末入蜜中煎融融耳適寒溫頓服
千金當歸湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛方
當歸三兩　生薑五兩　芍藥二兩　羊肉一斤
右四味切以水八升煮取三升適寒溫頓服七合日三
又療產後疼痛桃人芍藥湯方
桃人半升去皮尖熬　芍藥　芎藭　當歸

乾漆熬　桂心　甘草炙各二兩

右七味切以水八升煑取二升半分三服

又單行茱萸酒療產後腹內外疾痛方

吴茱萸一升酒三升漬一宿煎取半升頓服亦可再服差止並出第三卷中

必効療產後腹痛方

羌活四兩切酒二升煑取一升分服

又方

兎頭炙令熱以熨產婦腹努力絞痛者熨之立定

又療痛不可忍方

取一苦瓠蘆末經開者亦覺痛即開去子訖以沸醶酢投中蒸熱隨痛熨冷即換極甚効

產後虛熱方二首

千金蜀漆湯療產後虛熱往來心胷中煩悶滿骨節疼及頭

痛壯熱晡時輒甚又似微瘧方

蝭母（知母也） 芍藥（各二兩） 蜀漆葉 甘草（炙）

桂心 黃芩（各一兩） 生地黃（一斤） 黃耆（五兩）

右八味切以水一斗先煮地黃取七升去滓下諸藥煮取二升半分三服湯療寒熱不損人忌如常法出第三卷中

千金翼療產後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黃 牡蠣（各五兩熬） 桂心（三兩）

右四味切以水五升煮取二升半分三服日三湯不損人無毒亦療腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩甚驗大熱即除出第六卷中

產後虛勞方四首

千金增損澤蘭丸療產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭（熬） 甘草（炙） 當歸 芎藭（各七分）

附子炮 乾薑 白朮 白芷
桂心 細辛各四分 防風 人參
牛膝各五分 柏子人 乾地黃 石斛各六分
厚朴炙 藁本 蕪荑各二分 麥門冬八分去心
右二十味擣末蜜丸以酒下十五丸至二十丸良忌如常法
出第四卷中
延年增損澤蘭丸主產後風虛勞損黃瘦方
澤蘭七分熬 防風 乾地黃 當歸
細辛 桂心 茯苓 芍藥
人參 甘草炙 藁本 烏頭炮
麥門冬去心 石斛 紫菀 芎藭各五分
乾薑 柏子人 蕪荑人 厚朴炙
蜀椒汗各四分 白朮 黃耆各六分 紫石英研

石膏研各八分

右二十五味擣篩蜜和丸如梧桐子以酒下二十至三十丸忌如常法

删繁療産婦勞虛或本來虛實或産後血脉虛竭四肢羸弱飲食減少血脉斷絶血脉不通虛實依源澤蘭補虛丸方

澤蘭葉九分熬　石膏八分研　芎藭　甘草炙

當歸各七分　白芷　防風　白术

藁本　蜀椒汗　厚朴炙　乾薑

桂心　細辛各五分

右十四味擣篩蜜丸如梧桐子酒下二七丸至三十九日再忌海藻菘菜桃李雀肉生葱等

古今録驗澤蘭丸療産後風虛勞羸百病必効方

澤蘭葉六分　白芷　椒汗　蕪荑人

藁本 細辛各四分 白朮 柏子人
人參 桂心 防風 厚朴炙
丹參各五分 芎藭 甘草炙 當歸各七分
乾地黃十分
右十七味擣篩蜜和丸如梧桐子服二十丸至三十丸日再服忌
如常法

產後風虛瘦損方四首

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方
澤蘭七分熬 厚朴炙 人參 石斛
蕪荑人 續斷 防風 桂心各三兩
芎藭 白朮 柏子人 五味子
黃耆 遠志皮各四分 赤石脂六分 乾地黃六分
甘草六分炙

右十七味擣末蜜丸如桐子以酒下二十丸至三十丸日再忌如常法

小品療産後中風虚人可服他藥者一物若獨活湯主之及一物白鮮湯主之亦可與獨活合煑之方

獨活三兩以水三升煑取一升分服柰酒者亦可酒水等煑之用白鮮皮亦依此法

千金云凡産後滿百日乃可合會不爾至死虚羸百病滋長愼之凡婦人皆患風氣臍下虚冷莫不由此早行房故也又産後七日内惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進羊肉湯痛甚切者不在此例後兩三日消息可服澤蘭丸比至滿月丸藥盡爲佳不爾虚損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸又凡在蓐必須服澤蘭丸補服法必七日外不得早服也婦人因産取涼太多得風冷腹中積聚百病競起迄至於耆

百方療不能差桃人煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至
秋冬須服一兩劑以至年終常將服之

又桃人煎療萬病婦人産後百病諸氣方

桃人一千二百枚去雙人尖皮熬令香

右一味擣務令極細熟以上上酒一斗五升研三四遍如作
麥粥法以極細爲佳内小長項瓷瓶中令滿以麪遍封之
務取蜜内湯中煑一復時不停火使瓶口常出湯勿令
没藥成温酒和服一匙日再丈夫服亦極妙

延年澤蘭丸主産後風虚損瘦不能食令肥悦方

澤蘭七分熬 當歸七分 甘草七分炙 藁本三分
厚朴三分炙 食茱萸三分 蕪荑三分 白芷三分
乾薑三分 芍藥三分 石膏八分燉者研 人參四分
柏子人四分 桂心四分 白朮五分

右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸日二加至二十五丸忌生冷酢滑猪牛肉熱麪生葱桃李雀肉海藻菘菜等

產後虛羸方三首

廣濟療產後虛羸喘乏或乍寒乍熱狀如瘧名爲蓐勞猪腎湯方

猪腎一具去脂四破　香豉一升綿裹　白粳米一升　葱白切一升

人參　當歸各二兩

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服七合以意消息忌犬肉熱麪蒜出第三卷中崔氏云以水三斗煮取五升適寒溫隨便飲之

救急療產後羸瘦不復令肥白方

烏豆肥大者淨拭熬熟如造豆黃法去皮擣爲屑下篩以臘月猪脂成鍊者和丸如桐子以酒下五十丸日再服一月內肥白也無所禁

古今錄驗療產後諸病羸痩欲令肥白飲食和調地黃羊脂煎方

生地黃汁一升 生薑汁五升 羊脂二斤 白蜜五升

右四味先煎地黃汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑次下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒一升取煎如雞子大投酒中飲日三良

產後中風方三首

深師療產後中風口噤不知人小獨活湯方

獨活八兩 葛根六兩 生薑五兩 甘草二兩炙

右四味切以水九升煮取三升分三服微汗佳忌海藻菘菜

出第六卷中

小品大豆紫湯主婦人產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身痒劇者嘔逆直視此皆因風冷濕所為方

大豆三升炒令炮斷預取器盛清酒五升沃熱豆中訖

漉去豆得餘汁盡服之溫覆取微汗出身體纔潤則愈一以去風二則消血結云周德成妊胎觸墮因傷折胎死在腹中三日困篤服此酒即差後療無不佳千金用大豆五升酒八升右云更合獨活湯所以爾者產後多虛著風以獨活消風去血故也重者十劑崔氏云如中風口噤加雞屎白二升和豆熬更佳

又療產後中寒風痓通身冷直口噤不知人方

白朮四兩酒三升煑取一升去滓頓服忌桃李雀肉等

產後下痢方四首

廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼微痢方

茯苓　人參　厚朴炙各八分　甘草炙

橘皮　當歸　黃芩各六分

右七味擣散以飲下方寸匕日三度漸加至一匕半

又療產後下痢赤石脂丸方

赤石脂三兩　甘草炙　當歸　白朮

黃連 乾薑 秦皮各二兩 蜀椒汗

附子炮各一兩

右九味擣篩蜜和爲丸如梧桐子酒服二十丸日三忌猪肉冷水海藻菘菜

深師療産後下痢膠䗶湯方

粳米一合 䗶如雞子一枚 阿膠 當歸各六分 黃連十分

右五味切以水六升半先煑米令蟹目沸去米内藥煑取二升入阿膠䗶消烊溫分三兩服

千金療産後下痢腹痛當歸湯方

當歸 龍骨各三兩 乾薑一兩 白朮二兩

甘草炙一兩 附子炮一兩 熟艾一兩 芎藭二兩半

右八味切以水六升煑取二升半去滓分爲三服日三一日令盡忌猪肉冷水桃李雀肉等出第三卷中

產後赤白痢方五首

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛方

當歸　芍藥　地榆　龍骨

黃連各八分　艾葉八分　甘草炙八分　厚朴炙八分

黃芩　乾薑各六分

右十味切以水八升煮取二升半去滓分溫三服即差止忌生冷油膩海藻菘菜豬魚肉

又療產後赤白痢臍下氣痛方

當歸八分　厚朴炙　黃連各十二分　豆蔻五枚去皮

甘草六分炙

右五味切以水五升煮取二升去滓分溫三服差止忌如常法

文仲効方療產後赤白下痢腹中絞痛不可忍者

黃連四兩　黃蘗三兩　阿膠炙　梔子

蒲黃各一兩　當歸一兩半　黃芩二兩

右七味擣篩蜜和丸飲服六十丸日三夜一服立定破血止痢忌如常法

救急療産後下痢赤白腹中絞痛方

芍藥　乾地黃各四兩　甘草炙　阿膠炙

艾葉　當歸各二兩

右六味切以水七升煮取一升半去滓溫分三服忌海藻菘菜蕪荑

必効療婦人新産後赤白痢心腹刺痛方

薤白一升切　當歸二兩　酸石榴皮三兩　地榆根四兩

粳米五合　一本加厚朴一兩阿膠　人參

甘草炙　黃連各一兩半

右十味切以水六升煮取二升分三服忌如常法千金只用前五味

產後冷熱痢方二首

深師療產後冷熱痢黃連丸方

黃連三兩 烏梅肉一升熬 乾薑二兩

右三味擣末蜜丸如桐子以飲下二十至三十丸日再服忌豬肉

千金療產後忽著寒熱下痢生地黃湯方

甘草炙 黃連 桂心各一兩 生地黃五兩切

大棗二十枚 淡竹皮 赤石脂各一兩

右七味切以水一斗煮竹皮取七升去滓內藥煮取二升半分為三服日三翼同忌豬肉冷水海藻菘菜生葱出第三卷中

產後痢日夜數十行方二首

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血桂枝湯方

桂心　乾薑　甘草炙各二兩　赤石脂十兩

當歸三兩　附子炮一兩　蜜一升

右七味切以水七升煑取三升入蜜一兩沸分服一升日三忌海藻菘菜生葱冷水

必効療產後痢日五十行者方

取木裏蠹蟲糞鐺中炒之令黃急以水沃之稀稠得所服之差止獨孤祭酒訥方

產後卒患淋方五首

廣濟療產後卒患淋小便磣痛乃至尿血方

冬葵子一升　石韋去毛　通草各三兩　滑石四兩末湯成下

茯苓　子芩各二兩

右六味切以水九升煑取三升絞去滓一服七合差止忌熱麪酢物

集驗療産後卒患淋石韋湯方

榆白皮五兩 石韋去毛 黄芩各二兩 通草三兩

大棗二十枚 葵子一升 白朮一兩

右七味切以水八升煑取二升半分爲三四服忌酒麪桃李雀肉等千金有甘草生薑爲九味

千金療産後淋瀝葵根湯方

葵根二兩乾者 車前一升 亂髮灰 大黄

桂心 滑石末後下各一兩 冬瓜汁七合 通草二兩

生薑六兩

右九味切以水七升煑取二升半去滓分三服出第三卷中

又産後淋滑石散方

滑石五分研 通草 車前子 葵子各四分

右四味以漿水服方寸匕至二匕爲妙

千金翼療產後卒淋氣淋血淋石淋湯方

石韋去毛 黃芩 通草各二兩 榆白皮五兩 大棗三十枚

甘草一兩炙 葵子二升 生薑 白朮各三兩

右九味切以水八升煮取二升半分三服千金同

產後小便不禁兼數方四首

廣濟療產後小便不禁方

取雞尾燒作灰酒服方寸匕日三服

小品療產後小便不禁方

取雞子燒作灰酒服日三

又療產後遺尿不知出方

白薇 芍藥各一分

右二味擣散以酒服方寸匕日三千金翼各十分

千金翼諸產後小便數桑螵蛸湯方

桑螵蛸二十枚 鹿茸炙 黃耆各三兩 人參

甘草炙 牡蠣各二兩熬 生薑四兩

右七味切以水六升煮取二升半分三服日再差止忌海藻

菘菜

產後小便數兼渴方一首

集驗產後小便數兼渴栝樓湯方

桑螵蛸炙 甘草炙 黃連 生薑各二兩

栝樓 人參各三兩 乾棗五十枚

右七味切以水七升煮取二升半分三服忌猪肉冷水海藻

菘菜

產後渴方二首

集驗療產後渴栝樓湯方

栝樓四兩 麥門冬去心 人參各三兩 乾地黃三兩

甘草二兩炙　乾棗二十枚　土瓜根五兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌海藻菘菜蕪荑

千金療產後虛渴少氣力竹葉湯方

竹葉切三升　甘草炙　人參　茯苓各一兩

小麥五合　生薑　半夏洗各三兩　乾棗十五枚

麥門冬五兩去心

右九味切以水九升先煮竹葉小麥生薑棗取七升去滓內藥再煎取二升半絞去滓一服五合日三夜一忌羊肉海藻菘菜餳出三卷中

許仁則產後方一十六首

第一產後若覺血氣不散心腹刺痛脹滿喘急不能食飲宜依此方

鬼箭羽折之如金色佳　當歸　白朮　生薑各三兩

細辛　桂心各二兩　生地黃汁五合

右七味切以好無灰酒三升水四升和煎緩火火不要急煎取二升三合去滓溫分服三合忌如常法

第二產後若覺惡露下多心悶短氣貼然無力不能食宜依此方

當歸　艾葉　生薑各三兩　乾地黃四兩

人參一兩　地榆二兩

右六味切以水七升半煎取二升四合去滓分溫服八合日三

第三產後惡露下多少得所冷熱得調更無餘狀但覺腹內切痛可而復宜依此方

當歸五兩　生薑六兩　桂心三兩　芍藥二兩

右四味切以水酒各三升半煮取二升三合去滓分溫三服之忌生葱

第四產後諸狀無所異但不能食者宜依此方

白朮五兩 生薑六兩

右二味切以水酒各二升緩火煎取一升半分溫二服忌桃李雀肉等

第五產後更無他狀但覺虛弱欲得補氣力兼腹痛宜羊肉當歸湯方

肥羊肉一斤去脂膜 當歸五兩 生薑六兩 黃耆四兩

右四味切以水一斗緩火煮羊肉取八升澄清內藥煮取二升半去滓溫分服若覺惡露下不盡加桂心三兩惡露下多覺有風加芎藭三兩覺有氣加細辛二兩覺有冷加吳茱萸一兩覺有熱加生地黃汁二合

第六產後惡露雖下甚通利遂覺心腹滿悶脅肋脹妨兼欬喘息急不能食飲大便不通眼澀坐起不穩心腹時時痛宜服此方

白朮　當歸　桑白皮　大黄各三兩

生薑四兩　細辛　桂心各二兩

右七味切以水八升煮取二升六合去滓分溫三服此湯當得利利又不宜過多事不獲已所以取微利緣初產舉體皆虛尚藉藥食補之豈宜取利此緣病熱既不可勿以常途此湯得通氣息安貼利脫未即止須斷之取三兩匙酢飲飲之即止適寒溫將攝准忌桃李雀肉生葱生菜

如利後諸候不減宜依後方

當歸十分　白朮八分　甘草炙七分　生薑

桑根白皮各六分　桂心三分　人參三分　細辛四分

右八味擣篩蜜丸桐子大以酒下十五至二十丸忌如常法

第七產後患水痢宜依此方

神麴末五合熬六月六日者　人參四分　枳實炙六分　赤石脂十分

白朮（六分）

右五味擣散飲下方寸匕漸漸加之忌桃李雀肉等

第八產後患血痢宜依此方

艾葉（虎掌者三月三日五月五日者熬） 黃蘗 芍藥

甘草（炙各六分） 阿膠（十七分） 黃連（七分） 地榆（五分）

右七味擣散以飲下方寸匕甚妙忌如常法

第九產後患膿痢宜依此方

附子（炮） 蜀椒（汗） 乾薑（各五分） 甘草（炙六分）

赤石脂 黃耆（各十分） 白朮（七分）

右七味擣散飲服方寸匕加一匕半日再忌猪肉冷水海藻菘菜桃李雀肉等

第十產後諸痢方

取薤白煮食之唯多益好肥羊肉去脂作炙食之

唯多益好以羊腎炒薤白食之良

第十一產後腹內安穩惡露流多少得所但緣產後日淺久坐視聽言語多或運勞力遂覺頭項及百肢節皮肉疼痛乍寒乍熱此是蓐勞宜依此方

猪腎一具去脂 當歸 芍藥 生薑各三兩

桂心一兩 葱白三合

右六味切以水八升緩火煮腎取六升澄清內諸藥煮取二升分溫再服亦可用臘熏汗出即差

第十二產後覺患風手足不多隨和言語不多流利恍惚多忘精神不足宜依此方

獨活三兩 當歸 芍藥 防風

芎藭 玄參各二兩 桂心一兩半

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服如一劑覺安

穩隔三日又服一劑若一兩劑後漸差但須適寒溫將息如未全差即以此方作丸有熱加乾葛五兩有冷加白朮五兩有氣加生薑六兩有痛加當歸芍藥各二兩不能食加人參二兩玄參四兩覺手足不穩加牛膝五加皮萆薢各三兩黃耆四兩丸服忌生葱桃李雀肉等

第十三產後更無餘苦但覺體氣虛宜服此方

當歸　乾地黃各十分　澤蘭八分熬　防風
黃耆　續斷各六分　桂心　人參
地骨皮　芍藥各七分　乾薑十分

右十一味擣末蜜丸桐子大酒下二十丸忌生葱蕪荑

第十四產後不論服藥直爾不宜食諸生冷陳久滑物若服藥彌須將息每方服藥後合䟽忌食法爲欲録其都要不能一一具言諸方有白朮忌桃李細辛忌生葱甘草忌菘菜海藻

枸杞忌狗肉附子黃連忌猪肉桂心忌生葱

第十五産後血氣不多通散當時不甚覺之在蓐雖小不和出則成瘤結少腹疼硬乍寒乍熱食飲不爲肌膚心腹有時刺痛口乾唾粘手足沉重有此狀宜依此方

當歸 芍藥 人參 甘草炙

鬼箭羽 牛膝各五分 牡丹皮六分 白朮六分

桂心 白薇 烏梅熬各四分 大黃八分

虻蟲熬去翅足 水蛭熬各三分 蒲黃三分 朴消

赤石脂各十分 乾地黃七分 虎杖六分

右十九味擣末蜜丸桐子大酒服二十丸日再加二十五丸良忌如常法

第十六産後膿血痢相兼宜依此方

赤石脂 五色龍骨 黃連各十分 阿膠炙

黃耆各六分　黃蘗四分　白朮五分

右七味擣末蜜丸桐子大飲下三十丸散服亦妙如前服法忌桃李猪肉

產後遺糞方三首

廣濟療產後遺糞方

取故鷰巢中草燒末以酒下半錢亦治男子

集驗療產後遺糞方

取礬石燒牡蠣熬各等分下篩酒服方寸日三亦治男子

又療產後遺糞不知出時方

白斂　芍藥各二分

右二味擣爲散以酒服方寸匕

產後陰道開方二首

廣濟療產後陰道開不閉方

取石灰一升熬令能燒草以水二升投灰中適冷煖
入水中坐漬須臾復煖坐如常法用之

集驗療婦人產後冷玉門開不閉硫黃洗方

石硫黃研 蛇牀子各四分 菟絲子五分 吳茱萸六分

右四味擣散以湯一升投方寸匕以洗玉門差止

產後陰下脫方六首

集驗療婦人產後陰下脫方

取蛇牀子一升布裹炙熨之亦療陰中痛

千金療產後陰下脫方

以鐵精粉上推內之

又方

燒人屎末酒服方寸匕日三度

又方

臍下橫文灸二七壯

古今錄驗療產後陰下脫方

蜀椒一升　吴茱萸二升　戎鹽半雞子大

右三味擣以綿裹如半雞子大內陰中日一易二十日愈

又方

鼈頭陰乾二枚　葛根一斤

右二味擣散酒服方寸匕日三

八瘕方一十二首

素女經論婦人八瘕積聚無子斷絕不産令有子受胎養法并曾傷落依月服藥法及陰閉生息肉陰痒生瘡陰痒壘瘡帶下陰子藏不正陰門挺出陰腫堅隱疾方

黄帝問於素女曰吾聞天下婦人産乳有子而病者未曾生子而病者入産乳後而中絕不復産者何也諸病從生而令婦人腹中有積聚肖脅腰背攣而痛久而生八瘕之聚病深可畏不在腸胃療之或者已復其狀寧可得聞之乎對曰婦人之病皆由於月病生産所致又從胞胎所起其病不同鍼

飲食藥不得其方也
黃帝曰安心其要易聞之爲寶受之良久詳思念其事曰善哉療將奈何素女曰誠爲主説婦人胞胎之數皆在陰裏萬物皆從生淵深血脉精氣所從行腎爲陰陰主開閉左爲胞門右爲子户主定月水生子之道胞門主於子精精神氣所出入合於中黃門玉門四邊主持關禁閉子精臍下三寸名曰關元主藏魂魄婦人之胞三焦之府常所從止然婦人經脉俞絡合調則月水如時來至故能生子而無病婦人榮衛經絡斷絶不通其人思惟邪氣便得往來入合於子藏若生惡露未已合陰陽即令婦人經脉攣急令人少腹裏急支滿胷脅腰背相引痛苦四肢酸削飲食不調結牢惡血不陰月水不如時或在前或在後乍久不止因生積聚如懷胎狀邪氣盛甚令人恍惚多夢寒熱四肢不欲時動陰中生氣腫肉生

風甚者小便不利苦痛如淋狀面目黃黑歲月病即不復生子黃帝曰吾深所憂也療之柰何可得愈病令人有子願拜受非其人不敢妄傳何以神良耳素女曰今詳面圖

一曰黃瘕黃瘕者婦人月水始下若新傷墮血氣未止卧寢未定五藏六腑虛羸精神不定因向大風便利陰陽開闔　四

逮中於風濕氣從下上入於陰中稽留不去名爲陰虛則生黃瘕之聚令人病苦四肢寒熱身重淋露卧不欲食左脅下有氣結牢不可得抑苦病腰背相引痛月水不利則善令人不産少腹急下引陰中如刺不得小便或時寒熱下赤黃汁病苦如此令人無子療當刺關元氣衝行以毒藥有法療瘕當下即愈矣

又療黃瘕皂莢散導之方

皂莢一兩炙去皮子　蜀椒一兩汗　細辛六分

右三味擣散以三角囊大如指長二寸貯之取內陰中欲

悶則出之已則復內之惡血畢出乃洗以溫湯三日勿近男子忌生菜等

二曰青瘕青瘕者婦人新生未滿十日起行以湯浣洗太蚤陰陽虛玉門四邊皆解散子户未安定骨肉皆痛手臂不舉飲食未復內藏吸吸又當風卧不自隱蔽若居濕地及濕席令人苦寒洒洒入腹中心腹煩悶沈淖惡血不除結熱不得散則生青瘕之聚在左右脅下藏於背膂上與肩甲腰下攣急兩足腹下有氣起喜唾不可多食四肢不欲動搖恍惚善夢手足腫面目黄大小便難其候月水不通利或不復禁狀如崩中此自過所致令人少子療之當刺胃管行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又療青瘕導藥方

戎鹽一升　皂莢半兩去皮子炙　細辛一兩六銖

右三味擣散以三角囊大如指長三寸貯之內陰中但卧瘕

當下青如葵汁養之如産法

三曰燥瘕燥瘕者婦人月水下惡血未盡其人虛憊而以夏月熱行疾步若舉重移輕汗出交流氣力未平而卒以恚怒致腹中猥咽不泄經脉攣急內結不舒煩滿少力氣上達膈中背膂少腹攣急月水與氣俱不通利而反以飲清快心月水橫流溢入他藏不去有熱則生燥瘕之聚大如半杯上下腹中苦痛在兩脅下上引心而煩害飲食欲嘔吐胷及腹中不得太息腰背重喜臥盜汗足酸削久立而痛小便失時忽然自出若失精月水閉塞大便澀難有此病者令人少子療之以長鍼按而刺之法度行以毒藥瘕當下即愈矣

又療燥瘕方

大黃如雞子許 乾薑二兩 黃連三兩 雞膍胵中黃膜一枚炙

桂心一尺 䗪蟲三枚熬 厚朴十銖炙 郁李人一兩去皮尖熬

右八味擣散早朝空腹以溫酒一盞和三錢匕頓服瘕當下下畢養之如産婦法三月無子者當有三日勿合陰陽

四曰血瘕血瘕者婦人月水新下未滿日數而中止因飲食過度五穀氣盛溢入他藏若大飢寒吸吸不足呼吸未調而自勞動血下走腸胃之間流落不去內有寒熱與月水合會則生血瘕之聚令人腰痛不可以俛仰橫脅下有積氣牢如石少腹裏急苦痛背膂疼腰股下痛陰裏若生子風冷子門僻月水不時乍來乍去有此病者令人無子療之瘕當下即愈矣方闕

崔氏療婦人血瘕痛方

乾薑　烏賊魚骨各一兩炙　桃人一兩去皮尖熬

右三味擣散酒服二方寸匕日二

又方　取古鐵秤鎚或大斧頭或鐵杵以炭火燒令赤投好酒三升中稍稍飲之

又方　桂末溫酒服方寸匕佳日二並出第十下卷中

古今録驗療婦人血瘕攻刺腹脅時痛導藥方

大黄　當歸各半兩　山茱萸一兩　皂莢一兩去皮子炙

細辛　戎鹽各六銖

右六味擣以香脂丸如指大每以綿裹內陰中正坐良久瘕當下養如乳婦之法

五曰脂瘕脂瘕者婦人月水新若生未滿三十日其人未復以合陰陽絡脉分胞門傷子戶失禁關節散五藏六腑津液流行陰道瞤動百脉關樞四解外不見其形子精與血氣相遇犯禁子精化不足成子則生脂瘕之聚令人支滿裏急痛痺引少腹重腰背如刺四肢不舉飲食不甘卧不安席左右走腹中切痛時差時甚或時少氣頭眩身體疼解苦寒惡風膀胱脹月水乍來乍去不如常度大小便血不止有此病者令人

無子療之當刺以長鍼行以毒藥瘕當下即愈矣

又療脂瘕方

皂莢十八銖去皮炙　礬石六銖燒　五味子　蜀椒汗

細辛　乾薑各半兩

右六味擣散以香脂和如大豆著男子陰頭以合陰陽不三行其瘕乃愈

又療婦人絕不復生及未曾生皆以脂瘕腹中有塊以湯煎當下尚不受子導散方

皂莢炙去子皮　吴茱萸　當歸各一兩　蜀椒汗各二兩

細辛熬　礬石燒　五味子各三分　大黃

戎鹽各二兩　乾薑二兩

右十味擣散以輕絹袋如指大長三寸盛藥令滿內陰中坐臥隨意勿行走小便時去之別換新者

六曰狐瘕狐瘕者婦人月水當日數來而反悲哀自恐若以遠行逢暴風疾雨雷電驚恐衣被濕沈罷音疲倦少氣心中恍惚未定四肢懈墮振寒若寤寐脉氣絶精神遊亡邪氣入於陰裏不去則生狐瘕之聚食人子藏令人月水閉不通少腹瘀滯胷脅腰背痛陰中腫小便難胞門子戶不受男精五藏氣盛令人嗜食欲嘔喜唾多所思如有身狀四肢不舉有此病者終身無子其瘕有手足卒成形者殺人未者可療以長鍼急持刺之行以毒藥有法瘕當下即愈矣

又療狐瘕方

取新死鼠一枚裹以新絮塗以黃土穿地坎足沒鼠形置其中桑薪灼其上一日一夜出分去絮內桂心末六銖酒服二方寸匕病當下甚者不過再服差止

七曰蛇瘕蛇瘕者婦人月水已下新止適閉未復胞門子戶勞

動陰陽未平榮衛分行若其中風暴病羸劣飲食未調若起行當風及度泥涂因衝寒大旱若坐濕地名曰陰陽亂腹中虛若遠行道路伏飲汚井之水不潔之食通吞蛇鼠之精流落不去則生蛇瘕之聚上食人之肝心苦病長大條條在臍下上還絞左右脅不得喘息兩股脛間苦疼少腹多熱小便赤黃胱腰引陰中攣急腰背俱痛難以動作喜發寒熱月水或多或少有此病者不復生子其瘕手足成形者殺人未者可治之療有法度行以毒藥瘕當下即愈矣

又療蛇瘕方

大黃　黃芩　芒消各半兩　甘草大如指一尺炙

烏賊魚骨二枚　皂莢六枚去皮子尖

右六味擣以水六升煮之三沸下絞去滓下消適寒溫服之十日一劑空腹服之當下

八曰鼈瘕鼈瘕者婦人月水新至其人劇作罷(音疲)勞汗出衣服潤濕不以時去之若當風睡足踐濕地恍惚覺悟蹠立未安顏色未平復見所好爲開蕩魂魄感動五内脫消若入水浣洗沐浴不以時出而神不守水氣與邪氣俱入至三焦之中又暮出入或門先閉津液妄行留落不去則生鼈瘕之聚大如小柸令人少腹内切痛惡氣左右走上下腹中苦痛若存若亡持之躍手下引陰裏腰背亦痛不可以息月水不通面目黃黑脫聲少氣有此病者令人絶子其瘕有手足成形者殺人未者可治之療有法度以長鍼按療之行以毒藥瘕當下即愈矣

又療鼈瘕方

大黃(六分) 乾薑 側子(各半兩) 附子
人參(各九銖) 䗪蟲(一寸匕熬) 桂心(一兩六銖) 細辛
土瓜(各十八銖) 白朮(一兩)

右十味擣散以酒服方寸匕日三以上八般瘕疾出古今錄驗第三十卷中

肉癥方二首

集驗療婦人臍下結堅大如柸升月經不通寒熱往來下痢羸瘦此爲癥氣不可療未生癥者可療方

生地黃三十斤取汁　乾漆一斤熬

右二味擣漆爲散內地黃汁中微火煎令可丸酒服桐子大三丸至七八丸即止

删繁療女人子門不開血聚腹中生肉癥築築如物此呼爲癥氣藏寒所致生地黃煎破血丸方

生地黃汁一升　生牛膝汁一升　乾漆一斤半熬

右三味擣漆爲散內地黃等汁中攪微火煎取堪丸爲丸止停攪丸如梧子一服三丸以酒服日再若覺腹內過痛食後乃

服之

婦人崩中方一十一首

小品療婦人崩中晝夜十數行醫所不能療方

芎藭八兩

右一味切以酒五升煑取三升分三服不飲酒水煑亦得

千金療崩中方

白茅根二斤 小薊根五斤

右二味切以酒五升煑取四升分稍稍服

又療婦人白崩中方

芎藭 阿膠炙 桂心 赤石脂

小薊根各二兩 乾地黃四兩 伏龍肝雞子許七枚

右七味切以酒六升水四升煑取三升去滓內膠令烊分爲

三服日三並出第四卷中

千金翼療婦人白崩中馬通方

白馬通汁二升　乾地黄四兩　伏龍肝如雞子大七枚　桂心

芎藭　阿膠炙　小薊根　白石脂各二兩

右八味切以酒七升合馬通汁煑取三升去滓内膠令烊分服

日三

又療婦人崩中及痢一日一夜數十起大命欲死多取諸根煎丸

得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多仍合之

過有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得二斛爲佳薔薇根煎方

懸鈎根　薔薇根　柿根　菝葜各一斛

右四味剉合釜中以水淹使上餘四五寸水煑使三分減一去滓

無大釜稍煑如初法都畢會汁煎取可丸丸如梧桐子酒服

十丸日三良並出第八卷中

文仲療婦人崩中漏下去青黄赤白使人無子方

禹餘粮研 赤石脂研 牡蠣熬研 桂心

烏賊魚骨 竈下黃土各等分

右六味爲散以清酒服方寸匕日二服忌生葱

又方

鹿茸炙 當歸各二兩 蒲黃半兩

右三味擣散酒服五分匕日三度

又方

取好書墨爲末二匕若燒露蜂房末三指撮酒服之

又方

常炙猪腎食之並出第九卷中

必効療崩中方

丁香一百顆 好酒一大升

右二味煮取三兩沸去滓頓服

又療婦人崩中無久近悉主之方

伏龍肝一斤先於盆中以水二斗研令碎澄清取一斗

二升用煮諸藥 小薊根 寄生 續斷

地榆　艾葉各三兩　阿膠　當歸
赤石脂研　厚朴各二兩炙　生薑五兩
右十味切以伏龍肝水煑取三升絞去滓分三服忌如常法
崩中去血方一十三首
廣濟療崩中去血日數升方
龍骨研　赤石脂各六分研　烏賊魚骨　牡蠣粉
肉蓯蓉各五兩　龜甲炙　芍藥　續斷各八分
右八味擣散飲服方寸匕日三漸加之加乾地黃十分佳
又療崩中下血不止并主男子卒痢血方
取東南引桃枝三握細剉以水四升煑取一升頓服末
差更服良
删繁療婦人崩中泄血不斷淋瀝連年不絕黃瘕傷損芍藥散方
芍藥四分　牡蠣熬　乾地黃　白朮

乾薑　烏賊魚骨　附子炮　桂心

黃耆　龍骨各八分研

右十味擣散酒服方寸匕良

小品療崩中去血方

春生薊根汁一升溫服之亦可以酒煮隨意用之

又療婦人暴崩中去血不息方

牡蠣熬令赤　兔骨炙各分

右二味擣篩爲散以酒服方寸匕妙

集驗療婦人女子忽暴崩中血不斷或如鵝鴨肝者方

小薊根六兩　阿膠炙　當歸　芎藭

續斷　青竹茹各三兩　竈中黃土綿裹　地榆根各四兩

生地黃八兩　赤馬通汁一升

右十味切以水八升合馬通汁煮取二升半分爲三服未全止服

三四劑後服此丸方

續斷　甘草炙　鹿茸炙　小薊根

丹參各五分　乾地黃十分　芎藭　阿膠炙

青石脂　當歸　地榆各六分　柏葉四分熬

秦牛角䚡炙黃　龜甲各十二分炙令黑

右十四味擣篩蜜丸如桐子以酒服十丸日再加至三十丸忌如常法千金同

千金療婦人崩中去血積時不止起死人方

肥羊肉三斤去脂　乾薑　當歸各三兩　生地黃汁二升

右四味切以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁合藥煮取三升分爲四服尤宜羸瘦之人服妙

又療崩中去血産後餘疾丹參酒方

艾五斤　生地黃　地榆各五斤　丹參五斤　忍冬五斤

右五味合擣之以水清三宿去滓煮取汁以糯米一石釀酒飲服之

又温經湯療崩中去血一斗服之即斷月水過期不來者服之亦佳方

吴茱萸三兩　麥門冬一升去心　半夏八兩　當歸
芎藭　人參　芍藥　牡丹
桂心　阿膠炙　生薑　甘草各二兩炙

右十二味切以水一斗煮取三升分服忌羊肉生葱海藻菘菜等並出第四卷中

千金翼療婦人崩中去血不止薊根酒方

大小薊根各一斤酒一斗漬五宿任意多少服之良

又療婦人崩中下血櫸柳葉湯方

櫸柳葉三斤　麥門冬去心　乾薑各二兩　甘草一兩炙

乾棗十枚擘

右五味切以水一斗煮欅柳葉取八升去滓內藥煮取三升分
三服日三並出第八卷中

救急療崩中下血數斗氣欲絶方

伏龍肝五升 人參二兩 麝香二兩 生薑四兩

右四味切以水一大斗煮土取二升下藥煎取一升半更別
研伏龍肝一雞子許并香內湯中攪令調分服

帶下方一十首

廣濟療帶下病方

芍藥七大兩熬令黃黑爲散以酒服三錢匕

千金療帶下方

枸杞根一斤 生地黃五斤

右二味切以酒一斗煮取五升分爲三服

又方　燒牛角末酒服方寸匕日三

又方　桑耳燒令黑酒服方寸匕日三

又方　豉酒亦佳

又方　燒馬左蹄末酒服方寸匕日三

又方　燒狗頭骨灰亦佳

又方　以水煑甑帶汁服之亦佳並出第四卷中

救急療帶下方

以竈下黃土水和爲泥作彈子丸百枚暴乾以火燒熱㣲以三年酢漬一丸綿裹内玉門中唯深待冷即易之新患者三十丸老久者五十丸餘皆曰知即佳

必効療婦人帶下方

取兎皮燒令煙斷爲末酒服方寸匕妙

婦人虛羸及月病不能食方三首

千金療婦人虛羸短氣胸脅逆滿風氣石斛生地黃煎方

石斛　甘草炙　紫菀各四兩　桂心二兩

生地黃汁　淳酒各八升　茯苓一斤　大黃八兩

麥門冬二升去心　桃人半升去皮尖熬

右十味擣末合盛銅器中加炭火內鹿角膠一斤數攪之得一升次內飴三斤白蜜三升合和調更於銅器中釜湯上煎攪之以生竹抄無令著器攪令盡相得藥成先食酒服如彈丸日

又鍾乳澤蘭丸主婦人久羸瘦四肢百體煩疼臍下結冷不能食面目瘀黑憂恚百病悉主之方

澤蘭九分　芎藭　甘草炙　山茱萸

白芷　牛膝　當歸　署預

藁本各五分　柏子人　人參　乾地黃

麥門冬去心　石膏　石斛各六分　細辛

桂心各四分、蕪荑二分　艾葉三分

右十九味擣篩蜜和丸如桐子大服二十丸加四十九酒下忌如常法

並出第四卷中

救急療婦人月病不調或一月不來或隔月不來或多或少臍下絞痛面色痿黃四體虛吸羸瘦不能食方

當歸　牛膝　桃人去皮尖　牡丹皮

大黃別漬各三兩　芎藭　土瓜根各二兩　芍藥

朴消　桂心各一兩　䗪蟲去翅足熬　水蛭熬各半兩

右十二味切以水九升煮取三升分溫服忌如常法

婦人陰蝕及疳方八首

千金療陰蝕瘡方

當歸二兩　地榆三兩　甘草炙　芎藭

芍藥各二兩

右五味切以水五升煑取二升洗之日三夜一

又方

蒲黄一升　水銀一兩

右二味研之以粉上

又方

肥猪肉三十斤以水三石煑取熟去肉入盆中浸之冷即易不過三兩度並出第三卷中

崔氏療陰蝕洗搨湯方

甘草炙　乾漆熬各一兩　黄芩　乾地黄

芍藥　當歸各二兩　龜甲五兩炙

右七味切以水七升煑取半去滓以綿帛内湯中以搨瘡處良久即易日二度每搨湯可行十里許即裛乾捻取甘濕散薄付瘡上使遍可經半日又以湯搨搨訖如前傅藥其内甘濕散是蚺蛇膽等六味者是在余療甘濕卷中余家婢遇此疾就甘家療不差蝕處作兩瘡深半寸余於㴠子方中檢得此

甘草湯方仍以自處蚺蛇膽散用不經七日瘡乃平復甚効凡救十八人手下即活遇斯疾者請廣流布傳之出第十卷中

又療疳頻用大効方

蚺蛇膽（眞者研） 青木香 石硫黃（研） 鐵精 麝香（各四分） 舊用五月五日蝦蟆（麝香臨時分之多少入用緣麝香辟蛇毒若先以相和蛇膽即無力也）

右六味等分擣篩爲散更細研有患取如三棊子和井花水日再服服訖先令便利了即以後方桃枝熏下部訖然後取散如二棊子內竹管裏深吹入下部中亦日再老小量減其熏法每日一度不用再爲之甚良

又療疳蟲食下部及五藏方

取桃東南枝三七枚輕打頭使散以綿緩纏之又擣石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令末少厚又截一短

竹筒先內下部中仍以所燃藥桃枝熟然熏之並出

第三卷中

文仲療陰蝕欲盡者方

蝦蟆兎屎等分末傅之瘡上良

古今録驗療婦人陰蝕苦中爛傷狼牙湯方

狼牙三兩㕮咀以水四升煮取半升去滓内苦酒如雞子中黃一杯沸湯消夜適寒溫以綿濡湯以瀝瘡中日四五度即愈

肘後療陰中腫痛方

陰中腫痛方四首

灸枳實以熨之

經心録療婦人陰中腫痛不可近者湯洗方

防風三兩　大戟二兩　艾五兩

右三味切以水一斗煑取五升温洗陰中日可三度良

古今録驗療婦人陰腫堅痛礬石散方

礬石二分熬　甘草半分炙　大黄一分

右三味擣篩取棗大綿纒導陰中二十日即愈

又療婦人陰腫苦瘡爛麻黄湯洗之方

麻黄去節　黄連　艾　蛇牀子各二兩

酢梅十枚

右五味切以水一斗煎取五升洗之

陰中瘡方五首

集驗療婦人陰中痛生瘡方

羊脂一斤　當歸　杏人去皮尖　白芷

芎藭各一兩

右五味細切羊脂和置甑中蒸之藥成取如大豆一枚綿裹

藥內陰中日一度
肘後療女子陰中瘡方
末硫黃傅瘡上
又療女子陰中瘡方
杏人燒末　雄黃　礬石燒各二分　麝香半分
右四味和傅之日三度
古今録驗療婦人陰中生瘡黃芩湯洗方
當歸　黃芩　芎藭　大黃
礬石各二分　黃連一分　雄黃二分
右七味切以水五升煑取四升洗瘡日三度
又療婦人陰中生瘡雄黃散方
芎藭　藜蘆　雄黃研　丹砂研
蜀椒汗　細辛　當歸各一分

右七味擣篩散取方寸匕綿裹內陰中又傅外瘡上忌如常法

陰痒方五首

廣濟療苦産門痒無計方

蚺蛇膽研 雄黃研 石硫黃研 朱砂研

峭粉 藜蘆 蕪荑各二分

右七味擣細篩重羅令調以臘月猪脂和如泥取故布作篆子如人指長一寸半以藥塗上內孔中日一易易時宜以猪椒根三兩煑湯洗乾拭內藥佳

崔氏療陰痒痛不可忍方

取蒜隨多少水煑作湯洗之日三

又方

取狼牙蛇牀子煑作湯洗日三

又方

取杏人燒作灰承熱綿裹內陰中良並出第十卷中

經心録療陰痒方

枸杞根一斤水三升煑十沸適寒溫洗之

陰中痒有蟲方六首

千金療人陰蟲瘡方

以肥猪肉十斤以水煑肉令爛去肉以湯令極熱便灌瘡上冷易之

又方

取狼牙兩把以水五升煑取一升洗之日五六度並出第三卷中

崔氏療陰痒似有蟲狀煩悶眞丹散方

眞丹一分研　礬石三分燒研　芎藭四分

右三味爲散以穀囊盛著陰中蟲當死盡

又陰痒有蟲方

取雞肝去脂及熱內陰中蟲當盡死並出第十卷中

古今録驗療陰痒有蟲方

取牛肝截五寸繩頭內陰中半日蟲入肝出之豬肝亦得

又療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白少氣思美食方

用生鯉魚長一尺去頭內取骨擣末熬黃黑以豬脂和以絹袋盛如常法內陰中至痛處即止

陰下脫方四首

廣濟療陰下脫出方

皂莢去皮子炙 半夏洗 大黃 細辛各四分

蛇牀子六分

右五味擣散薄絹袋盛如指大內陰中日二易又以羊脂已煎煑遍塗上以鐵精傳脂上多少令調以火炙布令煖以熨之

研磁石酒服方寸匕日三服

集驗療婦人陰下脫散方

當歸　黄芩　牡蠣熬各二兩　芍藥一兩半

猬皮一兩切熬

右五味擣散酒服方寸匕日三服禁舉重良千金同

千金療陰下脫硫黄散方

硫黄研　烏賊魚骨各二分　五味子三銖

右三味擣散以粉上日三出第三卷中

千金翼療諸婦人陰下脫方

細研礬石酒服方寸匕日三服出第六卷中

陰挺出方三首

廣濟療婦人子藏挺出數痛洗方

蛇牀子一升　酢梅十四枚

右二味以水五升煮取二升半洗痛處日夜十過良

又方

烏頭炮　白及各四分

右二味擣散取方寸匕以綿裹內陰中令入三寸腹內熱即止月一度著明晨仍須更著以止爲度

集驗療婦人陰下挺出方

蜀椒　烏頭　白及各二分

右三味擣篩以方寸匕綿裹內陰中入三寸腹中熱明旦更著差止千金同

女人傷丈夫頭痛方二首

集驗療女人傷於丈夫四體沉重嘘吸頭痛方

生地黄八兩　芍藥五兩　香豉一升　葱白切一升

生薑四兩　甘草二兩炙

右六味切以水七升煮取二升半分三服不得重作慎房事千金同

千金翼療諸婦人傷丈夫若頭痛欲嘔悶桑白皮湯方

桑根白皮半兩 乾薑二累 桂心五寸 大棗二十枚

右四味切以酒一斗煑三四沸去滓分溫服之適衣無令汗出千

金同出第八卷中

交接輙血出痛方二首

千金療女人交接輙血出方

桂心二分 伏龍肝二分

右二味擣末以酒服方寸匕差止出第三卷中

崔氏療合陰陽輙痛不可忍方

黃連六分 牛膝 甘草炙各四分

右三味切以水四升煑取二升洗之日三四度差止出第十卷中

童女交接他物傷方三首

集驗療童女交接陽道違理及他物所傷犯血出流離不止方

取釜底墨斷葫蘆以塗之

又療童女交接陽道違理血出不止方

燒髮井青布末爲粉塗之

又方

割雞冠取血塗之

小戶嫁痛方四首

千金療小戶嫁痛連日方

甘草三分炙　芍藥二分　生薑三分　桂心一分

右四味切以酒二升煮取三沸去滓分溫服之神良出第三卷中

千金翼療小戶嫁痛單行方

牛膝五兩

右一味切以酒三升煮再沸分三服

又療婦人嫁痛單行大黃湯方

大黃三兩

右一味以酒一升煑一沸頓服

又療婦人小戶嫁痛烏賊魚骨散方

烏賊魚骨二枚燒爲屑酒服方寸匕日三並出第八卷中

坐藥方三首

通眞論療婦人子門冷坐藥法

蛇牀子四分 茱萸六分 麝香二銖

右三味擣散蜜丸綿裹如酸棗內之下惡物爲度

近効坐藥主下冷子門痒閉方

吳茱萸 葶藶子熬各二分 蛇牀子三分 無食子一枚

右四味爲散以綿裹如棗許內子宮中令熱爲度

又方

遠志二分 蛇牀子 五味子各四分 乾薑

蓮花葉各三分

右五味擣散以呂中玉泉和兎矢大內陰門中去冷內熱良

夏侯拯錄

婦人欲斷產方四首

小品斷產方

故布方圓一尺燒屑以酒飲服之終身不產千金云蠶子故布

又療姙身欲去之并斷產方

栝樓 桂心各三兩 豉一升

右三味切以水四升煑取一升半分服之

又方

附子二枚擣爲屑以淳苦酒和塗右足去之大良

千金斷產方

油煎水銀一日勿息空肚服棗大一丸永斷不損人

外臺祕要方卷第三十四

鄂兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔

外臺祕要方

三十五

小兒諸疾上

外臺祕要方卷第三十五 小兒諸疾上三十六門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞撿院上護軍臣林 億 等上進

小兒方序例論一首

千金論曰夫生民之道莫不以養小爲大若無小卒不成大故易稱積小以成高大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義即是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人小兒後丈夫耆老者則是崇本之義也小兒氣勢微弱醫人欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之内乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜而言之可爲太息者矣小品方云凡人年六歲以上爲小十六以上爲少三十以上爲壯五十以上爲老其六歲以下經所不載所以乳下嬰兒有病難療者皆爲無所承據也中古有巫妨者立小兒顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心於少

小詳其方意不甚深細小有可採未爲至秘今博撰諸家及自經用有効者爲上下兩卷可披而尋之凡百居家皆宜達兹養小之術則無夭橫之禍也出第五卷中

小兒初生將護法一十七首

崔氏療小兒亦生便以綿裹指拭口中及舌上青泥惡血此爲之玉衡（一作衡）若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣

又療兒生落地不作聲方

取煖水一器灌之須臾自當啼

又兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發

又方

以葱白徐徐鞭之即啼

又方

小兒亦生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹內雷鳴乃先浴之然後速斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼將暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶當令長至兒足趺上短即中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中若有蟲宜急剔撥去之不爾當入兒腹成疾矣

又兒中水及中冷則令兒腹中絞痛夭糾啼呼面青黑此是中水之過兒尿清（一云糞青）者冷也與兒臍中水即同方

當灸粉絮熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯若輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者但擣當歸末和胡粉傅之仍灸絮日日熨之至百日乃愈以啼呼止爲候

又兒初生法

宜用父故衣裹之若生女宜以母故衣勿用新帛切須依之令兒長壽

又一晬之内兒衣皆須用故綿帛爲之善兒衣綿帛特忌厚熱愼之愼之

又兒洗浴斷臍訖袝抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯取甘草可中指一節搥碎以水二合煑取一合以綿纏沾取與兒吮之可得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胷中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如飢渴須臾復與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止得吐去惡汁令兒心神智惠無病也吮一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與之乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也

又小兒初生三日中須與朱蜜只不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變噤痓而死也與朱蜜法

以眞經飛鍊朱如大豆以赤蜜一蜆殼和之以綿纏沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也亦勿過過此則傷兒與朱蜜訖可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以大豆粒多與嗍之嗍三豆許止日三與之滿七日乃可與哺也

又兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得依此法當用意少少增之若至三十日而哺者令兒無病兒若早哺之及多者令兒頭面身體喜生瘡愈而復發令兒尫弱難長乳兒不用太

飽飽則令吐候兒吐者乳大飽也當以空乳乳之即
消夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令兒欬痢乳
母竒兒當先以手按散其熱氣勿令乳汁奔出以令
兒噎如噎即便奪其乳令得氣息定復乳之如是十
反五反視兒肌飽以節度之一日之中幾乳而足以
爲常準又常捉去宿乳也乳母與兒卧當以臂與兒
枕之使乳與兒頭平乃可乳之令兒不噎毋欲睡即
奪去其乳勿令填兒鼻納乳不知飢飽忌之

又兒初生著口噤不開不收乳方

赤足蜈蚣半枚去足炙令焦末研之絹篩以豬乳二
合和之分三四服與之差

又兒著口噤體熱者方

煖竹瀝二合分四五服之

又兒新生慎不可逆灸灸之忍痛動其五脉因喜成癎是以田
舍小兒任其自然皆無此夭也

又兒初生有鵝口者其舌上有白屑如米劇者鼻外亦有療之法
以髮纏筋頭沾井花水撩拭之三旦如此便去不者
可煑粟荍汁令濃以綿纏筋頭沾拭之無粟荍煑粟
木皮如井花水法千金同並出第十上卷中

文仲療兒生有連舌舌下有膜如石榴子中隔連其舌下微微
喜令兒語不發不轉法
以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作
末以傅之即止千金同

又兒初生六七日後血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若
喉裏舌上有物如蘆蘀盛水狀者若懸癰有脹起者以綿纏長
針留刃處如粟米許大以刺決之令氣洩去青黃赤血汁也一

刺之止消息一日若不消又刺之不過三刺自消或餘小小未消三刺之亦止自然消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒齗上者名重齗皆刺之去血汁差止千金同

又療兒初生出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉耳其血阻（一作沮）敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃而啼（一作不啼）閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是血脉不斂也喜不育如此者宜與龍膽湯方在客忤部中十味者是也千金同

兒初生將息法二首

千金兒初生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃

又小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣

之勿用新綿也天和暖無風之時令母將於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏於幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日軟脆不堪風寒也出第五卷中

小兒初受氣論一首

崔氏論曰凡小兒初受氣在娠一月結胚二月作胎三月有血脉四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月藏腑具九月穀氣入胃十月百神能備而生矣生後六十日目瞳子成能咲應和人百五十日任脉生能反覆百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日髕骨成能獨倚三百六十日爲一朞膝骨成乃能行此其定法若有不依期者必有不平之處

小兒變蒸論二首

崔氏小兒生三十二日一變六十四日再變兼蒸九十六日三變百二十八日四變又蒸百六十日五變百九十二日六變又蒸二百二十四日七變二百五十六日八變又蒸二百八十八日九變三百二十日十變又蒸此小變蒸畢也後六十四日又蒸蒸後六十四日又一大蒸蒸後百二十八日又一大蒸此大小蒸都畢也凡五百七十六日乃成人所以變蒸者皆是榮其血脉改其五藏故一變畢輒覺情態忽有異也其變蒸之候令身熱脉亂汗出目睛不明微似欲驚不乳哺上脣頭小白泡起如珠子耳冷尻亦冷此其診也單變小微兼蒸小劇先期四五日便發發後亦四五日歇凡蒸平者五日而衰遠至七日九日而衰當變蒸之時慎不可療及灸刺但和視之若良久熱不已可微與紫丸熱歇便止若於變蒸中加以天行温病或非變蒸而得天行者其診皆相似唯耳及尻通熱口上無白泡耳當

先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當歇便就差若猶不都除乃與紫丸下之其間節度甚多恐悠悠不能備行今略疏其經要者如此

又黑散方

麻黃一分去節　大黃一分　杏人二分去皮尖熬令變色

右三味先擣麻黃大黃爲散杏人别擣如脂乃細細内散又擣令調和訖内密器中一月兒服如小豆大一枚以乳汁和服之抱令得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之爲度

又紫丸方

代赭　赤石脂各一兩　巴豆三十枚去心皮熬　杏人五十枚去尖皮熬

右四味擣代赭等二味爲末巴豆杏人别擣如膏又内二味合擣三千杵自相和若硬入少蜜更擣密器中盛封之三十

日兒服如麻子一丸與少乳汁令下喉食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減也小兒夏月多熱喜令發疿二三十日輒一服甚佳此丸無所不治代赭須真者若不真以左顧牡蠣代之忌豬肉蘆笋並出第十上卷中

相兒命長短法并論二十九首

千金翼兒生枕骨不成者能言而死　膝骨不成者能倨而死　掌骨不成者能匍匐而死　踵骨不成者能行而死　臏骨不成者能立而死　身生不收者死　魚口者死　股間無生肉者死　頤下破者死　陰不起者死　囊下白者死赤者死

相法甚慱略述十數條而已

兒初生陰大而與身色同者成人　兒初生額上有旋毛早貴

妨父母　兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽
兒初生汗血者多厄不壽　兒初生目視不正數動者大非佳人
兒初生自開目者不成人　兒初生通身軟弱如無骨者不成
人　兒初生髮稀少者不聽人　兒初生臍小者不壽
兒初生早坐早行早語早齒生惡性者非佳人　兒初生頭四
破者不成人　兒初生頭毛不周匝者不成人　啼聲散不成人
啼聲深不成人　汗不流不成人　小便凝如脂膏不成人
常摇手足者不成人
無此狀候者皆成人
兒初生臍中無血者好勿下縫通達黑者壽鮮白長大者壽
論曰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其夭壽兒
小時識悟通敏過人者多夭則項託顏回之流是也小兒骨法
成就威儀迴轉遲舒稍費人精神彫琢者壽其預知人意迴旋

敏[illegible]矣則楊脩孔融之徒是也由此觀之夭壽大畧可知
[illegible]梅花早發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事是晚成就者
[illegible]死也並出第十一卷中

小兒藏衣法五首

崔氏凡藏兒衣法

兒衣先以清水洗之勿令沙土草污又以清酒洗之仍內錢一文在衣中盛於新瓶內以青帛裹之其瓶口上仍密蓋頭且置便宜處待滿三日然後依月吉地向陽高燥之處入地三尺埋之瓶上土厚一尺七寸唯須牢築令兒長壽有智惠若藏衣不謹爲豬狗所食者令兒癲狂蟲蟻食者令兒病惡瘡犬鳥食之令兒兵死近社廟傍者令兒見鬼近深水洿池令兒溺死近故竈傍令兒驚惕近井傍者令兒病聾盲棄

道路街巷者令兒絕嗣無子當門戶者令兒聲不出耳聾著水流下者令兒青盲棄於火裏者令兒生爛瘡著林木頭者令兒自絞死如此之忌皆須慎之

又安產婦及藏衣天德月空法

正月天德在丁月空在丙壬 二月天德在坤月空在甲庚 三月天德在壬月空在丙壬 四月天德在辛月空在甲庚

五月天德在乾月空在丙壬 六月天德在甲月空在甲庚 七月天德在癸月空在丙壬 八月天德在艮月空在甲庚

九月天德在丙月空在丙壬 十月天德在乙月空在甲庚 十一月天德在巽月空在丙壬 十二月天德在庚月空在甲庚

凡藏兒衣皆依此法天德月空處埋之若有遇反支者宜以衣內新瓶盛密封塞口挂於宅外福德之上向陽高燥之處待過月然後依法埋藏之大吉

又法

甲寅旬日十日不得藏埋兒衣以瓶盛密封安置空處度十日即藏埋之

又法

甲辰乙巳丙午丁未戊申此五日亦不藏兒衣還盛瓶中密塞勿令氣通挂著兒生處過此五日即埋之亦不得更過此日

又法

甲乙日生兒丙丁日藏衣吉丙丁日生兒戊巳日藏衣吉戊巳日生兒庚辛日藏衣吉庚辛日生兒壬癸日藏衣吉並出第十上卷中

浴兒法一十一首

崔氏初生浴兒良日此謂初生浴兒以後重浴亦吉寅夘酉日大吉壬午丁未癸巳日凶

又浴兒虎頭骨湯主辟除惡氣兼令兒不驚不患諸瘡疥方

虎頭骨五大兩無頭身骨亦得碎　苦參四兩　白芷三兩

右三味切以水一斗煮爲湯内豬膽汁少許適寒溫以浴兒良

又療兒若卒客忤中人吐下不乳哺面青黃色變弦急者以浴之方

取錢七十文以水三斗煮令有味適寒溫浴兒良

又療兒生三日浴除瘡方

桃根　李根　梅根各八兩

右三味切以意著水多少煮令三四沸以浴兒

又療少小卒寒熱不佳不能服藥六物莽草湯浴兒方

莽草　丹參　蛇牀子　桂心各三兩

昌蒲半斤　雷丸一斤

右六味㕮咀以水三斗煮三五沸適寒溫浴兒避日向陰處

又療少小身熱一物李葉湯方

李葉無多少以水煮去滓以浴兒良忌準前

又方　白芷煎湯浴兒佳根苗皆得

又方　苦參湯浴兒良

又凡尋常浴兒不縁别療諸病只就浴者方

湯熟添少許清漿水一捻鹽浴兒浴訖以粉摩兒

既不畏風又引散諸氣

又兒不用數浴數浴多背冷令兒發癇其湯必適寒温得所

又療少小壯熱不能服藥冝此十二物寒水石粉散方

寒水石　芒消　滑石　石膏

赤石脂　青木香　甘草炙　大黄

黄芩　芎藭　麻黄去節　牡蠣熬

右藥各等分擣篩以粉一升和藥屑三合復下篩以粉粉兒

日三熱退即止本方有防風無牡蠣

又少小盗汗三物黄連粉方

黃連　牡蠣熬　貝母

右藥各等分擣篩以粉粉兒良出第十上卷中

剃兒頭法一首

崔氏初剃兒頭良日寅丑日吉丁未日凶

哺兒法三首

崔氏初哺兒良日以平定成日大吉其哺不得令鹹

又方寅丑辰己酉日良

又方男戊己日不得女丙丁日不得

攘謝法一十二首

崔氏軒轅者乾坤天丞相使者風伯犯之令兒驚吐可取梨枝六寸埋生處大吉

雷公者震神太陰使者天馬犯之令兒煩悶腹滿解之以三屠家肉為餅於產處謝之大吉

咸池者坎神天之雨師使者犯之令兒啼不止用羊脯酒於生處謝之吉

豐隆者艮神天之東明使者天僕也害氣犯之令兒乍寒乍熱大腹以白魚二枚於生處謝之又大豆一升投井中亦大吉

招揺者坤神天上使者犯之令兒驚空嚼不止以酒餅生處謝之即愈

天候者巽神天一執法使者犯之令兒腹脹張眼以白魚二枚於生處謝之吉

昊時者离神天一將軍遊擊使者犯之令兒驚腹痛用馬脯五寸於生處謝之吉又以白魚五枚并棗餅埋其生處吉

大時者兊神小時北斗使者犯之令兒腹脹下痢解之以酒脯於生處謝之又以大豆一升投井中吉

犯月殺者令兒驚啼用丹雄雞血於生處謝之吉

犯白虎者用稻米一升雞子三枚於生處謝之吉黍米亦得

犯大夫者用羊肝三枚及稻米一升於生處謝之吉又用雞𦙶羊脾黍米亦得

犯日遊者令兒口噤色變欲死者用三屠家肉麥餅於生處謝之吉

揀乳母法一首

崔氏乳母者其血氣爲乳汁也五情善惡悉血氣所生其乳兒者皆須性情知善形色不惡相貌稍通者若求全備不可得也但取不孤臭癭瘻氣嗽𤸷疥癡瘙白秃癧瘍瀋脣耳聾齆鼻癲癇無此等疾者便可飲兒師見其身上舊灸瘢即知其先有

所疾切須慎耳

小兒驚癇啼壯熱不喫妳吐不已不小便方五首

劉氏療小兒眠睡不安驚啼不喫妳虎睛丸方小兒熱甚神効

犀角十二分屑　子芩五分　梔子人　大黃各十分

虎睛一枚研

右五味擣篩蜜和如梧子大每服七丸大小量之妳母忌熱麪小兒熱風癇以乳汁或竹瀝研三丸服之漸增以差爲度小兒百日以下蓐内壯熱以妳汁研四丸與服即差

又療小兒初生不喫妳方

以乳兩合葱白一寸和煎一兩沸去葱與喫即能喫乳立效以蛤蜅灌之

又療小兒喫妳不穩三日至七日以來覺壯熱顏色赤及鼻孔黃即恐作撮口及孩子牙關裏有蟲似蝸牛亦似黃頭白蜂螺

者方

燒竹取瀝半合和少許牛黃與喫即差又以豬肉拭口即引蟲出或自消便差

又療小兒初生吐不止方

人乳二合　蘧蒢篾少許　鹽兩粟米大

右三味煎三兩沸牛黃兩米許研和與服即差止

又小兒初生不小便方

人乳四合　葱白一寸

右二味相和煎分爲四服即小便利神效

小兒將息衣裳厚薄致生諸癇及諸疾方并灸法二十八首

廣濟療小兒驚癇體羸不堪療子母五癇煎方

鈎藤二分　知母　子芩各四分　甘草炙

升麻　沙參各三分　寒水石六分　蚱蟬一枚去翅炙

蜣蜋三枚炙

右九味擣篩以好蜜和薄泔著銅鉢於沸湯上調之攪不停手如飴糖煎成稍稍別出少許一日兒啗之一枚棗核大日夜五六過服不妨五六日兒啗之三枚一百日兒啗四枚二百日兒至三百日兒啗五枚三歲兒啗七枚以意量之

小品云玄中記曰天下有女鳥一名姑獲又名鈞星鬼也喜以陰雨夜過飛鳴徘徊人村里喚得來也是鳥淳雌無雄不產喜落毛羽於中庭置入兒衣中便使兒作癇必死即化為其兒也是以小兒生至十歲衣裳不可露七八月尤忌之

千金夫癇病小兒之惡病也或有不及求醫而致困者然氣發於內必先有候常宜審察其精神而采其候也手白肉魚際脉累者是癇候魚際脉赤者熱脉青大者寒青細者為平也

又鼻口乾燥大小便不利是癎候　又眼不明上視喜陽是癎候　又耳後完骨上有青絡盛臥不靜是癎候脉青大刺之令血出　又小兒髮逆上啼哭面暗色不變是癎候　又鼻口青時小驚是癎候　又意氣下而妄怒是癎候　又身熱小便難是癎候　又吐痢不止厥痛時起是癎候　又身熱目時直視是癎候　又目閉青時小驚是癎候　又咽乳不利是癎候　又身熱頭常汗出是癎候　又目瞳子卒大黑於常時是癎候　又身熱吐晛而喘是癎候　又喜欠目上視是癎候　又臥惕惕而驚手足振搖是癎候　又身熱目視不精是癎候　又臥夢笑手足動搖是癎候　又弄舌搖頭是癎候

以上諸候二十條皆癎之初也見其候便當爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足脉絕亦依方與湯

又直視瞳子動　腹滿轉鳴　下血身熱　口噤不得乳　反張脊強　汗出發熱　爲臥不悟　手足掣瘲喜驚凡八候癎之劇也如此非復湯爪所能救便當時灸之妙

又小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解愼不可鍼灸爪之動其百脉仍因驚成癎也惟陰癎噤痙可鍼灸爪之凡灸癎當先下兒使虛乃承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人也

又癎平旦發者在足少陽　黃昏發者在足太陰　日中發者在足太陽　夜半發者在足少陰　人定發者在足陽明　晨朝發者在足厥陰

右癎發時節病所在視其發早晚灸其所也

又五藏之癎六畜之癎或在四肢或在腹内審察其候隨病所在灸之雖少必差若失其要則爲害也

肝癎之爲病面青目反視手足揺灸陽明太陰各三炷

心癎之爲病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二肋端宛宛中此爲巨闕也又灸手心主及少陰各三炷

脾癎之爲病面黃腹大泄痢灸胃管三壯俠胃管傍各二壯足陽明太陰各二炷

肺癎之爲病面目白口沫出灸肝兪二壯灸太陰二炷

腎癎之爲病面黑正直視不揺如尸狀灸心下二寸二分三壯又灸肘下動脉各二壯

膈癎之爲病目反四肢不舉灸風府又灸頂上鼻人中下脣承漿皆隨年壯

腸癇之為病不動揺灸兩承山又灸足心兩手勞宮又灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中可五十壯

右五藏癇證候

又馬癇之為病張口揺頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服

牛癇之為病目正直視腹脹灸鳩尾上及大椎各三壯燒牛蹄灰末服

雞癇之為病延頸反折喜驚自揺灸足諸陽各三壯

羊癇之為病喜揚目吐舌灸大椎上三壯

豬癇之為病喜吐沫灸完骨兩傍各一寸七壯

犬癇之為病手屈拳攣灸兩手心一壯灸足太陽各一壯灸肋戶兩腳頭兩穴各一壯良

右六畜癇證候

凡諸反張大人脊下容側手小兒容三指者不可療也又若目反上視瞳子動當灸顖中取之法横度口盡兩吻際又横度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在顖上未合骨中隨手動者是此最要處也次灸當額上入髮際二分許直望鼻為正也次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許次灸頂上迴毛中次灸客主人穴在眉後際動脉是也次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷中是也次灸兩耳上捲耳取之一法當捲耳上頭是也一法大人當耳上横三指小小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可以鍼刺令血出

次灸玉枕項後高骨是也 次灸兩風池穴在項後兩轅筋外髮際陷中是也 次灸風府當項中髮際亦可與風池三處高下相等 次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也

右頭部凡二十九處兒生十日可灸三壯三十日灸五壯五十日灸七壯病重者具灸之輕者唯灸顖中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷無益也

又若腹滿短氣轉鳴灸肺募穴在兩乳上第二肋間宛宛中垂繩取之當瞳子是也 次灸膻中 次灸胷堂 次灸臍中 次灸薜息穴薜息在兩乳下第二肋間宛宛中是也 次灸巨闕穴巨闕大人鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去心鳩尾下一寸是也并灸兩邊 次灸胃管 次灸金門穴金門在穀道前囊之後當中央是也從陰囊下度至大孔前中分之

右腹部一十二處胷堂巨闕胃管十日兒三炷一月以上可五炷陰下縫三炷或云隨年壯以灸之

又若脊強反張灸大椎并灸諸藏俞及督脊上當中央從大椎度至窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也

右背部一十二處十日兒灸三壯一月以上灸五壯

又若手足掣瘲驚者灸赤澤 次灸陽明 次灸少商 次灸勞言 次灸心主 次灸宮谷

次灸三間穴 次灸少陽

右手部一十六處其要者陽明少陽心主尺澤合谷少商也

壯數如上

又灸伏兔 次灸三里 次灸腓陽 次灸鹿溪 次灸陽明 次灸少陽 次灸然谷

右足部一十四處皆要可灸如上壯數手足陽明謂人四指

凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣瘲者盡灸手足十指端又灸本節後

又論曰若病家始發便來告師師可訴候所解爲法作次序療之以其節度首尾取差也病家已經雜療無次序不得制病病則變異其本候後師便不知其前證虛實直依其後證作療亦不得差也要應精問察之爲前師貫首所配依取其前蹤續以爲療乃無逆耳前師處湯本應數劑乃差而病家服

一兩劑求効便謂不驗已後更問他師師不尋前人爲療寒温
次序而更爲療而不依次前師療則斃也或前已下之後須平
和療以接之而得差也或前人未下之或不去者或前療寒温
失度後人應調理之是爲療敗病皆須邀射之然後免耳不依
次第及不審察必反重斃也又茵芋丸療少小有風癇疹至長
不除或遇天陰節變便發動食飲堅強亦發百脉攣縮行步不
正言語不便者服之不發方

茵芋葉炙　鉛丹熬　鈎藤皮炙　杜蘅

防葵　石膏研　秦艽各四分　昌蒲

黄芩各六分　松蘿二分　蜣蜋十枚炙　甘草十四分炙

右十二味擣篩丸如小豆三歲以下服五丸三歲以上服七

丸五歲以上服十丸十歲可至十五丸大小量之

又神農本草經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常

便是癇候也初出胎血脉不斂五藏未成稍將養失宜即爲病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寛唯中風最暴卒也又小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇

又凡小兒不能乳哺當與紫丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益及變蒸日滿不解者並宜龍膽湯也方在客忤中若不時下則成大病病成則難療矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏風癇亦當下之然以豬心湯下之驚癇但按圖炙之及摩膏不可大下也何者驚癇心氣不定下之内虛益令甚耳驚癇甚者特爲難治如養小常慎驚勿令兒聞大聲抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時便掩塞兒耳井作餘細聲以亂之

凡養小兒皆微驚以長血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六十日灸者驚復重甚生百日後灸驚脉乃善

治少小心腹熱除熱丹參赤膏方

丹參　雷丸　芒消　戎鹽

大黃各三兩

右五味切以苦酒半升浸四種一宿以成鍊豬脂一斤煎三上三下去滓內芒消膏成以摩心下冬夏可用一方但參丹雷丸亦佳並出第五卷中

千金翼凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時時有耳十人之中未有一二是食癇者凡是先寒後熱發癇者皆是食癇也驚癇當按圖灸之風癇當與豚心湯下之食癇當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作此風癇也驚癇

者起於驚怖先啼乃發作此驚癇也驚癇微者急療勿復驚之或自止也其先不哺乳吐變熱後發癇此食癇也早下則差四味紫丸逐澼飲最良去病速而不虛人赤丸差駃病重者當用之

小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從小起常令大便稀勿使大下也稀後便漸減之矢不酢臭乃止藥

又凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下後腹中當小脹滿故當節哺乳將紫丸數日又乳哺小兒常令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥停哺但與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是澼為重要當下之無不差者不下則致寒熱或反吐而發癇或更致下痢此皆病重不早下之

所爲也此爲難療
又凡小兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此癇之初也服紫丸便愈不差更服之兒立夏後有病療之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又臍中以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之
又凡小兒矢黃而臭者此腹中有熱宜微將服龍膽湯若白而酢者此寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者小增令小下皆須節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷矣並出第十一卷中
備急療少小百二十種癇病肖中病蛇蛻皮湯方
蛇蛻皮三寸炙　細辛　甘草炙　鈎藤
黃耆各二分　大黃四分　蚱蟬四枚炙　牛黃五大豆許
右八味切以水二升半煮取一升一合百日兒一服二合甚良

若窮地無藥物可一二味亦合不可備用然大黄一味不得闕常用效

又療少小二十五癎大黄湯方

甘草炙　大黄　甘皮　當歸各一兩

細辛半兩

右五味擣篩以指撮著水一升煑取二合一歲兒服一合日二

古今録驗赤湯療二十五種癎吐痢寒熱百病不乳哺方

大黄五兩　當歸　芍藥　黄芩

栝樓　甘草炙　桂心　人參

赤石脂　牡蠣熬　紫石英　麻黄去節各二兩

右十二味擣篩令調盛以韋囊八歲兒以乾棗五枚用水八合煑棗取五合兩指撮藥入湯中煑取三沸去滓與兒服之取利微汗自除十歲用棗十枚三指撮藥水一升煑三沸服

之此湯療小兒百病及癇神驗

又療未滿月及出月兒壯熱發癇鈎藤湯方

鈎藤一分　蚱蟬一枚去翅熬末湯成下　柴胡　升麻

黃芩各二分　蛇脫皮二寸炙　甘草炙　大黃各二分

竹瀝三合　石膏三分碎

右十味切以水一升煑取三合半和竹瀝服一合得利見湯色出停後服至五十六十日兒一服一合乳母忌海藻菘菜等

崔氏云若連發不醒加麻黃一分去節

又療百日及過百日兒發癇連發不醒及胎中帶風體冷面青反張宜服麻黃五癇湯方

麻黃去節　羌活　乾葛　甘草炙

枳實各二分炙　杏人二十枚去皮尖碎　升麻　黃芩去腸

大黃各四分　柴胡　芍藥各三分　鈎藤皮一分

蛇蛻三寸炙　蚱蟬二枚去羽炙　石膏六分碎

右十五味切以水二升并竹瀝五合煎取六合每服一合佳

小兒驚悸方二首

必效鈎藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出方

鈎藤　人參　蚱蟬炙　子芩各一分

蛇蛻皮三寸炙　龍齒四分碎　防風　澤瀉各二分

石膏一兩碎　竹瀝三合

右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差爲度

又方

茯神　蚱蟬炙各二分　龍齒碎　麥門冬去心各四分

人參三分　鈎藤一分　牛黃兩大豆許研　杏人十二枚去皮尖碎

蛇蛻皮三寸炙末入

右九味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息

服之令盡差

小兒夜啼方一十首

小品療小兒夜啼一物前胡丸方

前胡（隨多少）

右一味擣篩蜜丸如大豆服一丸日三加至五六丸以差爲度千金同

又方

以妊娠時食飲偏有所思者以哺兒則愈千金同

千金療小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼糞中骨燒作灰水服如黍米粒一枚即定

又療小兒夜啼至明不安寐芎藭散方

芎藭　防已　白朮（各二分）

右三味擣篩以乳和之與兒服之量多少又以兒母手掩臍

中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和之
服如麻子一丸

又方

交道中土 伏龍肝各一把

右二味以絹篩水和少許服之差

又方

取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止並出第五卷中

備急或常好啼方

取犬頭下毛以絳囊盛繫兒兩手立効

必効小兒夜啼方

以日未出時及日午時仰卧著於臍上橫文屏氣以

朱書作血字其夜即斷聲効

古今錄驗小兒夜啼如腹痛方

䗪蟲熬令煙盡 芍藥炙 芎藭熬各等分

右三味擣末服如刀圭日三以乳服之

又療小兒夜啼不止腹中痛宜以乳頭散方

黃耆 甘草炙 當歸 芍藥

附子炮 乾薑各等分

右六味爲散以乳頭飲兒丸可胡豆三丸大小量之

小兒驚夜啼方七首

廣濟療小兒五驚夜啼龍角丸方

龍角 黃芩 大黃各二分 牡丹皮一分

蚱蟬一枚炙 牛黃小豆大五枚

右六味擣篩蜜和丸如麻子少小以意增減之甚良千金牡丹作牡蠣崔氏名五驚丸

千金療小兒驚啼方

以雞屎白熬末以乳服少許

又方　以臘月縛豬繩燒灰服之

又方　燒猬皮三寸灰著乳頭飲兒

又方　車轄脂如小豆許內口中及臍中差

又小兒因宿乳不消腹痛驚啼牛黃丸方

大附子二枚炮去皮　牛黃三銖　巴豆去心皮熬　杏人去尖皮熬別擣

眞珠各一兩研

右五味擣附子眞珠下篩別擣巴豆杏人令如膏內附子及牛黃擣一千二百杵若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之隔上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服

並出第五卷中

文仲隱居效方小兒夜啼不安此腹痛故至夜輒劇狀似鬼禍

五味子湯方

五味子 當歸 芍藥 白朮各四分

甘草炙 桂心各二分

右六味切以水一升煎取五合分服之增減量之

小兒客忤一十首

千金論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人爲客忤也雖是家人或別房異户或乳母父母從外還衣服或經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆爲忤也發作喘息乳氣未定者皆爲客忤其乳母遇醉及房勞後乳兒最劇能殺兒也不可不慎

又論曰凡中客之爲病皆頻吐下青黃白色水穀解離腹痛夭糺面色變易其侯似癇但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍膽湯下之

又龍膽湯療嬰兒出腹血脉盛實熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例若必知客忤及有魅氣者可加人參當歸各如龍膽秤分多少也一百日兒加半分二百日兒加一分一歲兒加半兩餘藥皆準爾

龍膽　鈎藤皮　柴胡　黃芩

桔梗　芍藥　茯神　甘草炙各一分

蜣蜋炙二分　大黃四分

右十味切以水一升煎取五合爲劑也服之如後節度藥有虛實虛藥宜足數合水也兒生一日至七日分取一合爲三服生八日至十五日分取一合半爲三服生十六日至二十餘日至四十日者盡以五合爲三服十歲亦準此得下即止勿復

服也

又少小卒客忤不知人者方

取新熱馬屎一枚絞取汁飲兒下便愈亦治中客忤而嘔啼面青腹強者

又少小見人來卒不往腹中作聲者二物燒髮散方

用向來者人頭上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細末和乳飲兒即差

又少小中忤人一物馬通浴湯方

用馬通三升火燒令煙盡以酒一斗煑三沸去滓以浴兒即差

又凡乘馬行還得汗氣臭又未盥洗易衣裝而便向兒邊令兒中馬客忤兒忽卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令兒中馬汗氣及客忤愼護之持重一歲兒也一云護之持黑中

又凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之法諸有從外來人及有異物入户當將兒迴避之勿令見也若不避者即燒牛糞令有煙氣置户前則善

又方

吞麝香如大豆許立愈

又療少小客忤二物黃土塗頭方

以竈中黃土熟者曲蟮糞等分合擣如雞子黃大塗兒頭上及五心良（一方雞子清和如泥）

又療小兒犯客忤發作有時方

取母月衣覆兒上大良

又療卒客忤方

剪取驢前膊胛上旋毛大如彈丸以乳汁煎之令毛消藥成著孔頭飲之下喉即愈

又療小兒卒客忤方

銅鑑鼻燒令赤投少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含與之即愈並出第五卷中

小兒癥瘕癖方六首

廣濟療少小及大人腹中宿食積成癥癖兩脅妨滿氣息喘急不能食面黃日漸瘦腹大脹硬除百病紫雙丸方

代赭研 丹砂研 大黃各八分 青木香

當歸各五分 桂心四分 犀角三分屑 巴豆六分去心皮別擣

右八味擣篩蜜和丸如梧子大大人小兒量之十歲兒服大豆二丸六歲者小豆許二丸以下臨時斟酌要瀉病出爲度久疾日一丸以漕洩而已不在猛瀉忌如常法

又療小兒痃癖發腹痛不食黃瘦鼈甲丸方

鼈甲炙 郁李人各八分 防葵 人參各五分

訶黎勒七顆皮 大黃四分 桑菌三分

右七味擣篩蜜丸大小量之以酒飲乳服五丸至十丸

千金牛黃鼈甲丸療小兒癖實癰腫壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃二分　鼈甲炙　麥麴熬　柴胡

大黃　枳實炙　芎藭各一兩　厚朴炙

茯苓　桂心　芍藥　乾薑各半兩

右十二味擣篩蜜丸如小豆日三服以意量之

又療小兒心下生痞淡澼結聚腹大服滿身體壯熱不欲哺乳芫花丸方

芫花　黃芩各四分　大黃　雄黃細研各十銖

右四味擣篩為末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲以下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避良

又療小兒痰實結聚宿癖羸露瘦不能飲眞珠丸方

眞珠半兩研 麥門冬一兩去心 蕤人五十枚一云二百箇 巴豆七枚去心皮熬一云四十枚

右四味擣篩蜜和丸朞歲兒服二丸小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知爲度當下病赤黃白黑葵汁勿絕藥病盡下自止又服令小兒肥白無病已試驗並出第五卷中

劉氏療小兒冷癖痃癖氣不下食瘦時時脅下痛方

防葵 當歸 枳實炙 厚朴炙

楮實 人參 黃耆 茯神

白朮 訶黎勒皮各八分 牛膝 郁李人去皮

柴胡 大麻人 芍藥 橘皮

防風 紫菀洗去土 薏苡人各六分 鼈甲炙

三棱根各十二分 桂心七分 仙鼠二枚如無以糞二合代 大附子二枚炮

乾薑末二分 甘草炙 乾地黃各十分 大黃十分

五味子四分　檳榔人四顆

右三十味擣篩蜜丸如梧子大小增減以意量之湏飲服之良

小兒淡結方二首

千金療少小宿食癖氣淡飲往來寒熱不欲食消瘦芒消紫丸方

芒消四分熬　大黃四兩　半夏二兩洗　代赭一兩

甘遂二兩熬　巴豆三百枚去心皮熬　杏人一百二十枚去尖皮熬別擣

右七味擣篩別治巴豆杏人令如膏稍内藥末擣數千杵令相和如強內少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度之當候兒大便中藥出爲愈若不出復與加初出第五卷中

古今錄驗療八歲以上兒熱結淡實不能下食方

大黃十二分　柴胡九分　黃芩　知母各十二分

升麻十分　枳實炙　杏人去尖皮熬各六分　芍藥

梔子各八分　細辛二分半　竹葉切一升

右十一味切以水六升煮取一升八合分四服十歲兒分三服以下以意消息多少量之千金有桔梗黃連無枳實杏人

小兒因食痞滿羸瘦不下食腹脹方四首

小品療四五歲兒因食及在胎中宿熱乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒哺不爲肌膚心腹痞滿痿黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之令充悅方

芍藥十分炙令黃　黃耆　鼈甲炙　人參各四分

柴胡八分　茯苓六分　甘草炙　乾薑各二分如熱以枳實代

右八味擣篩蜜和爲丸如大豆服五丸日二服忌如常法千金有大黃無黃耆云服一丸一歲以上乳服三丸七歲兒服十丸日二

千金療少小傷寒久病不除差復劇羸瘦骨立五味子湯方

五味子十銖　大黃六銖　芒消五分　麥門冬六分去心

石膏一兩 甘草炙 當歸 黃芩

黃連 前胡各一分

右十味切以水三升煑取一升半分服二合下利即止增減量之效

又療小兒羸瘦惙惙常服不妨乳方

甘草五兩炙

右一味擣篩蜜丸如小豆一歲兒服十丸日三盡即更合並出第五卷中

劉氏療小兒肚脹漸瘦不食四肢熱不調方

甘草炙 鼈甲炙 柴胡 茯神

子芩各六分 訶黎勒皮十分 檳榔人兼皮三顆研 芍藥

橘皮各三分 生薑 當歸各四分 知母五分

大黃八分

右十三味切以水一升半煎取七合分爲數服得瀉病差

小兒食不下及不消不嗜食方四首

廣濟療小兒心腹滿喫食不下地黃飲子方

生地黃汁三合　生薑汁三合　訶黎勒皮四分末　白蜜一匙

右四味相和調勻分溫服之微利尤良

小品療小兒宿食不消發熱九味當歸湯方

當歸　甘草炙　芍藥　人參

桂心　黃芩　乾薑各一分　大棗五枚

大黃二分

右藥切以水一升半煎取六合去滓分服增減量之

千金療少小五六日不食氣逆桂心橘皮湯方

桂心半兩　橘皮三兩　薤白五合切　黍米五合

人參半兩

右五味切以水七升先煮藥取二升次下薤米米熟湯成稍
稍服之

又療少小胃氣不調不嗜食生肌肉地黃丸方

乾地黃　大黃各五分　茯苓三分　當歸

柴胡　杏人各二分去尖皮熬

右六味末之以蜜丸如麻子大服五丸日三服並出第五卷中

小兒霍亂方十二首

廣濟療小兒霍亂心腹刺痛吐痢方

茯苓　桔梗　人參各六分　白朮五分

甘草炙　厚朴炙各四分

右六味切以水二升煮取六合去滓溫服之

又療小兒霍亂嘔吐不止方

人參六分　厚朴三分炙　陳倉米三合

右三味切以水三升煑取七合去滓分服之

千金療小兒吐痢霍亂方

人參四分　厚朴炙　甘草各二分炙　白术三分

右四味切以水一升二合煑取五合六十日兒服一合百日兒分三服朞歲兒分再服中間隔乳服乳母忌油膩等

備急療小兒霍亂吐痢方

人參四分　厚朴炙　甘草各二分炙　乾薑一分

白术三分

右五味切以水一升煑取四合分服之

又療孩子霍亂已用有效立驗方

人參　蘆籜各二分　萹豆藤二兩　倉米一撮

右四味切以水二升煑取八合温温分服

又方

人參四分　生薑三分　厚朴炙　白术

甘草炙各二分

右五味切以水一升煑取四合分服中間與乳喫

又方

人參四分　木瓜一枚　倉米一撮

右三味切以水煑分服以意量之立效

必效主小兒乳霍亂方

取厠屋戶簾燒灰研以飲服一錢匕

又方

訶黎勒一枚

右一味先煎沸湯研一半許與兒服立止再服神妙

古今錄驗療小兒霍亂吐痢人參白朮湯方

人參六分　白朮　茯苓各四分　厚朴炙

甘草炙各三分

右五味切以水一升半煑取六合分溫服立効

劉氏療百日以來及蓐內兒霍亂方

以人乳半合及生薑汁少許相和煎服入口定

又療小兒霍亂方

生薑四分切　香葇一兩　薄荷一兩

右三味以水煎分溫兒與奶母俱服之甚良

小兒霍亂雜病方六首

劉氏療小兒霍亂空吐不痢方

人參六分　生薑四分　厚朴二分炙　橘皮一分

兔骨一兩炙碎

右五味切以水一升二合煎取四合服之即利下部又以杏人鹽少許皂莢末少許麪和硬溲如棗核大以綿裹內之便通奶母忌熱麪大効

又療小兒霍亂空利不吐方

烏牛葹斜移切　草一團　生薑　人參各三兩

右三味切以甜不醋漿水一升半煎取五合分服之如孩子渴

取曲蟮糞爛龍骨一兩以漿水煎澄清與兒喫即差

又療小兒霍亂不吐不痢肚脹妨滿上下不通方

甘草四分炙　當歸二分　石鹽三分

右三味切以漿水一升半煎取六合去滓牛黃麝香各半錢

匕研蜜半匙相和以下灌之即通妳母與漿水粥喫勿喫麪

肉等

又小兒乾霍渴熱及壯熱眼色慢四大困悶方

以烏豆二升淨乾擇生薑一兩切以水三升煎烏豆

皮欲爛即濾取汁二合和少許蜜喫即變吐如人行

六七里又與喫無問大人小兒並與服之效

又療小兒熱霍諸藥不差方

以蘆葉二大兩糯米三大合水三升先煮葉入米煮

取一升入蜜少許和服即差不足即取桑葉二升生
薑半兩切以水三升煮取一升著一匙白米爲飲服

又療小兒霍亂吐痢不止方
以人乳汁二合生薑汁粟米許荳蔻取人碎似蕎麥
大二七枚蘧蒢一小把龍骨六分以乳煎取一合著
少許牛黃麝香兎毛灰等和分爲三服如渇以糯
米汁著蜜與喫即差止

小兒吐痢方四首

千金療小兒吐痢方
以亂髮灰二分鹿角一分作末以米飲服一刀圭日三

又方
以熱牛失汁嚾之

又方
燒特豬矢水解取汁少少飲兒

劉氏療百日以下蓐內兒吐痢方

麪炒一錢　乳汁兩合　龍骨六分

右三味煎龍骨和炒麪服之即差

小兒噦方二首

備急療小兒噦方

以生薑汁五合　牛乳五合

右二味合煎取五合分二服

又方

以羊乳一升煎減半分五服無用牛乳代之

小兒口噤方四首

千金療小兒口噤方

以鹿角粉之大豆末之等分和乳塗乳飲兒

又方

以驢乳二升豬乳一升合煎得一升半服如杏人三四服差

備急療小兒鵝口并噤方

礬石燒末　朱砂各等分末

右二味和研令極細傅兒舌上日三以亂髮洗舌上垢頻頻令淨即差止

古今錄驗療小兒噤其病在咽中如麻豆許令兒沫不能乳哺方

取水銀如黍米與服覺病無早晚水銀下咽便愈以意量之不過小麻子許與則也

小兒重舌方一十三首

千金療小兒重舌方

灸行間隨年壯穴在足大指歧中是

又方

取田中蜂房燒灰酒和薄喉下愈

又方

以竈中黃土末苦酒和塗舌上

又方

以赤小豆末和醋塗舌上

又方

取簸箕舌燒灰傅舌上

又方　黃蘗竹瀝漬取細細點舌上良

又方　兒重舌舌強不能收唾燒蛇脫末以雞毛蘸醋展樂掠舌下愈

千金翼療小兒重舌方

取三屠家肉各如指大以摩舌上兒立能乳便啼

又方　以衣魚燒作灰以傅舌上（千金云衣魚塗舌上）

又方　兒重舌舌強不收唾者鹿角末如小豆許著舌下數數與之

又療小兒重舌口中瘡涎出至多方

以蒲黃傅舌上不過三度愈

古今錄驗療兒重舌欲死方

灸右足踝三壯立愈又灸左右並良（千金云灸兩足外踝）

又方

取亂髮燒灰末傅舌上甚佳

小兒鵝口鷰口方六首

千金療小兒心藏熱口爲生瘡重舌鵝口方

取柘根剉五升無根只以弓材佳

右一味以水一斗煑取二升以汁更煎取五合細細傅拭齒數

數爲之良

又方

口生瘡白漫漫取桑木汁先以父髮拭口次以桑汁

塗之

又療小兒鵝口不能飲乳方

取白鵝屎汁瀝口中良

又方

取黍米汁塗之

又方

取父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井華水東向日以髮

拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

救急療小兒鷰口兩吻生瘡方

取髮灰以豬脂和塗之千金同

小兒口瘡方五首

小品療小兒口爛瘡方

取羊乳細細瀝口中不過三度差

千金療小兒口瘡方

大青三分　黃連二分

右二味切以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

文仲支太醫療小兒口瘡方

桑木白汁　生地黃汁各一合　赤蜜半合

右三味和煖傅兒口中瘡便差

救急療小兒口瘡方

以蛇脫皮水漬令濕軟拭口內瘡一兩遍即差

劉氏療小兒口瘡方

黄蘗皮切一兩　烏豆一升

右二味以水二升煑取兩合去滓重煎如餳入少許龍腦香研和傅之甚良

小兒口中涎出方三首

千金療小兒口涎出方

以白羊屎内口中差止

又方

以東行牛口中沫塗兒口中及頤上

又方

桑白汁塗之差

小兒舌上瘡脣腫方五首

小品療小兒脣腫及口赤生白瘡爛方

清旦研桑木白皮取汁以塗兒脣口即差

又小兒舌上瘡方

烏賊魚骨燒末以雞子黄和塗之至喉咽舌下遍

傅即差止

千金療小兒舌瘡方

烽房燒灰屋間塵各等分和先洗瘡使乾傅之效

又方

羊蹄骨中生髓和胡粉傅上日三取差

又舌腫強滿口方

滿口含糖醋少時熱氣通愈

小兒咽喉生瘡方二首

千金療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入者膏方

當歸　射干　升麻（各一兩）　附子（半兩）

白蜜（四合）

右五味切以豬膏四兩先煎之令成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎令附子色黃藥成去滓投蜜更上火一兩沸以器盛之取杏人許含之日四五咽之無妨大人小兒並用妙

又療口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

豬脂一斤　黃連一兩　白蜜一升

右三味合煎令成膏去滓合半棗大日四五夜亦含之

小兒喉痹方四首

千金升麻湯主小兒喉痹痛若毒氣盛便咽塞并大人喉咽不利方

生薑　升麻　射干各二兩　橘皮一兩

右四味切以水六升煎取二升分溫三服

又療小兒卒毒腫著喉頸壯熱妨乳方

升麻　射干　大黃各一兩

右三味切以水二升半煑取八合一歲兒分三服餘滓傅腫處冷更煖而薄大兒以意加之

又方　煑桃皮汁三升服之又燒荆瀝汁服之

劉氏療小兒喉痺熱塞方

升麻五兩切　馬藺子一合

右二味以水一升煎取二合入少白蜜與兒服之甚良

小兒亭耳方四首

千金療小兒亭耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一差止

又療少小亭耳方

桃人熟末以鼓許裹塞耳中

古今錄驗小兒亭耳方

青羊屎暴乾以綿裹塞中即差

又小兒亭耳有瘡及惡肉耳中雄黃散方

白麻揩取皮一合　花燕脂十顆

右二味擣篩細研傅耳中令滿一兩度差止方中無雄黃未詳其各

小兒鼻塞方四首

千金療小兒鼻塞不通足涕出方

杏人二分 椒出汗 附子去皮 細辛各一分

右四味切以醋五合漬藥一宿明旦以豬脂五合煎令附子色黃膏成去滓待冷塗絮導鼻孔中日再兼摩頂上

又療小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛各一兩

右二味擣篩以綿纏如棗核大藥如豆著綿頭著鼻孔中日二

古今錄驗療小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛 通草各一分 辛夷人一分半 杏人二分去皮

右四味切以羊髓三合豬脂三合緩火煎之膏成絞去滓取米粒許大以內鼻孔中頻易佳

劉氏療小兒鼻塞不通喫乳不得方

醍醐合三 青木香 零陵香各四分

右三味切和煎成膏取少許以膏和撚爲丸或以膏塗兒頭上及塞鼻中以通佳

外臺秘要方卷第三十五

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

外臺祕要方

三十六

小兒諸疾下

外臺秘要方卷第三十六 小兒諸疾下五十門

朝散大夫守光禄卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

千金療少小中風手足拘急二物石膏湯方

石膏（雞子許一枚碎綿裹） 眞珠（一兩研）

右藥以水二升煮取五六沸內眞珠煮取一升去滓稍稍分服之

又療少小中風脉浮發熱自汗出項彊鼻鳴乾嘔方

甘草（炙） 芍藥 桂心 生薑（各一兩）

大棗（四枚擘）

右五味切以水三升煮取一升去滓分溫三服忌如常法（此張仲景桂枝湯但劑分小爾）

又療少小新生中風二物驢毛散方

驢毛（取背交脊上會中毛拔取如手大拇指一把是鬐頭毛也） 生麝香（如大豆二枚研）

右藥以乳汁和於銅器中微火上煎令焦熟出研末之小兒不能飲以乳汁和之於葦竹筒中盛寫入咽中然後飲乳汁令入腹

又療少小新生肌膚幼弱喜爲風邪所中身體壯熱或中大風手足

驚掣五物甘草等生摩膏方

甘草 防風各一兩 白朮 桔梗各二十銖

雷丸二兩半

右藥切以不中水猪脂一斤煎取成膏合諸藥於微火上煎之消息視之凝膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病常以少膏摩顖上及手足心甚辟風寒良翼同並出第五卷中

小兒欬嗽方八首

小品療少小欬嗽腹脹七物小五味子湯方

五味子碎 紫菀各二分 黃芩 甘草炙

麻黃去節 生薑 桂心各一分

右藥㕮咀以水一升煮取七合分五服忌如常法

又療少小欬嗽晝差夜甚初不得息不能復啼四物欵冬丸方

欵冬花　紫菀(各一兩半)　伏龍肝(一分)　桂心(二分)

右藥擣篩蜜和如泥取如棗核大塗乳頭令兒飲之日三(千金同)

又療少小十日以上至五十日卒得暴欬吐乳嘔逆晝夜不得息四物湯方

桔梗　紫菀(各三分)　甘草(一分炙)　麥門冬(七分去心)

右藥切以水一升煑取六合去滓分五服以差爲度(千金有桂心無桔梗以水二升煑取一升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過節哺乳)

又療小兒中冷及傷寒暴欬嗽或上氣咽喉鳴氣逆者或惡寒鼻塞清水出紫菀湯方

紫菀　杏人(去皮尖)　甘草(炙)　黃芩

麻黃(去節)　橘皮　桂心　青木香

當歸(各一兩)　大黃(三分)

右十味切以水三升煑取九合去滓一歲以上至五歲兒以意

量之分服（千金云兒六十餘日至百日一服二合半百餘日至二百日一服三合餘同）

千金療少小欬嗽八物生薑煎方

生薑（七兩） 乾薑（四兩） 桂心（二兩） 甘草（三兩）

杏人（一升去尖皮熬） 款冬花 紫菀（各三兩） 蜜（一升）

右藥末之以蜜微火上合諸藥煎之使如飴餔量其大小多少與兒含咽之百日小兒含如棗核許日四五甚良有驗出第五卷中

備急療少小欬嗽上氣杏人湯方

麻黃（八分去節） 杏人（四十枚去尖皮）

右二味切以水一升煮取七合去滓分服百日小兒患熱氣急不得服小便赤黃服之甚良大人孩童以意量之與服忌如常法

又療少小欬嗽方

紫菀六分 貝母三分 欵冬花一分

右三味擣爲散取豆許著乳頭令兒飲之日三姊母忌如常法

劉氏療小兒欬嗽不得卧方

甘草六分炙 桔梗四分 桑白皮 貝母

茯苓各三分 大青 吴藍 五味子

人參各二分

右九味切以水二升煮取八合去滓量多少大小與服忌如常法

小兒欬逆上氣方七首

千金杏人丸主大人小兒欬逆上氣方

杏人三升去尖皮雙人熬令黄黑

右一味熟擣如膏蜜一升分爲三分以一分内杏人擣令彊更内一分擣之如膏又内一分擣熟止先食含之咽汁量其多少日三每可半方寸不得過也

又射干湯主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干二兩 麻黃去節 紫菀 甘草炙

生薑各一兩 桂心五寸 半夏五枚洗 大棗二十枚去核

右八味切以水七升煮取一升半內蜜五合去滓分溫服二合忌餳羊肉生葱

又方

半夏四兩洗 生薑三兩 桂心 紫菀

細辛 阿膠各二兩 甘草二兩炙 欵冬花二合

蜜一合

右九味切以水一斗先煮半夏取六升去滓內諸藥煮取二升五合去滓兩歲兒飲六合五歲兒飲一升量大小多少加減之

又五味湯主小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫晝夜不息食則不止方

五味子二分 麻黃一分去節 當歸二分 人參一分
細辛半分 乾薑一分 桂心一分 紫菀一分
欵冬花半分 甘草一分炙 大黃六分
右十一味切以水二升半煑取九合去滓兒六十日至一百日服二合半百日餘至二百日一服三合出第五卷中一方無欵冬大黃有大棗三枚

千金翼療小兒寒熱欬逆膈中有澼乳若吐不欲食方
乾地黃四兩 麥門冬半升去心 五味子五合 大黃
消石各二兩 蜜半升
右六味切以水三升煑取一升去滓內消石蜜煑令沸服二合日三皆中當有宿乳一升許出兒大者服五合

又療小兒大人欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方
燒淡竹瀝煑二十沸一服一合日五服大人服一升不妨食息乳哺並出第十一卷中

劉氏療小兒上氣急滿坐卧不得方

鼈甲一兩炙令極熟擣爲末　燈心一握

右二味以水二升煎取八合以意量之與服

小兒傷寒方三首

千金論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脱之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

又療小兒傷寒方

生葛汁　淡竹瀝各六分

右二味相和二三歲兒分三服斟酌服不宜者生服佳

又療少小未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆麥門冬湯方

麥門冬三分　桂心八銖　寒水石　石膏碎　甘草炙各二分

右五味切以水二升半煮取一升分服一合日三

又療少小傷寒芍藥四物解肌湯方

芍藥　黄芩　升麻　葛根各二分

右藥切以水二升煮取九合去滓分四服朞歲以上分三服

並出第五卷中

小兒天行方八首

廣濟療小兒天行壯熱欬嗽心腹脹妨方

人參　甘草各二分炙　生地黄　麥門冬去心　茅根各六分

右五味切以水二升煮取七合去滓以意量之分温與服忌如常法

又方

麥門冬去心　茅根各六分　甘草炙　人參各二分

紫菀　升麻　貝母　竹瀝各三分

右八味切以水二升煮取八合分服忌如常法

千金療少小有熱不汗二味通汗散方

雷丸四兩　粉半斤

右藥擣篩以粉兒身以差爲度

又療小兒生一月至五月乍寒乍熱方

細剉柳枝煑取汁以洗兒立效若渇絞冬瓜汁服之

又療小兒寒熱及赤氣中人豬蹄散方

取豬後脚懸蹄燒灰末以乳汁飲一撮立效並出第五卷中

劉氏療小兒天行頭痛壯熱方

青木香六分　白檀香三分

右二味擣散以清水和服之以水調塗頂頭痛立差

又方

吴藍　大青各十分　甘草炙　生麥門冬去心
生薑各六分　茵蔯三分　梔子人十顆　蘆根一握洗
右八味切以水二升煮取九合分温服之忌如常法
又療小兒天行五日以後熱不歇方
萎葉一握　麻黄一兩去節　葱白一切合　豉一合
右四味切以童子小便二升煎取九合去滓分服之
小兒諸黄方四首
千金療小兒黄方
擣土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大豆許又服三合
又方
擣麥青汁服之
又方
擣韭根汁以滴兒鼻中少許即出黄水差
又療諸黄方
小豆二十一枚　瓜蔕十四枚　糯米四十顆

右三味擣散吹鼻中差並出第五卷中

小兒諸瘧方九首

廣濟療小兒瘧方

取蛇皮燒灰一錢匕和冷水服之

又方

取驢軸下垢膩刮取和麪作燒餅與喫以差止

刪繁療小兒瘧或自能飲或不能飲毋含藥與飲之常山酒煎方

常山二兩　桂心一兩　甘草半兩

右三味切以酒一升煎取七合去滓分服取吐差止

千金常山湯主小兒溫瘧方

常山四分切　淡竹葉一握切　小麥三合

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合爲三服八日至十五日兒一合半爲三服十六日至二十日兒二合爲三服四十日至六十日兒六合爲三服六十日至百日兒

一服二合半百日至二百日兒一服三合其一歲至七八歲兒增

藥水並以此爲率

又方

灸兩乳下一指各三壯

又方

燒雞腔胵黄皮末和乳與服男雄女雌

又方

生鹿角末發時與一錢匕服之

又方

燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕并以火灸

身並出第五卷中

劉氏療小兒瘧方

黄丹半錢匕以蜜水和與服若冷以酒和與服之良

小兒眼赤痛方八首

古今録驗療小兒眼痛方

取淡竹瀝拭之

又方

取鯉魚膽傅之

又方　取車前草汁和竹瀝傅之

又方　以人乳浸黃連點之

劉氏療小兒赤眼方

黃連三分　朴消一分燒令乾

右二味以婦人妳汁浸之點眼良

小品療小兒蓐內赤眼方

生地黃薄切冷水浸以貼之妙

又方　取羊子肝薄切以井花水浸以貼之妙

又方　取黃蘗以乳浸點之

小兒諸淋方六首

千金療小兒淋方

車前子一升水二升煑取一升分服之一方用車前草

又方　以冬葵子煑汁服之

又方　取蜂房亂髪燒灰末以水服一錢匕日再服

文仲療小兒淋兼石淋方

取特牛陰毛燒灰末以漿水服一刀圭日再服

又方

榆皮　瞿麥各六分

右二味切以水一升煮取半升去滓分溫服之

又方

小麥一合　葱白一握

右二味以水一升煮去滓取一半分服之

小兒小便不通方五首

廣濟療小兒熱極病小便赤澀或不通尿輒大啼呼滑石湯方

滑石十六分　子芩十四分　冬葵子八分　車前草切一升

右四味以水二升煮取一升一歲至四五歲服一合日再服甚良

小品療小兒小便不通地膚子湯方

地膚子一分　瞿麥　冬葵子各二分　知母

黃芩　豬苓　海藻　橘皮

升麻　通草各一分半　大黃八分

右十一味切以水二升煮取一升大小多少量與服忌如常法千金有枳實無橘皮

千金療小兒小便不通方

車前草切一升　小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓以煮粥服日三四量與服

又方

冬葵子一升

右一味以水二升煮取一升入滑石末一分溫分服

劉氏療小兒忽不得小便急悶方

葱白一握　通草一兩　冬葵子一合

右三味切以水二升煮取一升去滓量服

小兒遺尿失禁方五首

千金療小兒遺尿方

瞿麥　龍膽　石韋去毛　桂心

皂莢炙去皮子各二分　雞腸草四分　車前子五分　人參一兩

右八味擣篩蜜丸如小豆每服五丸加至六七丸翼中又有雞腸十二分

又方

灸臍下一寸半隨年壯

又方

灸大敦三壯

又方

小豆葉擣汁服佳

又療失禁不覺尿出方

以豆醬和竈突黑如大豆許內尿孔中佳

小兒大便有血方三首

救急療小兒大便訖血出方

鼈甲一枚炙末五分

右一味以水和量多少大小服日三忌如常法千金云鼈頭一枚

又方　以車釭一枚燒令赤內水中與服差千金同

又方　燒甑帶灰塗乳上與飲之差千金同

小兒大便不通方四首

千金紫雙丸主小兒身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾唯飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱唯此丸治之不差復可再服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方

巴豆去心皮熬　蕤核人各十八銖別擣　麥門冬十銖去心　甘草五銖炙

甘遂二銖　真珠二銖　牡蠣熬　臘各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研以新布絞去油別擣甘遂甘草牡蠣麥門冬細篩畢擣巴豆蕤人令極熟乃內諸藥散更擣三千杵如藥燥入少蜜足之半歲兒可服如荏子一雙一二歲

兒服如半麻子作一雙三歲兒服如麻子一枚作一雙四歲兒服如麻子二丸五六歲兒服如大麻子二丸七八歲兒服如小豆二丸九歲十歲兒微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者飲熱粥汁數合即下丸皆雙出也下甚者飲冷粥止之

必効療小兒大便不通方

灸口兩吻各一壯

又方

豬苓一兩

右一味以水少許煑雞矢白一錢匕與服立差

又主小兒大小便不通妨悶方

白蜜一合

右一味以鎗中煎爲丸内下部中即通小便不通嚼生葱以綿裹少許内小便道中即通

小兒赤白痢方七首

廣濟療小兒赤白痢腹痛方

赤石脂　龍骨　地榆　黃連各四分

厚朴炙　人參各三分　當歸　乾薑各二分

右八味擣散以飲汁服半錢匕日再服之蜜丸以乳汁下三丸至七丸亦佳此方甚妙以意量之

又療小兒客冷白痢方

人參六分　厚朴炙　甘草炙各四分　茯苓

桔梗各五分　梁州欅皮八分炙

右六味切以水三升煑取一升量其大小可一合爲度以差止忌如常法

救急療二百日小兒赤白痢日夜五十行方

白朮　乾薑各五分　茯苓　甘草炙各四分

附子二分炮

右五味切以水三升煮取一升八分温服之

必効療小兒一歲以上二歲以下赤白痢久不差雞子餅方

雞子二枚取白　胡粉兩錢熬　臘一棗許

右三味於鎗中熬令消下雞子胡粉候成餅平明空腹與喫可三頓痢止

劉氏療小兒赤白痢方

油麻子一抄許炒令香

右一味擣末以蜜作漿調與服大人亦療之

又療小兒赤白痢咽脹不出方

黃蘗半兩炙　當歸六分

右二味切以水一升煮取六合分温服之佳

又方

茛菪子　羊肉薄切布上

右二味以綿裹內下部中不過再差量之可用甚妙

小兒蠱毒血痢方九首

廣濟療小兒熱毒膿血痢方

羚羊角　地榆　阿膠　赤石脂

黃連　當歸各八分　吴藍　蒨根

甘草炙各六分　黃芩五分

右十味切以水六升煮取二升半量大小服之甚妙

又療小兒熱毒血痢方

犀角十分　地榆六分　蜜三分　地麥草五合

右四味切以水三升煮取二升去滓量大小服之

又方

葱白三兩　香豉三合　梔子七枚綿裹　黃連一兩

右四味切以水二升煮取九合去滓分服

又療下鮮血方

取梔子人燒灰末水和一錢匕服之量其大小加減服之

小品療少小熱痢不止梔子丸方

梔子人七枚 黃連五分 黃蘗三分炙 礬石四分燒

大棗四枚炙令黑

右五味末之以蜜丸空腹服小豆許七丸差如未除更服忌如常法

古今録驗療小兒熱痢子芩湯方

子芩十二分 知母 女萎各六分 竹葉切八分

黃蘗 甘草炙各四分

右六味切以水二升煮取一升分服甚妙

又療小兒痢血犀角櫸皮煎方

梁州櫸皮二十分炙切 犀角十二分屑

右二味以水三升煮取一升量大小服之神良崔氏同

又療小兒蠱毒痢血蘘荷湯方

蘘荷根 犀角屑 地榆 桔梗各二分

右四味切以水二升煮取九合去滓服一合至再服

劉氏療小兒血痢方

地榆 黃蘗 黃連 黃芩各六分

馬藺子二分 蒨根一兩 生薑三分

右七味切以水二升煮取一升分服大小量與之一合至二合為度

小兒熱渴痢方四首

小品療少小壯熱渴痢八味龍骨散方

龍骨碎 甘草炙 赤石脂 寒水石

大黃 石膏 桂心 栝樓各三分

右藥擣散以水及酒五合煮散二合量大小分服之効

又療少小夏月藥大下後胃中虛熱渴唯可飲麥門冬湯方

麥門冬去心　甘草炙各四分　枳實炙　黃芩

人參各三分　龍骨六分

右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服

古今錄驗療小兒渴痢欅皮飲子方

梁州欅皮十二分　栝樓　茯苓各八分　人參六分

粟米二合

右五味切以水三升煮取一升二合去滓分服量大小與服之

劉氏療小兒痢渴不徹肚脹不能食方

訶梨勒皮六分　桑葉十分炙末

右二味切以水一升煮取五合去滓分服之亦治大人

小兒疳痢方七首

廣濟療老小一切痢久成疳方

白龍骨六分　黃連　白石脂　雞矢白熬

胡粉熬　茯苓　阿膠各四分炙

右七味擣篩蜜丸以飲汁下五丸漸加至七丸十丸大小增減服之雞矢一作雞子黃

又療小兒疳痢渴瘦方

取椿木根乾末之　粟米擣粉煮飲汁

右二味以蜜和作丸服五丸至七丸十丸以差爲度崔氏同

又療大人小兒久痢成疳方

豉三升　葱白一握　桃葉一握　鹽二十顆

苦參五寸　青黛一抄

右六味切以水三升煮取一升二合去滓仰卧灌下部中極妙

又療小兒疳痢困垂死方

益母草

右一味煮食之取足差止甚妙崔氏同

劉氏療小兒痢大部開并有䘌疳痢經四五日吹藥止痢療疳神驗方

黃連二分擣末 麝香少許研

右二味相和以竹筒吹大部中三兩度差止

又療小兒疳痢三歲以上口裏有瘡身壯熱及手足心煩大便處極臭即是疳痢宜用方

黃連 黃蘗 地榆炙 白頭翁

高良薑 酸石榴皮 生薑 當歸各二分

白朮一分 龍骨四分

右十味切以水二升煮取八合分服大人量之其口中瘡以

蘆會末赤地麥擣末相和塗之下部末蚺蛇膽黃連麝香

擣傳之兼以竹筒吹少許內下部中差止亦主小兒疳瘡

必効療小兒久痢無問冷熱疳痢悉主之方

棗一枚去核勿令皮破內胡粉令滿

右二味於炭火中燒令如炭於瓷器中研之以米飲和分服之一歲以下分服之不過三顆差王郎中處得之此方傳用甚妙

小兒无辜疳痢方三首

備急療小兒无辜疳痢方

龍骨　當歸　黃連　人參

墨食子　甘草炙各一兩

右六味擣散蜜丸服二九日再以差爲度大小增減量之

救急療小兒瘦頭乾无辜兼痢方

馬齒莧

右一味擣絞汁服三合以差止

劉氏療孩子頭乾肚中有丐辜者益腦散方

地榆大分 蝸牛十二分熬 青黛三合 麝香

人糞燒灰 蘭香根燒灰 蚺蛇膽各一分 龍腦香一兩許

右八味擣散以飲下半錢匕量大小與服之忌如常法

小兒諸雜痢方四首

劉氏療小兒膿痢直從春至秋冬以來不差者方

薤白切一合 生薑 蕪荑各一分 子芩

黃蘗 阿膠 芍藥 厚朴炙

人參各二分 地榆 當歸各三分 香豉一合綿裹

右十二味切以煮銀水重濾者一升半煮取九合分服以差爲度秋末冬末加赤石脂半兩乾薑一分白朮二分大小量之忌如常法

又療小兒痢後虛手足心熱痢縱未斷亦可服之方

橘皮　生薑各三分

右二味切以牛乳半升煎取四合去滓分溫服之

又療小兒水痢不止方

厚朴炙　黃連各一兩

右二味切以水一升煎取六合分服雜痢此方並治之

又療小兒曩痢方

甘草炙　茯苓各六分　人參　黃連各四分

厚朴炙　生薑各二分　龍骨八分

右七味切以水一升煎取三合欲臥先取鹽麪麝香爲小丸內下部中然服此飲分服甚妙忌如常法

小兒衄血方六首

深師療少小衄血方

桂心十八銖　亂髮洗燒灰　乾薑各六銖

右三味擣篩爲散服方寸匕日再

又方　燒桑耳令焦

右一味擣散以內於鼻孔中爲丸以內亦得

小品療少小未滿百日傷寒身熱衄嘔逆五味麥門冬湯方

麥門冬心去　石膏　寒水石各三分　甘草二分炙　桂心一分

右藥切以水一升煮取八合分服効

古今錄驗療小兒鼻衄不止方

以馬矢綿裹塞鼻孔中

又方　燒髮灰末吹鼻孔中亦佳

又方　單服白馬屎汁三合甚良

小兒齒不生方二首

小品療少小齒落不生方

取牛屎中大豆二七枚小開頭皮小許以次注齒根

數度即當生千金同

又方 取雌鼠屎二七枚以一枚拭齒根處盡此止二十一日齒當生雌鼠屎頭尖是也千金同

小兒頭汗及盜汗方三首

千金療少小頭汗二味茯苓粉散方

茯苓 牡蠣各四兩熬

右藥以粉八兩合治下篩有熱輒以粉頭汗即自止

又此由心藏熱之所感宜服犀角飲子方

犀角三分 茯神四分 麥門冬六分 甘草二分炙 白术一分

右五味切以水九合煎取四合分再服即定又加龍齒四分佳

延年療小兒盜汗方

麻黄根 雷丸 牡蠣各三兩熬 甘草二兩炙

乾薑一兩 粱米一升

右六味擣粉以粉身汗即止

小兒顖開不合方四首

廣濟療小兒顖開不合方

防風^六分^　白及　栢子人^各四分^

右三味擣末以乳汁和塗顖上以合爲度千金同

范汪療少小腦長頭大顖開不合臂脛小不能勝頭三歲不合

熨藥方

半夏　芎藭^各一升^　細辛^二兩^　桂心^三尺^　烏頭^十枚^

右五味切以淳酒四升漬之晬時温之以絮熨兒顖門上朝暮各二三二十日自彊急^千金桂一尺又有生薑一升^

千金療小兒顖陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

又方

取猪牙車骨煎取髓塗顖上愈生用亦得

小兒解顱方二首

千金療小兒解顱方

蛇蛻皮（熬末）

右一味和猪頰車骨中髓以塗顱上日三

又療小兒解顱三味細辛傅藥方

細辛　桂心（各一分）　乾薑（三分）

右藥擣散以乳汁和塗於顱上乾復塗兒面赤即愈

小兒月蝕耳瘡方三首

集驗療小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡蝸瘡悉著黃連胡粉膏散方

黃連（二兩）　胡粉　水銀（研入各一兩）

右三味擣爲散相和水銀研令相得以傅瘡上縱黃汁引成瘡亦以粉之即差一方有白礬一兩燒蛇床子一兩末入用亦甚妙至耳邊到項上並用

又療小兒耳瘡方

燒馬骨灰粉以傅之

又方

傅雞屎白佳

小兒臍汁出并瘡腫方一十一首

廣濟療小兒臍汁出不止兼赤腫白石脂散方

以白石脂一兩研成粉熬令温以粉臍瘡甚良千金同

備急療小兒臍中生瘡方

以桑汁塗乳上使兒就飲之千金同

又方

取羖羊乳飲兒千金同

又方

取東壁土末以傅之甚良千金云若汁不止燒蒼耳子粉之

又方

燒甑帶灰和膏傅之千金同

又兒生過月臍汁出方

燒絳灰傅臍中千金同

又兒臍赤腫方

杏人（二分熬令紫色） 猪牙車骨中髓

右二味先研杏人入此髓和令調以塗臍上千金同

古今録驗療小兒風臍汁出甘草散方

甘草（炙） 螻蛄（熬各三分）

右二味擣散以安臍中差止甚妙

又療小兒臍中汁不差黃蘗黒散方

黃蘗（炙一兩） 釜底墨（四分）

右二味擣和作散以粉臍中即差

又療小兒臍著濕煖鹽豉熨方

鹽 豉（等分）

右二味擣作餅如錢許安新瓦上炙令熱用熨臍上差止

亦用黃蘗末以粉之妙

劉氏療小兒初生至七日者臍欲落封藥方

雄鼠屎七顆 乾薑大棗許 胡粉熬三分 麝香少許

緋帛灰

右五味擣研爲粉看臍欲落不落即取藥以傅之是以不令風入故也著乾薑恐痛不著亦得

小兒癰腫方二首

千金漏蘆湯主小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癤方

漏蘆用葉一分 升麻一分半 連翹一分 白斂一分

甘草炙一分 芒消一升 枳實炙一分半 麻黃去節一分半

黃芩一分半 大黃四分

右十味以水一升煮取五合兒生一日以上至七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十餘日至三十日取三合分三服

又五香連翹湯主小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧附骨癰疽節解不舉白丹走遍身中白瘮搔不已方

青木香　薰陸香　沈香　雞舌香

黄芩　麻黄（去節各一分）　連翹　海藻

射干　升麻　枳實（炙各二分）　麝香（半分研）

大黄（八分）　竹瀝（三合）

右十四味切以水四升煮取二升内竹瀝煮取一升二合兒生百餘日至二百日一服三合生二百日至朞歲一服五合（一方不用麻黄）

小兒丹毒方七首

廣濟療小兒丹毒方

青藍汁（五合）　竹瀝（七合）

右二味相和分爲二三服大小量之一合至三合

千金療小兒數十腫丹皆主之搨湯方

大黃　甘草炙　當歸　芎藭
白芷　青木香　獨活　黃芩
芍藥　升麻　沈香　木蘭皮各一兩
芒消三兩
右十三味切以水一斗二升煮取三升去滓內消以綿搵湯以㧾之乾則易之取差止
又療小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方
以水一升煮桑根皮取一升以洗浴之
救急療小兒赤丹一名丹溜方
取小豆擣末以雞子白和塗之以差爲度先以鍼決丹上然傅之千金亦療火丹
古今録驗療月內兒發丹方
升麻　黃芩　犀角　大黃別浸　柴胡各二分

甘草一分炙　石膏三分　藍葉三合切　梔子八分

右九味切以水一升二合煮取八合下竹瀝四合更煎取一半去滓分二服甚妙

又療小兒丹毒方

取慎火草擣以封之差止

又方

擣藍汁塗之又藍淀塗之妙

小兒禿瘡方七首

千金療小兒頭上禿瘡方

取雄雞屎白陳醬汁苦酒和以洗瘡傅之日一度

又方

取不中水蕪菁葉燒灰和豬脂傅之

千金翼療小兒禿瘡無髮苦痒方

野葛一兩末　豬脂　羊脂各一合

右三味合煎令消待冷以傅之不過三上千金同

備急療若頭生瘡白禿不生髮有汁出或無汁乾燥痛方

煮雞子 七枚剝去白

右一味取黃於銅器中急火熬乾末以傅之取差爲度

又方

取春秋桃葉心無問多少擣汁塗之 千金并翼治小兒頭不生髮取楸葉擣汁以傅頭上立生

又方

燒鯽魚末以醬汁和塗之 上同

又方

取臘月猪屎乾末以傅之差爲度

小兒頭瘡方三首

千金療小兒頭瘡方

胡粉 一兩　黃連 二兩

右二味爲末先洗瘡去痂拭乾傅之即愈更發如前傅之

又方

胡粉 二兩　白松脂 三兩　水銀 一兩研　猪脂 四兩

右四味合煎去滓內胡粉水銀攪令和調傅之大人同翼同

救急療小兒頭瘡經年不差差而復發方

雄黃研　大黃　黃蘗　黃芩　薑黃

雌黃研　白芷　當歸　青木香各四分

右九味切㕮咀以苦酒浸一宿以猪脂一大升煎候白芷色黃膏成去滓入水銀一兩以唾於手中研令消入膏攪相得於瓷器中收每以皂莢湯洗瘡乾拭以膏塗之日夜再換以差爲度

小兒頭面瘡方七首

廣濟療小兒頭面生熱瘡方

黃連　蛇床子　黃蘗各八分　胡粉四合

右四味擣散以麻油和塗瘡遍傅之佳

千金療三日小兒頭面瘡起身大熱方

升麻　柴胡　石膏各一兩　大黃

甘草二兩　當歸二兩

右七味切以水三斗煮取一斗去滓以浴小兒瘡上訖傅黃連散

又療小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮乾者多少任用

右一味擣末以醋和塗之綿覆上蟲出立差亦可以豬脂和塗之

千金翼苦參湯主小兒頭面熱瘡方

苦參八兩 黃芩二兩 大黃 芍藥

黃連各二兩 蛇床子一升 黃蘗五兩 菝葜一斤洗

右八味切以水二斗煎取一斗以洗浴兒日三即差千金云治上下遍身生瘡

又方

石南草 大黃 黃芩 黃蘗

礬石 澤蘭各一兩 戎鹽二兩真者 蛇床子三合

右八味切以水七升煮取三升以絮內湯中洗拭兒日三度差

備急療小兒三歲患頭上起熛漿如釘蓋一二日及胷背皆生

仍成瘡方

水銀　朱砂各半兩破兩相得　石硫黃一兩研　臘月猪脂和研如膏

右四味煮桑葉湯洗以傅之勿令豬犬婦人小兒等見之無效

古今録驗療小兒頭瘡面上亦有日月益甚者方

黃連　赤小豆各等分

右二味擣末以臘月豬脂和塗之即差止

小兒瘰癧方二首

千金連翹丸主小兒无辜寒熱彊健如故而身體項頸結核瘰癧及心脅腹背裏有堅不痛名爲結風氣腫方

海藻洗三分　連翹　桑白皮　牡丹

白頭翁　防風　黃蘖　桂心

香豉　獨活　秦艽各四分

右十一味擣篩蜜丸如小豆三歲以飲服五丸至十丸五歲

以上以意加之

必効療小兒項上瘰癧方

以楡白皮爛擣如泥封之頻易

小兒侵淫瘡方三首

備急療小兒侵淫瘡方

取竈中黃土亂髮灰各三分研成粉以豬膏和塗之

差千金同亦治身赤腫起

又方

燒艾作灰傅之千金同

又方

以牛屎燒作灰傅之千金同

小兒蠼螋瘡方二首

備急療小兒蠼螋瘡繞身匝即死方

擣蒺藜葉傅之無葉子亦可使用千金同

又方

取鷰窠土研成粉以猪脂和塗之乾易千金同

小兒惡瘡方五首

文仲療小兒身中惡瘡方

取笋煮汁洗之又燒笋皮作灰傅之

古今錄驗療小兒惡瘡方

取豆豉熬令焦黃末以傅瘡差止千金同

又療小兒惡瘡匝身衆藥所不能療之方

取父裩洗取汁以浴兒勿使母知良

又療小兒面及身上生瘡如火燒方

取黃米一升末以蜜水和塗之差爲度

又方

以赤地利擣末以粉之佳

小兒火灼瘡方二首

千金療小兒火灼瘡者一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍痒方

甘草　芍藥　白斂　黃芩

黃連　黃蘗　苦參各半兩

右七味擣末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

千金翼療小兒火瘡方

煮大豆濃汁温洗之差亦令無瘢

小兒風疹瘙痒方五首

廣濟療小兒風疹浴湯方

柳木空中屑二升　蒴藋根切二升　鹽二合　櫨木切一升

右四味切以水二斗煑取一斗入鹽以洗浴頻爲之以差止

又療小兒壯熱隱疹已服湯丸不消宜服竹瀝湯方

淡竹瀝一升二合　葛根汁五合　牛黃三豆粒顆研

右三味相和與兒服一歲至五六歲一合至三合五合再服以意增減之

千金療小兒風瘙隱疹方

蕳藋（一升切） 防風 羊桃 石南 秦椒
升麻 苦參 茵芋 芫花（一作芫蔚） 蒺藜子
蛇床子 礬石（燒） 枳實（各一兩）
右十三味切以酢漿三斗煮取一斗內礬石令少沸以浴之
又療小兒風搔隱㾖方
牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差擣末傅之王胃
疽癩病瘰癧絕妙
千金翼療隱㾖方
巴豆五十粒去皮以水三升煮取一升半以綿內湯
中拭病上隨手滅神良
小兒𤸎氣陰㿗方八首
小品療少小陰㿗白頭翁傅之神效方
生白頭翁根不問多少擣之隨偏處以傅之一宿當

作瘡二十日愈（一方三月上徐日取之）

千金療小兒狐疝傷損生㿗方

半夏（洗一分） 芍藥 茯苓（各三分） 防風（一作防葵）

大黃（各二分） 桂心 椒（各一兩汗）

右七味擣散蜜丸如大豆以湯飲下一丸至二丸三丸日五服

以差爲度

又方

桂心（三分） 地膚子（一分） 白朮（五分）

右三味擣蜜丸如小豆白酒服七丸日三服亦治大人

千金翼療小兒氣㿗方

土瓜根 芍藥 當歸（各一兩）

右三味切以水二升煮取一升去滓分服五合日三

備急療小兒㿗方

以蜥蜴一枚燒灰末以酒服之

又方

灸足厥陰大敦左患灸右右患灸左各一壯即當差千金同

古今錄驗療小兒陰㿉方

狐陰一具炙　飛生蟲十四枚　桂心　附子炮

乾薑　蒺藜　消石一作滑石　細辛各二分

卷栢　桃人去尖熬各六分

右十味擣散蜜丸大豆許以飲下五丸至七丸再服差止

劉氏療小兒疝氣陰囊核腫痛灸法

如一歲兒患向陰下縫子下有穴灸三壯差五歲以上

即從陰上有穴灸之即愈

小兒陰瘡及腫方八首

千金療小兒陰瘡及腫方

取狼牙濃煮汁洗之

又方　黄連　胡粉等分

右二味末和以香脂油傅之差

備急療小兒陰瘡方

人屎燒作灰以傅之即差千金同

又方　猫兒骨燒作灰傅之即差千金去猫骨灰傅之

又療小兒𡀔股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛十日五日自差一月二十日復發連年不差者方

灸瘡搔去痂以帛拭令乾以蜜傅更作燒餅熟即以餲塗上以熨之冷即止再度差千金同

又治小兒陰腫方

猪屎五升水煑沸布裹安腫上千金同

又方　灸大敦七壯差千金同

又方　擣蕪菁菜葉根薄之

小兒脫肛方六首

備急鼈頭丸療少小積痢久下下後餘脫肛不差腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鼈頭一枚炙令焦　小形蝟皮一枚炙焦　磁石四兩　桂心三兩

右四味擣篩蜜丸如大豆三歲至五歲服五丸至十丸日三兒漸大以意加之千金同

又療小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入

又方

灸尾翠三壯愈千金同

又方

灸臍中三壯愈千金云隨年壯

古今錄驗療小兒久痢脫肛方

東壁土五分　龜頭一枚炙焦　五色龍骨五分　卷柏四分

右四味擣散以粉傅之按內之即差

又方　取鐵精粉傅內之差

小兒䘌蟲食下部方四首

千金療小兒蟲食下部方

胡粉熬　雄黃末各等分

右二味以著下部穀道中即差

又除熱結腸丸斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛生䘌蟲䘌方

黃連　蘖皮　苦參　鬼臼

獨活　橘皮　芍藥　阿膠炙各二分

右八味擣篩以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸冬天無藍汁可用藍子一合舂蜜和丸一云三歲以下服三丸三歲以上服五丸五歲服十丸

又杏人湯方

杏人五十枚去皮尖　鹽一合

右二味以苦酒一升煮取一半量與服之

又療小兒下部被蟲食大腸赤瘡爛方

水銀一兩以煖水煮之取少許以唾研安著竹筒中吹入下部中三度差

小兒疳濕瘡方六首

備急療小兒疳濕瘡方

以鐵上衣少許內下部中即差千金同

又方

自大椎數至第十五椎夾脊兩傍灸七壯不差加七壯千金同

又方

艾葉一兩水一升煮取四合分三服差（千金云艾葉切五升以水一斗煮取一升半分三服）

又小兒疳瘡方

胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得千金同

又方

嚼栗子塗之差（千金云嚼麻子傅之日六七度）

又方

羊膽二枚以醬汁和灌下部中猪膽亦得千金同

小兒蚘蟲方七首

千金療小兒蚘蟲方

楝木削上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此有小毒

又方

大麻子研取汁與飲之

又方

石榴根一把水五升煮取一升分二服

又小兒羸瘦有蚘蟲方

雚蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服之

又方

萹蓄三兩水一升煮取四合分服之擣汁服亦佳

又方

東引茱萸根白皮（四兩） 桃白皮（三兩）

右二味切以酒一升二合漬之一宿漸與服取差

又方　蕪荑六分　狼牙四分　白斂二分

右三味擣末以苦酒和量與服之

小兒蟯蟲及寸白方五首

千金療小兒蟯蟲方

取猪膏服尤妙

又方

擣生槐實內下部中差爲度

又主寸白蟲方

東行石榴根一把水一升煮取三合分服

又方

桃葉擣絞取汁服之

又主小兒三蟲方

雷丸　芎藭各等分

右二味擣散服一錢匕日三

小兒瘻瘡方四首

千金療小兒瘻方

塚中石灰研傅之厚著之良

又方

燒桑根灰傅之并燒烏羊角灰和傅之

又療小兒疽瘻方

丹砂　大黃各五分　雌黃　雄黃

藺茹各四分　礬石燒如馬齒者佳　莽草各三分　黃連六分

右八味㕮咀以豬脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓

下諸石藥末攪凝塗之差

備急若患漏瘡頭盡開出膿夜復合者方

大附子一顆內鯽魚腹中於炭火上燒灰研以傅之

更擣蒜以封之良

小兒疥瘡方六首

范汪療小兒疥瘡雄黃膏方

雄黃研　雌黃各一兩研　烏頭一枚　松脂

亂髮各一雞子許　豬脂一升半

右六味和煎之候髮消烏頭色黃黑膏成去滓以傅之熟塗之

千金療疥方

以臭蘇和胡粉傅之差為度

備急療疥方

燒竹葉灰以雞子白和塗之以差為度

又方

以亂髮灰以豬膏和傅之效

救急療疥瘡及小兒身上熱瘡並主之方

黃連　黃蘗　赤小豆　臭黃各一兩　水銀半兩研相和

右五味為散以麻油和先淨洗瘡然後塗之甚佳

又療小兒瘡疥等神驗方

黃連　糯米粉各十二分　水銀八分碎　胡粉六分

吳茱萸　赤小豆各一兩

右六味擣散水銀手中和唾研如泥以猪脂并水銀成膏先洗瘡乾拭令淨以塗藥三兩度差忌猪雞魚肉

小兒癬瘡方六首

集驗療小兒癬方

以蛇床子末以白膏和傅之亦主瘙妙

千金療小兒濕癬方

枸杞根擣末和臘月猪膏傅之一云酢和亦佳

又方

桃青皮擣末以醋和傅之日二

又方

煎馬尿洗之一方云治小兒體上習習

又方

揩破以牛鼻上津塗之

又方

狗屎灰和猪脂以塗之

小兒誤吞物方四首

小品療小兒誤吞鐵珠子如狸豆大者經年不以爲害後病瘦瘠食不生肌膚時下痢或寒熱服諸藥自療來反劇不效看師診之云是吞物不消作法服衆藥所吞物不去終不差令其家中察之去兒近歲常弄十六具鐵珠覺失一顆慮是吞之從來積歲實不以爲疑之師六診乃信是故令病矣爲處湯藥所患即差復與將療其兒肌膚充悅而志說其方且記之又有一家女子六七歲許患腹痛其母與摩按之覺手下有一橫物在兒肉裏正平橫爾問兒曰鄃得鍼在肉中大驚怪脫衣看之肉宁淨無有刺處按之兒亦不患鍼痛惟覺腹裏痛耳其母即以爪甲重重介之乃橫物折爪下兩段亦不偏痛迎師診之共察若吞鍼刺物者其嬰兒時不經鯁礙惟恐養兒時母常帶鍼躶抱攬兒體鍼入兒肌膚中兒縱覺痛啼呼與乳卧息便止遂成不覺今因腹痛摩之知耳鐵得土木濕皆生屑易朽鍼在

人肉中經數歲肉得血氣皆朽也故介之即折令患腹痛不安

但療腹痛服溫中湯下心腹痛差後長大嫁因産乳不閒道鍼

處爲患故記之

千金療小兒吞鍼方

取磁石如棗核大吞之其鍼立出

又誤吞鐵等物方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升頓服之即下

肘後療小兒誤吞梅李方

以少許水灌小兒頭承其水與飲之即出良

近效療小兒誤吞錢在喉中不出方

取麩炭末以指彈入喉中其兒當便咯出妙

小兒雜療方六首

劉氏療小兒上冷下熱上熱下冷難將息方

犀角末　甘草　生地黃各六分　芍藥五分

白朮　茯苓　梔子各三分　柴胡

人參　大黃　生薑各四分　黃芩二分

桂心一分

右十三味切以水三升煑取一升分溫服之

又療小兒身體滿氣急卧不得方

郁李人一合擣末和麪溲作餅子如常法與兒喫

微利即差

又方

郁李人末六分以水七合和調去滓煑粥與兒喫之

又療小兒油丹赤腫方

栝樓三大兩以醶醋擣藥以傅之佳

又方

取蕎麥麪以醋和塗之差

又療小兒野雞下部痒悶方

枳實二兩　鬼箭羽　青木香　鬼臼各二兩

右四味擣爲末以釅醋和以青布裹以熨之有頭即破熨訖令根拔去之差止甚佳

外臺秘要方卷第三十六

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　校勘

外臺祕要方　三十七

乳石論

外臺秘要方卷第三十七 乳石論一十九門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

乳石論序

按古先服餌賢明繼踵合和調鍊道術存焉詳其羽化太清則素憑仙骨若以年留壽域必資靈助此蓋金丹乳石之用豈流俗淺近而能知所患其年代浸深訣籙微密世有傳習罕能詳正更加服石之士精麤不同雖志貪補養而法未精妙遂使言多鄙褻義益繁蕪每加披覽實長疑惑既子弟不得親授亦家童莫能曉了存諸左右殆謂闕如余宿尚谷神栖心勿藥歲月云久經書粗通知文字之一失乃性命之深誤是以會集今古考量論訣取斷名醫都凡纂要建題篇目并五藏合氣經絡受病八風所中形候論訣兼諸家會同將息妙術及乳石丹與雜石壓理之法錄定倫次即亦以時代為先後今刪略舊論纂集

新要分成上下二卷可謂價重千金比肩萬古垂之於後學豁若冰消者乎

薛侍郎服乳石體性論一首

中書侍郎薛曜論曰夫金石之性堅剛而急烈又性清淨而惡滓穢凡服乳石訖即須以意消息尋檢舊法不可無備忌也但人性或冷或熱或寛或急皆須量性將衛不可輕有犯觸凡乳石一服之後常在腸胃若人氣力衰石氣强即發動若人氣力盛石氣安即强健謹按古法皆令五十以上始服乳石殊謂不然今驗所見年少服者得力速兼無病患何以言者年少筋力滿盛飲食飽飫彌益精明壯健終無發理年歲遲暮氣候衰竭食飲失宜此石氣勝人無不發動歷觀得失莫過於此夫人年少縱不喫飲食血氣自强年老力微縱肉精細猶不可健以此言之足明古法疎矣凡人身血脉經行不絶如血脉微有滯處便於其處發瘡或發熱神氣昏悶必欲防之每朝及暮温一兩盞清酒或可以生薑刮碎和少茱萸飲之令遍體熱重重又作

熱羹粥歠之使腸胃通利即石氣流行其初服石一二百日尤宜作此將息是古法服石不取夏月即取冬月所以然者石有發動與服時皆背此又殊乖通論今驗服石飲食失時勞役過度立即發動豈待背時今歷見將衛得宜並不發動復見名醫平章服石之人常作熱將息儻發調適乃易耳脫若石氣發動匙須宣泄服少冷藥便得轉瀉若得通暢熱氣併除若常作冷將息脫若石氣發動用冷藥無由得轉此一曲之說今古存之但欲廣聞見爾其將息皆須自量本性冷熱爲候務取安穩不可拘執古論捨已從人庶通幽君子以此爲意也按本草石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊食之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時蛇牀子爲之使惡牡丹玄

石牡蒙畏紫石蘘草少室猶連嵩山也今第一出始興而江陵及東境名山石洞亦皆有之唯通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中無鴈齒光明者爲善長挺乃有一二尺者黄色以苦酒洗刷則白仙經用之少俗法所重亦甚貴之謹按鍾乳第一始興其次廣連澧朗柳等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今硤州清溪房州三洞出者惡（本草作亞）於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴只可擣篩白練裹之合諸草藥酒浸服之耳陶云鍾乳一二尺者謬說之

李補闕研鍊鍾乳法一首

研鍊鍾乳法

取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊唯黄赤兩色不任用欲鍊亦不限多少置鍾乳於金銀器中即以大鐺中著水沈金銀器於鐺中用

火煎之常令如魚眼沸水減即添若薄乳三日三夜
即得若麤肥厚管者即七日七夜候乳色變黃白
即熟如疑生更煎滿十日最佳煑訖出金銀椀其鐺
内煑乳黃濁水弃之勿令人服服必損人咽喉傷人
肝肺令人頭痛兼復下利不止其有犯者食猪肉即
愈弃此黃水訖更著清水準前更煑經半日許即
出之其水色清不變即止乳無毒矣即於甆盆鉢中
用玉鎚著水研之其鉢及鎚須夾白練袋籠口稍長
作之使鎚得轉兼通上下每日著水攪令調勻勿使
著鎚鉢即封繫練袋自作字記勿使人開一即免纖
塵入中二免研人竊喫研覺乾濇即是水盡即更添
水常令如稀泔狀乳細者皆浮在上麤者沈在下復
繞鎚鉢四邊研之不及者即麤細不勻爲此每日須

一開或二開攪刮令勻勿使著鎚即得勻熟免有麤細研至四五日狀若乳汁研揩視之狀如書中白魚膩即成自然光白便以水洗之不隨水落者即熟若得水而落者即未成更須研之以不落爲限熟訖澄取暴乾任將和藥及和酒空腹服佳千金翼同

曹公草鍾乳丸法二首

主五勞七傷肺損氣急療丈夫衰老陽氣絶手足冷心中少氣髓虛腰疼脚痺體煩口乾不能食服之安五藏補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中法唐尚書用之

鍾乳二兩別研十日 吴茱萸二分 石斛 菟絲子各一兩酒浸別擣

右四味擣篩蜜丸如梧子空腹服七丸日再服訖行數百步温酒三合飲之復行二三百步口脣内熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常須暖將息不用聞見屍穢等氣亦不用

食麤臭陳惡食初服七日内勿爲陽事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患欲多陽事者加雄蛾三十枚若失精加蓯蓉花三兩佳千金翼同

又鍾乳丸法

成鍊鍾乳二十四分　石斛　蛇牀子各五分　人參

桂心各四分　椒三分汗去目并合口者　乾薑三分

右七味擣四十八分計一十二兩以鍊白蜜和之擣三千杵藥成丸如梧子空腹溫無灰清酒下二十五丸日再服如性飲宜加飲少許仍行三數百步即乳氣溜下任食若能節量甚佳古法云令食乾要得丸力速如覺熱衝上進一兩口飯行步消息良久任食若能節食甚佳古法云令食乾飯豆醬不得過多不可依古法終是節食忌行陽事最要能依此法將慎補益之功不可具而述之終妙也

崔尚書乳煎鍾乳餌法二首

療風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力法

鍾乳三兩研如麪以夾帛練袋盛稍寬容急繫頭內牛乳一大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服爲再服亦得若再服即待晚間食消時服之如能頓服即平朝盡服之不吐不利若稍虛冷人即微下少溏利亦無所苦明朝又以一大升牛乳準前煎之依法服餌其鍊袋每煎訖即以少許冷水濯不然氣不通洩如此三十度以上四十度以下即力盡其袋中滓和麪飼母雞取其生子食亦好不然用浸藥酒亦得若有欲服白石英並依此法若患冷人即用酒煎患熱人即用水煎若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之

永不發動忌在別卷中千金翼同

單服乳粉法

乳小秤一兩分爲兩服朝服夜盡無問多少一準此法一兩爲度凡服乳皆須温清酒服之常令酒氣不絶爲佳不得使醉吐唯須少食日食一升許飯得滿三日不出即乳不隨食下化爲度三日外任意作美食將息其乳多少任人貧富服之師云服一斤百病自除二斤流及三世三斤臨死之時顔色不變在土下滿五百年後乃成強壯人

雜餌鍾乳丸散補益法二首

千金鍊鍾乳散療虛羸不足六十以上人瘦弱不能食息百病法能多得常服益佳

鍾乳一斤取白淨光明色好者即任用之非此者不

堪用一味先泥一鐵鐺受四五斗者爲竈貯水令滿去口三寸內乳著金銀瓷器中任有者用之使得沈之於鐺中令水沒器留一寸餘即得常令如此勿使出水也微火煑之日夜不絕水欲竭即添成煖水每日一周時輒易水洗鐺并淘乳七日七夜出之淨淘訖內瓷缽中玉鎚縛格著水研之一日一夜多著水攪令大濁瀉取別澄爲粉其乳麤者自然沈底可研之凡三日三夜皆細逐水作粉畢澄取暴乾更於銀缽中研之一日候入水洗不落爲佳可分秤入散藥服之取鍊成乳粉三兩

上人參三分　上石斛三分　乾薑三分

右三味擣篩與乳令相得均分作九貼早朝空腹溫酒服一貼昏黃後服一貼三日內準此服之三日補還須準舊服如

前盡此一斤乳訖其氣力當自知耳不能具述也新撰英乳論同

延年秘録鍾乳散主補虛勞益氣力消食法

防風 人參各一分 鍾乳二分研 細辛半分

桂心二銖 乾薑一銖

右六味爲散分作三貼每晨温酒服一貼食時服一貼食時進不用過飽亦不得過飢常令飲酒使體中薰薰有酒氣若熱煩以冷水洗手面不用熱食亦不得冷忌法如常

雜餌鍾乳酒法二首

纂靈記鍾乳酒主風虛氣上安五藏通百節利九竅益精明目補下焦傷竭脚弱疼久服延年益壽肥健好顏色不老法

鍾乳三兩細研兩重帛練袋盛內六外清酒中用白甆器盛密封安湯中煎令三分可減二分即出湯還

添酒滿元數封頭七日取飲一服三合忌如藥法

又和酒服餌鍾乳法

成鍊鍾乳三兩以無灰新熟清酒一斗於不津器中相和密封閉冬七日夏二日空腹温服三合日再服漸加以知爲度十五日令盡亦有用此三兩和酒服三日令盡並令節食忌陽事雜愼如藥法 千金翼同

東陵處士鍊乳丸餌并補乳法二首

鍾乳無問州土但白薄光潤者即堪以疎布袋盛懸於釜中勿令著底炭火煑之日三度易水出釜水淨洗訖内釜中發火如前候水色不變爲度將乳袋出於新汲清水中洗去乳袋上浮沫更以牛乳五升緩火煑之一日欲服乳先飲此牛乳任和酒飲之其袋中乳傾出於盤中以水淨洗入鉢即研研滿七日七夜常添水令如牛乳狀勿令乾燥使麤細不匀候白光可愛水霑

不落爲度餘法如前不能重述服法

成鍊乳粉　桂心　蜀天雄各一兩炮　人參

乾地黃　遠志皮　萎蕤各二兩

右七味擣篩六味訖即内乳粉入鉢更研使相和訖溫白蜜去沫和爲丸如桐子酒下二十丸漸加至三十日再服比用

殊妙忌如藥法

補乳法

凡三日服乳三日補之十日服乳十日補之以此爲度補乳法欲得飽食服乳法欲得少飡補乳以牛羊麞鹿等骨並煎取汁任意作羹噉之不得食倉米臭肉等物及陽事待經一月以後稍覺精氣滿盛百脉流通身體覺熱繞臍肉起此爲得力之狀爾然可稍近陽事舒寫亦不得頻數令藥氣頓竭彌更害人戒

之愼之其乳所以名之爲乳者以其狀人乳也宜與
神丹作地與一切凡石逈殊故乳稱石精石滓先師
云上士服石服其精下士服石服其滓滓之與精力
遠矣

周處温授段侍郎鍊白石英粉丸餌法并論紫石白石

英體性及酒法五首

本草經白石英味甘辛微温無毒主消渴陰痿不足欬逆胷膈
間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五藏通日月光
明久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三
寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英
青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬目毒公
今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正
用之仙經大小並有用唯須精白無瑕雜者如此說則大者

爲佳其四色英今不復用謹按白石英所在皆有今澤州虢州
洛州山中俱出虢州者乃大徑三寸長五六寸者今通以澤州
所出爲勝採之妙
又經云紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子
風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補
心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫
令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時長石爲之
使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄昌蒲共療霍亂畏
扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑今第一用太山石色重澈下
有根次出雹零山亦好又有南城石無根又有青綿石色亦重
黑不明澈又有林邑石腹裏心有一物如眼吴興石四面纔有
紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今散家
採擇唯太山最餘處可作丸酒耳仙經不正用而爲俗法所重

也採時依此又鍊服石英法周司戶處溫傳授云於段侍郎處得甚妙

白石英（五大兩）微擣碎以醶酢五大升於不津甆器中蓋頭埋屋北陰處經七十日出瀉除酢擣碎研以水飛如出粉法澄清瀉之更研飛之可經二七日以醶酢三小升還置不津甆器中蓋頭不埋可經二十日出以水洗去酢味盡研之極細即以好驢乳三大升安不津器中重湯煑令乳竭止依方用和後丸

又丸法

生乾地黃　茯苓（華州者）　人參（潞州者）　蜀天門冬（去心）

枸杞（白皮取時月州土者各三兩）

右五味擣篩爲散入前石粉令相得勻調鍊蜜和丸如梧子初服十丸加至二十丸日一服以後地黃酒服之

又酒法

生地黃（切五小升） 烏豆（三小升）

右二味以無灰清酒漬經五宿取服

雜煑石英和金銀草藥餌及銀鑵中煑水飲法三首

千金翼煑石英服餌法

石英五大兩澤州光淨無點翳者取石英打碎如小豆蕎麥許大去細末更於水中濤洗令淨重練袋盛之以繩子繫頭取五大升清水於不津鐵鐺中煑之煑時石袋不用著鐺底恐沙石煎壞先以一杖橫鐺口挂石袋著杖上去底三二分許煑取一升汁置椀中經宿澄取清平朝空腹頓服若以此汁煑稀粥服之亦佳每服後可行五百步并飲三兩盞清酒又更依前法煑石二十度者石即無力以布裹埋南牆下

深三尺滿百日又堪用服之然終不如新者

又石英和金銀人參煑服餌法

金十大兩　銀四大兩　白石英五大兩　人參二大兩

右四味取一鐵釜淨洗即下前件藥於釜中先下水三大升立一杖入釜中令至底水所浸著處即刻記之更下水二大斗七升通前揔三大斗煎之如魚眼沸漸減至杖所刻處即停火急取濕土置釜底取其汁貯以不津器中其金銀石等漉出收取其人參隨藥汁細細喫却其汁每朝空腹服三大合夜間又服二大合欲作食餌亦任每服之後隨性飲少多酒使行藥氣忌如常法

纂靈記銀鑵煑白石英服水法

白石英五大兩上上者

右以銀鑵盛石受可一小升鑵底開小孔子令遍週側畔近下

又兩行開孔遶遍於鐵鐺中著水五大升則內銀鑵水中炭火上煎取二小升去鑵澄清分再服服訖飲少酒脯行一二百步許其石三遍煎一迴打碎一片作兩片乃至麻米大即休弃之不堪服也無所誡忌矣

同州孟使君餌石法一首

服石法

麤白石英一大斤敲碎顆粒如酸棗核大不用全取白石顆先砂盆中和麤石碎砂使壯兒仍少著水和挼三二千下訖即淨洗取石又於砂盆中和砂更挼一二千下依前淨洗即安柳篋箕中蒿茉兼少許水熟挼訖以水淨淘出曬令乾又以手細細挼之令浮碎揔盡熟挼使光滑即盛於夾帛練袋中若出將行若於家內安當門牀上每日平明未梳裹前取七顆

含於口中以酒或水下之一顆一迴咽七迴呑直令到小腹下以兩匙飯壓著即依大家食一無所忌死生穢惡白酒牛肉但是石家所忌皆揔不慎所以辛苦料理使光滑者恐有浮碎薄人腸胃作小瘡子亦無他疑即每日亦起梳裹前依前服之值冷熱都揔無忌此至日午左側即便轉出爲新石推陳石下下訖還依大家食時即喰飯若自知病羸至夜食前又服七顆依前法呑一夜令在小腹下温齊脚明日平明先便轉陳石揔與石下訖又朝法夜法服之此石常在小腹内仍附倉門但小腹温熱於四肢膀胱頭目髓腦膚體之内元無石氣欲發從何而作丈夫婦人多有積冷若下熱必須上冷若上下俱冷胃口不下食便成消渴致死若上下俱熱頭面生瘡脣乾眼赤

手脚枯槁皮毛浮起不久成骨蒸凡人必須上下焦冷熱氣息調和筋脉通達若上熱下冷必有痼積服石之後即下熱自然上冷骨氣堅實腰腎強健萬病自除諸況可悉石氣力得三年以來若不得力十斤亦須常喫若得力訖一斤即止也

羊肉中蒸石英及石汁蒸猪肉兼作薑豉服餌法三首

羊肉中蒸石英服餌法

精羊肉一斤 白石英三兩

右二味先取肉擘作兩段鑽作孔內石著肉中還相合即用荷葉裹又將臘紙裹又將布裹於一石米飯中蒸之候飯熟即出却石後取肉細切和葱椒薑等絕小作餛飩子熟煮每旦空腹冷漿水中吞一百子吞訖將冷飯壓之百無所忌宜春夏服大驗其石永不發勿令餛飩破碎其石三兩迴用之

乃換之

又石汁中𤍠猪肉餌法

白石英一大兩

右一味絹袋盛以水三斗煎取四大升去石以猪肉一斤細切椒葱𪉟豉一如食法煑之候肉熟即下向一合中盛任意服之隔十日一度打碎煑之一無所忌甚妙

又石英汁作虀豉服餌法

白石英二大兩　肥猪肉三斤

右二味以水八升煑石英取五升量煑猪肉得爛熟爲度取猪肉汁下葱豉切肉作虀豉食之一劑可六七日喫令盡二兩石英三度煑之第一度全用第二度中破第三度擣碎煑之每煑皆用白練袋盛之其石經三度煑即須換新者二月以前八月以後皆可作餌也千金翼同

猪肚中煑石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服

餌法三首

千金翼猪肚煑石法年四十以下服二大兩年四十五十乃至六十以上加二兩常用四月以後服之以熱者緣石性重服經兩月以後石力若發即接秋氣石力下入其藏腰腎得力終無發理

白石英二大兩末以生絹袋重盛縫却口　人參末　生地黃切

生薑細切各三大兩　葱七莖細切　豉一抄　椒四十九顆去目合口者

羊肉半斤細切　猪肚一具淨料理如食法　新粳米一合和前件藥并石英袋內著猪肚中急繫口勿使少洩氣及水入

右十味以水二斗煑至八升即停出藥肚著盤上使冷然後破之如熱破恐汁流出先出石袋訖取煑肚汁將作羹服之每年三度服每服石英依舊餘藥換之分數一依初法每服

隔一兩日不得食木耳竹笋

又石英飼牸牛取乳服餌法

白石英（三大斤取好者以上亦得）

右一味擣篩細研三兩日研了取一牸牛十歲以上養犢者唯瘦甚佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日即得取乳每朝空腹熱服一升餘者作粥喫任意食之百無所忌以五月上旬起服大好如急要亦不待時節終無發世牛糞糞地隨意種菜供服乳人喫之

又石英和磁石浸酒餌法

白石英（五大兩澤州上好者）磁石（五兩去毛石連鐵多者十兩亦得二物各擣令碎各用兩重帛練袋盛之）

右二味以好酒一斗置不津器中懸藥浸經五六日以後每日飲三兩盞常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者

加之仍隨所加有忌者禁之餘百無所忌一年以後鬚髮變黑腰疼耳聾悉差其酒三五日已後即漸添一二升常令瓶滿所加草藥疑力盡者任換之經三四箇月疑石力稍微即更出擣碎還以袋盛經半年以後弃之準前更合

服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者藥菜等一十條

不可食者油脂（其性滑腸而令人不能食縱喫勿遣多也） 又蕪荑（能生瘡發石氣） 又薺苣（云發石亦云損石） 又芥子及芥菜（善能發藥發熱） 又蔓青菜（發氣觸石） 又葵菜（滑而且擁亦不可食）凡不可食者勿食爲佳

若欲食者皆須報鍊雜以葱椒然可通食者蘇（其物潤腹而能行石氣）

又冬瓜龍葵（此二物甚壓石亦多食熱服） 又蔓菁（作黃韲和肉作羹始可少食亦須椒葱雜之）

又葵（不可空喫腹胃燥澀可取三五葉入肉時食一頓也）

張文仲論服石法要當違人常性五乖七急八不可

兼備不虞藥并論二十三條

五乖

重衣更寒一乖凡人寒衣即暖服石人宜薄衣若重衣更寒經云熱極生寒故云一乖

飢則生臭二乖平人飲食不清作生食氣服石人忍飢失食即有生食氣與常人不同故云二乖

極即自勞三乖平人有所疲極即須消息將養服石人久坐久臥疲極唯須自勞適散石氣即得暢故云三乖

溫則泄利四乖平人因冷乃利得暖便愈服石人溫則泄冷即差故云四乖

飲食欲寒五乖平人食溫暖則五內調和服石人食飲欲寒乃得安穩故云五乖千金翼名六反云瘫瘡水洗六反也餘同此但有

五條名五乖

七急

當洗勿失時一急若覺身體暖疼關節強直翕翕發熱憒憒心悶即須洗浴若初寒先用冷水後用生熟湯若初熱先用煖水後用冷水浴訖可以二三升冷水淋頭故云一急

當食勿飢二急須食即食不得忍飢故云二急

酒必淳清令溫三急無問冬夏常須飲多少任性熱飲尤佳故云三急

衣溫便脫四急

食必極冷五急

臥必榻薄六急

食不厭多七急

八不可

冬寒欲火一不可

飲食欲熱二不可

當疾自疑三不可（凡服石常須消息節度覺小不安將息須依法不得自生狐疑）

畏避風濕四不可（若覺頭風熱悶憒憒心煩則宜當梳頭以水洗手面即好不比尋常風濕依此尤佳）

極不欲行五不可（若久坐久臥有所疲極必須行役自勞）

飲食畏多六不可

居貪厚席七不可

所欲從意八不可（不用從意所違石性將息節度爲妙）

凡藥石發宜浴浴便得解浴訖不差者乃可餘療若浴不差
即得依後服葱白麻黃等湯諸隨身備急藥目新附

紫雪　金石凌　甘草　萎蕤

黃芩　大黃　狗白糞　芒消

朴消加二　蘆根　麥門冬　香豉

石膏　犀角　胡豆　露蜂房

白鴨通　大麥奴

右以上諸藥皆乳石所要仲嗣今與名醫擇之常用隨身
備急

寒食諸法服之須明節度明節度則愈疾失節度則生疾愚者不可強強必失身智者詳而服之審而理之曉然若秋月而入碧潭豁然若春韶而泮冰積實謂美矣凡將理解折法具在中卷參而行之

乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十五首

延年祕録論曰乳者陽中之陰石者陰中之陽乳石從來陰陽精體處至陰之裏有正陽伏其中正陽之中復在至陰之裏故陽生十一月甲子後服乳陰生五月甲子後服石陰陽發明互相爲用而服之旨理於內不泄於外也夫人膚虛皆帶風氣處人全軀常經含象理之有法則禍害不生乖於時候則危療立至竊覽古法皆云四月服石此謂浮學不曉由來按聞承開服石僉曰四月雖開而未平六月謂得氣之節他皆倣此常以不全實其府不全虛其藏即八風之道無所滞焉或有藥觸成痾飲食發疾今並倫次詳而行之舊

論曰神農桐君深達藥性所以相反畏惡備於本草但深師祖學道洪道洪所傳何所依據云

鍾乳動朮令人頭痛目疼朮動鍾乳即胷塞氣短海蛤動乳即目疼氣短雖患不同其療一矣如與上患相應速服葱白豉湯其五石大散自後人發動將療亦非古法乃云鍾乳與朮更互相動本草既無成文但學者穿鑿今但依頭疼目痛胷塞氣短證候速服葱白豉湯方（千金云鍾乳又對栝樓）

葱白（切一斤去青）　香豉（三升綿裹）　吳茱萸（一升）　甘草（一兩炙切）

右四味以水一斗半先煮葱白澄清取八升內藥煮取三升分三服訖令人按摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以暖衣汗出去衣服湯熱歠即便冷濤飯醬脯等物任意食之（千金用葱半斤豉二升甘草人參各三兩無吳茱萸）

若服此不解復服甘草湯方

甘草（三兩炙）　桂心（二兩）　豉（二升）　葱白（半斤）

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復

服桂心湯方

桂心 麥門冬（去心各三兩） 人參 甘草（各二兩炙）

葱白（半斤） 豉（二升）

右六味合服如前法出千金

防風細辛動硫黃令人煩熱脚疼腰痛或瞋忿無常或下痢不禁防風細辛能動硫黃而硫黃不能動彼纔覺發便服杜仲湯方

杜仲（三兩） 枳實（炙） 甘草（炙） 李核人（去皮各二兩）

梔子人（十四箇） 豉（二升）

右六味合服如上法若不解復服大麥奴湯方

大麥奴（四兩） 甘草（炙） 人參 芒消

桂心（各二兩） 麥門冬（去心半斤）

右六味合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣或冷

腹脹人參湯方

人參　乾薑　甘草炙　當歸各一兩

附子炮一枚

右五味合服如上法出千金

附子白石英兩更相觸若白石英先發令人煩熱腹脹若附子先發令人嘔逆不食或口噤不開或言語難手足酸疼切覺宜服生麥門冬湯方

生麥門冬三兩去心　甘草二兩炙　麻黃二兩去節　豉二升

右四味切先以水一斗煮麻黃掠去沫訖內諸藥煮取三升分三服服別若按摩卧覆取汗候藥氣散溫飯醬菜脯等任食若熱未退更服大黃湯方

大黃三兩別漬　甘草二兩炙　梔子二十九枚擘　豉二升

右四味切以水九升煮甘草梔子取二升半然下大黃煎三

四沸去滓分三服待下泄止不下當盡服一法若煩熱加細
辛一兩若熱勢未除視瞻高而患渴復服栝樓湯方
生栝樓 大麥奴各四兩 甘草二兩炙 葱白半斤
豉二升
右五味合服如上法稍稍一合服之隱約得一升許便可食
少糜動若已解胃中有餘熱復服芒消湯方
芒消 桂心各二兩 通草 甘草炙各三兩
白朮一兩 大棗二十箇擘 李核人二十一箇去皮
右七味合服如上法若腹脹去芒消加人參二兩 出千金
人參動紫石英令人心急而痛或驚悸不得卧或恍惚忘誤
失性發狂或惛惛欲眠或憒憒喜瞋或差或劇乍寒乍熱或
耳聾目暗又防風雖不動紫石而紫石猶動防風爲藥中亦
有人參緣防風動人參轉相發動令人心痛煩熱頭項強纔

覺發宜服麻黃湯方（千金服人參湯後）

麻黃（三兩去節）　人參（一兩）　甘草（二兩炙）　葱白（切一升）

豉（一升）　大麥奴（一把）

右六味切以酒五升湯三升煮取三升分三服良

又解服人參湯法

人參（三兩）　細辛（一兩炙）　白朮（二兩）　桂心（二兩）

豉（三升）　千金有甘草（二兩）

右五味以水一斗煮取三升去滓分三服若老瞋盛加大黃黃芩梔子各三兩出千金

若忘誤狂發猶未除服麥門冬湯方（在後礜石法下）

若心有餘熱氣更服人參湯方

人參　防風　甘草（炙各三兩）　桂心（二兩）

生薑（切）　白朮（各一兩）

右六味合服如上法出千金

桔梗動赤石脂令人心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗令人頭痛目赤身體壯熱始覺發宜温清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦可服大麥麨方

大麥麨令汗出燥止勿令大焦舂去皮細擣篩以冷水和服之入蜜亦佳千金翼去炒去皮蒸令熟暴乾香擣篩

礜石無所偏對發則令人心急口噤骨節疼強或節節生瘡將冷太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五六石灌之食少煖食飲少熱酒行步自勞即服麥門冬湯方

麥門冬半斤去心　豉二升　葱白半斤切

右三味以水七升煮取三升分三服覆暖衣汗出即差一法加甘草三兩人參一兩半千金又有桂心二兩云始覺發即

服葱白豉湯用葱白半斤豉二升甘草二兩炙三味以水六升煑取二升半分三服若散發身體卒生瘡即服麥門冬湯

銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條

薛侍郎曰服石之後二三百日内須喫精細飲食羹粥酒等使血脉通利羹法

取麞鹿兎雉鵝鴨肉等以水淨洗切如指大於鐺中炒令欲熟即多下葱白少下椒鹽熬令香即下少水煑次下粳米糝次下豉清醬汁調鹹酸適口每欲食先須歠十數口羹汁令胃口開通皮膚津潤然後進諸食縱噉炙肉亦無所慮作此將養食多且健縱噉餺飥亦須多殺臛汁

又若覺體氣沈滞石勢不行慎勿喫麪若覺虛惙任餌署預

餺飥方

取大暑預刮去皮薄切日暴乾承潤挼作粉不粉者更暴依前挼粉訖下篩以煖湯及鹽如麪細切作餺飥肉造臛如前羹法用澆餺飥任食此肉補益強筋骨止渴

又若覺渴及熱盛慎勿食炙肉羊羶尤惡自外肉性平冷者通食仍勿熱進恐成消渴

又若欲知體實而壅者先看脚拇指甲肉滿及肉色赤是實也實即畏熱發當須服藥微瀉

又若覺四肢筋強背脊重或頭痛如刺眼睛欲脫者宜以香湯浴須虛靜大屋內適寒溫先以湯淋大椎及顖上三五十椀然後乃浴勿令見風浴訖覆被安卧擬取汗仍須喫葱根葛豉

粥法

葱根三大握 乾葛六兩切 豉三合 葱白一大握擘

生薑少許切 椒十五顆干

右六味先以水五大升煑葱根減半去滓下葛及豉煑取二大升去滓細研少米作稀粥并著葱白等煑熟承熱啜服之訖依前覆被取汗訖令婦人以粉遍身指摩使孔合半日許始可出外其病立差如不損可重爲之

又若覺大熱者可服紫雪或金石淩或絳雪或白雪等但温半大升水取次研一大兩香湯浴後頓服之候一兩行利熱乃退矣凡此數急紫雪爲上如不得通洩宜服黄芩飲子法

黄芩一大兩 梔子人二七枚 乾葛二大兩 芒消半大兩

右四味切以水三大升煑取軟一大升絞去滓下芒消調之分温兩服快利即差止

又若發熱但依法次第將息及服藥後得微汗微利爲佳不要

多利利多即反損石勢又加虛人

又若覺體氣惛惛不痛不痒小便赤澀即擣茅根汁服之

又若口乾即擣蔗汁服之其甘蔗能利大小腸如先利即勿喫甘蔗在下卷口乾法中

又若少覺不下食服生薑汁酒等法

生薑汁一合　白蜜一匙　清酒倍生薑汁

右三味相和温頓服之半日乃效甚佳

又若覺食不下兼嘔宜服麥門冬飲子法

麥門冬一大兩去心　甜竹葉一大握　生薑半大兩切　小麥四合淘去土粃

右四味以水三升煑取一升半分温兩服

又若不下食體弱乏氣力即酒食鮮鯽鱠法

取鮮鯽魚剥去鱗破去腸血勿洗之但用新布一二尺淨拭令血脉斷名曰上鱠餘依常鱠法美作蒜虀

勿食瓜薑等醬尤益人下食亦療氣痢赤痢

又若發瘡及腫有根無根但服五香連翹等湯及丸其法在此卷末癰疽法中

忌食豬肉蒜生菜等唯宜食兎肉仍傷熟喫甚佳

又若腫有根堅如鐵石帶紫赤色者服湯後仍以小小艾炷當腫上灸之日一兩炷爲佳養如常法

又若觸穢必不善四體懔懔飲食無味亦可含香丸如不瘥服一盞五香湯取微利一行佳則不煩沐浴也

飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條

古今録驗論曰飲酒則石勢敷行經絡氣力強溢腎胃氣堅王即頓爲陽事陽事過多便腎虛腎虛則上熱熱盛則心下滿口乾燥飲隨嘔吐胃府不和宜服葛根飲安穀神除熱嘔止渴也且石酒相得遞相爲用若石勢不行則須少飲如石氣調歇不復須飲料量亦與石性同

又若熱盛充滿經絡心腹少脹欲心下痞痞不消或時聚如堅
隨復消者宜服秦艽湯得利便差秦艽湯法

秦艽（三兩細切）以牛乳一大升煮取一小升去滓頓服之得利即差若老弱可量氣力進之其飲食亦宜清冷不得濁熱濁熱則使石勢壅塞不行喜嘔吐病堅結也亦能發黃或小便赤心堅痛者亦宜服秦艽湯得溏泄差熱氣散後黃色縱徹皮膚是差候勿怪熱散後慄慄寒顫若因顫黃復出外者是謂餘熱欲散也勿厚覆但使肌膚中少寒顫良

又若熱解寒不解者可飲三合熱酒使解

又若寒解後頭重耳鳴滿眼漠漠心下痛者可飲二合許清酒便差寒溫宜依此法

又若心下結硬腹脹大小便不利者急服前胡大黃湯下之法

在下卷小便淋法中

又若欲狂癖失常者與白薇湯下之法在下卷淡澼乾嘔法中

又若酒熱歇石熱亦不復行心下熱結已消黃縱未歇亦無所苦但冷飲食勿進辛辣菜及熱補食若不欲進清冷者可和煖餌勿令大熱

又若飲熱歇後石勢虛損飲食入口自覺諸脉中疈疈如冷水入者是酒石俱退經絡空虛故也宜積日調冷食兼依服進猪蹄羹通養諸脉自差止

又若頭眩耳聞空中有人語心怯恐懼兼憂悸不安四肢如痺或起眠即輙驚如被虎狼所逐威熱所攝者方

服淡竹瀝二三升乃至三升差止亦可進白薇湯下之消息稍與令飲粥常令有食力時進雞心酸棗湯常令對偶安慰之以美言相悅愼不可以惡事驚之

又雞心酸棗湯療飲後陽多腎虛發熱積日不食胃中虛熱飲食不已氣入百脉心藏虛盛令人失常法（出古今錄驗）

雞心（十枚） 酸棗（半升） 人參（一兩） 茯神

芍藥（各二兩） 白薇 枳實（炙） 知母

甘草（炙） 栝樓（各二兩） 生地黃（八兩）

右十一味切以水一斗煮藥半熟內心煑取三升冷分三服

餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條

小品論曰凡服五石散及鍾乳諸石丹藥等既差節度觸動多端發狀雖殊將攝相似比來人遇其證專執而療之或取定古法則與本性有違或取決庸醫則昧於時候皆為自忤遂推石過深省其理未曰合宜每尋古醫互相晦見直言沐浴實未探微寒溫適情蓋須自度隨時之義易所通焉故陶正白云昔有人服寒食散檢古法以冷水淋身滿二百罐登時殭斃又

有取汗乃於狹室中四角安火須臾則殞據茲將息豈不由人追之昔事守株何甚今列篇章幸擇長而錄用耳寒食藥得節度者一月輒解或二十日解堪溫不堪寒即已解之候也其失節度者或頭痛欲裂爲服藥食溫作癖宜急下之

又若手脚卒患頑癖者爲犯熱經久故也急與冷水洗飲熱清酒進冷食即止一法飲冷清酒亦止

又若體上生瘡結氣腫痛不得動者爲自勞太過也宜服香豉飲法

香豉三升　葱白一虎口

右二味以水三升煮三沸服之不止乃至三四劑自止

又若腰痛欲折兩目欲脫者爲熱上肝膈腰腎冷極故也宜服黃連飲法腰痛欲折兩目欲脫千金翼作二條

黃連　甘草炙各一兩　萎蕤二兩

右三味切以水三升煮取一升去滓內朴消一兩頓服得微利止
又若眩冒欲倒者爲衣厚犯熱故也宜冷水淋頭并洗之須臾
即愈千金翼云宜洗頭
又若脚疼欲折者爲久坐溫處故也宜常須單床行役并以冷
水洗浴即止
又若腹脹欲裂者爲久坐下熱衣溫失食故也宜數冷食冷洗
當風取冷須臾即差
又心痛如刺者爲應食不食應洗不洗寒熱相擊氣結不通塡
於心中故也宜數飲熱酒任性多少酒氣行經絡通達淋以冷
水又冷淹手中搭著苦處溫復易之須臾解也解後仍速與
冷食食多益善於諸痛之中心痛最急宜速救之法在下卷
心痛法中
又若發急遍身熱如湯火或氣結不識人時倒口噤不開不自

覺知者救之要以熱酒隨其性灌之卒不得下者當打去齒灌之咽中寒盛酒入必還出但灌勿止半日許以酒下氣徹乃蘇酒卒不下者難可救矣

又若下痢如寒中者爲行止食飲犯熱所致冝速脫衣冷食冷飲冷水洗即差

又若百節酸疼者爲卧處太厚又蓋覆被衣温不脫故也但單牀薄被單衣或以冷水洗勿著新衣著故垢衣雖冬寒常須散髮受風仍以冷石熨其衣勿繫帶若犯此酸悶者急入冷水浴勿忍病而畏冷兼食冷飯

又若兢顫惡寒或發熱如温瘧者爲失食忍肌失洗不行又食臭穢故也冝急飽冷食冷水洗數行即愈

又若惡食臭如死物氣者爲食温作澼故也冝急以三黃湯下之若不下終不差法在下卷解壓法中

又若咽中痛鼻中塞清涕出者爲衣温近火故也但速脱衣取冷當風以冷石熨咽鼻當自差不假洗也

又若胷脇滿氣上嘔逆者爲肌而不食藥氣上衝故也速與冷水洗食冷飯止

又若食便吐出不得安住者由癖故也宜急以甘草飲下之不下當危人命爾甘草飲法

甘草（二兩炙） 大黄（三兩別漬） 黄芩（二兩）

右三味切以水三升煮三兩沸去滓分服以利爲度

又若大便難腹中堅如盤蛇者爲犯温積久腹中有乾糞不去故也宜銷酥蜜膏服一二升津潤腹内即下若不可服大黄朴消等下之

又若患淋者爲久坐温處或乘鞍馬坐處大熱熱入膀胱故也但冷食冷水洗冷石熨腹不過一日即差止（千金翼云若不止可下之不下殺人）

又若寒慄頭掉不自支持者爲食少藥氣溢於肌膚五藏失守百脉搖動與正氣相競故也宜強飲熱酒以和其脉強食冷食以定其藏強行以調其關節強洗以宣其擁滯即差

又若小便稠數者爲熱食及噉諸熱餅肉之屬故也宜冷水洗腹兼服梔子湯法

梔子人二兩　甘草炙　芒消下湯成　黃芩各二兩

右四味切以水五升煑取二升分温二服取利即差

又若失氣不可禁止者爲犯温不時洗故也但冷水洗之即差

又若遺糞不自覺者爲熱氣入胃大腸不禁故也當冷洗即差

又若目痛如刺者爲熱氣衝肝上眼故也但數冷食清朝温小便洗之不過三日即差止

又若耳鳴如風聲又有汁出者爲自勞過度陽事不節氣上耳故也宜數飲食補之節禁陽事即差

又若口中傷爛舌強而燥不得食味者爲食少穀氣不足藥氣積在胃管故也宜急作豉湯服之豉湯法

香豉二升　萎蕤　甘草炙各二兩　麥門冬去心　小蘗各三兩

右五味切以水六升煑取二升分溫三服能頓服益佳再合爲度

又若關節強直不可屈伸爲久停息不自勞洩藥氣不散漸侵筋血故也出力使溫冷洗即差止

又若得傷寒溫瘧者爲犯熱故也宜以常療藥救之無咎但勿服熱藥耳其傷寒瘧藥等皆除熱破癖不與寒食相妨故通服也凡服寒食雖已熱解而更病者要先以寒食救之終不中冷其法在下卷解壓法中

又若飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗之復寒甚者

數十日輕者數日晝夜不得寢寐愁悲恚怒自驚跳悸恍惚忘誤者爲犯温積久寢處失節食熱作澼內熱與藥併行寒熱交爭雖以法救之終不可解也昔皇甫氏曾餌此散每發即欲自刑尊親制之乃免斯禍強令飲食其熱漸除縱家有寒熱藥發急皆忘雖素聰明發皆頑嚚告令難喻爲茲斃者不可勝數遂檢家兄士元救急之法合三黃湯服之大下便差止而錄之法在下卷解壓法中

又若脫衣便寒著衣便熱爲脫著之間失適故也小寒自可著小温便可脫即止洗之則爽然差慎勿忍之便病成也小品云洗則了然差矣應洗勿忌之忍則病成也

又若齒斷腫脣爛牙齒搖痛頰車噤爲坐犯熱故也宜時救之可當風張口使冷氣入咽漱寒水即差

又若脉洪實或斷絕不足似死脉或細數弦駃其所犯非一此脉

無醫不識也熱多則弦駃有癖則洪實急痛則斷絶凡寒食藥熱率常如此自無所苦非死唯勤節度爲妙

又若大便稠數爲坐久失節度將死之候也如此難療矣可與前大黃黃芩梔子芒消湯下之黨十有一生耳可爲必死之療不可不利致死令人恨也

又若人已困而脉不絶爲藥氣盛行於百脉人之真氣已盡藥氣尚自行故不絶非生氣也死後體因溫如生人肌腹中雷鳴顏色不變一兩宿乃作死人也

又若周體患腫不能迴轉者爲久坐不行又不飲酒藥氣滯在皮膚之内血脉不通故也宜飲酒冷水洗自勞即差若不能行者遣人扶持強行使肢節調暢乃止亦不得令過度使反發熱或反熱者還當洗之

又若食患冷不可下者爲久冷食口中不知味故也當作白酒

糜多著蘇熱食一兩頓若小悶者還令冷飲食即差止
又若下部臭爛者爲坐薦席厚熱故也當坐冷水中即差
又若夜眠不得睡者爲食少熱在内故也服梔子湯方
梔子人十四箇　大黄三兩　黄芩二兩
右三味切以水五升煑取三升去滓分三服微利又當數進
冷食自得眠睡
又若嘔逆咽喉中傷清血出者爲卧温及食熱故也但飲冷水
冷石熨咽喉即差
又若藥發輒安卧不與人語者爲熱盛食少失其性故也但與
熱酒冷洗冷食自勞便差千金翼云藥發輒尸卧不識人由熱氣盛食少不充邪忤正性故也
又若四肢面目浮腫者爲飲食温久不自勞力藥與正氣相隔
故也但飲熱酒冷食自勞洗浴即差千金翼云藥氣與正氣相併
又若鼻中有氣如斷雞子臭者爲著衣温故也或陰囊臭爛

爲坐熱故也入冷水中即差宜脫衣洗浴即自差
又若卒目暗無所見者爲飲食居處太温故也但脫衣冷洗冷食須臾差止
又若身肉處痛痛無常處如遊風者爲犯熱所作非風冷故也宜冷洗以冷石熨之自差
又若服藥心悶亂者爲服温藥與疾爭力故也法當大吐如或不吐病當至死若吐不絕可食冷食飲自然差也若絕不識人口復不開者亦當斲齒以熱酒灌之入咽吐出者更與之但得酒氣下通不半日即便蘇矣
又若嗜寐不覺者爲久坐熱悶故也宜冷洗冷食即差
又若肌膚堅如石不可屈伸爲熱食温卧作癖五藏隔閉血脉不通故也急服前三黃湯下之食冷食飲熱酒自勞即差
又若臂脚偏急痛苦者爲久坐卧温熱不自移轉氣入肺脾

胃故也宜勤以二布巾淹冷水搭之覺温則易如此不過三日即差千金翼云熱入腹附骨故也

又若患腹背熱如手如杯如盤許大者以冷石隨處熨之

又若脚指間生瘡者爲履襪太温故也當以脚踐冷地以冷水洗足差

又若口熱痛煩悶者方

生雞子五枚

右一味頓服之即便愈

癰疽發背證候等論并法五十三首

夫二儀含象三才貫形五體以類於五行六府乃同於六呂人之肉也則脾之所主人之皮膚則肺之所管膚肉受病皆由滋味而與衣服衣服厚暖則表之呼寒滋味失度則府藏皆熱府藏既擁則血脉不流血脉不流則毒氣偏注湊於俞穴俞穴之

所陰陽會津承虛伏守必養其血血敗即潰肉肉腐而成膿實則爲癰浮則爲腫也若兼腎肝虛熱遂成疽成癧矣且疽則附骨癧則著筋凡曰癰疽脉皆有狀有浮有滑有數有澀有弱有沉浮爲陽虛滑爲陽實數爲陽燥澀爲陰寒弱爲陰虛沉爲陰堅三陽三陰之脉也若三部之中脉有一陰一陽復結爲失常經者癰疽之候也且脉法心洪肺浮肝弦腎沉若肺肝心俱至即發癰疽何以言之爲一陰一陽水火競焉舊論寒熱客於經絡血澀不通其理乖也論熱盡發於內而形於外未有外熱能入於內而成其腫皆由表虛客寒所搏故衣厚暖呼其寒是其義也凡癰發生皆由自召一呼吸失度二喜怒不調三飲食愆時四陰陽乖候犯此四者則六府不和榮衛不利榮者血也衛者氣也血傷寒則澀氣傷熱則益氣則爲火血則爲水水火相博遂形癰疽故加虛則氣撮心惙四肢顫掉若有失

而悸此爲膿不出盡之候久即成漏縱差終發宜服排膿補養藥即無咎也癰疽之名大體相似發有深淺療有虛盈然攝之於藥物殊途而同歸也

凡人強壯之年少陽氣省皮膚疏薄滋味愜情腸胃壅塞因壅發熱即受其寒寒氣摠至受有淺深隨處爲證淺即內陽尚壯中即少虛深即虛竭病在陽即易去在陰即難除其有決生死之神功辨形色之宗旨明劉涓之術錄爾

凡癰疽膿出後不可療者有五一眼白睛青黑而小二咽藥而嘔三傷痛渴甚四髆項中不仁五音嘶色奪此爲極也

又凡食諸生果皆召其痾養生法云勿食不成核之果勿食和汚粒之食皆爲瘡癰略爲綱舉以曉將來耳

千金論曰凡發背皆由服五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服石而自發背者此是上代有服之者

其候率多於背兩膊間起初如粟米大或痛或痒仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至不救及其臨困時瘡方圓徑三四寸高一寸兼有數十孔以手按之諸孔之中膿皆反出尋即失音不言所以養生者小覺背上痛痒有異即取淨土水和作泥捻作餅子徑一寸厚二分貼著瘡上以麤艾大作炷灸之一炷一易餅子腫若粟米大時可灸七餅即差若如榆莢大灸七七炷即差若至錢許大日夜灸不住乃差并服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈

又五香連翹湯方

青木香　沈香　獨活　連翹

升麻各二兩　麝香半兩　薰陸香攻頭痛不著亦得　雞舌香各二兩

射干二兩一法一兩　大黃三兩別漬　淡竹瀝二升　桑寄生二兩

通草二兩

右十三味切以水九升煑藥待水減半然內竹瀝更煑取三升分溫三服甚佳千金本方有丁香無雞舌香

又五香丸療心腹鼓脹冷瀉鬼氣疰忤方亦名沈香丸

沈水香　青木香　丁香　硃砂各一兩別研

麝香別研　犀角鑡取屑　薰陸香　梔子人

連翹　石膏二兩別研各　芒消熬　蜀升麻

大青　乾藍　栝樓　乾葛

茵蔯　黃芩　肉桂　芎藭

茯苓各三兩　巴豆三兩去心皮熬令變色別研如脂　大黃三兩

右二十三味擣篩蜜和更擣一千杵封以油臘紙無在有患時溫熱疰病鬼癨病心腹鼓脹疽黃垂欲死者可服四五丸丸如梧子大或至六七丸但取三兩行快利爲度利止即差

又療發背腸癰乳癰一切毒腫服之膿化爲水神驗方

犀角屑十二分 大黃五分 蜀升麻 梔子人

黃芩 防風 蜀當歸 甘草炙

乾藍 人參 黃連 黃耆各四兩

巴豆二十顆去心皮熬別擣

右十三味擣篩蜜和爲丸初服十丸取快利三兩行如不快利更服三兩丸以快利爲度若利多以冷酢飯止之已後服每減丸常取塘利腫消乃止一方有蔘實

又療一切腫初覺痛不可忍神效方

取麪溲如十指許麤繞腫令匝滿中布生椒又以一片麪可椒上蓋之當中以艾炷如酸棗大灸之蓋麪欲焦即換著新麪痛停止

又療風毒及一切腫塗散方天后賜會稽王岑十六遂於嶺南見郭訥駙馬患腫發背會稽與蘆黃門等親與藥須臾平復

岑侯因得此法

大黃五兩 白斂三大兩 寒水石 紫葛

青木香各一大兩 消石 黃芩各二大兩 大青三兩

苦參一兩

右九味擣散和牛乳塗故布上搨腫上隨著即消乾復易之若腫在骨節即搨近骨節好肉處移取腫榻即消

又方汝陰靈明府說傳云甚驗

水銀二斤

右一味以紙分爲兩裹密繫頭更以帛重裹勿令走失遞互將搨上覺溫即易不過十數度熱毒盡歇即消矣神效

又發背神驗方

狗白糞半升覺欲作腫者

右一味以煖水一升絞取汁分再服以滓傅上每日再爲之

瘥止

又方　凡腫起於背胛中頭白如黍粟四相連腫赤黑令人悶亂者名發背也冝禁陽事酒蒜麪若不灸療即入内殺人可當瘡灸七八百壯有人不識多作雜腫療皆乃死

又方　取三年酢滓微火煎和牛脂封上日一易之

又方　取亂髮灰酒服一方寸匕

又方　狗牙灰酢和封之瘥

又方

又方
飲鐵漿三升下利即差
又方
猪羊脂封之亦療乳癰妙
又方
鹿角灰酢和塗之佳
又療石氣在皮膚重熱膏方
生麥門冬（去心） 萎蕤 鼠李皮 石膏（碎）
凝水石 沙參（各一兩） 青葙子 露蜂房（各一分）
竹瀝（一大合） 杏人油（二大合） 牛酥（五大兩） 生地黃汁（五合）
右十二味切內酥油瀝中微火上煎令魚眼沸一炊久膏成
覺有熱處即摩之差止
又療發背及癰疽潰漏并未潰毒腫方
栝樓 榆皮 胡燕窠 鼢鼠土

女人潮信帛水洗取汁

右五物等分潮信汁和如泥塗腫上乾即易之潰者四面封亦覺即封之三五日差

又排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方

防風　茯苓　白芷　桔梗

遠志去心　甘草炙　人參　芎藭

當歸　黃耆各一兩　附子二枚炮　桂心二分

厚朴二兩炙　赤小豆五合熬

右十四味擣散酒服一方寸匕日三服夜一服

又排膿止痛利小便散方

瞿麥二兩　芍藥三兩　赤小豆微熬　桂心

芎藭　麥門冬去心　白斂各二分　黃耆

當歸各二兩

右九味擣篩先食温酒服一方寸匕日三

又療癰腫自潰長肉薏苡人散方

薏苡人　桂心　白斂　當歸

肉蓯蓉　乾薑各二兩

右六味擣篩爲散先食温酒服一方寸匕日三夜再之

又療諸虛不足發背及癰疽差後經年復發皆由大風聚結毒氣在内閉塞得夏月出攻背不治積聚作膿血或爲内漏

内塞排膿散方

山茱萸　五味子　茯苓　乾薑各六分

當歸　石韋去毛　芎藭各四分　附子二分炮

肉蓯蓉　巴戟天去心　遠志去心　麥門冬去心

乾地黄各八分　菟絲子酒漬　地麥各三分取乾者　石斛

人參　甘草炙　芍藥　桂心各五分

右二十味擣散服一方寸匕日三夜一稍加至二匕長服終身不發癰癤

又療癰疽發背婦人發乳諸癤已潰未潰者便消不消者速潰疾愈内補散方

木占斯　敗醬　細辛　乾薑

厚朴炙　桔梗　甘草炙各一兩　人參六分一法二兩

栝樓子六分　防風六分

右十味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜二間食長服去敗醬

又療癰疽發背猪蹄湯方

猪蹄一具　黃耆　黃連　芍藥

黃芩各二兩　薔薇根　狼牙各八兩切

右七味切以水三斗煑猪蹄令熟澄取三升漬諸藥煑取一升洗瘡一食頃著帛拭乾著生肌膏日二生痂止瘡痛者加

當歸甘草各二兩

又蝕惡肉散方

馬齒礬石燒研 藺茹 麝香研 丹砂研

雄黃研 雌黃研 白礬各三分燒汁盡研 硫黃三分研

右十味細作散傅之先蝕惡肉令盡即封生肌膏

又癰疽蝕惡肉膏方

大黃 附子去皮 莽草 芎藭

雄黃研 雌黃研 真珠研各一兩 白斂

礬石燒研 黃芩 藺茹各二兩

右十一味先以猪膏一升半煎六種草去滓內藺茹礬石等末絞之塗瘡中惡肉盡即止

又散方

藺茹上頭者 礬石燒研 雄黃研 硫黃研各二分

右四味爲散内瘡孔中惡肉盡止多使過好肉也

又療癰疽發十指或起膀胱及發背去惡肉方

猪蹄（二具治如食法） 當歸 大黃 芎藭

芍藥 黃芩 獨活 莽草（各一兩）

右八味以水三斗煑猪蹄取八升汁内藥煑取四升去滓洗瘡兩食頃拭令燥以後麝香膏封之

又麝香膏主諸惡瘡及癰疽發背去惡肉方

麝香 礬石（燒） 雄黃 眞珠（各一研研作末）

右四味以猪脂攪令如泥塗惡肉盡即止更傅生肌膏

又生肌膏主癰疽發背已潰方

甘草 當歸 白芷 椒（去目）

乾地黃 細辛 續斷（各二兩一法無續斷） 烏啄（六枚去皮）

肉蓯蓉（三兩） 薤白（二十莖） 蛇銜（一兩）

右十一味切以好酢半升和漬一宿取猪膏三斤微火煎之令魚眼沸三上三下候白芷黄膏成用塗之佳

又療肩背遊腫癰黄耆湯方

黄耆　人參　麥門冬去心　石膏碎

芎藭　當歸各二兩　生地黄八兩　甘草炙

芍藥各三兩　生薑五兩切　大棗三十枚擘　半夏四兩洗去滑

右十二味切以水一斗煮竹葉取九升去滓內藥煮取三升分四服日三夜一服

又療服石之人患瘡腫等單服牛蒡方

每吞三撮

又方

每食訖含生乾地黄丸如胡桃大除熱補益也

又療年四十以上強壯常熱發癰無定處大小便不通大黄湯方

大黄 黄芩各三两 升麻二两 梔子五枚

芒消一两湯成下

右五味切以水五升煑取二升四合去滓下芒消攪令調分三服得利爲度不過三劑即差

又療散發生瘡腫赤焮方

取赤石臼一片燒令赤置酢中擣作末傅之如燥更易以差爲度又取糞中蠐螬蟲擣如泥塗腫上不過三度即合口甚妙

又主腹内癰方

大黄四兩 牡丹三兩 芥子半升 消石三合

桃人五十枚去尖皮碎切

右五味切以水六升煑取一升五合分再服膿即下無者下血

又若大熱背腫身多生瘡下諸石方

露蜂房六兩　木緋帛一尺　亂髮二兩　升麻三兩

右四味先用緋帛裹蜂房等以麻纏使遍於炭火上燒令煙盡及熱擣碎作黑灰篩之取末候熱時空腹酒和服一方寸匕日再服此藥五六日即常以小便及大便下青黃赤汁及黑物極滑而腥臭者此石下候三五度下即休若多恐令瘦損若不大急困但煮五加木汁服亦療丁腫

又療背上初欲作腫方

大黃　升麻　甘草炙　黃芩各三兩

梔子人百枚

右五味切以水九升煑取二升半分服快利便止不下便進

又凡發背爲癰疽腫已潰未潰方

香豉三升

右一味少著水和熟擣如強泥作餅子厚三分依腫大小貼

之以艾布其上炙其豉餅使温温熱而已勿令破肉也若熱
痛急易之或一日二日炙之若先有瘡孔勿令豉餅蓋却但
四面著灸孔中汁出即差止

又療惡毒腫著陰卵或偏著一邊疼急攣痛牽入小腸痛不可
忍一宿殺人方

　茴香草

右一味擣取汁飲一升日三四服又取滓傅腫此外國神法
從元嘉末來用之神効起死人

又生魚薄主乳癰方

　生鯉魚長五寸　大黃　莽草　竈中黃土各六兩

右四味別擣魚如膏三物下篩更擣令調以生地黃汁和傅
腫上日五六夜二三即愈

又療動散背腫已自利虛熱不除宜服竹葉黃耆湯方出古今錄驗

竹葉切三升 黃耆四兩 小麥一升 芍藥三兩
甘草二兩炙 石膏二兩研 人參二兩 升麻一兩
茯苓二兩一法七分 桂心六分一法三分 當歸三兩 乾棗十四枚
五味子三兩 生薑三兩 乾地黃一兩 麥門冬三兩去心
知母一兩
右十七味切以水一斗二升煮竹葉小麥取九升去滓內藥
煮取三升溫分四服
又商陸貼諸腫方
商陸二兩 黃芩 黃連 白芷
白斂 大黃 莽草各二兩 白及二兩
右八味擣篩消膠汁和如泥塗紙貼腫乾即易之
又有患癰破下膿訖著兑藥塞瘡孔乃瘡痛煩悶困極有人爲
去兑藥以楸葉十重以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即

上此法大良無比勝於衆法貼此主癰疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之潤用之亦佳薄削楸白皮用之亦得

又梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒消湯成下　甘草炙各二兩　黄芩　知母各三兩

大黄四兩別漬　梔子人七枚

右六味切以水五升煑四味減半下大黄煑取一升八合去滓内芒消分三服

又療癰疽發背及小瘰癧李根散方

李根切一升　甘草炙　桔梗　黄芩各二兩

葛根　當歸各三兩　桂心　芍藥各四兩

芎藭六分　通草　白斂　厚朴炙

附子炮各一兩 栝樓子一升 半夏洗一升

右十五味擣篩爲散酒服一方寸匕日三瘡大困者夜再有人發背骨出十餘節服此即差

又主癰瘡發背方

蜀椒汗 黃芩 人參各二分 乾薑

附子炮 白斂 防風 桂心

甘草炙各一兩 芎藭二兩 赤小豆一合半

右十一味爲散酒服一方寸匕日三夜再服之

又內補散療癰疽發背已潰未潰排膿生肉方

當歸 人參各二兩 桂心 芎藭一

厚朴炙 防風 白芷 桔梗

甘草炙各一兩

右九味爲散以酒服一寸匕日三夜再瘡未合服勿停

又瞿麥散主諸癰未潰瘡中疼痛膿血不絕法

瞿麥 白芷 黃耆 當歸

細辛 芍藥 芎藭 薏苡人

赤小豆末各一兩

右九味先以清酒一升漬小豆出銅器中熬之乾復漬漬復熬五遍止然後擣諸藥下篩酒服一方寸匕日三夜二服三五日後痛者痒肌肉生一法以春酒漬小豆多痛倍瞿麥痛未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡人芍藥甚妙

又黃耆散主癰疽撮膿方

黃耆五分多膿倍 赤小豆一分熱口乾倍 芎藭二分肉不生倍 芍藥三分痛不止倍

白斂三分 栝樓三分小便多倍之

右六味擣散酒服方寸匕日三服之一方有甘草三分

又療發背及癰腫熱焮已熟者即令膿出熟者自然消除神

驗方

牛蒡根 嫩者洗去土勿令見風細切一大升

右一味以水三大升煑令爛絞去滓更盛於甆器中重湯煎之使如稀糊以塗爛帛貼腫上熱則易之驗

外臺秘要方卷第三十七

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張　寔校正

外臺祕要方 三十八

乳石下

外臺秘要方卷第三十八 乳石下一十八門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林　億　等上進

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十三首

論曰夫乳石之性緩而且速能悍風寒逐暑濕導經脉行飲食之氣在陰即補其不足在陽即能發其炎陰盛陽虛則二儀亢位所以炎上府之受邪則表熱氣隔至陰之伏也脉形陽浮而數陰伏而沈理之於經自然通泰若炎之於孫絡即血脉遄流或全抑之則乖於石性理而兼助則表裏周榮若遇小發可自勞力按摩

不可即大熱不已者別法隨事擇用解散方

療寒熱胷中塞面腫手足煩疼是鍾乳發宜服生麥門冬湯方

生麥門冬四兩去心 豉三升綿裹 葱白切半斤

右三味以水八升煑取三升分服體氣熱是客熱當自漸加衣物雖似惡加之後必佳忌如常法此方甚良千金同

又壓丹石發方天台山國清師所傳用

杏人一百枚去皮尖

右一味以水二升於盆中研之絞取汁令盡以白麪二升用杏人汁溲作餺飥還以杏人汁煑務令極熟其病者量性多少噉之令盡訖又取美酒數升煑十餘沸候熱訖病者量性多少飲之徐令盡蓋覆安卧初覺心悶須間四體輕虛一服三年不發大效

又療乳石發方

甘草炙 麻黄去節各一兩

右二味切以水三升煑取強半升和清酒半升其患者先須火邊灸熱徹欲汗承熱服令盡蓋衣卧須臾大汗即差千金翼同

又若因食倉米臭肉動乳方

必須葱豉湯細細服之五六度即差千金翼同

又食飲損者方

於葱豉湯中加當歸一兩煎之去滓分服即差若未可即服蘆根湯千金同

又若已服安和藥仍不退者此小觸動服葱豉等湯不解者可服蘆根湯解壓之方

蘆根 地榆 五加根各一握

右三味切以水三升煑取一升服之即解千金翼同

又若得時氣冷熱不調動乳者皆是實熱所致其狀似瘧久久不

療損人性命縱服湯藥必終難差宜作生熟湯浴之方
以大器盛湯若大熱投少冷水即於湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定久乃出湯以衣被覆蓋睡豁然平復如患大重者不過三兩度即差千金翼同

又解一切石發方 僧琢法

胡豆 半升

右一味擣研之以水八合絞取汁飲之即差虛弱人半升中半以意量之

又大黃丸方

大黃 五兩擣末　大麻子 五兩熬令焦待冷於簸箕中以手挼去皮取人研如膏

右二味合治令勻以蜜和丸如梧子大以湯飲下十丸至二十丸以宜利爲度此方甚妙通暢壅秘服之尤良忌如常法

華他薺苨湯療石毒卒發者慄慄如寒或欲食或不欲食若服紫石英發毒者亦熱悶惛惛喜卧起止無氣力或寒皆是腑藏氣不和所生療之方

薺苨（四兩）　甘草（炙）　藍子（各一兩）　茯苓

黃芩（各二兩）　蔓菁子（一升）　人參（一兩）　芍藥（二兩）

右八味切以水一斗煮蔓菁子取八升去滓內餘藥煎取三升去滓分三服日三若虛弱加人參一兩若氣上加茯苓薺苨一兩甚良（千金翼云若體寒者倍人參減黃芩若氣上倍茯苓加薺苨一兩）

應楊州所得吳故單葱白湯療沈體中數年或更發宜服之方

葱白（一斤切）

右一味以水五升煮取二升半去滓服盡未定更作服之至三劑即差止

又療乳石發㷭尚書傳蕭亮常服良驗余因熱重盛切慮不安

遍於李虔祐率更吳昇諮議處求解法亦稱此味奇絶方

甘草二兩炙　生犀角一兩半屑　萎蕤三兩

右三味切以水四升煑取一升半分服甚效

又方

烏豆二升

右一味以水九升煑取五升去滓以銅銚重湯煑取一升每服一匙以盡即差未定更作佳

又若盛熱發方

取無灰酒煑三五沸承稍熱服之以布手巾兩箇醮水以搨熱處取差爲妙更互用之

又療諸乳石發動口乾寒熱似鬼神爲病方

麥門冬八分去心　五加皮　犀角屑　黃芩各四分

萎蕤四兩　梔子四分　升麻四兩　大黃五分

芍藥四分　大青　甘草炙各三分　參六分

右十二味擣篩蜜丸食後以蜜水服十四丸漸加至二十丸日再以意加減千金翼同

又療諸石發熱困苦方

猪脂五合成鍊者　芒消四分　葱白五合切　豉心三合

右四味以水三升煑葱豉取一升二合去滓下猪脂芒消分三服未差再服千金翼同

又療石發熱盛充實四體煩滿脉急數大小便赤澀升麻湯方

升麻　黃蘗　黃連　甘草炙各三兩

黃芩四兩　芍藥六兩　白鴨通五兩　淡竹葉切一升

梔子十四枚　豉一升　大黃三兩

右十一味切以水二斗煑竹葉鴨通取一斗二升去滓澄清取一斗内諸藥煑取四升去滓分三服若上氣者加杏人五合腹

滿加石膏三兩千金同

又常防備熱發法方

麥門冬三兩去心 甘草一兩 人參三兩

右三味擣篩蜜和丸如彈丸一日服三丸甚良千金翼同

又三黃湯折石熱通氣泄腸胃解肌方

大黃三兩別漬 黃芩二兩 梔子十七枚 甘草二兩炙

豉一升 麻黃一兩去節

右六味切以水九升煮麻黃去上沫下諸藥煎取三升半下大黃三五沸去滓分服得利以差止千金翼同

又方

黃芩二兩 豉五合綿裹 葱白五合 梔子人二七枚

右四味切以水四升煮取一升八合去滓分服三劑差止

又療石發身熱如火燒黃芩湯方靳邵法

黃芩三兩 枳實炙二兩 厚朴炙 栝樓

芍藥各一兩 梔子人十四枚 甘草炙一兩

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌如常法千金翼同

又療熱氣結滯經年數數發方

胡荽半斤五月五日採陰乾如此物可先收貯備之

右一味以水七升煮取一升半去滓分服未差更作服春夏取葉秋冬取根莖用

又療膈上熱方

柴胡 黃芩 甘草炙 茯苓

麥門冬去心 枳實炙 生地黃各三兩 竹葉切一升

右八味切以水一斗煮取三升去滓分服

又方

又方

取河中石不限多少燒令赤投小便一大升倏冷頓服之良

又方

取寒水石長含以差爲度

又方

取黃連水漬服一升最良

又療心下煩熱悶內熱不安冷石湯方

冷石半兩細研之

右一味以水攪如白飲頓服不差更作

又去石毒麻黃湯方

麻黃二兩去節　甘草二兩炙　豉一升綿裹

右三味切以水五升煑取一升去滓分溫再服之

又猪膏湯解大散方

豬膏（二兩煉之） 豉（一升）

右二味以水三升煮豉取汁二升內豬膏服七合日三服石人飲宜清冷不宜過熱過熱即氣擁痞石唯酒一種須熱也千金翼同

又療乳石發如寒熱狀似瘧方

前胡（半斤） 黃芩 甘草（炙） 生薑

知母（各三兩） 牡蠣（熬） 石膏（各六兩） 大棗（二十枚擘）

右八味切以水一斗煮取四升去滓分爲四服取差爲度此方甚良

又療肖背頭中遊熱補虛方

黃耆 芍藥（各三兩） 甘草（炙） 桂心（各一兩）

茯苓 人參 石膏 生乾地黃

生薑 麻黃（去節） 麥門冬（去心各二兩） 大棗（二十枚擘）

竹葉切一升

右十三味切以水一斗二升煑竹葉取一斗去滓下諸藥煎取三升去滓分服之一方無茯苓有大黄

又療石發諸藥療不差方

以消石含之效

又方

若熱盛可向泠地卧覆下以厚物薦之覆以上令薄使受稍似凉即起不得過度

又三黄丸療虚熱氣壅不通方

黄連　黄芩各三兩　大黄二兩

右三味擣篩蜜丸以湯飲下十五丸至二十丸如梧子以利即差

又療精神如失氣攻上骨熱方

柴胡　升麻　黄芩　澤瀉各三兩

淡竹葉（切一升） 生地黃（切二升） 乾藍 芒消（各二兩）

右八味切以水八升煮取三升去滓下芒消分服取利止忌如常法

又療石熱將行體微飭畜即此方從叔汾州刺史河東公口受此法余久服石每服此飲頗甚為效方

茱萸 蔞蕤（各一兩） 豉心（一升） 葱白（一握）

右四味切以水四升煮取減半分服

又療服諸藥石後或熱不禁多向冷地臥又不得食諸熱麵酒等方

五加根皮（二兩）

右一味切以水四升煮取二升半候石發之時便服未定更作服

又療諸石盛熱不除心腹滿小便赤大便不利吐逆氣衝胷口焦乾目赤重熱三黃湯方

黃連 芒消（各二兩） 甘草（炙） 大黃（一兩）

黄芩三兩

右五味切以水五升煑取二升半去滓下芒消分服以利爲度甚良妙

又療天行丹石發動上下擁隔不通頭痛口苦不能食立效方醴泉杜主簿傳

青木香　紫葛　紫參　玄參

丹參　苦參　人參　石膏

代赭　細辛　桂心　獨活

蓯蓉　乾薑　齊鹽　吴藍各一分

巴豆二分去皮心熬

右十七味擣篩蜜和丸如梧子有患丈夫服三丸强者服五丸餘即量與之以飲下得快利三兩行即差忌如常法

又療石發内有虚熱胷中痞滿外風濕不解肌肉拘急方

香豉一升　梔子十四枚　葱白一握　黄芩二兩

右四味切以水七升煑豉五六沸去豉内藥煑取三升分三服之不止更爲之千金翼同

又療熱腫初起始欲作癰便宜服升麻湯方

升麻　大黄　黄芩　芍藥

枳實各二兩　甘草炙　當歸各一兩

右七味切以水八升煑取三升分三服腫即消散如熱加黄芩三兩千金翼同

又淡竹葉湯方

淡竹葉切一升　茯苓　白术　甘草炙

枳實炙　梔子　人參各一兩　大黄二兩

黄芩三兩

右九味切以水七升煑取三升分服以差止

又療服散不得力食不下飲酒解散輒嘔吐七味三黄湯方

豉五合綿裹　梔子十四枚　枳實八分炙　甘草炙
前胡　大黃各一兩　芒消二兩
右藥切以水七升煮取三升分服
又增損竹葉湯解散下氣方
黃連　麥門冬去心　竹葉切　人參各二兩
枳實炙　梔子各一兩　甘草炙　茯苓各二兩
右八味切以水八升煮取三升分服之差止
又療心忪熱煩悶如火氣上方
石膏八兩　茯神　萎蕤　黃芩各四兩
橘皮　五味子　乾藍　麻黃去節
甘草炙　犀角屑各二兩　杏人去皮尖　梔子各三兩
右十二味切以水八升煮取三升分服之差止
又療虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急內痞小便不利大便數而

少吸吸口燥少氣折石熱方

大麻人五合研　豉二升

右二味以水四升合煑取一升五合分三服三劑即止千金翼同

又療內熱結不除或更服散或以飲酒冷食澡洗猶不解或腹脹頭痛眼睚疼或先有癖實不消或連飲不食或時作心痛服此湯皆愈方

甘草炙　黃芩　大黃各二兩

右三味切以水五升煑取二升分三服千金翼同

又散熱白鴨通湯方

白鴨通五升以沸湯二斗半淋之澄清取二斗　麻黃四兩去節　豉二升

冷石一兩　梔子人二十一枚　甘草五兩炙　石膏三兩碎

右七味切以鴨通汁煑取六升去滓內豉煑三沸每服五合若覺冷小便利其間若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小小勞漸漸進食不可令食少但勿頓多耳千金同

又下氣除熱前胡湯方

前胡　黄芩　甘草炙　茯苓各二兩

梔子人　枳實炙　大黄各一兩　杏人六十枚去尖皮

生薑三兩切

右九味切以水九升煑取二升半分服

又麻黄湯下氣解肌折熱方

麻黄四兩　黄芩　甘草炙　石膏各三兩碎

升麻二兩　梔子人一兩

右六味切以水一斗煑取三升半分三服之

又療服升麻湯内解外不解者宜此麻黄湯方

麻黄去節　升麻　大黄　黄芩

石膏各三兩碎　甘草一兩炙　梔子人三合

右七味切以水九升煑取三升分服之差止

又療腹中無妨直患虛汗方

澤瀉　知母　石膏各二兩碎　當歸

甘草炙　人參　桂心　黃芩

茯苓各二兩　麥門冬三兩去心　竹葉切三升

右十一味切以水一斗二升煮竹葉取一斗去滓下諸藥煮取四升分服差忌如常法

右發熱嗽衝頭面兼口乾方六首

論曰五藏之尊心雖爲王耐肺最居其上也肺爲華蓋覆其四藏合天之德通達風氣而肺毋火也性慣受溫而惡寒心火更炎上蒸其肺肺金被火傷則葉萎倚著於肝肺發痒即嗽或因石增熱心肝虛弱不能傳陽至下焦遂被正陽俱蹐變成嗽矣或爲發背或作癰頭也夫言惡寒則何以知也肺主皮毛皮毛遇寒即慄而粟起其肺嗽亦萎倚著肝而成痾亦由木能扣金興鳴也凡如

此先食養肺抑心肝虛熱和其腎即愈矣

療石發熱衝頭面兼口乾嗽方

生麥門冬去心 萎蕤 石膏各三兩碎 生地黃汁七合

葱白一握和鬚 乾葛四兩 豉心三合

右七味切以水七升煮取三升分三服忌如常法

又療熱嗽方

取生豉漬汁温之纔免冷食服訖即卧勿令入腰中

故也以意消息之

又天門冬煎主定肺氣去風熱明目止嗽喘麤唾血腥乳石發冷而

補之方

天門冬汁一升 生地黃汁二升 生薑汁二合 杏人五合去皮尖研如膏

白蜜八合 牛酥五合 款冬花 升麻

百部根 紫菀 麻黃去節各二兩 甘草四兩炙

右十二味切以水八升煑麻黄去沫下諸藥煎取二升去滓澄濾銅器中微火煎去半下天門冬等汁次第下之鍊成煎取一匙含咽之日三五度取差忌如常法

又療上氣肺熱呼嗽涕唾方

麥門冬十分去心　杏人三十枚去皮尖研　貝母　生薑各六分切

石膏八分碎　黄芩五分　甘草炙　五味子

白朮各四分　淡竹葉切一握　白蜜一匙

右十一味切以水四升煑取一升二合去滓内蜜分服若須利入芒消

又療肺脹氣急呼嗽喘麤眠卧不得極重恐氣即絶紫菀湯方

紫菀六分　甘草炙　茯苓各八分　檳榔七枚碎

葶藶子三分熬末之

右五味切以水六升煑取二升去滓分再服

又宜服丸主上氣呼嗽不得卧卧即氣絶方

芸薹子　葶藶熬各十二分　馬兜苓七顆　紫菀

人參　杏人去皮尖　皂莢去皮子炙　白前

甘草炙各六分　漢防已八分

右十味擣篩蜜和丸如桐子大服十丸至二十丸增減量之

石發兼虛熱淡澼乾嘔方五首

論曰凡人有五藏合則脾胃爲水穀之府且國府足穀則足食足兵也人胃足食則榮衛不厥若人能食則能悦也陰陽和平有何患乎若服石之人皆增於熱失時不食則胃口乾焦胃口乾焦則土不足或因飲酒水而食少變爲淡結酒水流下迎陰上昇下焦無陽即陽虛也中府無穀上焦漸炎致之嘔噦經曰陽數即嘔吐又曰嘔噦發下焦之間此之義也可以破淡結通水穀填胃府則無咎也夫通填之義不可虛其虛實其實𢦏伯曰瀉虛補實神去其室

他藏皆倣此

療因飢空腹飲酒飲水食少淡結心頭乾嘔方

枳實五兩炙　梔子人一兩　香豉一升　大黃二兩別浸

右四味切以水六升煮取二升分再服忌如常法

又療結熱澼心下腫肖中痞塞嘔逆不止鴈肪湯方

鴈肪一具　甘草炙　當歸　桂心

芍藥　人參　石膏各二兩碎　桃人三十枚去皮尖

大棗二十枚擘　大黃二兩

右十味切以水一斗二升煮鴈肪取汁一斗煮諸藥取五升去滓分服無鴈肪以鴈肉無鴈以鴨代之雞亦得

又療嘔不止不下食方

薤白一握　橘皮一兩　豉半升　麥門冬二兩去心

粟米一合

右五味切以水三升煑取一升去滓細細服之差止

又療熱發胷中淡醋乾嘔煩熱方

半夏洗 白薇各二兩 乾薑一兩 甘草半兩炙

右四味切以苦酒五升煑取三升分服夫苦酒能令石朽爛故用之

又療數振動煩悶嘔逆人參湯方

人參 甘草炙 栝樓 麥門冬去心各二兩

黄芩 蘆根各一兩

右六味切以水四升煑取二升分四服差止

右發吐血衄血方七首

論曰五藏所藏心藏血也血之傷盛則心脫力制固無守自然流溢爲陽氣傷故也或有衄血者加以肺風熱之謂也若益之於服石則客熱復盛榮衞增勞旋周無趣則投虛而出出而多則傷榮氣邑

奪而黄久不療則氣撮撮仍忘先須破污血留好血調經絡平腑藏則愈也

療石發熱盛吐血方

生地黄（五兩擣碎） 小薊根（切一升） 黄芩（二兩） 豉（一升）

梔子人（三七枚）

右五味切以水五升煑取二升分温服之

又衂血方

生地黄汁 小薊汁

右二味隨多少以點鼻中兼服之良

又療心肺中熱甚鼻中衂血不止方

胡粉（熬） 光墨（末） 釜下墨（末） 乾薑（炙）

髮灰 伏龍肝（末等分）

右六種但得一物以兩碁子許以竹筒吹令入兩鼻孔中即止

又方

橘皮　葈耳莖葉　翹遥莖葉　生地黄

雞蘇苗

右五種但得一味擣絞汁服五六合即止如未定即更服之

又療頭痛壯熱鼻衂血心上硬遍身疼痛四肢煩悶兩膊舉不得方

小薊四兩　青竹茹　生麥門冬去心碎　雞蘇各三兩

生薑二兩切　生地黄汁半斤

右六味切以水九升煮取三升去滓分服之以止爲度忌如常法

又療卒吐血一二升口鼻俱出至一二斗者方

生地黄汁　小薊汁　生麥門冬汁　伏龍肝末十匙

右地黄等三味汁相和每服五合著伏龍肝末一匙許和攪服之

以止爲度忌如常法

又療心悶吐血方

生麥門冬八分去心 生地黃二十四分碎 甘草四分炙 薺苨

乾薑各六分 茅根十分 香豉五合以綿裹

右七味切以水五升煮取二升去滓分服之忌如常法

石發熱煩及渴方一十六首

論曰凡人陽處其表陰處其裏則非純陰在其下復非純陽在其上皆須陰陽通平陰陽通平則五氣不乏五氣不乏則人無病只如服石之人多爲陰虛而服攝之過温則經脉湊溢或遭陽時亦發其證也正陽本自浮昇石力更藏陽氣客主兩陽併蒸肝肺故患渴也或藏實腑虛而生發背亦渴不獨兩陽爲禍也且肺是庚辛庚辛畏火即告其子其子腎腎爲壬癸雖子投而性惡寒陽雖得水暫寒而水潛流於下客水正水足爲滂沱渴乃未除更增腎冷凡遇此候皆先泄溝瀆致陰氣於腎微理其石氣勢病不瘥乎

療解散失度飲食冷熱不消虛脹吐清水而渴悶欲死方

人參　栝樓　枳實炙　甘草炙

白朮各一兩　大棗二十枚擘

右六味切以水六升煑取二升半分溫二服差止

又療發癰虛熱大渴方

生地黃八兩　竹葉切三升　小麥二升　黃耆

黃芩　通草　前胡各三兩　栝樓四兩

芍藥　升麻　甘草炙　大黃別浸

知母　茯苓各二兩　人參　當歸各一兩

右十六味切以水二斗煑竹葉小麥取一斗去滓內餘藥煑取四升去滓分服之小便利除通草大熱者去人參當歸忌如常法

又療客虛熱衝上焦胷中口乾燥頭面熱赤并渴方

生葛汁　生地黃　生麥門冬汁　白蜜各一升

棗膏八合 生薑汁二合

右六味和煎之內蜜候如稀餳食後漸漸含之其功甚妙

又療消渴止小便方

黃連一斤金色者 麥門冬八兩去心 生地黃汁 羊乳

栝樓汁各三兩

右五味擣上二味爲末以汁相和藥末衆手一時丸如梧子食後以飲服二十丸忌如常法

又療熱渴竹葉湯方

淡竹葉切五升 茯苓 石膏各三兩碎 小麥三升

栝樓二兩

右五味切以水二斗煑竹葉取八升下諸藥煑取四升去滓分溫服忌如常法

又療發癰盛患渴口乾排膿止渴方

黄耆　梔子人　栝樓　生乾地黄

升麻各二兩　麥門冬去心　芍藥各二兩　黄芩一兩半

右八味切以水一斗煮取三升服之差止忌如常法

又療消渴方

取螺三升

右一味以一石江水浸養之傾澄取汁飲之經日放却更取新者漬之准前服

又方

竹根濃煮汁飲之

又方

煮青粱米汁飲之

又方

擣冬瓜汁飲之

又方

冬麻子一升

右一味擣以水煮三四沸飲之

又方

以水浸雞子取清生服甚良

又方

黃蘗一斤

右一味切以水一斗煮汁飲之

又方

桃人五升去尖熬　研白米三升

右二味以水一斛煮取三斗渴即飲之良

又方

石膏碎　枳實炙　茯苓各三兩

右三味切以水九升煮取四升分服之

又方

茯苓半斤 澤瀉四兩 白朮 乾薑

桂心各三兩 小麥三升 甘草二兩炙

右七味切以水一斗煮小麥取八升入藥煎取五升分服之

石發熱風頭痛心煩寒熱方三首

論曰五行五藏皆互相生肝雖處中而爲藏首位在甲乙懷養懷仁故應春而王也爲心之母餘藏循而次生焉心爲王主身神毅而無纖不察四藏爲四鄙四鄙有擾王必懷憂四藏和平則王有悅悅則榮衛不錯憂則經絡患生心不受邪所病者爲憂樂能致也肺爲風府施於大穹爲呼吸之門氣息之道也諸藏紊亂氣息皆形誰能出不由户耳若熱風盛心憂即頭痛若過憂即心煩熱盛必寒寒盛必熱倚伏之道足可明焉皆由風狂邪

熱之謂也但平風熱抑狂邪榮衛自然通泰也

療熱如火燒頭痛心煩悶乍寒乍熱胸中熱嘔逆方

升麻　前胡　甘草炙　黃連各二兩

黃芩　生地黃各三兩　枳實炙　梔子人

栝樓各一兩　豉五合綿裹

右十味切以水八升煮取三升分服忌如常法

又療食訖心煩悶眩心下胸中不安方

茵陳四兩　大黃二兩　梔子人二十枚

右三味切以水五升煮取二升分服取差

又療頭痛欲裂方

取當歸二兩清酒一升煮取六合飲至再服

石發口瘡連胸面及身上心痛方一十四首

論曰夫人痒者為虛痛者為實在表為虛在裏為實心肺虛

熱衝胷口乾乾久乃成瘡生膿則瘥矣自然虛極非是實也藏者藏也爲不能含藏陽氣使陽氣妄出發則日虛若獨肝家有風即木氣摶心故痛亦非真心痛若真心痛只得半日而死爲心不受邪故也

療乳石熱發頭痛心痛胷脅脹滿寒熱手足逆冷或口生瘡爛或乾嘔惡聞食氣上欲絶久虛者方

前胡　芍藥　黄芩　大黄

甘草炙各二兩　大棗二十枚擘

右六味切以水八升煮取三升分服若堅實加茯苓二兩若胷滿塞加枳實一兩炙若吐逆加乾薑二兩若口燥加麥門冬二兩增減以意量之忌如常法

又療食失度口中發瘡欬之湯方

黄芩三兩　升麻　甘草炙各二兩　石膏五兩碎

右四味切以水五升煮取三升去滓冷含漱口吐却日十數過差止

又療口瘡方

子蘗四兩 龍膽三兩 黃連二兩 升麻一兩

右四味切以水四升煮取二升別取子蘗冷水浸投湯中令相得絞取汁稍稍含之取差忌如常法

又若熱發腹內肖中惡有瘡方

升麻二兩 烏梅十枚 黃芩 黃連

栝樓 甘草炙各一兩

右六味切以水五升煮取半升去滓含之咽亦不妨

又療體赤熱煩悶口中瘡爛表裏如燒痛不能食方

黃芩三兩 梔子人二十一枚 香豉一升 大黃二兩

右四味切以水四升煮取一升半去滓分服

又塗飛雪湯方

麻黃四兩去節 石膏二兩碎 黃芩三兩 芒消四兩

右四味切以水八升煮取四升去滓內生雞子白二枚及芒消攪令勻以拭瘡上取瘡差即止

又療熱不散體生細瘡并熱不已方

黃連 芒消各五兩

右二味切以水六升煮取三升去滓內消以拭瘡上取差爲限

又療紫石發動惡寒壯熱口舌乾焦方

烏豆二兩

右一味以水四升煮令稀稠得所如餳去豆下蜜二合更一兩沸以匙抄細細含之如腹中鳴轉欲利即停得利即差忌熱食陳臭物千金翼治發背癰疽

又療石氣發熱身體微腫面生瘡方

升麻 萎蕤各六分 黃芩 紫雪各八分

甘草炙　犀角各四分　梔子十四枚

右七味切以水五升煮取二升内雪分服之以飛雪湯塗之即差千金翼同

又療體卒熱生瘡麥門冬湯方

麥門冬五兩去心　豉二升　桂心　人參各二兩

甘草三兩炙　葱白一斤

右六味切以水一斗煮取三升去滓分服之忌如常法

又療表裏俱熱身體生瘡或發癰癤大小便不利方

芒消湯成下　黄芩　知母　甘草各二兩

梔子人二七枚　大黄四兩

右六味切以水五升煮取二升下芒消分服忌如常法

又療兩脛生瘡熱痒内亦熱兼頭痛方

麥門冬去心　知母　澤瀉　甘草炙各二兩

粳米五合　竹葉切一升　小麥二升

右七味切以水一斗半煑竹葉小麥取九升去之內諸藥煑取四升去滓分服日三夜一忌如常法

又療生瘡熱氣奔背方

豉一升　葱白切　梔子人各十四枚

右三味以水二升煑取九合去滓分服之忌如常法

又療石熱發煩熱滿脹及體生瘡兼氣力弱方

黃芩　芒消　麥門冬各二兩　大黃三兩

梔子十四枚　甘草一兩炙

右六味切以水六升煑取二升分再服之

石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首

論曰服石之人發狀非一或發於外陽則頭角皮膚作癤癰腫頭痛是也或發於內陰則反冷藏虛口瘡吐血是也凡氣內溫

五藏外榮經絡石性清淨不喜煩穢目所覩鼻所聞皆欲馨香不願鬱腐因成種種之疾也或食陳臭生酸之物貯於胃腑胃腑不受推諸藏藏諸藏不受即肝膈痞滿或爲臚脹而堅積便發心痛亦非心自然而痛爲穢觸神氣也覺此候者可速滌腸胃無令留壅不然即成淡澼其心轉痛豈能不勉哉

蘄邵療寒過度成淡澼水氣心痛百節俱腫者大黃丸方

大黃　葶藶子熬　豉各一兩熬　杏人去尖皮熬

巴豆各三十顆去皮心熬

右五味大黃擣篩末四味別擣如膏入少蜜和更擣一千杵以飲下一丸如麻子稍強至二丸三丸以意量之忌如常法

又療赤石脂發心痛飲熱酒不解方

葱白半斤切　豉二升綿裹

右二味以水六升煮取二升半分再服之良

又療大熱心腹滿脹方
石膏半升碎 黄芩 麻黄 芍藥各二兩
大青 續斷各三兩
右六味切以水八升煑取四升去滓分服之
又療心腹痛不解若遍身顫寒者榮衛不通人參湯方
麻黄三兩去節 人參 枳實炙 黄芩
甘草炙 茯苓各一兩
右六味切以水五升煑二升分服之
又療散發心痛腹脹兼冷熱相搏甘草湯方
甘草炙 枳實炙 白朮 梔子各二兩
桔梗三兩
右五味切以水六升煑取二升分再服之忌如常法
又療腹脹頭痛眼眶疼先有癖實不消或飲酒下食内熱或時

時心急痛方

甘草炙 黃芩 大黃別浸 麥門冬去心

芒消各二兩 梔子三十枚

右六味切以水七升煮取三升分服之忌如常法

又療石發動上氣熱實不除心腹滿小便赤大便不利痞逆衝胷口乾燥目赤痛方

大黃一兩別浸 黃芩三兩 黃連 甘草炙

芒消 麥門冬去心各二兩

右六味切以水五升煮取二升入大黃更煎三五沸去滓分再服之

石發熱目赤方一十一首

論曰凡人五藏盡有風而發有高下動有淺深則腎風發脚氣肝風目滲而暗肺風鼻齆噎而嗽脾風肉緩而重心風恍惚

而志若加於熱亦隨藏覲候即肝風脅滿而怒喜靜加之熱即目漠漠而暗若石氣兼之則赤而益痛或生努肉及腫而爛速可隨輕重瀉之不然喪明矣經曰肝王則目赤若兼石則夂慎勿食熱熱既不散遂成伏氣遇春必發預宜法防之即非石藥之過豈不惜哉黃帝曰形受味精受氣皆爲飲食寒溫呼吸之召也諸藏倣此

療眼夂赤痛方

乾棗（相接長一尺切） 黃連（相接長一尺擘）

右二味以水一升煎三合綿裹夜卧點眼眥中以差爲度忌如常法

又瀉肝湯不服石人亦主之方

大黃 黃連 石膏（各二兩碎） 甘草（炙）

黃芩 細辛 生薑 半夏（洗各一兩）

梔子（十四枚擘）

右九味切以水八升煑取三升分温服忌如常法

又療眼赤閇目不門煩悶熱胷中澹澹瀉肝湯方

前胡　大青　秦皮　乾薑

子芩　細辛各三兩　決明子三兩　梔子人二兩

石膏八兩碎　淡竹葉　車前葉切各一升

右十一味切以水一斗煑取三升去滓分服或加朴消三兩得

得利即差忌如常法

又療眼腫痛不開方

精猪肉薄切以貼眼上熱即易之一方用子肝又以

井花水浸更冉用之取差

又療久風目赤兼胎赤方

光明鹽六分　杏人油五合又云半雞子

右二味以淨銅娑羅一尺面者一枚內鹽油即取青柳枝如

筋大者一握急束截令頭齊用研之三日候如稠墨即先剜地作一小坈置瓦於底又取熟艾一鷄子許於瓦上燒火即安前藥𤀹羅覆坈上令煙熏之勿令火滅候火盡可收置於銅合子或𡊮合子中每夜用點目眥間便卧頻點之取差

又主眼生赤脉息肉磣痛不開者方

大棗（七枚取肉）　黄連（二兩碎綿裹）　淡竹葉（切五合）

右三味以水二升煑竹葉取一升澄清取八合内棗肉黄連煎取三合去滓以點眼眥中差止

又療目痒赤方

黄連（半兩碎）　丁香（二七枚碎）　黄蘗皮（半兩切）　青錢（七文）

蕤人（三七枚碎）

右五味以水二升煑取一升去滓以綿纏杖子頭點之妙

扁鵲療令人目明髪不落方

取十月上巳日槐子去上皮不限多少於瓶中封口三七日初服一枚再服至二枚十日十枚還從一起甚驗

又療發熱心腹脹滿小便赤大便難逆衝胷中口燥目赤痛方

黄芩 大黄各二兩 梔子一兩 豉三合

右四味切以水三升煮取一升二合去滓分服

又療目翳方

乾藍二分 雄黄二分研

右二味相和以少許點上三五度即差

石發淡結大小腹留壅老小虛羸方六首

論曰夫老小尫羸爲和氣不足寒氣獨積于地炎氣獨散于天地不交故體成否體成否則肌肉不潤腠理不通胷膈氣急腸胃招滿爲隂氣衝陽陽不接也或膀胱堅積支足沈痾爲陽氣不能下營隂氣獨盛也致大腸留擁湯藥不下或水穀不消更

加短氣若不利關格寔不得其死也

療羸劣老弱體性少熱因服石散而寒氣盛藥伏胷膈冷熱不調煩悶短氣欲死者藥既不行又不能大便作害於人急宜吐之方

甘草四兩生用

右一味切以水五升煑取折半去滓令頓服之當大吐藥亦與病俱去便愈矣夫散家患心腹痛服諸藥不差者服此甘草湯諸膈即通大便亦利甚驗

又療盛虛弱去熱益氣力方

竹葉切一升　大棗二十枚擘　黄耆四兩　芍藥三兩

甘草炙　人參　乾地黄　升麻

生薑各二兩　桂心　黄芩　茯苓各一兩

右十二味切以水一斗五升煑竹葉取一斗去竹葉入諸藥煎取三升分温服之忌如常法

又療散發後虛熱羸乏或脚疼腰痛本是虛勞人并挾風氣宜腎瀝湯方

羊腎一具去脂膜切 五味子三兩 當歸 甘草炙

芎藭 遠志去心 芍藥 麥門冬去心

茯苓 乾地黃 生薑各四兩切 黃芩

桂心各二兩 大棗二十枚擘

右十四味切以水一斗煮腎取八升內諸藥煎取三升半去滓分服忌如常法

又療性熱虛羸補益方

生地黃一石細切蒸之極熟

右一味以好酒一升灑之於葉子上暴乾擣衆併手丸之每食前含一丸如胡桃大咽令盡日三五度甚妙

又療人身體黃瘦不能食及服藥膂背拘急痛眠臥陷牀沉重

不能起行宜秋夏中服之方

半夏洗 茵蔯各四兩 生薑 茯苓各三兩

黃芩 土瓜根 梔子各二兩 大黃一兩別浸

右八味切以水八升煑取三升去滓分溫服

耆婆湯療人風勞虛損補髓令人健方

麻油一升 牛酥一斤 葱白一握 胡麻人一升研

豉二升以水三升漬一宿取汁 蜜一升 上酒二升

右七味先於鐺中入油煎令沸著葱白令色黃下酥蜜豉汁麻人沸下酒成煎收不津器中盛之日服一匙兩匙或和酒服亦妙冷即加生薑一斤取汁乾薑末亦可用之

石發大小便澀不通兼小便淋方一十六首

論曰夫言大小便澀者皆由大腸虛受邪氣所致也且府有高下而肺府係在天上中接土府名之大腸爲傳導之府也有風

氣熱結即大便乾澀而不通順或發癰腫口鼻乾燥或腎府有
虛則心肺俱至使小便赤而澀也或腎氣虛熱膀胱不足加之以
渴飲即小便淋澀皆由藏虛不能主其府也且形能受味氣能
致精氣散則精虛味益則體實體實之人筋骨有餘因
勞精氣精氣既衰即招其病故石氣流入膀胱作其淋疾則非正
石氣而行此肺遭熱盛傳之於腎腎為精竭純陰自孤石氣懼
陰不入便投其膀胱膀胱受邪遂成淋也淋狀合澀數赤熱而
痛何以知之澀至故知肺傳於子也數至為子被母逼水急奔
下也熱赤至為心兩石氣相傳也痛至為本藏自虛客氣衝擊
也所以服石藥者藉其少滋味而助精氣即神門之固病邪不能
入也何以知因石虛竭虛竭之人其陰好怒而交接難畢其病者強
中或不交接其精自流也或為消利為作消渴皆由少服諸石用
之傷勞也夫遇茲候等可救其病失時不療便至夭枉不可全服

補虛之藥恐變諸疾常以不虛不實於大腸不寒不燥於腠理能調神氣有何患乎

療小便淋澀少腹痛方

大黃　芍藥　茯苓各一兩　麻人四兩研

右四味切以水五升煮取二升去滓分服下之良

又方

桑螵蛸二十枚熬　黃芩一兩

右二味切以水一升煮取四合頓服之

又療熱淋澀痛方

車前草　葵根各切一升　通草三兩　芒消八分

右四味切以水五升煮取二升去滓入消分服之

又療血淋不絶方

雞蘇　竹葉各一握　葵子末　石膏各八分碎

蜀葵末四分

右五味切以水二升煮取九合後下葵末服之

又療初患淋方

滑石五兩　通草二兩　石韋拭去毛　瞿麥各三兩

芒消二兩湯熟下　冬葵子一升

右六味切以水九升煮取三升分服之忌諸熱物

又療淋積年醫不能損或十日五日一度發即可時或頻發不定方

冬葵子　滑石各八分　茯苓　芍藥

子芩　蒲黃　芒消各六分　石韋去毛

瞿麥各五分　陳橘皮四分

右十味擣散空腹煮後飲子和服一方寸匕加至二匕以小便通利為度忌如常法

下散飲子方

桑白皮六分　白茅根十分　通草八分　甘草四分炙

滑石十分

右五味擣散煎湯服前散

又卒患淋方

取舡底青苔如雞子大以水一升煮服之

又主熱淋方

白茅根四斤切

右一味以水一斗半煮取五升適寒溫飲之差止

又石淋狀如碎沙石下者方

車前子二斤以絹囊盛

右一味以水八升煮取三升經宿空腹服之即石下

又療煩熱身體微腫不能食飲小便不利方

茯苓三兩　甘草炙　栝樓根　人參

黃芩　桂心　白朮各二兩　枳實二兩炙

右八味切以水六升煮取三升去滓每服三合盡即差甚妙

又療氣上不得食嘔逆大小便澀氣滿煩悶折熱下氣方

前胡　黃芩各三兩　梔子　大黃各兩

甘草炙　茯苓　生薑各二兩　杏人四十枚去尖皮碎

右八味切以水八升煮取三升分服之忌如常法

又療熱小便數少如淋葵子湯方

冬葵子一升

右一味以水三升煮取一升半分服之忌如常法

又若大小便塞不通或淋瀝尿血陰中疼痛此是熱氣所致先以冷物熨之少腹又以熱物熨更互冷熱若小便數亦是取冷所致即暖將息也

療發熱體氣昏昏不痛不痒小便赤澀方

生茅根五大斤淨洗擇擣絞取汁服之差

又若發熱口乾小便澀方

取甘蔗去皮盡足喫之咽汁若口痛擣取汁服之

又方

取萋蕤五兩煑汁飲之差

石發後變霍亂及轉筋方一十六首

論曰服石之人體常多熱熱即引飲飢復加飡水穀既傷胃府失度土既衰損木必來乘故曰肝入胃即泄或單下而不吐是肝乘之盛也木既剋土剋過必宣三氣俱虛而肝必怒陽氣既乏則發轉筋變吐加腎肝之病也冝速止之仍温足而兼復調以五味其病必瘥矣

療石發霍亂絞痛不可忍方

茱萸一升

右一味以酒三升煑取一升強服之得下差
又療霍亂吐多者必轉筋不渴即臍上築者腎氣虛先療其築
理中湯方
人參 桂心 甘草炙各三兩 乾薑二兩
右四味切以水八升煑取三升分服又加白朮三兩
又療霍亂轉筋入腹方
取雞矢白乾者一方寸匕以水和頓服之
又療轉筋入腹痛方
灸脚心下當拇指上七壯
又方
灸足大拇指下約中一壯
又乾嘔方
灸手腕後四指兩筋間左右各七壯名間使

又若吐止而下痢不止方

灸臍下一跌約上二七壯

又嘔不息者方

薤白一握

右一味切以水一升煮取六合頓服之

又吐痢不止轉筋入腹欲死方

生薑三兩切

右一味以酒一升半煮三沸頓服之良

又方

藿香一把

右一味以水四升煮取一升服之差艾亦佳

又療轉筋不吐不下氣息急方

木瓜一枚

右一味切以水二升煑取一升服之差

又方

高良薑五兩搥碎

右一味以酒二升煑取一升服亦主腹痛

又方

桑葉切二升

右一味以水三升煑取一升三合去滓服之

又療腹滿痛不可忍方

取鹽一合熬以水二升煑取一升頓服即得吐止若吐痢止心中煩悶及渴不止取竹瀝一升分服即止不止心中復似冷取茱萸一兩於鐺中炒擣末以水二升煑取一升著少鹽澄清服之取差

又療霍亂吐痢不止方

粟米任多少研

右一味以水攪如乳服之即差

又療脚轉筋方

灸兩大拇指爪甲後連肉處當中央三壯

石發後變下痢及雜痢方一十二首

論曰凡石性剛烈氣多炎上理之傷溫即火轉爲熾内煎脾肺苦熱遂成其渴飲水過量即溲腸胃得水則吐腸得水即金寒藏雖寒火炎不滅水漸流下而爲行潦遂變擁腸胃虛冷水穀不消在陽益氣不飡在陰腸鳴而泄久將不差有成痟者經嘔噦發下焦之間其斯之謂歟療下痢乾嘔服香豉多服之佳如不損更發宜服此方

香豉二升 乾薑三兩 甘草二兩炙 葱白一升切

右四味切以水五升煑取二升去滓溫分服之甚良

又方

乾薑五兩

右一味切以水二升煮取一升去滓頓服之

又療白赤痢兼熱悶方

梔子人十四枚　薤白一握切

右二味以水三升煮取一升二合去滓分服之良

又療白痢方

黃連一兩綿裹碎　白蜜一合

右二味以童子小便二升漬一宿煮取一升去滓入蜜分服之

又方

黃連一兩碎　薤白切一升　烏梅一握

右三味以水二升煮取一升分溫服之

又療解散已經快利熱尚不退兼痢不斷黃連湯方

黃連一升碎　白粱米二合

右二味以水五升煮取二升分服之

又療癰腫熱盛取冷過多寒中下痢食完出方

甘草炙　乾薑　附子炮各六兩　蜀椒二百三十枚汗

右四味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又療大行兼有客熱下血痢止血破棺起死黃連湯方

黃連四兩　黃蘗三兩　梔子人十五顆　阿膠一兩炙

乾薑　枳實炙　芍藥各二兩

右七味切以水六升煮取三升分服之忌如常法

又解散除熱止痢黃連湯方

甘草炙　升麻各一兩　黃連三兩　豉五合

梔子人十四枚

右五味切以水三升煮取一升分温服之

又解散因痢宜服甘草湯方

甘草炙 人參 黃連各一兩 梔子人二十枚

右四味切以水五升煮取二升分服之

又療熱毒赤白痢方

羊肝去膜切以水淘二十遍血盡以粟米飯拌作麪餅

右一味以水煮熟漉著漿水中淘之乾漉以美蒜虀候極飢食之不過三兩頓即差

又療水穀痢方

取鯽魚無問多少治如食法以新布乾拭斷血脉切作鱠以蒜虀食之取足候至夜要以白粥量事喫之即得差忌如常法

石發兩脚卒冷兩脅腋卒熱并口噤方三首

論曰經言脉有陰蹻陽蹻有陰摶陽摶此在三陰位也脉足大陰

脾脉也脾爲中州含藏陽氣壓水脉者矣若人之和平則脾能行陽氣暖其三陰三陰暖則足能舒適若脾虛不能含藏則地氣但泄陽上騰則三陰堅塞足便冷也或有踵緩急不仁者則加之以腎肝之氣不足使少陰厥陰之闕也所以足無載運之功而不能蹻捷其力是陰搏其陽此由藏虛所生陽氣傷狂而陰不能獨理有因發熱口噤及腋下熱不可近者即三陽傷盛之所致也況服石增熱飡餌失度在陰爲疢可外温其足内置陽氣於三陰則愈也在陽爲疢可微冷於外又以寒藥散其内熱其痾豈能逃乎

療兩脚卒冷方

以醋漿温置盆中以浸脚即差

又療口噤氣上欲絶方

蔓菁子二升 茯苓三兩 葵藍子 人參

薺苨　甘草炙　黃芩　白朮各二兩

右八味切以水二斗煑蔓菁子取八升去滓內餘藥煑分服

若口噤以物嚾之即差

又療兩腋熱不得相近方

滑石一斤　寒水石三斤　芒消一斤

右三味擣散取絹一尺分作袋盛散藥結口更互於腋下夾之勿住取涼冷止

石發苦熱解折下石方四首

論曰五形之人其性各別則土形之人骨聳氣清水形之人體薄氣長木形之人筋骨麤聲圓而長火形之人性急氣尖而散其有固疾者則先服草藥病愈後始服石必速應也凡土火二形人性躁氣高而肥盛多火氣若更服石益之於炎物盛必衰自焚之名也若覺禍發速宜下之只如固疾之人服食者病氣

久強石熱尚薄不能破其病但增其熱亦能損人若熱不濟者亦可速下自餘形人服之者如有發動但以石投之自然而差不可見小熱即求大冷為山九仞終虧一簣醫者意也詳而行之臣億等按論中五形少金別無本校今闕

蜂房飲解石餘方

露蜂房三兩炙

右一味以水三升煮取一升去滓頓服不定三五日更服如熱悶服後方千金翼療石發熱困甚宜下石方露蜂房一升切以水三升煮取一升一服五六合日二服石從小便下如細沙盡停無所忌

又下石方

葛根　紫草各八兩　犀角十二兩屑　露蜂房十兩炙

芒消　大黃各二兩　薺苨　人參各七兩

玄參　甘草炙　銀屑細研各四兩　豬脂十二兩臘月者

右十二味以無灰酒漬經十日其猪脂用酒一升煎取脂三兩取銀屑和研内藥中每日空腹服之一匙前合藥未得本法元本如此可求別定本細而勘之千金翼方中更有升麻萎蕤各七兩黃芩八兩梔子十四枚計十六味以無灰酒八升漬經十日猪脂用酒一升煎鍊取三兩與銀屑和研内藥中每日空腹服之量力多少忌熱麪炙肉海藻蒜等

又療散發不可堪忍欲下之方

肥猪肉五斤　葱白　薤白各半斤

右三味並擣研合器中蒸之令熟早朝噉之盡爲度

又療雖服乳石等而常患冷此由不先服瀉湯而服石等以其病藥各在一處丹石不行則病所以依舊患冷宜依此法瀉之冷自差石勢行方

人參　茯苓　乾地黃　當歸

桔梗　甘草炙　芍藥各二兩　大黃四兩

右八味切以水三升煮取一升二合去滓分服之

服石後將息飲食所宜法二首

論曰服石所宜飲食時宜以自調護隨所取適若一一依方愼之則動成滯礙能依此法庶得通濟方

取少脂猪肉一月二服百沸餺飥任性無妨新熟白酒少飲亦好及白羊頭蹄并猪肉作薑豉任作食之

壓石肥肉棃柿等甚佳

凡欲喫熱羊肉餺飥宜先食三五匙冷飯後喫之即不畏熱喫訖乃速以飯壓之行步適散乃可不慮致損生菜亦然芸薹胡荽等亦不宜多食服石人有性好麪嗜醋不能禁愼者宜食淡糠醋百沸紫餺飥及水潄餅即不慮熱冷韭薤亦大補時時宜食之諸飲食品類旣多不可一一但言不得服所不宜者服石人亦不宜多飲酒飲酒多則失食味失食味則不多食不多

食則令人虛熱虛熱則令石數發惡寒寡況又損石力爲酒能壓石故也多飲則損石勢亦令人風虛脚弱此由飲酒致之耳若能飲食者大佳甚妙其方藥如右服石特忌熱麪陳臭哀孝哭泣憂恚大醋生蒜薤芥醬雞犬肉老牛肉鮑魚肉鮓衡熱忍飢冷酒有灰酒蕎麥小豆胡麻餺飥枸杞羹倉米臭魚脯勿承飢虛熱沐浴夏月不宜喫猪肉冷水恐腸滑痢不止傷冷飲食不消或成霍亂特宜消息愼之

紫餺飥并食飲將愼法三首

千金紫餺飥方

烏豆任多少煮取濃汁

右一味以和麪稍鹽和之依常法作餺飥以此豆汁中熟煮奇三二十沸澄添冷烏豆汁以猪羊肉爲臛亦精好或以山芋粉尤妙

又宜食麪餅方

取麪溲如家常作餅法細切如小豆許以麪於簸箕中拌令圓煑之令極熟承熱任以諸肉作臛食之大涼補腰脚又夏月冒熱遠行早食晚失飢石氣發動作大麥餅將行在路食之亦壓得石氣

凡患瘡腫無問大小或如黍米即須加意專精療之或以冷水淋或鹽湯洗以指擿破即以指甲細細掐傍邊亦以藥塗之或以蒼耳湯浸洗之或以冷石熨之即差夫服石將慎至難若不能將息特宜勿服非但服之若瘦熱更增他疾性行躁暴唯多忽恚飲食日減形體日消妻子不能供承卑下何其能濟比皆由將慎失度致使然也人之無檢慎勿輕服至於背坼腦烈藥物無及也婦人則發乳癰腫帷䧟不脩特宜冝審慎自量力將息尤佳

服石後防慎貯備雜藥等一首

石人常宜收貯藥等

人參　朴消　苦竹瀝　大黃　梔子

大麥麨　好豉　薔苣　黃連　升麻

石膏　荆瀝　葛根并粉　猪膏　酥

蜜　紫蘇子　白鴨矢　粳米　前胡

冬葵子　生薑　冬瓜　大豆　車前

地榆　五加皮　大小麥奴　天門冬　葱白

萎蕤　麥門冬　生地黃　蘆根　紅雪

紫雪　黃芩　露蜂房

外臺祕要方卷第三十八

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔校勘

外臺祕要方 三十九

明堂灸法

外臺祕要方卷第三十九　明堂灸法七門

朝散大夫守光禄卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

明堂序

明堂序

夫明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙並取三部爲定如此則明堂甲乙是醫人之秘寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣

之流通外勞肢節內連藏腑是以原明堂之經也自古之體解孰能與於此哉故立經以言疾之所由圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脉俞之會合有圖而無經則不能論百疾之要也由是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差差之毫釐則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身（千金方云七尺六寸四分）今半之以爲圖人長三尺七寸五分（千金方云三尺八寸二分）其孔穴相去亦半之五分爲寸其尺用古尺其十二經脉皆以五色作之奇經八脉並以綠色標記諸家並以三人爲圖今因十二經而畫圖人十二身也經脉陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其針法古來以爲深奧今人卒不可解經云針能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄針經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病爲良具注

於明堂圖人並可覽之黃帝素問擿孔穴原經脉窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於形必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脉內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入於五藏之次也如此則療其經令邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉塞不通不得入於經溢於大絡而生奇病焉出第二卷中

夫五藏六腑精靈之氣順脉而出附經而入終而復始如環無端若越其數者則傷脉而損經變爲異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多者風熱也寒性沈重色或青或黑痛多者寒也濕性萎潤色黃䵟痰

痺多濕也此三種本同而末異也風爲百病之長邪賊之根一切衆病悉因風而起也欲灸風者宜從少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從三壯五壯七壯又從三十五十七十壯名曰從少至多也灸寒濕者宜從多以至少也從七十五十三十又從七百五百三百名曰從多以至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸者亦可以蒸爇熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦可蒸爇熏之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沈重則難消故從多而至少也

論疾手足腹背灸之多少及補寫八木火法

楊操音義云凡手足內脉皆是五藏之氣所應也手足外脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓多血脉絕於火下而火氣不得行隨脉遠去也故云三壯五壯七壯者經曰乃更添灸以差爲度其手足外皆是陽脉也不得過於二壯腹中者水穀之所盛風寒之所結灸之務欲多也脊者身之梁棟大陽之所合陰陽動作冷氣成疾背又重厚灸之宜名經脉出入往來之處故灸能引火氣凡灸皆有補寫補者無吹其火須住自滅寫者亦不支即須吹其火至滅也其艾炷根下廣三分長三分若減此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病也凡灸忌用松柏桑棗竹胡枳榆八木以用灸人害人肌肉筋脉骨髓可用陽燧火珠脉日取火若陰無火鑽槐木以菊莖延火亦可碏石以艾蒸之取火用灸大良又無此宜以麻油布纏及艾莖別引取火則去疾不傷人筋骨皆欲得脉傷其痛根瘡若不壞則病不除也甲乙丙卷云灸瘡不發者灸故履底令熱好熨之三日即發也得發則病愈矣

不宜灸禁穴及老少加減法

甲乙經頭維下關承光腦户氣衝脊中伏兔乳中地五會風府泉腋瘖門天府經渠白環輸鳩尾迎香石門女子絲竹空承泣耳門人迎瘈脉少商尺澤陰市陽關甲乙經少海小海睛明關衝

右三十一穴並禁不宜灸千金甄權楊操同第三卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰老者少灸盛壯肥實者多灸凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節爲寸男左女右又一云三寸者盡一中指也人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里下氣也出第二十七卷中

黃帝問曰凡灸大風大雨大陰大寒灸否既不得灸有何損益岐伯荅曰大風灸者陰陽大錯大雨灸者諸經絡脉不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脉畜滯此等日灸乃更動其病令人短壽大風者所謂一復時不可加火艾大寒者所謂盛冬凌辰也大雨者但雨日即不得雖然有卒得又逢大雨此止可灸之大陰者謂諸雲霧惣合凡人初患卒得終是難下手經云當其盛也慎勿衰傷即是初得重病之狀候

年神傍通法

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次易知所以省披討也

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數穴或數

病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須灸者即灸之不宜灸者經穴注了其灸並爲良法但恨下俚間知者鮮爾所以學者深須解之皆須妙解知灸知藥固是良醫

臍 心 肘 咽 口 頭 脊 膝 足

年一	二	三	四	五	六
七	八	九 以上人神所在傍看佗皆倣此		十	十一
十二	十三	十四	十五	十六	十七
十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三
二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九
三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五
三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一
四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七
四十八	四十九	五十	五十一	五十二	五十三

五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九
六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五
六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一
七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七
七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三
八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九
九十

右件九部人神歲移一部周而復始不可灸皆凶

心 喉 頭 肩 背 腰 腹 項 足 膝 陰 股
年一 二 三 四 五 六
七 八 九 十 十一 十二
十三 十四 十五 十六 十七 十八
十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四

二十五　二十六　二十七　二十八　二十九　三十
三十一　三十二　三十三　三十四　三十五　三十六
三十七　三十八　三十九　四十　四十一　四十二
四十三　四十四　四十五　四十六　四十七　四十八
四十九　五十　五十一　五十二　五十三　五十四
五十五　五十六　五十七　五十八　五十九　六十
六十一　六十二　六十三　六十四　六十五　六十六
六十七　六十八　六十九　七十　七十一　七十二
七十三　七十四　七十五　七十六　七十七　七十八
七十九　八十　八十一　八十二　八十三　八十四
八十五　八十六　八十七　八十八　八十九　九十
九十一　九十二　九十三　九十四　九十五　九十六

右件十二部人神所在並不可灸及損傷愼之

推月忌日忌傍通法

月忌法

正二三四五六七八九十十一十二

血忌丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子凶

月厭戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥凶

四激戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未凶

月殺丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰凶千金云戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉

月刑巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌凶

六害巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午凶

天醫卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰吉

右於天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日在足大指 二日外踝 三日股內及脚腨 四日腰及髀 五日口齒舌根咽懸癰及足指

趺

六日手小指少陽及臍下　七日內踝　八日足腕一云在脚　九日尻及龜尾手陽明　十日膝眼及足拇指

十一日鼻柱及眉　十二日面髮際　十三日牙齒　十四日胃管咽喉管足陽明

十五日遍身　十六日胷乳　十七日氣衝及脅　十八日腹內　十九日足趺足下及項

二十日膝以下一云踝及膊　二十一日脣舌足小指　二十二日伏兔外踝一云胷臆中　二十三日肝俞足趺兩腋

二十四日手陽明兩脅及小腸　二十五日足陽明心腹一云膝足　二十六日手足胷　二十七日膝內踝一云肩膊膈下及兩足并陰囊中

二十八日陰中及耳頰　二十九日膝頭顳顬兩手足　三十日足趺上及頰膝頭又云關元下至足心又云遍身

右件人神所在上件日並不宜灸

十干人神所在法

甲日在頭　乙日在項　丙日在肩臂　丁日在胷脅　戊日在腹及頷頸　巳日在背

庚日在膝及髀腰　辛日在脾及心肺　壬日在腎及手　癸日在足

十二支人神所在

子日在目孫氏云在肩口　丑日在耳及腰　寅日在胷孫又云在口　卯日在脾孫氏云在鼻　辰日在腰

巳日在頭口孫氏云在手　午日在心腹　未日在兩足心孫氏云在足　申日在二肩額一云在頭腰　酉日在[illegible]孫氏云在背

戌日在咽喉孫氏云在頭一作項　亥日在髆頭又云在臂膝孫氏云在項

十二時人神所在法

子時在踝　丑時在頭　寅時在耳孫氏云在目　卯時在面孫氏云在耳　辰時在項孫氏云在口

巳時在乳　午時在胷　未時在腹　申時在心　酉時在膝孫氏云在背

戌時在腰孫氏云在陰左右　亥時在股

十二柢人神所在法

建日不治足一作頭禁晡時　除日不治眼一作膝禁日入　滿日不治腹禁黄昏　平日不治背禁人定　定日不治心禁夜半

執日不治手禁鷄鳴　破日不治口禁平旦　危日不治鼻禁日出　成日不治脣禁食時　收日不治頭一作足禁食時

開日不治耳禁日中　閉日不治目禁日昳

又法甲乙日忌寅時不灸頭　丙丁日忌辰時不灸耳　戊己日忌午時不灸髮鬢一云不灸膝臏　壬癸日忌酉時不灸足

又法每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日甲辰

庚寅　乙卯　丙辰　辛巳　五辰　五酉　五未

八節日前後各一日若遇以上日並凶不宜灸之

又法正月丑 二月戌 三月未 四月辰 五月丑 六月戌 七月未
八月辰 九月丑 十月戌 十一月未 十二月辰
又法男忌壬辰 甲辰 己巳 丙午 丁未 女忌甲寅 乙卯 乙酉 乙巳 丁巳 又男忌除日 女忌破日 又男
忌戌 女忌辰孫氏云忌巳
又法丙子日天子會 壬子日百王會 甲子日太子會 丁巳日三公會
丙辰日諸侯會 辛卯日大夫會 癸卯日人臣會 乙亥日以上都會
又木命人行年在木不宜鍼及服青藥
又火命人行年在火不宜汗及服赤藥
又土命人行年在土不宜吐及服黃藥
又金命人行年在金不宜灸及服白藥
又水命人行年在水不宜下利及服黑藥
凡不知此法下藥若遇命厄會深者下手即死
又法立春春分脾 立夏夏至肺 立秋秋分肝

立冬冬至心四季十八日腎

又春左脅秋右脅夏在臍冬在腰以上人神並不宜灸之傷神殺人

五藏六腑變化流注出入傍通 宜每藏傍看從腎藏至天井三焦出入止諸藏腑他皆倣此

凡五藏六腑變化無窮散在諸經其事隱没難得具知今纂集相附以爲傍通令學者少留意推尋則造次可見矣

論曰假令肝心脾肺腎爲藏則膽小腸胃大腸膀胱爲腑足少陰爲腎經足太陽爲膀胱經下至五藏五果五菜皆爾觸類長之他皆倣此出千金方第二十九卷中 近附二十四條

五藏	肝	心	脾	肺	腎	
六腑	膽	小腸	胃	大腸	傍胱	三焦 三焦有經無藏
五藏經	足厥陰	手少陰	足太陰	手太陰	足少陰	
六腑經	足少陽	手太陽	足陽明	手陽明	足太陽	手少陽
五行	木	火	土	金	水 以上各主一藏	

五行數三八 二七 五十 四九 一六 以上五行數以配五藏

五行色青 赤 黃 白 黑 以上五行色五藏所象

五行相生水 木 火 土 金 以上五藏相生

五行相剋金 水 木 火 土

五藏胎月 八月 十一月 五月 二月 五月 不宜灸吐利

五藏相月 冬三月木相 春三月火相 夏三月土相 季夏六月金相 秋三月水相並不宜補養

五藏王月 春三月 夏三月 季夏六月 秋三月 冬三月 有疾可宜泄

五藏廢月 夏三月木廢 季夏六月火廢 秋三月土廢 冬三月金廢 春三月水廢宜補不宜瀉

五藏囚月 季夏六月木囚 秋三月火囚 冬三月土囚 春三月金囚 夏三月水囚宜補不宜瀉

五藏死月 秋三月木死 冬三月火死 春三月土死 夏三月金死 季夏六月水死宜補

五藏王日 甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸 以上五藏王日不灸不服藥

五藏王時 寅至辰 巳至未 辰未戌丑 申至戌 亥至丑 王時不灸

五藏困日 戊己土也 庚辛金也 壬癸水也 甲乙木也 丙丁火也宜補養安和

五藏困時　食時日映土也　晡時日入金也　人定夜半水也　平旦日出木也　禺中日中火也宜補養

五藏忌日　庚辛　壬癸　甲乙　丙丁　戊己並忌此日得疾病

五藏忌時　申至酉　亥至子　寅至卯　巳至午　辰戌未丑並忌此時得病

五時　春　夏　季夏　秋　冬

五音　角六十四絲　徵五十四絲　宮八十一絲　商七十二絲　羽十八絲以上象五行應五藏

五屋　歲東方　熒惑南方　鎮中央　太白西方　辰北方星以上五各象一藏

五常　仁肅　禮哲　信聖　義乂　智謀各從五藏出

五樂　琴　竽　鼓　磬　瑟外象五行內應五藏

五兵　矛　劒　楯　戟　弩各應其藏

五味　酸　苦　甘　辛　鹹以上各隨五藏所宜

五宜　苦　甘　辛　鹹　酸子來扶毋

五不宜　辛　鹹　酸　苦　甘此五味須忌之

五事　貌恭　視明　思睿　言從　聽聰隨所藏感

五咎 狂 豫 蒙 僭 急

六情 好喜 忪慮一作惠好 樂 威怒一作感怒 惡哀 出五藏之情 惡哀二字文不類無字本可校今闕疑他倣此

八性 慈恚悲 愛 公私怨 氣正 欲忌 各稟之性

生 華 肉 髓 骨 腦 各隨初生長

形 直 銳 方 圓 曲 外應五行之形內法五藏之象

五養 筋 血脉 肉 皮毛氣 骨 精各從五藏所養

五液 泣一云淚 汗 涎 涕 唾 各隨藏所生

七神 魂 神 意智 魄 精 志以上脾腎各二神故七神

五竅 目左目甲右目乙 舌榮於耳外爲血內主五音左耳丙右耳丁 脣口爲戊舌爲己 鼻左孔庚右孔辛 耳左腎壬右腎癸

五聲 呼 言 哭 歌 呻 噫 五藏若中風有此聲應

五響 諷詠 肆 唱 歌 吟

五氣 呵 吹呼 唏 噓 呬 有疾各隨其藏消息其法在調氣論

五惡 風 熱 濕 寒 燥 氣之惡

五惡　辛　鹹　酸　苦　甘　味之惡

五有餘病　怒　笑不止　脹滿　噫　喘欬上氣　脹洩欠實則此疾見

五不足病　悲　憂　少氣　息痢　厥虛則此疾見

五積　肥氣　伏梁　痞氣　息賁　賁豚

生疾　奔氣　憂恐　食飲　風寒　强力喘息失度乃生此疾

五傷　久行傷筋　久視傷心　久坐傷肉　久臥傷皮　久立傷骨人欲勞勿極

五藏本氣千金云五臭　臊　羶　焦　香　腥　腐五藏各有此氣

五方神　青龍　朱鳥　黃龍　白虎　眞武五方神象五藏

五畜　虎兎千金云雞　蛇馬千金云羊　龍牛羊犬　猴雞　鼠猪各主本藏所宜

五穀　麻　麥　稷　黃黍千金云稻　大豆以上補益五藏六腑

五果　李　杏　棗　桃　栗以上果以益五藏

五菜　韭　薤　葵　葱　藿蔘以上菜可久食

五木　榆　栗　桂　桑　梧桐以上宜助五藏

五藏斤兩 四斤四兩（左三葉右四葉） 十二兩（三毛七孔） 二斤三兩 三斤三兩（六葉兩耳）

一斤一兩（以上五藏輕重數）

六腑斤兩 三兩三銖 二斤十四兩 二斤十四兩 二斤十二兩

九兩二銖（以上六腑輕重數）

六腑丈尺 三寸三分 二丈四尺（廣二寸四分） 二尺（六寸一云大一尺五寸） 一丈二尺（廣六寸）

九寸（以上六腑長短數一云廣七寸）

六腑所受 三合（一云一合） 二斗四升 三斗五升 一斗二升 九升九合（以上六腑受盛數一云九升二合）

五藏官 尚書（一云上將軍又爲郎官） 帝王 諫議大夫 上將軍（一云大尚書） 後宮列女（以上五藏官位）

六腑官 將軍 決曹吏 監倉吏 內嗇吏（疑溢） 監倉椽 水曹椽（以上六腑官位）

五藏俞 九（椎下兩傍各一寸半是也） 五（椎下兩傍各一寸半是也） 十一（椎下兩傍各一寸半是也） 三（椎下兩傍各一寸半是也） 十四（椎下兩傍各一寸半是也）

六腑俞 十（椎下兩傍各一寸半是也） 十八（椎下兩傍各一寸半是也） 十二（椎下兩傍各一寸半是也） 十六（椎下兩傍各一寸半是也） 十九（椎下兩傍各一寸半是也）

十三（椎下兩傍各一寸半是也）

五藏募 期門 巨闕 章門 中府 京門

六腑募　日月　關元　太倉　天樞　中極　石門（三焦）

五藏脉　弦（長）　洪（盛）　緩（大）　浮（短）　沈（濡）

五藏流注傍通

出井（木）　大敦　中衝（出心胞脉餘藏無）　隱白　少商　涌泉

流滎（火）　行間　勞宮　大都　魚際　然谷

注俞（土）　太衝　太陵　太白　太淵　太谿

行經（金）　中封　間使　商丘　經渠　復溜

入合（水）　曲泉　曲澤　陰陵泉　尺澤　陰谷（以上五藏出入）

謹按銅人鍼經甲乙經九墟經並無五藏所過爲原穴唯千金臺祕再集有之今列穴名于左

中都　內關　公孫　列鈌　水原

心之藏主出入

出井（金）　少衝　流滎（水）　少府

注俞木　神門　過原　通里
行經火　靈道　入合土　少海

六腑流注傍通

出井金　竅陰　少澤　厲兌　商陽　至陰
流滎水　俠谿　前谷　内庭　間谷一名二間　通谷
注俞木　臨泣　後谿　陷谷　三間　束骨
過原　丘墟　腕骨　衝陽　合谷　京骨
行經火　陽輔　陽谷　解谿　陽谿　崑崙
入合土　陽陵泉　小海　三里　曲池　委中　以上六腑出入

三焦流注傍通

出井金　關衝　流滎水　掖門
注俞木　中渚　過原　陽池
行經火　支溝　入合土　天井　以上三焦出入

十二身流注五藏六腑明堂

肺人肺者藏也兩傍一十八穴

甲乙經

肺出于少商少商者木也在手大指端內側去手甲角如韭葉手太陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于魚際魚際者火也在手大指本節後內側散脉中手太陰脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太淵太淵者土也在掌後陷者中手太陰脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于經渠經渠者金也在寸口陷者中手太陰脉之所行也爲經不可灸灸傷人神明

入于尺澤尺澤者水也在肘中約上動脉手太陰脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少商在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘧寒厥及熱煩心善噦心滿而汗出寒濯濯熱煩手臂不仁唾沫脣乾引飲手腕攣指支痛肺脹上氣耳中生風欬喘逆痺臂痛嘔吐食飲不下彭彭熱病象瘧振慄鼓頷腹脹俾倪喉中鳴耳前痛甄權云在手大毋指甲骨外畔當角一韭葉白肉際宛宛中是也此脉脾肺之候論藏湊不宜灸之忌生冷熱食

魚際在手大指本節後內側散脉中灸三壯主虛極洒洒毛起惡風寒舌上黃身熱欬嗽喘痺走胷背不得息頭痛甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒腹痛不下食飲肘攣支滿喉中焦乾渴痓上氣熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也膈中虛食飲嘔身熱汗不出數唾涎嘔吐血下肩背寒熱脫色目泣出皆虛也唾血時寒時熱厥心痛卧若從居心間痛動作痛益甚色不變者肺

心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂易霍亂胃氣逆

太淵在手掌後陷者中灸三壯主脾逆氣寒厥急煩心善唾噦噫胷滿歎呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得臥胷中滿喘背痛肺脹滿彭彭臂厥肩膺胷滿痛目中白翳眼青轉筋掌中熱乍寒乍熱缺盆中相引痛數欠喘不得息臂內廉痛膈飲煩滿病溫身熱五日以上汗不出厥心痛臥若從居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也如乳噫胃氣上逆心痛唾血振寒嗌乾狂言口僻肘中痛瘖瘧痺

經渠在寸口陷者中不可灸傷人神明主瘧寒熱胷背急胷中彭彭然甚即交兩手如瞀為暴痺喘逆喉痺掌中熱欬逆上氣喘息數欠熱病汗不出心痛欲嘔

列缺手太陰絡去腕上一寸半灸五壯甄權云腕後臂側三寸交义頭兩筋骨罅宛宛中是也主偏風口喎半身不隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚癇如有見者欬喘掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手如瞀為口沫出實則肩背熱痛汗出四肢腫身濕搖時寒熱飢則煩飽則面色變口禁不開惡風泣出喉痺欬上氣數欠四肢厥逆善笑溺白熱病先手臂痛身熱瘈瘲脣口聚鼻張咽下汗出如連珠小便白熱痛兩乳下三寸堅脅下滿悸善忘口中沐出

孔最手太陰郄去腕上七寸灸五壯主熱病汗不出此穴可灸五壯汗即出厥頭痛

尺澤在肘中約上動脈灸三壯甄權云在臂屈橫文中兩筋骨罅陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脅痛心彭彭痛欬逆上氣舌乾脅痛心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振慄瘈瘲手不伸欬嗽唾濁氣鬲善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因為縱衄唾血時寒時熱胞中有大疝瘕積與陰相引痛苦冗泄上下出喉痺哽噎寒熱實則肩背熱痛汗不出四肢暴腫虛則臂背寒短氣心煩癲疾嘔沫手臂不得上頭肘痛

俠白在天府下去肘下五寸動脈手太陰別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府在腋下三寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相搏口鼻出血身脹逆息不得臥風汗出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺甄權千金楊操同

大腸人　大腸者肺之腑也兩傍四十二穴并下三單穴共四十五穴

甲乙經

大腸出于商陽商陽者金也一名絕陽在手大指次指內側去爪角如韭葉手陽明脉之所出爲井冬三月宜灸之

流于二間二間者水也一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于三間三間者木也一名少谷在手大指本節後內側陷者中手陽明脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于合谷一名虎口在手大指歧骨間手陽明脉之所過也爲原

行于陽谿陽谿者火也一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脉之所行也爲經

入于曲池曲池者土也在肘外輔屈肘曲骨之中手陽明脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

商陽一名絕陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胸中喘息支脅熱病汗不出耳中生風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下齒痛臂痠引口中惡寒䪼腫肩痛引缺盆喉痺青盲二間一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中灸三壯主多卧善驚肩髃痛寒鼻鼽赤多血侵淫起面身熱痎痺如哽背傷忽振寒肩疼齒痛三間一名少谷在手大指本節後內側陷者中灸三壯主喉痺腫如哽齒齲痛惡清多卧善驚胸滿腸鳴瘧痎寒熱脣口乾身熱喘息目急痛善驚合谷一名虎口在手大指歧骨間灸三壯主寒熱痁瘧狂易鼻衄熱病汗不出瞶目目痛瞑頭痛古齒齲痛驚喉痺痱痿臂腕不用脣吻不收聾耳中不通瘖不能言口禁不開陽谿一名中魁在腕中上側兩筋間陷者

中灸三壯主熱病煩心膿目目痛泣出厥逆頭痛胷滿不得息寒熱癲疾不嘔沫善笑見鬼喉痺耳聾鳴齒痛驚掣瘧寒甚熱病腸澼臑肘臂痛虛則氣膈滿肩不舉吐舌戾頸妄言痂疥

偏歷 手陽明絡在腕後三寸灸三壯主風瘧汗不出寒熱風痛汗不出膿目目䀮䀮癲疾多言耳鳴口僻頰腫實則聾喉痺不能言齒齲痛鼻鼽衄虛則痺隔

温留 一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後小士五寸大士六寸灸三壯主腸鳴而痛傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉瘧面赤腫口齒痛癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼狂臥喉痺不能言虛氣面腫

下廉 右輔骨下去上廉一寸怒輔齊兌內分外斜灸三壯主眼痛溺黃

上廉 在三里下一寸陽明之會灸三壯主小便黃腸中鳴相追

三里 在曲池下二寸按之肉起兌肉之端灸三壯主腹䐜時寒腰痛不得臥齒痛頰腫

曲池 在肘外輔屈肘曲骨之中灸三壯主肩肘中痛難屈伸手不可舉喉痺不能言目不明腕急身熱驚狂躄痿痺重瘈瘲癲疾吐舌胷中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱傷寒餘熱不盡

肘窌 在肘大骨外廉陷者中灸三壯主肩肘節痠重痺痛不可屈伸

五里 在肘上三寸又行馬大外中央灸十壯主風勞驚恐久吐血肘不飲舉風癲嗜臥四肢不欲動搖身黃寒熱頸癧適欬呼吸膿目目䀮䀮少氣痎瘧心下服滿痛上氣左取右右飲左

臂臑 在肘上七寸䐃肉端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸瘰癧肩痛不可舉

臑會 一名臑窌在臂前廉去肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主瘿臂氣腫腠理氣

肩窌 在肩端臑上斜舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛

肩髃 在肩端兩骨間手陽明蹻脈之會灸三壯主肩中熱指臂痛

巨骨 在肩端上行兩叉骨陷者中手陽明蹻脈之會灸三壯主肩背痺痛臂不舉血瘀肩中痛不能動搖

扶突 一名水穴在曲頰下一寸人迎後手陽明脈氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽喉鳴喝喘息暴瘖氣哽

天鼎 在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半手陽明脈氣所發灸三壯主暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

禾窌 一名頻直鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脈氣

所發主鼻窒口僻清涕出不可止鼽衄有癰口噤不可開

水溝在鼻柱下人中督脈手陽明脈之會直脣取之灸三壯主寒熱頭痛癲疾互引水腫人中盡滿脣反者死振寒手捲前僵鼻鼽不能息鼻不收洟不知香臭衄不止口不禁水漿喎僻瞤目

兌端在脣上端手陽明脈氣所發灸三壯主寒熱鼓頷口禁癲疾吐沫寒熱痓互引脣吻強上齒齲消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止

齗交在脣內齒上齗縫灸三壯主痓煩滿寒熱口僻癲疾互引目痛不明齒間出血者有傷酸齒尖落痛口不可開引鼻中鼻中息肉不利鼻頭頷頞中痛鼻中有蝕瘡甄權千金楊操同

肝人肝者藏也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出于大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于行間行間者火也在足大指間動脈應手陷者中足厥陰脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太衝太衝者土也在足大指本節後二寸或一寸半陷者中足厥陰脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于中封中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所行也爲經

入于曲泉曲泉者水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒心痛汗出陰跳遺溺小便難而痛陰上入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中邑邑不樂小

兒癇瘈遺清溺虛則病諸瘕癩實則閉癃少腹中熱善寐尸厥死不知人脉動如故痓

行間 在足大指間動脉應手陷者中灸三壯主欬逆上氣唾沫溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐卒陰跳腰痛不可以俛仰面倉黑熱腹中䐜滿身熱厥痛心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息肝心痛也月事不利見赤白而有身反敗陰寒腹痛上支心心下滿癃莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息癲疾短氣嘔血肓背痛善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱嗌乾渴喉痺口喎喉咽如扼狀

太衝 在足大指本節後二寸半或一寸半陷者中灸三壯主腰痛少腹滿小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足膽中邑邑狐疝環臍痛陰騫兩丸縮腹堅不得臥黃疸熱中善渴女子疝及少腹腫溏泄癃遺溺陰痛面蒼黑目下眥痛暴脹胷脅支滿足寒大便難面脣色白時時嘔血男子精不足女子漏血乳難嘔厥寒時有微熱脅下支滿喉痺痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛酸腋下腫馬刀瘻肩腫吻傷痛肝脹心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛也

中封 在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸三壯主色蒼蒼然太息如將死狀振寒小便白便難瘻厥身體不仁手足偏小頹疝陰暴腄疝癃臍少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身濕重女子少腹大乳難嗌乾嗜飲俠臍疝

蠡溝 足厥陰絡在內踝上五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰跳腰腹痛實則挺長寒熱攣暴痛遺溺偏大虛則暴癢氣逆腫睾卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣不足腹中邑邑少腹痛咽中有熱如息肉狀如著欲出背攣不可俛仰

中郄 一名中都足厥陰郄在內踝上七寸脛骨中灸五壯主頹疝崩中腹上下痛腸澼亦止精

膝關 在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脉氣所發灸五壯主膝內廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽痛

曲泉 在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝按之如湯沃兩股中少腹腫陰挺痛瀝背來下血陰中腫或癢漉青汁若葵血閉頹疝陰跳痛引臍中不得尿陰痿腹脅下支滿癃閉後時少泄四肢不舉實則身熱頭眩痛汗不出目䀮䀮筋攣膝不可屈伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽病泄下血

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走灸三壯主腰痛少腹痛五里在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脈灸三壯主少腹中滿熱閉不得溺陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脈灸三壯主婦人絶產若未曾產甄權千金楊操同

膽人膽者肝之腑也兩傍一百四穴

甲乙經

膽出于竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于俠谿俠谿者水也在足小指次指岐骨間本節前陷者中足少陽脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于臨泣臨泣者木也在足小指次指間本節後間陷者中去俠谿一寸半足少陽脈之所注也爲腧夏三月宜灸之

過于丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸足少陽脈之所過也

行于陽輔陽輔者火也在足外踝上四寸輔骨前絶骨端如前三分許去丘墟七寸足少陽脈之所行也爲經

入于陽陵泉陽陵泉者土也在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脅痛欬逆不得息及爪甲上與內分者左取右右取左立已不已復取之手足清煩熱汗不出手厥轉筋頭痛如錐刺之循循然不可以動動益煩心喉痺舌卷口乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴俠谿在足小指次指岐骨間本節前陷者中灸三壯主胷中支滿寒如風吹狀寒熱熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛逆寒江出多汗耳鳴聾目痒胷中痛不可反側痛無常處瘖瘂狂疾地

五會在足小指次指本節後陷者中不宜灸使人瘦不出三年死主內傷唾血不足外無膏澤乳腫

臨泣在足小指次指間本節後去俠谿一寸半陷者中灸三壯主厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不得行足外皮痛背中滿腋下腫馬刀瘻善自齧頰天牖中腫淫濼胻酸頭眩枕骨頷顱痛目澀身痺洒淅振寒季脅下支滿寒熱胷脅腰腹膝外廉痛月水不利見血而有身則敗及乳腫背痺心一痛不得息痛無常處大風目外眥痛身熱痱缺盆中痛瘧日西發

丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸灸三壯主目視不明振寒目翳瞳子不見腰脅痛腳痠轉筋胷脅痛善大息胷滿彭彭然瘧振寒腋下腫痿厥寒足腕不收躄坐不能起髀樞腳痛大疝腹堅寒熱頸腫狂疾

懸鍾足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脈絕乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能食飲

光明足少陽絡在外踝上五寸灸五壯主身體寒少熱甚惡心惕然此與絕骨穴療病同功主淋瀝胻酸熱病汗不出狂病虛則痿躄坐不能起實則厥胻熱膝痛身體不仁手足偏小齧頰不能俛仰痓

外丘足少陽郄少陽所生在外踝上七寸灸三壯主膚痛痿痺胷脅滿頭痛項內寒熱癲疾不嘔沫

陽輔在外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前三分許去丘墟七寸灸三壯主寒熱腰痛如小錘居其中弗然腫不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常處寒熱酸痟四肢不舉腋下腫馬刀瘻髀膝胻骨搖酸痺不仁喉痺

陽交一名別陽一名足髎陽維郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間灸三壯主寒厥癲疾噤齘瘈瘲驚狂喉痺胷滿面腫寒熱髀胻不收瘖不能言

陽陵泉在膝下一寸外廉陷者中足少陽脈氣所發灸三壯主大息口苦咽中介介數唾脅下支滿嘔吐逆髖痺引膝股外廉痛不仁筋急嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之膽脹

陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中不宜灸主膝外廉痛不可屈伸胻痺不仁

中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脈氣所發灸五壯主寒氣在分肉間痛上下者痺不仁

環跳在髀樞中側臥伸下足屈上取之足少陽脈氣所發灸五十壯主樞中痛不可舉腰脅相引急

痛急髀筋瘈脛痛不可屈伸痺不仁

本神 在曲差傍一寸半髮際一曰直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胷脅相引不得傾側癲疾不嘔沫小兒驚癇

頭維 在額角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言

臨泣 當目上眥直上入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰清不得視口沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇反視

目窗 一名至營在臨泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目瞑遠視䀮䀮上齒齲腫

正營 在目窗後一寸足少陽陽維之會灸五壯主牙齒痛脣吻強上齒齲痛惡寒

承靈 在正營後一寸半足少陽陽維之會灸五壯腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通

腦空 一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會灸五壯主頭痛身熱引兩頷急腦風目瞑頭痛風眩目痛鼻管疽發爲厲鼻癲疾大瘦

風池 在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主寒熱癲疾僵仆狂熱病汗不出頭眩痛痎瘧頸項痛不得顧目泣出互引鼻鼽衄目內眥赤痛氣厥耳目不明喉痺傴引項筋攣不收

顱息 在耳後青脈間足少陽脈氣所發灸三壯主身熱頭脅痛不可反側小兒癇喘不得息耳鳴

懸顱 在曲周顳顬上廉足手陽脈氣所發灸三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛

頷厭 在曲周顳顬上廉足少陽陽明之會灸三壯主善嚏頭痛身熱目眩無所見偏頭痛引目外眥而急耳鳴

懸釐 在曲周顳下廉手足少陽陽明之會灸三壯主熱病偏頭痛引目外眥耳鳴善嚏

陽白 在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目瞳子不可以視俠白強急不可以顧

絲竹空 一名目窌在眉後陷者中足少陽脈氣所發不可灸不幸使人目小及盲眩頭痛互引目中赤䀮䀮臏風目上插痓反目憎風癲疾狂煩滿

瞳子窌 在目外去眥五分手足少陽之會灸三壯主青盲無見遠視䀮䀮目中膚瞖白膜一名後曲

天衝 在耳上如前三寸灸九壯主頭痛癲疾不嘔沫痓互引善驚

蟀谷 在耳上入髮際一寸五分

嚼而取之灸三壯主醉酒風發兩角弦痛一云兩目眩不能飲煩滿嘔出

曲鬢 在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會灸三壯主頸頷支滿引牙齒口噤不開急痛不能言

浮白 在耳後入髮際一寸下曲頰後灸三壯主足緩不收痿不能行不能言寒熱喉痺欬逆吐疝積胸中滿不得喘息胸痛耳聾嘈嘈無所聞頸項癰腫不能言及癭肩不能舉齒牙齲痛

竅陰 在完骨上枕骨下手足太陽少陽之會灸五壯主管疽發厲項痛引頭癰腫

完骨 在耳後入髮際四分足太陽少陽之會灸三壯主風頭耳後痛煩心足痛不收失履口喎僻頭項搖瘈牙車急癲疾僵仆狂虛面有氣齒牙齲痛小便赤黃喉痺項腫不可俛仰頰腫引耳瘖瘂狂易

淵腋 在腋下三寸宛宛中舉臂取之主胸滿馬刀臂不舉禁不可灸之不幸生腫馬瘍腹內潰者死寒熱生馬瘍可治

大包 脈出淵腋下三寸脾之大絡布胸脅中九肋間及季肋端灸三壯主大氣不得息息即胸脅中痛實則其身盡寒虛則百節皆縱

輒筋 在腋下三寸復前行一寸著脅足少陽脈氣所發灸三壯主胸中暴滿不得臥喘息

天池 一名天會在乳後一寸腋下三寸著脅直腋撅肋間手心主足少陽脈之會灸三壯主寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有聲喉中鳴

章門 脾募也一名長平一名脅髎在大橫外直臍季肋端足厥陰少陽之會側臥屈上足舉臂取之灸三壯主腹中鳴盈盈然食不化脅痛不得臥煩熱口乾燥不嗜食胸脅支滿喘息而衝膈嘔心痛及傷飽身疲痟羸瘦腰痛不得反側賁豚腹腫腰清脊強四肢懈墮善怒欬少氣鬱鬱然不得息厥逆肩不舉馬刀強身瞤石水胃脹

帶脈 在季肋下一寸八分灸五壯主婦人少腹堅痛月水不通

五樞 在帶脈下三寸一曰在水道下一寸半灸五壯主男子陰疝兩丸上下入少腹痛婦人下赤白裏急瘈瘲

京門 腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季肋本俠脊灸三壯主痓脊反折腰痛不可以立俛仰寒熱腹䐜央央然不得息溢飲水道不通溺黃少腹裏急腫洞泄髀痛引背

維道 一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脈之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食

居髎在長平下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會灸三壯主腰引痛少腹在腋前兩筋間主肩前痛與胷相引臂裏攣急手不得上舉至肩甄權千金楊操同後腋在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急下得上頭轉穀在傍各下二骨間陷者中主胷脅支滿不欲食穀入不化嘔吐復出舉腋取之飲郄在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臆脹痛引臍傍腹鳴濯濯若中有水聲仰腹取之應突在飲郄下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之脅堂在腋陰下二骨陷者中主胷脅支滿臚脹賁豘噫噦喘逆臑視目黃舉腋取之旁庭在脅堂下二骨間陷者中舉腋取之灸三壯主卒暴中飛尸遁及胷脅支滿時上搶心嘔吐喘逆咽乾脅痛始素在腋脅下廉下二寸骨陷者中主脅下支滿腰痛引腹筋攣陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

甲乙經

脾出于隱白隱白者木也在足大指端內側去爪甲角如韭葉足太陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于大都大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰之所留也爲榮春三月宜灸之

注于太白太白者土也在足內側核骨下陷者中足太陰脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于商丘商丘者金也在足內踝上微前陷者中足太陰脉之所行也爲經

入于陰陵泉陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脉之所入也爲合秋三月宜灸之出第

三卷中甄權千金楊操同

隱白 在足大指端內側去爪甲角如韭葉灸三壯主腹中有寒氣起則氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足脛中寒不得卧氣滿胷中熱暴洩仰息足下寒膈中悶嘔吐不欲食飲尸厥死不知人脈動如故飲渴身體痛多睡

大都 在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也瘧不知所苦風逆暴四肢腫濕則晞然寒飢則煩心飽則眩

太白 在足內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重頰痛煩寃身熱腰痛不可以俛仰腹滿兩頷痛甚暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔洩有膿血苦嘔無所出先取三里後取太白章門厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也胷脅支滿腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痿不相知熱病滿悶不得卧脾脹

公孫 在大指本節之後一寸別走陽明太陰絡也灸三壯主瘧不嗜食多寒熱汗出實則腹中切痛厥頭面腫起煩心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲霍亂

商丘 在內踝微前下陷者中灸三壯主癲疾狂多食善笑不休發於外煩心中渴瘧寒腸中痛已汗出腹滿響響不便心下有寒痛陰股內痛氣癰狐疝走上下腹痛脾虛令人病寒不樂好太息喉痺寒熱善嘔骨痺煩滿癲瘈手足擾癲疾目昏口噤溺黃筋攣痛病善厥夢者絕子厥頭痛面腫起欬而泄不欲食痔骨蝕管疽

漏谷 在足內踝上六寸骨下陷者中亦足太陰絡灸三壯主腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿腹脹而氣快然引肘脅下皆主之少腹脹急小便不利厥氣上頭巔

三陰交 在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會灸三壯主足下熱脛疼不能久立濕痺不能行腹中熱若寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及巔脾病者身重苦飢足痿不欲行善瘈掣腳下痛虛則腹脹腹鳴溏洩食飲不化脾胃肌肉痛此出素問

地機 一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸灸五壯主癩疝溏瘕腹中痛藏痺

陰陵泉 在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之

灸三壯主溏泄穀不化腹中氣脹嗑盍脅下滿腹中氣盛腹脹逆不得臥腎腰痛不可俛仰氣癃尿黃寒熱不節女子疝瘕按之如以湯沃其股內至膝飧泄婦人陰痛少腹堅急痛重下不嗜食心下滿寒中小便不利霍亂足痺痛

血海 在膝下臏上內廉白肉際二寸中足太陰脈氣所發灸五壯主婦人漏下苦血閉不通逆氣脹

箕門 在魚腹上越筋間動應手陰市內足太陰脈氣所發一云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼷痛小便難

期門 肝募也在第二肋端不容傍一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人產餘疾食飲不下胸脅支滿目眩足寒小便難心切痛善噫聞酸臭痿痺腹滿少腹尤大息賁脅下氣上下胸中有熱目青而嘔霍亂泄痢痊腹大堅不得息欬脅下積聚喘逆臥不安席時寒熱心大堅奔肫上下癃遺溺鼠鼷痛小便難而白瘖不能言

日月 膽募也在期門下五分灸五壯主太息善悲少腹有熱欲走多唾言語不正四肢不收

腹哀 在日月下一寸半足太陰陰維之會灸五壯主便膿血寒中食不化腹中痛

大橫 在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會灸五壯主大風逆氣多寒善悲

腹結 一名腸窟在大橫下一寸三分灸五壯主繞臍痛搶心膝寒泄痢

府舍 在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主疝瘕髀中急痛循脅上下搶心腹滿積聚厥逆霍亂

衝門 一名慈宮去大橫五寸在府舍橫骨兩端約中動脈足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心

雲門 在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脈應手足太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主喉痺胸中暴逆先取衝脈後取三里雲門皆寫之欬喘不得息坐不得臥呼吸氣索咽不得胸中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盆脈代不至寸口四逆脈鼓不通

中府 肺募也一名膺中俞在雲門下一寸一云一寸六分乳上三肋間動脈應手陷者中足太陰之會灸五壯主肺系急胸中痛惡清胸滿邑邑然嘔膽胃中熱喘逆氣氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出面腹脹膈中食噎不下食喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿

周榮 在中府下一寸六分

陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿**胷鄉**在周榮下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿却引背痛臥不得轉側**天谿**在胷鄉下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發仰而取之灸五壯主胷中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣喉鳴有聲**食竇**在天谿下一寸六分陷者中足太陰脉氣所發舉臂取之灸五壯主胷脅支滿膈間雷鳴滀陸常有小聲甄權千金楊操同

、**胃人胃者脾之腑也兩傍九十穴**去下一單穴共九十一穴

甲乙經

胃出于厲兊厲兊者金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于內庭內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于陷谷陷谷者木也在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于衝陽一名會骨在足趺上五寸骨間動脉上去陷谷三寸足陽明脉之所過爲原

行于解谿解谿者火也在衝陽後一寸半腕上陷者中足陽明脉之所行也爲經

入于三里三里者土也在膝下三寸胻外廉足陽明腹之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

厲兊在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口噤氣絕脉動如故其形無知如中惡狀瘧不嗜食腹寒脹滿熱病汗不出鼽衄眩前仆面浮腫足脛寒惡人與木音喉痺齲齒惡風鼻不利多臥善驚**內庭**在足大指次指外間陷者中灸三壯主四厥手足悶者使人久持之逆冷脛痛

腹脹滿皮膚痛善伸數欠惡人與木音振寒嗌中引痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄齗口噤僻不嗜食

陷谷

在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三壯主熱痢面腫目癰腫善齧唇善噫腹痛脹滿脹鳴熱病汗不出水腫留飲胸脅支滿

衝陽

一名會原在足跗上五寸骨間動脈上去陷谷三寸灸三壯主皮先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆主之齒齲痛腹大不嗜食振寒而欠狂妄而行登高而歌棄衣而走足下緩失履風水面胕腫

解谿

在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱調言風水面胕腫顏黑厥氣上支腹脹大下重瘧瘈瘲驚股膝重胻轉筋頭眩痛癲疾厥寒熱欠煩滿悲泣出狂易見鬼與火霍亂風從頭至足面目赤口痛齧舌足大指傅傷下車挃地適臂指端傷爲筋痹

豐隆

足陽明絡也在外踝上八寸下廉胻外廉陷者中灸三壯主厥逆胸痛如刺腹中切痛大小便澀難厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痹不能言

巨虛下廉

足陽明與小腸合在上廉下二寸灸三壯主少腹痛飧泄出糜次指間熱若脈陷寒熱身痛唇乾不得汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰驚痹脛腫足跗不收跟痛

條口

在下廉上一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脛寒不得臥脛痠足緩失履濕痹足下熱不能久立

巨虛上廉

足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸痛狂妄走善欠大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能行立胃脅支滿惡聞人木音風水面腫甄權云主大氣不足偏風腰腿腳不隨

三里

在膝下三寸胻外廉灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善噦痓中有寒腹中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足陽鳴腹痛泄不化心下脹熱病汗不出喜嘔吐苦痓痙身反折口噤喉痹不能言寒熱陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言胸中瘀血胸脅支滿膈痛不能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳癰有熱五藏六腑脹狂歌安言怒恐惡人與火罵詈霍亂遺矢失氣

犢鼻

在膝臏下骭上俠解大筋中足陽明脈氣所發灸三壯

主犢鼻腫先熨去之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也

梁丘 足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主大驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸不可以行

陰市 一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脈氣所發不可灸主寒疝下至腹膝膝腰痛如清水大腹諸疝按之下膝上伏兔中寒痛腹脹滿痿厥少氣

伏兔 在膝上六寸起肉足陽明脈氣所發禁不宜灸

髀關 在膝上伏兔後交分中灸三壯主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣 一名谿穴一名面髎在目下七分直目瞳子蹻脈任脈足陽明之會甄權云在眼下八分禁不宜灸無問多少三日以後眼下大如拳息肉長桃許大至三十日即定百日都不見物或如升大目不明淚出目眩瞢瞳子痒遠視䀮䀮昏夜無所見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言

四白 在目下一寸足陽明脈氣所發灸七壯主目痛口僻淚出目不明

迎香 一名衝陽在禾髎上鼻下乳傍手足陽明之會主鼻鼽不利窒洞氣塞喎僻多涕鼻衄有齆不宜灸

巨髎 在俠鼻傍八分直瞳子蹻脈足陽明之會主面目惡風寒䪼腫癰痛招搖視瞻瘈瘲口僻青盲無所見遠視䀮䀮目中淫膚白膜覆瞳子

地倉 一名胃維俠口傍四分如近下蹻脈手足陽明之會灸三壯主口緩不收不能言語手足痿躄不能行

承漿 一名天池在頤前下脣之下足陽明任脈之會開口取之灸三壯主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫寒熱痓互引口乾小便赤黃或時不禁消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齲

頰車 在耳下曲頰端陷者中足陽明脈氣所發灸三壯開口有空主頰腫口急頰車骨痛齒不可用嚼

大迎 一名髓孔在曲頷前一寸二分骨陷者中動脈足陽明脈氣所發灸三壯主寒熱頸瘰癧癲疾口喎喘悸痓口噤厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不能言不得嚼

上關 一名客主人在耳前上廉起骨開口有空灸三壯主脣吻強上齒齲痛口僻噤不開耳痛聾聵瘈瘲口沫出寒熱痓青盲瞶目惡風寒

下關 在客主人下耳前動脈下空下廉合口有空張口而閉灸三壯主失欠下齒齲下牙痛䪼腫耳聾鳴痓口僻耳中有乾底聤耳有膿不可灸之

耳門

在耳前起肉當耳中缺者灸三壯主耳中有膿及底耳聹耳皆不灸主耳痛鳴聾頭頷痛上齒齲

人迎一名天五會在頸大脈動應手俠結喉傍以候五藏之氣足陽明脈氣所發禁不可灸灸之不幸殺人一云有病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胷滿不得息胷滿呼吸喘喝窮屈窘不得息刺人迎入四分不幸殺人

水突一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍在頸直人迎俠天突陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣瘤癭氣瘤癭咽腫肩腫不得顧喉痺

氣戶在巨骨下俞府兩傍各二寸陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味

庫房在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血

屋翳在庫房下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體腫皮膚不可近衣淫濼苛獲久則不仁

膺窗在屋翳下一寸六分灸五壯主胷滿癰腫乳癰寒熱短氣卧不安

乳中禁不可灸灸之生瘡瘡中有膿血清汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胷下滿痛膺腫乳癰悽索寒痛不可按搔

不容在幽門傍各一寸半去任脈二寸直四肋端相去四寸足陽明脈氣所發灸五壯主嘔血肩息脅下痛口乾心痛與背相引不可欬引腎痛

承滿在不容下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主腸鳴相逐不可傾側肩息唾血

梁門在承滿下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脅下積氣結痛

關門在梁門下五分一云一寸太一上足陽明脈氣所發灸五壯主遺溺腹脹善滿積氣身腫

太一在關門下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門在太一下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

天樞一名長谿一名穀門去肓俞一寸半在俠臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝遶臍而痛時上衝心女子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴

氣上衝胃不能久立腸中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重休腨急瘧振寒熱盛狂言髀脹四肢重不能勝衣陰疝氣疝煩嘔面腫大腸脹

外陵 在長谿下五不太巨上足陽明氣所發灸五壯主腹中盡痛

大巨 一名掖門在長谿下二寸足陽明脉氣所發灸五壯主腹滿痛善煩頹疝偏枯四肢不用善驚

水道 在大巨下三寸足陽明脉氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中用水至則腰背中痛胞中瘕子門有寒引髕髀三焦約小便不通

歸來 一名谿穴在水道下二寸灸五壯主少腹痛賁豚卵上入痛引莖中女人陰中寒

氣衝 在歸來下一寸鼠鼷上一寸動應手足陽明脉氣所發灸三壯主腸中大熱不安腹有大氣女子月水不利或閉塞暴腹脹滿癃淫濼身熱腹中絞痛頹疝陰腫乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹滿不得反息腰痛控睪少腹及股卒俛不得仰脫下石水無子少腹痛陰疝莖中痛兩丸騫痛不可仰卧甄權千金楊操同

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

心出于少衝少衝者木也 一名經始在手小指内廉之端去爪甲如韭葉手少陰脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于少府少府者火也 在手小指本節後陷者中直勞宮手少陰脉之所留也爲榮春三月宜灸之

注于神門神門者土也 一名兊衝一名中都在掌後兊骨之端陷者中手少陰脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于通里 手少陰絡在腕後一寸

行于靈道靈道者金也在掌後一寸半或一寸手少陰脈之所行也爲經

入于少海少海者水也一名曲節在肘內廉節後手少陰脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少衝一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸一壯主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中熱肘腋胷中痛口中熱咽喉中酸乍寒作熱手捲不伸掌痛引肘腋

少府在手小指本節後陷者中直勞宮灸三壯主煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手捲不伸

神門一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯主瘧心煩甚欲得冷水寒則欲處熱熱中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸悸氣不足喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺手及臂寒

少陰郄在掌後脈中去腕半寸灸三壯主十二癇失瘖不能言悽悽寒欬吐血氣驚心痛

通皇手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱熱則卒心中懊憹數欠頻伸悲恐頭眩痛面赤而熱無汗及癲心下悸臂臑肘痛實則支滿虛則不能言苦嘔喉痺少氣遺溺

靈道在掌後一寸半或云一寸灸三壯主心痛悲恐相引瘈瘲臂肘攣暴瘖不能言

少海一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒熱齒齲痛狂易瘧背振寒引肘腋痛甄權云穴在臂側曲肘內橫文頭屈手向頭而取之陷者中主腋下瘰癧不宜灸

極泉在腋下筋間動脈入胷手少陰脈氣所發灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病嗌乾心痛渴而欲飲爲臂厥是主心所生病者目黃脅痛臑臂內後廉痛掌中熱痛甄權千金楊操同

黃帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也是五藏六腑之大主也精神之舍也其藏堅固邪不能害害之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡者絡者心主之脈也故獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端出第三卷中

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出于少澤少澤者金也一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脉之所出也爲井冬三月灸之

流于前谷前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于後谿後谿者木也在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也爲原

行于陽谷陽谷者火也在手外側腕中兊骨之下陷者中手太陽脉所行也爲經

入于小海小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也爲合秋三宜灸之出第三卷

中甄權千金楊操同

少澤一名少吉在手小指之端去爪甲下一分陷者中灸一壯主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉脅痛欬瘈瘲口乾項痛不可顧瘖瘧寒熱前谷在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癲疾耳鳴寒熱頷腫不可顧喉痺勞癉小便赤難欬衄肩滿肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫濼肩甲小指痛臂不可舉頭項痛咽腫不可咽鼻不利目中白瞖目痛泣出甚者如脫瘖瘧後谿在手小指外側本節後陷者中灸一壯主振寒寒熱肩臑肘臂痛頭[illegible]痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛爛眥生瞖鼽衄發聾臂重腫肘

攣痂疥背滿引臑泣出驚頸項强身寒耳鳴瘖瘧寒熱頸頷腫狂互引癲疾數發 腕骨 在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脅痛不

得息頸頷腫寒熱耳鳴無聞衄狂易痓互引消渴偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂臑頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰怵痎瘧 陽谷

在手外側腕中兌骨之下陷者中灸三壯一去在腕上側兩筋間陷者中主狂癲疾熱病汗不出脅痛不得息頸頷腫寒熱耳聾鳴牙上齒齲痛肩痛不能自

帶衣臂腕外側痛不舉風眩驚手腕痛泄風汗出至腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥肬瘈瘲頭眩目痛瘖瘧背滿不得息 養老

手太陽郄在踝骨上一空在後一寸陷者中灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下 支正 手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振寒

寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生肬小者痂疥風瘧 小海 在肘內大骨外去肘端半寸陷者中屈肘乃得之灸三壯甄權云屈手向頭而取之

不宜灸主寒熱齒齲痛風眩頭痛狂易癰肘瘧背脊振寒項痛引肘腋腰痛引少腹中四肢不舉 天窗 一名窗聾在曲頰下扶突後動應手陷者中手

太陽脈氣所發灸三壯主耳聾無聞頰痛腫喉痛瘖不能言肩痛引項汗出及偏耳鳴 秉風 在俠天髎外肩上小髃後手太陽陽明手足少陽之

會舉臂取之灸五壯主肩痛不能舉 天宗 在秉風後大骨下陷者中手太陽脈氣所發灸三壯主肩脅支滿搶心欬逆肩重肘臂痛不可舉 臑俞

俠肩髎後大骨下甲上廉陷者中手足太陽陽維蹻脈之會舉臂取之灸三壯主寒熱肩腫引甲中臂酸寒熱頸歷適肩痛不可舉臂 睛明 一名

淚孔在目內眥手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛目䀮䀮無所見眥癢痛淫膚白翳甄權云不宜灸甄權千金

楊操同

心包人心脉也兩傍一十六穴

心出于中衝中衝者水也在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于勞宮勞宮者火也一名五里在掌中央動脈手心主脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太陵太陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注也爲腧夏三月宜灸之

行于間使間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也爲經

入于曲澤曲澤者水也在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

中衝在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛

勞宮一名五里在掌中動脈灸三壯主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胷脅痛不可反側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲累嘔噦欷善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚小兒口中腥臭胷脅支滿黃癉目黃

太陵在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胷中熱狂言不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胷痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急嘔血瘀痺欲嘔耳鳴

內關手心主絡在掌後去腕二寸灸三壯主面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實則心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹善驚恐心悲

間使在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐驚狂面赤目黃熱病煩心喜噦胷中澹澹善動如熱頭身風熱嘔怵惕寒中少氣

掌中熱肘攣腋腫卒心中痛瘈瘲互相引肘由廉痛心熬熬然脊痺引背時寒喜驚瘖不能語因中哽頭大浸淫 郄門 手心主郄去腕五寸灸五壯主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足 曲澤 在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒欬逆心下澹然喜驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘瘈善搖頭清汗出不過肩傷寒病溫 天泉 一名天濕在曲腋下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不可以行心痛背中痛脅支滿痛膺背甲間兩臂內廉痛虛則背腹下與腰背相引而痛取經少陰水天泉主之甄權千金楊操同

腎人腎者藏也兩傍五十四穴 并二十三單穴共七十七穴

甲乙經

腎出涌泉涌泉者木也 一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也爲井冬三月宜灸之

流于然谷然谷者火也 一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所留也爲滎春三月宜灸之

注于太谿太谿者土也 在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也爲輸夏三月宜灸之

行于復溜復溜者金也 一名伏白一名昌陽在足踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也爲經

入于陰谷陰谷者水也 在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也爲合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金方楊操同

涌泉 一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利甄權云在脚心底宛宛中白肉際是主熱中少氣厥

寒灸之熱去頭痛煩心痛不嗜食欬而短氣喉痺良熱痛脊脅相引忽忽善忘足厥喘逆足下清至膝陰痺腹脹頭項痛眼眩男子如蠱女子如阻身體腰背如解不欲食丈夫頹疝陰跳痛篡中不得溺腹䐜脅下支滿閉癃陰痿後時少泄四肢不舉實則身頭痛汗不出目肮肮然無可見怒欲殺人暴痛引臏下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛引嗌足厥痛肩背頭痛時眩婦人無子咽中痛不可內食轉筋風入腹中俠臍急胷脅支滿衄不之五指端盡痛足不得踐地癲疾瘖不能言

然谷 一名龍淵在足內側踝前起大骨下陷者中灸三壯主不嗜食心如懸哀而善怒嗌內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如似刺厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也胷中寒脈代時不至上重下輕足不能安地少腹脹上搶心胷脅支滿欬唾有手喉痺癃疝石水女子不字陰暴出淋漏男子精溢脛酸不能久立寒熱消渴黃癉足一寒一熱亂縱煩滿小兒臍風口不開善驚瘈厥癲疾洞泄

太谿 在足內踝後骨上動脈陷者中灸三壯主瘧欬逆心悶不得卧嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱腎脹熱病汗不出默默嗜卧溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內腫涎下厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也霍亂出泄不自知消癉善噫氣走喉咽而不能言手足清尿黃大便難嗌中腫痛唾血口中熱如膠胞中有大疝瘕積與陰相引如痛苦冗泄上下出痓胷中滿痛乳腫潰癰欬逆上氣喉咽喝有聲厥氣上支

大鍾 在足跟後衝中足少陰絡灸三壯主實則閉癃悽悽腰脊痛宛轉目循然嗜卧口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胷中鳴脹滿口舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒驚恐不樂欬喉中鳴欬唾血大腸結

照海 陰蹻脉所生在足內踝下灸三壯主熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指間動脈皆先補之目痛引脊少腹偏痛嘔瘈瘲視昬嗜卧痓驚善悲不樂如墮墜汗不出面塵黑病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取右右取左立已陰暴起疝女子不下月水婦人淋瀝陰挺出四肢淫濼心悶暴瘧及諸淋目中赤痛偏枯

不能得行大風默默不知所痛視如見星尿黃少腹熱咽乾痺**水原**足少陰郄去太谿下一寸在內踝下灸五壯主月經不來來而多閉心下痛目

䀮䀮不可遠視**復溜**一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯主腰痛引脊內廉嗌乾腹瘈痛坐起目䀮䀮善怒多言瘧熱少氣足胻寒不

能自溫腹䐜切痛引心心如懸陰厥脚腨後廉急不可前却血淋腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收履溺青赤白黃黑青取井赤取滎黃取

輸白取經黑取合血痔泄後重腹痛如淋狀枉仆必有所扶持及大氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗出不休心風四肢腫氣在橫骨風逆四肢

腫乳難**交信**穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間足陰蹻之郄灸三壯主氣癃㿗疝陰急股樞腨內廉痛**築賓**在足內踝上腨分中

灸五壯主大疝絕子狂癲疾嘔吐**陰谷**在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶狂痺脊內廉痛溺難

陰痿不用少腹急引陰及脚內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蠱女子如阻寒熱腹偏腫**輸府**在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中

足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣喘不得息嘔吐胷滿不得飲食**彧中**在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸

五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安**神藏**在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷滿欬逆喘不得息嘔吐

煩滿不得飲食**靈墟**在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食**神封**

在靈墟下一寸六分陷者中灸五壯主胷脅支滿不得息欬逆乳癰洒淅惡寒**步郎**在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五

壯主胷脅支滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂**幽門**一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主胷脅背相引痛心下溷溷

嘔吐多唾飲食不下善噦支滿積不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善唾女子心疝氣善吐食不下**通谷**在幽門下一寸陷者中衝脈足

少陰之會灸五壯主失欠口喎僻不端食飲善嘔不得言一云舌下腫難以言舌縱喎戾不端 **陰都** 一名食宮在通谷下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主身寒熱痦瘂心滿氣逆 **石關** 在陰都下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主痓脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛 **商曲** 在石關下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛 **肓俞** 在商曲下一寸直臍旁五分衝脉足少陰之會灸五壯主心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛 **中注** 在肓俞下五分衝脉足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難 **四滿** 一名髓府在中注下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主臍下積疝瘕胞中有血腸澼泄切痛振寒大腹石水腎痛 **氣穴** 一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛 **大赫** 一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮 **橫骨** 一名下極在大赫下一寸衝脉足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛 **鳩尾** 一名尾翳一名髑骭在臆前蔽骨下五分任脉之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息息賁時唾血血瘀熱病胷中痛不得卧心痛不可按善噦心疝大息面赤心背相引而痛數噫喘息胷滿欬嘔腹痛皮瘙痒喉痺食不下甄權云宜針不宜灸 **巨闕** 在鳩尾下一寸任脉氣所發灸五壯主心痛不可按煩心熱病胷中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿瘈瘲病心疝滿不得息息賁時唾血心腹脹滿噫煩熱善嘔膈中不通利霍亂狂妄言怒恐惡火善罵詈狐疝驚悸少氣胷脅支滿瘈瘲引少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹 **上管** 在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸足陽明手太陽任脉之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化五腹䐜脹心腹胷脅支滿脉虛則生百病甄權云主心風驚悸不能食心下有膈嘔血目眩頭懸眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反側腹中滿暴痛汗出 **中管** 一名太倉在上管下一寸手太陽少陽足陽明所生任脉之會灸七壯主腹脹不通心大堅胃脹霍亂出泄不自知先取太谿後取太倉之原溢飲脅下堅痛腹脹不通寒中傷飽食飲不化頭熱

衂血目黃振寒噫煩滿隔嘔傷憂損思氣積痓甄權云主因讀書得賁豚氣積聚腹中脹暴滿心痛身寒難以俛仰衝疝冒死不知人心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘咬也鼻聞焦臭大便難小腸有熱尿赤黃病溫汗不出有血溢水

建里 在中管下一寸灸五壯主心痛上搶心不欲食支痛斥膈甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管 在建里下一寸足太陰任脉之會灸五壯主飲食不化入復還出六腑之氣穀不轉甄權云主小便赤腹堅硬也

水分 在下管下一寸臍上一寸任脉氣所發灸三壯主痓脊強裏急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫

臍中 灸三壯主水腹大臍平腹無理不治絕子灸令人有子臍疝繞臍痛衝胷不得息甄權云主水腫鼓脹腸鳴狀如雷聲時上衝心日灸七壯至四百壯罷

陰交 一名少因一名橫戶在臍下一寸任脉陰衝之會灸五壯主水脹水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底宛宛中主驚不得眠善斷水氣上下五藏遊氣也陰疝引睾女子手脚拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰痒賁豚上䐜腹堅痛引陰中不得小便兩丸騫

氣海 一名脖胦一名下肓在臍下一寸半任脉氣所發灸五壯主少腹疝臥善驚甄權云主下熱小便赤氣痛狀如刀攪

石門 一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸任脉氣所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三焦脹水腹大及水氣行皮中心腹中卒痛而汗出氣癃小便黃氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳餘疾絕子陰痒賁豚上䐜腹痛口強不能言莖腫先引腰後引少腹腰寬少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫甄權云主婦人因產惡露不止

關元 一名次門在臍下三寸任脉足三陰之會灸七壯主寒熱石水痛引脅下脹頭眩痛身盡熱氣癃尿黃甄權云主小便處狀如散灰色轉胞不得尿少腹滿引脅下脹頭眩痛身盡熱賁豚寒熱入少腹時欲區傷中溺血小便數腰背臍痛下引陰䐜中窘急欲湊後泄不止癲暴疝痛少腹大熱身所傷血出多及中風寒若有所墜墮四肢解㑊不收名曰體解女子絕子衃血在內不下

中極 一名氣原一名玉泉在臍下四寸任脉足三陰之會灸三壯主女子禁中

央腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰痒及痛經閉不通乳餘疾絕子內不足賁肫上搶心甚則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引臍而痛少腹與脊相控暴痛時窘之後經閉不通小便不利丈夫失精

曲骨 在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脉足厥陰之會灸三壯主膀胱小便難脚屈轉胞不得尿婦人赤白淫陰中乾痛惡合陰陽水脹滿尿溢癩疾不嘔沫

會陰 一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脉別絡俠督脉者衝脉之會灸三壯主痺小便難竅中熱實則腹皮痛虛則痒搔痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰端寒上衝心中很很

廉泉 一名本池在頷下結喉上舌本陰維任脉之會灸三壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫噤齘上氣窮屈胷滿

天突 一名五户在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脉之會灸三壯主欬上氣喘暴瘖不能言及舌下俠青縫脉頸有大氣喉痺咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱頸腫肩痛胷滿腹皮熱衄氣癭心痛隱軫頭痛面皮赤熱身肉盡不仁

琁璣 在天突下一寸中央陷者中任脉氣所發仰頭取之灸五壯主胷滿痛喉痺咽廱水漿不下

華蓋 在琁璣下一寸陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿痛引胷中欬逆上氣喘不能言

紫宮 在華蓋下六分陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胷脅支滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂 一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脉氣所發灸五壯主胷中滿不得息胷痛骨疼喘逆上氣嘔吐煩心

亶中 一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中任脉氣所發仰而取之灸五壯主胷痺心痛煩滿欬逆喘唾短氣不得息不能言

中庭 在亶中下一寸六分陷者中任脉氣所發灸三壯主胷脅支滿膈寒飲食不下嘔吐食復還出甄權千金楊操同

膀胱人膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴并二十二單穴及膏肓附穴共一百四十四穴

膀胱出于至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于束骨束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中足太陽脉之所過也爲原

行于崑崙崑崙者火也在足外踝後跟骨上陷者中足太陽脉之所行也爲經

入于委中委中者土也在膕中央動脉足太陽脉之所入也爲合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼻鼽及瘈汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目瞖鼻及小便皆不利瘧寒熱疝風寒從足小指起脉痺上下帶胷脇痛無常處失精

通谷在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛喜驚互引鼻鼽瘨疾寒熱目眈眈喜欬喘逆狂疾不嘔沫痓善蹄頭眩項痛煩滿振寒瘖瘧

束骨在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行瘨疾寒熱腰痛如折痓驚互引脚如結踹如裂暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可顧髀樞痛泄腸澼瘧從䯒起

京骨在足外側大骨下赤白際陷者中灸三壯主瘖瘧寒熱善蹄頭重足寒不欲食脚攣瘨疾狂妄行振寒善目瞖瞋偏枯腰髀樞痛善摇頭鼽衄血不止瘨瘲頭痛目白瞖跟尻瘈瘲頭腫痛泄注上搶心目赤眥爛無所見痛從內眥始腹滿頸項强腰背不可俛仰眩瘈厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絶骨寫之厥心痛與肩背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛

也痓目反白多鼻不通利涕黃便去血

申脈　陽蹻所生也在足外踝下陷者容爪甲灸三壯主腰痛不能舉足小坐若下車躓地脛中矯矯然寒熱頸腋下腫癲疾互引僵仆

金門　足太陽郄一名關梁在足外踝下灸三壯主尸厥暴死霍亂轉筋癲疾不嘔沫馬癇

僕參　一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽陽蹻脈所會灸三壯主腰痛不可舉足跟中踝後痛脚痿癲疾僵仆轉筋尸厥暴霍亂馬癇

崑崙　在足外踝後跟骨上陷者中灸三壯主痓脊強頭眩痛脚如結踹如裂厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也寒熱癲疾目䀮䀮鼽衄瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔脊強大風頭多汗腰尻腹痛踹跟腫上齒痛脊背尻重不欲起聞食臭惡聞人音狂易女子字難若胞衣不出泄風從頭至足癇瘈口閉不得關每大便腹暴滿按之不下噫悲喘

付陽　足陽蹻之郄在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間灸三壯主痿厥風頭重䪼痛樞股踹外廉骨痛瘈瘲痺不仁振寒時有熱四肢不舉

飛揚　一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡灸三壯主身懈寒少氣熱甚惡人心惕然取飛揚及絕骨跗上臨泣已滛濼脛痠熱病汗不出皆主之下部寒體重逆氣頭眩痛痓反折瘧實則腰背痛虛則鼽衄不渴間日作狂癲疾體痛頸項痛歷節汗出而步失履寒腹不仁踹中痛痔篡痛

承山　一名魚腹一名肉柱在兌踹腸下分肉間陷者中灸五壯寒熱篡反出癲疾瘈瘲鼽衄腰背痛脚踹酸重戰慄不能久立踹如裂脚急跟痛足攣少腹痛引喉咽大便難腹痛

承筋　一名踹腸一名直腸在踹中央陷者中足太陽脈氣所發灸三壯主大腸實則腰背痛寒痺轉筋頭眩痛虛則鼻衄癲疾腰痛濈然汗出令人欲食欲走寒熱篡後出瘈瘲脚踹酸重戰慄不能久立脚急腫痛附筋足攣少腹痛引喉嗌大便難痔篡痛腰背相引霍亂脛痺不仁

合陽　在膝約中央下二寸灸五壯主痺厥癲疾不嘔沫瘈瘲拘急跟厥膝重腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝酸重

委中　在膕中央動脈灸三壯主腰痛俠脊至頭沈沈然目䀮䀮瘧頭痛寒從背起先寒後熱渴不止汗乃出癲疾反折熱痛俠脊痛痔篡痛遺溺筋急身熱少腹堅

腫少腹時熱小便難尻股寒髀樞痛外引季脅內控八髎衄血不止**委陽**在足太陽之前少陽之後出于膕中外廉兩筋間承扶下六寸壯足太陽之絡灸三壯一云屈身取之主胷滿彭彭然實則閉癃腋下腫痛虛則遺溺脚急兢兢然筋痛不得小便痛引腹腰痛不得俛仰

浮郄在委陽上一寸展膝得之灸三壯主不得卧止**郡門**在肉郄下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則化痛得之舉重惡血之

扶承一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰上衝文中一云股陰下衝文中灸三壯主腰脊尻臀股陰寒大痛虛則血動實并熱痛痔篡痛尻脽中腫大便直出陰胞有寒小便不利

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄户在第三椎下兩傍各三寸足太陽脈氣所發正坐取之灸五壯主肩膊間急悽厥惡寒項背痛引頸欬逆上氣嘔吐煩滿背痛不能引顧

神堂在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發灸五壯主肩痛胷腹滿悽厥脊背急強

譩譆在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸以手按之痛病者言譩譆足太陽脈氣所發灸五壯主腋拘攣暴脈急引脅而痛內引心肺從項至脊以下至十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱痓互引身熱欬逆上氣虛喘喘逆衄肩甲內廉痛不可俛仰眇季脅引少腹而脹痛小兒食晦頭痛引顖瘖瘧風

膈關在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發闊肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎

魂門在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主胷脅脹滿背痛惡風寒飲食不下嘔吐不留住

陽綱在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

意舍在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主腹滿臚脹大便泄消渴身熱面目黃

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臚脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

肓門在第十三椎下兩傍各三寸又脅間灸三

十壯主心下大堅婦人乳餘疾志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脅下滿少腹堅急胞
肓在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅癃閉下重不得小便以手按之則欲小便澁而不得
出肩上熱手足小指外側及膕踝後皆熱若脈陷取委中央秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脈氣所發伏而取之灸三壯主腰痛
骶寒俛仰急難陰痛下重不得小便攢竹一名員柱一名始光一名夜光一名明光在肩頭陷者中足太陽脈氣所發灸三壯主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛
善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頞中痛項椎不可左右顧目系急瘈瘲癲疾互引反折戴眼及眩狂不得卧意中煩目䀮䀮不明惡風寒癇發目上插痔痛
曲差一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足太陽脈氣所發正頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒喘息不利煩滿汗不出五處在督脈傍去上
星一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重寒熱承光在五處後二寸足太陽脈氣所發不可灸主熱病汗不出而苦嘔煩心青
盲遠視不明通天一名天白承光後一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主頭痛重暫僵仆鼻窒鼽衄不得通喎僻多涕鼽衄有瘡絡却
一名強陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主青盲無所見癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘈瘲玉枕在絡却後七分半俠
腦戶傍一寸三分起肉枕骨上入髮際三寸足太陽脈氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不出悽厥惡寒嘔吐目內系急痛引頞頭重項痛寒熱骨痛頭眩目
痛頭半寒目痛不能視項似拔不可左右顧癲疾不嘔沫互引天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脈氣所發灸三壯主寒熱暴痾攣癇
眩足不任目䀮䀮赤痛痓厥頭痛項先痛腰脊爲應眩頭痛重目如脫項如拔狂見目上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言小兒驚癇大杼
在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽手寸陽之會灸七壯主癲疾不嘔沫瘖瘂頭項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實則脅滿夾脊有并氣熱汗

不出腰背痛痓脊強喉痺大氣滿喘背中鬱鬱身熱眩目眩眩項強急寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

風門

一名熱府在第一椎下兩傍各一寸半督脈足太陽之會灸五壯主風頭眩痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

肺俞

在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣相追逐胷滿背膺急息難振慄脈鼓氣膈胷中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹癲疾憎風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺目妄見瘈瘲泣出死不知人

心俞

在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主寒熱心痛循循然與背相引而痛胷中邑邑不得息欬唾血多涎煩中善噎飲食不下嘔逆汗不出如瘧狀目眩眩淚出悲傷瘖瘧心脹

膈俞

在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主悽悽振寒數欠伸欬而嘔膈寒食飲不下寒熱皮肉骨痛少氣不得臥胷滿支兩脅膈上兢兢脅痛腹䐜胃管暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚嘿嘿然嗜臥怠墮不欲動身常濕心痛無可搖者周痺身皆痛無可大汗出痓大風汗出癲狂

肝俞

在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脅滿急不得息不可反側撅脅下與臍相引筋急而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂衄少腹滿目眩眩生白翳欬引胷痛筋寒熱唾血短氣鼻酸痓筋痛急互相引肝脹癲狂

膽俞

在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發正坐取之灸三壯主胷滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下

脾俞

在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季脅黃癉善欠脅下滿欲嘔身重不動脾痛熱痓大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食痺脹

胃俞

在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胃中寒脹食多身羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胷脅支滿嘔吐脊急痛筋攣食不下

三焦俞

在第十三椎下兩傍各一寸半足太陽脈氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴臚脹欲嘔時注

腎俞

在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱痓寒熱食多身羸瘦兩脅引痛心下䐜痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目眩眩喘欬少氣溺滑赤骨寒熱瘦

難腎脹風頭痛如破足寒如水頭重身熱振慄腰中四肢淫濼欲嘔腹鼓大寒中洞泄食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞 在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴腹䐜面腫暴洩腰痛是主津液所生病者目黃口乾衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則熱腫虛則寒慄

小腸俞 在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控睪引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺難黃赤口乾大小便難淋痔

膀胱俞 在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主熱痓互引汗不出反折尻臀內痛似癉瘧狀腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息委重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起

中膂肉俞 在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊胂起肉灸三壯主腰痛不可以俛仰寒熱痓反折互引腹脹腋攣背中怏怏引脅痛內引心從項始數脊椎俠膂如痛按之應手灸立已

白環俞 在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發不可灸主腰脊以下至足不仁小便赤黃

上窌 在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善傴睪跳騫寒熱熱病汗不出瘖瘂女子絕子陰挺出不禁白瀝

次窌 在第二空俠脊陷者中灸三壯主腰痛怏怏不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取尾骶與八窌女子赤白瀝心下積脹同上法

中窌 在第三空俠脊陷者中灸三壯主厥陰所結腰痛大便難飧洩尻中寒女子赤淫時白氣癃月事少男子癃小腸脹

下窌 在第四空俠脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹痛女子下蒼汁不禁赤淫陰中痒痛引少腹控䏚不可以俛仰腹腸鳴澼泄

會陽 一名利機在陰尾骨兩傍督脈氣所發灸五壯主五藏腹中有寒泄注腸澼便血

素窌 一名面王在鼻柱端督脈氣所發主鼽衄洟出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

神庭 在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會灸三壯主頭腦中寒鼻鼽目泣出癲疾嘔沫風眩善嘔煩瘖瘂寒熱頭痛喘喝目不能視

上星 在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脈氣所發灸五壯主風眩善嘔煩滿顱青瘖瘂鼻鼽衄熱病汗不出目中

痛不能視面胕腫癲疾凡云上星主之者皆先取譩譆後取天牖風池顴權去不宜多灸

顖會在上星後一寸陷者中督脈氣所發灸五壯主痓風眩善嘔煩滿滿頭痛顏青癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫

前頂在顖會後一寸五分骨陷中督脈氣所發灸五壯主風眩目瞑惡風寒面赤腫小兒驚癇

百會一名三陽五會在前頂後一寸半頂中央旋毛中陷容指督脈足太陽之會灸五壯主痎瘧癲疾不嘔沫耳鳴痓頂上痛風頭重目如脫不可左右顧

後頂一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脈氣所發灸五壯主風眩目眩[illegible]上痛目䀮䀮不明惡風寒眩偏頭痛癲疾瘛瘲狂走項直頸痛

強間一名大羽在後頂後一寸半督脈氣所發灸五壯主頭痛如針刺不可以動項如拔不可左右顧癲疾狂走瘛瘲搖頭口喎戾頸強

腦戶一名匝風一名會[illegible]在枕骨上強間後一寸半督脈足太陽之會不可灸主目赤痛不能視面赤腫頭重項痛目不明風則腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風癲疾骨痠眩狂瘛瘲口噤羊鳴舌本出血瘖不能言痓目不眴寒熱

風府一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會不可灸之主頭痛項急不得顧側目眩鼻不得喘息舌急難言狂易多言不休狂走欲自殺目反妄見暴瘖不得言喉嗌痛足不仁

瘖門一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中入繫舌本督脈陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不能言脈傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱衄善噫風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重

大椎在第一椎上陷者中三陽督脈之會灸九壯主寒熱以年爲壯數傷寒熱盛煩嘔

陶道在項大椎節下間督脈足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目瞑悽厥寒熱項強雖以反顧汗不出

身柱在第三椎節下間督脈氣所發俛而取之灸五壯主癲疾怒欲殺人身熱狂走讝言見鬼瘛瘲

神道在第五椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主身熱頭痛進退往來痎瘧恍惚悲愁

至陽在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主寒熱解爛淫濼脛酸四肢重痛少氣難言

縮筋在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三

壯主小兒驚癇瘈瘲狂走癲疾脊急強目轉上插**脊中**在第十一椎節下間督脈氣所發不可灸之主腹滿不能食腰脊強不得俛仰黃癉**懸樞**在第十三椎節下間督脈氣所發灸三壯主腹中積上下行**命門**一名屬累在第十四椎節下間督脈氣所發伏而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出癲瘈裏腰腹相引痛**腰俞**一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶在第二十一椎節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以日死生數發針在左取右右取左立已腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉寒熱女子閉溺脊強互引反折汗不出乳子下赤白**長強**一名氣之陰郄督脈絡別在脊骶端少陰所結灸三壯主腰痛上實則脊急強癲疾發如狂者面皮敦敦厚者不療虛則頭重洞泄癃痔大小便難腰尻重難起居寒熱痓反折心痛形氣短尻膭濇小便黃閉小兒癇瘈瘲脊強互相引**膏肓俞**主無所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩膂去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百壯多至千壯當覺下礱礱然流水狀亦當有所下出若停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久坐伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩甲骨使相離不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小有常定不爾則前却失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令得平復其穴近第五椎相準望取之**論曰**昔者和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不能及即此之穴是也人不能求得此穴所以宿病難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出第三十卷中

三焦人三焦者腑也兩傍五十六穴

三焦出于關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲如韭葉手少陽脉之所出也爲井冬三月宜灸之

流于腋門腋門者水也在手小指次指之間陷者中手少陽脉之所留也爲滎春三月宜灸之

注于中渚中渚者木也在手小指次指本節後間陷者中手少陽脉之所注也爲輸夏三月宜灸之

過于陽池陽池一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脉之所過也爲原

行于支溝支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者中手少陽脉之所行也爲經

入于天井天井者土也在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脉之所入也爲合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

關衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痺舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭眩頷痛面黑渴風肩頭痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴甄權云不宜灸 腋門在手小指次指間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘧頭痛目澁暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齲則上齒痛膽善驚妄言面赤泣出 中渚在手小指次指本節後間陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引頭痛耳鳴目痛寒熱嗌外腫肘臂痛手上類類也五指瘈不可屈伸頭眩頷額顱痛耳聾兩顳顬痛身面痒瘧項痛目䀮䀮無所見喉痺 陽池一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱瘖瘧肩痛不能自舉汗不出頸腫 外關手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內

廉痛不可及頭耳淳淳渾渾聾無所聞口僻噤**支溝**在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出互引頸嗌外腫肩臂酸痛脅腋急痛四肢不舉痂疥項不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣汗出口噤不可開暴瘖不能言男子脊急目赤欬面赤熱**會宗**手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主皮毛中肌肉耳聾羊癇**三陽絡**在臂上大交脈溝上一寸灸三壯主嗜臥身體不能動搖大濕內傷不足**四瀆**在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛**天井**在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁大風默默然不知所痛嗜臥善驚瘈瘲胷痺心痛肩肉麻小瘧食時發心痛悲傷不樂癲疾吐舌沫出羊鳴戾頸**清冷淵**在肘上三寸伸肘舉臂取之灸三壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣**消濼**在肩下臂外開腋斜肘分下行灸三壯主寒熱痺頭痛項背急**和窌**在耳前兌髮下動脈手足少陽之會灸三壯主頭重頷痛引耳中膿膿嘈嘈**聽會**在耳門前陷者中張口得之動脈應手手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱喘喝目視不能視目泣出頭痛耳中顛颼顛颼者若風齒齲痛**聽宮**在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如無聞膿膿嘈嘈若蟬鳴鶗鳩鳴驚狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出**角孫**在耳郭中間上開口有空是也灸二壯主齒牙不可嚼齲腫**瘈脈**一名資脈在耳本雞足青絡主小兒癇瘈吐泄驚恐失精視瞻不明眵瞶**翳風**在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會灸三壯主聾僻不正失欠口不開痓不能言**天牖**在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脈氣所發灸三壯主肩背痛寒熱癧適頸有大氣暴聾氣蒙瞀耳目不用頭頷痛淚出洞鼻不知香臭風眩喉痺三焦病者腹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候滑瘧**天容**在耳下曲頰後手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱疝積胷痛不得息窮屈胷中痛陽氣大逆上滿於胷中憤䐜肩息大氣逆上喘喝坐伏病咽壹不得息欬逆上氣唾沫肩痛

不可舉頭項癰腫不能言耳聾嘈嘈無所聞喉痺瘈**顴窌**一名兑骨在面頄骨下廉陷者中手少陽太陽之會主口僻齒痛面赤目赤目黃口不能爵頰腫脣癰**肩井**在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索**天窌**在肩缺盆中上毖骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主肩脥中痛引項寒熱缺盆痛汗不出胷中熱滿**肩貞**在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒熱項歷適耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉**肩外俞**在肩甲上廉去脊三寸陷者中灸三壯主肩甲中痛熱而寒至肘**肩中俞**在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血**曲垣**在肩中央曲甲陷者中按之痛應手灸十壯至肩痛周痺**缺盆**一名天蓋肩上橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適胷中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺欬嗽血甄權千金楊操同

外臺秘要方卷第三十九

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟　校勘

外臺祕要方

四十

蟲獸傷觸

附

六畜疾

外臺秘要方卷第四十 蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林 億 等上進

熊虎傷人瘡方七首

葛根汁

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方

燒青布以熏瘡口毒即出仍煮葛根沐令濃以洗瘡日十度并擣葛根爲散煑葛汁以服方寸匕日五甚者夜二文仲備急姚方小品删繁古今録驗並同千金方治虎咬口

又方　嚼栗塗之姚方文仲備急古今錄驗千金同

又方　煑生鐵令有味以洗瘡姚方文仲備急古今錄驗千金同

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣令人將入山草中自宜先作禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山下先閉氣三十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺氣上自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝荅之云何畢便行一山虎走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大喚咄曰虎北斗君使汝去虎即走止宿亦先四向如此

又方　雄黃　硫黃　紫石

右三物擣末以絳囊盛之帶以防用本方無硫黃

集驗療熊虎傷人瘡方

取葫蘿大一把剉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘□

以薄瘡上

備急入山辟虎法

燒牛角羊角虎不敢近人文仲肘後千金姚同出第八

卷中

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝰蒼虺白頸大蜴六月中竹狩文蝮黑甲赤目黃口反鉤白蝰三角此皆蛇毒之猛烈者中人不即療多死第一有禁第二則藥令凡俗知禁者少縱尋按師術已致困斃唯宜勤事諸藥但或輕行草路何由皆齎方書則應諸其所至之藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之甚可不防慎之乎文仲備急同

出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法路安滿所傳

有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處即面巳地依左右駃掐頭指内第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰

囓蛇頭掐蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠然後緩放所掐處即差

路安滿禁蛇法

五月五日從門東刺向南三步九跡四方取氣訖重向南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用

其遮吒呵迦吒僧禁吒嘿劒吒蛇毒死嘿劒嚴蛇毒爛

若欲誦呪時須在月建上立喚被螫人當前立定然

後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立掐指二所
如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊久放掐目
也若不解呪蛇致死乃放掐目誦云吾庭前有木百
尺無枝鳳皇在上資斯速出放汝去攝汝毒命寧收
急急如律令出第五卷中

古今録驗禁蛇齧方高元海大李參軍送

呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時
於某處爲某色蛇螫某處陰呪云你是巳功曹我是
亥明府你若不攝毒吾當掐你口閉氣隨想掐蛇口
蛇口在食指第二節白肉際文以手大指甲掐之各
自以其手屈食指掐之閉氣急掐若螫右手右手掐
左手左手掐螫當中兩手盡掐急忘任放手腫處手
剌去血即便差出第四十五卷中

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃爲上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便摩以療之帶五蛄黃丸良以丸有蜈蚣故也人入山伐舩有大赤足蜈蚣置管中繫腰又有蚕龜噉蛇帶其尾亦好鴆日喙彌佳禁法中亦有單行輕易者今疏其數條然皆須受而後行不爾到山車口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈剌之因左迴兩步思作蜈蚣數千以衣身便行無所畏也張文仲備急同

集驗入山草辟衆蛇方

乾薑　生麝香　雄黃

右三味等分擣以小絳囊盛男左女右則蛇逆者辟人爲蛇所中便以療之如無麝香以射岗和帶之療諸毒良肘後千金文仲備急古今録驗同出第九卷中

千金療入山辟衆蛇方

當燒羚羊角令煙出蛇則去矣肘後同出第二十六卷中

蛇齧人方一十四首

廣濟療毒蛇齧方

取慈孤草擣以薄之即差其草以鷰尾者是大效出

第五卷中　　千金

肘後蛇齧毒腫方

乾薑末傅之燥復易之備急文仲千金同

又方

灸齧處三五壯則毒不能行

又方

擣射菵塗腫上血出乃差備急文仲千金同

又方

猪屎熬令焦末藍一把水三升煑取二升投屎攪和

以洗之差

文仲療蛇齧方

又方

擣雄黃末以傅之日三四度差

又方

取梳裏垢如指大長一寸以尿和傅之

又方

炙梳使汗出以熨瘡口即驗備急千金同

又方

取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差千金同

必効療蛇咬方

五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覔莧葵先知處記之至五月五日日中時先以手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口嚼取莧葵嚼使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日潔齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方

燒桑刀塗麝香少許和刀上以烙嚙處令皮破即差

又方

生蠶蛾陰乾爲末傅嚙處孔中數易之其蛾有生子者妙

又方

麝香　雄黃　半夏　巴豆

右四味等分爲末傅之

又方

先以唾塗咬處熟挼生大豆葉封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方

取大小蒜各一升合擣以熱湯淋取汁灌瘡中姚同

崔氏療被蛇螫驗方

生椒三兩 好豉四兩

右二味以人唾和擣令熟用薄傷處須臾即差

又方

取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差爲度

又方

取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹煻火炮令熱用冷即易之

又方

取醋草熟擣以傅螫處仍將膩幞頭裹之數易其醋

草似初生短嫩首蓿苗是

又方

取遠志嚼令碎以傅之并内一片子於所螫瘡處孔中數易之並出第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黃　麝香　乾薑

右三味各等分擣研以蜜和爲膏傅毒螫處良瓦舍中疑有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

又方

取獨狼牙擣臘月猪脂和以傅毒上立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止肘後同

青蝰蛇螫方五首

小品療竹中青蝰蛇螫人方

雄黃　乾薑

右二味各等分擣篩以射茵和之著小竹管中帶之行有急便用傅瘡兼療諸蛇毒千金同（肘後有麝香為五味）三味

肘後青蝰蛇論此蛇正綠色喜緣木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚齧人齧人必死那可屢肆其毒此蛇無止極大大者不過四五尺世人皆呼為青條蛇其尾二三寸色異者名熇尾最烈療之方

破烏雞熱傅之

蝮蛇螫方一十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心　栝樓

右二味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇即傅之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用文仲同

又方

草似初生短嫩首蓿苗是

取遠志嚼令碎以傅之并内一片子於所螫瘡處孔

中數易之並出第五卷中

蛇毒方三首

救急療蛇毒方

雄黄　麝香　乾薑

右三味各等分擣研以蜜和爲膏傅毒螫處良瓦舍中疑

有蛇處取雄黄燒令氣散及蛇並走不住

又方

取獨狼牙擣臘月猪脂和以傅毒上立差

又方

取荆葉以袋盛薄瘡腫處即差止肘後同

青螳蛇螫方五首

小品療竹中青螳蛇螫人方

雄黃　乾薑

右二味各等分擣篩以射罔和之著小竹管中帶之行有急便用傳瘡兼療諸蛇毒千金同肘後香爲

肘後青蝰蛇論此蛇正綠色喜緣木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚齧人齧人必死郝可屢肆其毒此蛇無止極大大者不過四五尺世人皆呼爲青條蛇其尾二三寸色異者名熇尾最烈療之方

破烏雞熱傅之

蝮蛇螫方一十首

肘後療蝮蛇螫人方

桂心　栝樓

右二味等分爲末用小竹筒密塞之以帶行卒爲蝮蛇即傳之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用文仲同

又方　急掘地作坎以埋所螫處堅築其上毒則出土中須臾
痛緩乃出徐徐以藥療之　須臾
又方　擣小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上
又方　取猪耳中垢著傷瘡中當黄汁出差牛耳中垢亦可用之良
又方　嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

備急瘡蝮蛇螫人方

又方　燒蜈蚣末傅瘡上良肘後同
又方　蠟及蜜等分於鐺中消令和以無節竹筒著瘡上以
蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之亦得
又方　急屎瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀掘地作小坑以
熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥塗瘡
上肘後同

文仲療蝮蛇螫人方

細辛　雄黃

右二味等分以內瘡中日三四傅之兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東間諸山甚多其毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來齧人東人呼爲千歲蝮或中之必死然其齧人畢即跳上林木作聲云斫木斫木者但營棺其判不救若云博叔博叔者猶可急療之吴音呼藥爲叔故也

虺蛇螫方四首

古今録驗療虺蛇毒方

擣葵根以傅之

肘後療虺蛇衆蛇螫人方

以頭垢傅瘡中張文仲備急同

又方　兩朳於水中相摩良久飲其汁痛即止備急張文仲同

又方　擣葎草以傅之立愈神良

衆蛇螫七首

集驗療衆蛇螫人方

取紫莧菜擣飲汁一升滓以少水和塗瘡上又擣冬瓜根以傅之肘後千金同

又方　取常思菜擣取汁飲一升以滓傅瘡上又以鬼目菜薄之止痛並出第九卷中肘後云擣鬼針草傅上

文仲療衆蛇螫方

嚼乾薑薄瘡上不過三四差又煑吴茱萸湯以漬瘡上立差集驗同

又方　擣生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又挼藍青薄之

又方　擣大蒜塗之以少鹽豉合擣尤佳備急集驗古今録驗同

又方　以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口嗍所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口嗍當小腫無苦狀備急同

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤蟌音連黃頷之類復當六七種不盡知其名水中黑色名公蠣山中一種亦相似並不聞螫人有鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有㕧蛇人忽傷之不死終身伺覔其主雖百人衆中亦直來取之唯遠去百里乃免耳又有桅蛇長七八尺如桅毒中人必死即削取船桅煑漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變爲龍也凡青蝰中人立死蝮中人一日死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜審按之並出第八卷中

蜘蛛咬方六首

以兩刃於水中相摩良久飲其汁痛即止備急張文仲同

又方　擣葎草以傅之立愈神良

衆蛇螫七首

集驗療衆蛇螫人方

取紫莧菜擣飲汁一升滓以少水和塗瘡上又擣冬瓜根以傅之肘後千金同

又方　取常思菜擣取汁飲一升以滓傅瘡上又以鬼目菜薄之止痛並出第九卷中附後云擣鬼針草傅上

文仲療衆蛇螫方

嚼乾薑薄瘡上不過三四差又煑吳茱萸湯以漬瘡上立差集驗同

又方　擣生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又挼藍青薄之

又方　擣大蒜塗之以少鹽豉合擣尤佳備急集驗古今録驗同

又方　以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口㗭所

螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口㗭當小腫無

苦狀備急同

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤蟦音連黄頷之類復當六七種

不盡知其名水中黒色名公蠣山中一種亦相似並不閒螫人有

鈎蛇尾如鈎能倒牽人獸入水後而食之又南方有呴蛇人忽傷

之不死終身伺覔其主雖百人衆中亦直來取之唯逺去百

里乃免耳又有栬蛇長七八尺如栬毒中人必死即削取船栬

煑漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王

字者有靈或有角形者此是欲變爲龍也凡青蝰中人立死蝮

中人一日死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一

法宜審按之並出第八卷中

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方

取生鐵衣以醋研取汁塗之差附後同

又蜘蛛咬作瘡頻療不差方

取蘿摩草擣如泥封之日二三傅毒化作膿膿出頻著易傅

又方

棗葉　栢葉各五月五日採陰乾　生鐵衣　晚蠶沙

右四味各等分擣散以生麻油和如泥先灸咬處塗之差並出第五卷中

千金療蜘蛛咬人方

以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止肘後同出第二十六卷中

備急療蜘蛛咬人方

取羊桃葉擣傅之立愈肘後同

以蒜切作兩斷以揩之又以蒜摩地取泥塗之文仲同

並出第八卷中

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方

取人溺新者洗之差備急文仲必効刪繁同

又方 斫穀木取白汁塗之桑汁亦良備急文仲小品古今録驗同

又方 煑蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之千金同（本方云燒羊角灰苦酒和塗之）

又方 刮齒垢塗之備急文仲千金同

千金治蜂螫方

蜜五合 蠟二兩 猪脂五合

右三味和煎如膏候冷以塗之甚良（一云稍稍食之）

又方 以淳醋沃地取泥塗之

又方 以尿泥塗之

又方 取蛇皮以蜜塗之炙令熱以貼螫處効又以醬汁塗

蛇皮炙以封之甚効並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

擣青蒿封之亦可嚼用之肘後同

又方

近用薄荷挼貼之大効蜀中用驗並出第六卷中

肘後療蜈蚣螫人方

蜈蚣螫方八首

割雞冠取血塗之差備急文仲删繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去備急小品文仲古今録驗同

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土揩之良小品備急文仲必効古今録驗同

又方

挼蛇銜草封之佳

備急療蜈蚣螫人方

按藍汁以漬之即差蜈蚣不甚齧人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇脫爲所中幸可依此療之藥家皆用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和傅之下品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趂雄雞令走以雞觜氣呵之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

取錫炙令熱以熨之不越十度即差出第十卷中

蠍螫二十七首

廣濟療蠍螫毒方

擣蒜塗之崔氏備急同

蛇皮炙以封之甚効並出第二十六卷中

必効療蜂螫方

擣青蒿封之亦可嚼用之肘後同

又方

近用薄荷挼貼之大効蜀中用驗並出第六卷中

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方

割雞冠取血塗之差備急文仲刪繁必効同

又方

嚼鹽塗之効又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去備急小品文仲古今録驗同

又方

嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底揩之良小品備急文仲必効古今録驗同

又方

挼蛇銜草封之佳

備急療蜈蚣螫人方

挼藍汁以漬之即差蜈蚣不甚齧人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇脫爲所中幸可依此療之藥家皆用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也張文仲肘後同

又方

取屋中土以水和傅之小品同

崔氏療蜈蚣螫人方

趂雄雞令[illegible]雞背氣呵之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方

取錫炙令熱[illegible]熨之不越十度即差出第十卷中

蠍螫二十七首

廣濟療蠍螫毒方

擣蒜塗之崔氏備急同

又方　半夏以水研塗之亦止

又方　呪曰一名蒿枝一名薄之傍他籬落螯他婦兒毒氣急去不出他道你愚癡急急如律令並出第五卷中

集驗療蠍蟲螫人方

余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無効有人見令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖便痛頭以冷水漬小暖即易之餘處冷水浸故布以搨之此實大驗肘後備急千金必効文仲同

又方

蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若旦者用井底泥傅之溫則易雌者用當屋瓦溝下泥之若不值天雨泥可用新汲水從屋上淋下於下泥傅之

又方　畫地作十字取上土水服五分匕並出第一卷中

千金療蠍毒方

取齒中殘飯傅之又以猪脂封之又以射罔封之

又方　硇砂和水塗上愈救急同

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方　嚼茱萸以封之立愈

又方　生烏頭末以唾和塗之良

崔氏療蠍螫人方

取人參嚼以傅痛處立差又以黃丹塗之差

又方　深削桂心醋磨塗之立定

又方　滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之並出第五卷中

備急療蠍螫人方

蜀葵花　石榴花　艾心

右三味等分並以五月五日午時取陰乾合擣和水塗螫處

立定花取未開者上張文仲同

又方

温湯浸之肘後崔氏同

又方

挼馬莧菜封之差肘後備急文仲同

又方

嚼乾薑塗之差肘後備急文仲同並出第八卷中

必効療蠍咬人方

温酒以漬之又擣豉作餅如錢大貼螫處以艾灸七壯

又方

問被咬人去是物遣報去蠍螫即語去役所苦語訖即

私向一處翻一瓦還安舊勿使其人知迴更問差未

遣報去差訖即痛止神効

古今録驗療蠍螫人方

取苦李子人嚼以封之即差

又方　挼蛇銜取汁以傅之差

又方　以木椀率取此螫處即以木椀合之便差神驗不傳

又方　挼鬼針草取汁傅之即差

又方　五月五日取莧葵熟擣以遍塗手至後日中時即然後洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍螫人法

呪曰繫（胡計反）梨平俱尚蘇婆訶於五月五日桑木正北陰中莧葵日正午時先七步至莧葵此右膝著地立左膝手摘取莧葵子摘取著口中熟嚼吐著手內與五葉草莧葵等相和若無子直取二葉相和於手內左轉挼之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍止所挼葉令汁出涂手其葉還放置莧葵處起勿反顧之一日一夜不得洗手亦不用點汗手內亦不得人知作

此法不得人見被螫者口問云何處即陰呪七遍男以左手摩蛰處口云差去若由小瘮痛者男掐左手無名指第一節內側文頭陰呪掐之女掐以右手指以右手摩蛰處其莧葵私取移種於桑北五葉草處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲遍用諸藥塗傅不能應時有効遂依角法以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之繞令搭得蛰處指用大角角之氣漏不嗍故角不厭大大即嗍急差速作五四枚鎗內熟煮取以角蛰處冷即換初被螫先以針刺蛰處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之此神驗不可以口嗍毒入腹殺人輒公云灸即差以熱角嗍之無火炎也並出

第四十五卷中

蠼螋尿方二十二首

千金療蠼螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處痠痛如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘖㾫作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉惡寒壯熱劇者連起盡腰脅肖也療之法初得之便磨犀角塗之止其毒療如火丹法𠍣以武德中六月得此病經五六日覺心悶不佳以他法療不愈又有人畫地作蠼螋形以刀細細取盡蠼螋腸中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈將知天下萬物相感難曉其由矣

又方

羚羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差

又療蠼螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方

取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

此法不得人見被螫者口問云何處即陰呪七遍男以左手摩蜇處口云差去若由小瘳痛者男掐左手無名指第一節內側文頭陰呪掐之女掐以右手指以右手摩蜇處其莬葵私取移種於桑北五葉草處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲遍用諸藥塗傅不能應時有効遂依角法以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之纔令搭得蜇處指用大角角之氣漏不嗍故角不厭大大即嗍急差速作五四枚鐺內熟煮取以角蜇處冷即換初被螫先以針刺蜇處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之此神驗不可以口嗍毒入腹殺人輒公云灸即差以熱角嗍之無火炎也並出

蠼螋尿方二十二首

千金療蠼螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處瘮痛如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘖瘰作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉惡寒壯熱劇者連起盡腰脅肖也療之法初得之便磨犀角塗之止其毒療如火丹法已以武德中六月得比肩經五六日覺心悶不佳以他法療之不愈又有人畫地作蠼螋形以刀細細取盡蠼螋腹中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈將知天下萬物相感難曉其由矣

又方

羚羊鬚燒灰臘月猪脂和以封之差

又療蠼螋尿方

熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方

取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

廣濟療蠼螋尿繞腰欲死方

取敗蒲扇煑汁塗之

又方

萹豆葉擣塗之並出第五卷中

深師療蠼螋尿方

取鵲巢中土以苦酒和傅之

又方

以雞子和白墡傅之侵淫爲廣以大蒜磨研書墨塗之一方以胡粉塗之一方以猪膏塗之又燒蒲灰傅之並出第二十九卷中

集驗療蠼螋尿瘡方

燒鹿角擣末以苦酒和傅之已有汁者燒道邊弊蒲席灰以傅之深師千金并翼文仲同

又方

槐白皮半斤切　苦酒二升

右二味漬半日刮去瘡以洗日五六遍末赤小豆和苦酒傅

之燥即易之小兒以水和傅之甚良千金并翼文仲深師同

又方　嚼大麥以傅之日三千金同

又方　猪脂和鷰巢中土傅之千金同並出第九卷中

千金翼療蠼螋尿瘡方

取茱萸東引根下土以醋和塗之

又瘡表裏相當一名侵淫瘡方

取猪牙車骨年久者搥破燒令脂出及熱塗之千金同

又方　取楝木枝若皮燒灰傅之乾者以猪膏和傅并主小兒禿及諸惡瘡深師同出第二十四卷中

崔氏療蠼螋尿瘡習習然黃水出者方

取韮擣取汁以塗之

又方　煮甘草湯洗之

又方　嚼桂塗之

又方　絞馬屎汁洗之

又方　嚼麻子塗之

又方　令患人於日裏立側近作沸湯徹取以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人熟嚼蒜以噀患人影中患處口中餘蒜氣即真噀患人瘡上愈並出第五卷中

救急蠼螋尿方

取鷰窠和醶醋塗之大良出第五卷中

惡蚝方三首

必効療惡蚝已洪腫者並差方

取楝木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒溫浸洗瘡冷即易再三差

又惡蚝已洪腫爛者方

乾薑　水銀　猪脂臘月者

右三味搡令相得即置丸向椀中燒以竹筒籠上熏所腫處未
熏先破兩處然後熏即差
又方
取胡葱於煻火中煨令軟即出以紙隔手挼令破以搨
瘡上以痛定爲度李饒州多用神効並出第十六卷中
蠆螫方二首
肘後論云此蠇字作蠆字所謂蜂蠆作於懷袖賁音爲之驚
恐言其小而有毒起乎不意也世人呼蝘蜓爲蠆子而未嘗中
人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家呼蝘蜓爲守
宮本草云守宮即是蜥蜴依如東方朔言則兩種物矣今蜥及
蛇醫音醫毋並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是龍不可殺之令人
震死今又有一小鳥蟲子尾有翹世人呼爲甲蟲而尾似車鑿兩口
尾復言此蟲是蠆未詳其正矣
又療蠆螫人方

擣常思草絞取汁以洗瘡出第八卷中

古今録驗薑螿人方

取屋霤下土水和傅之立愈出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行反入水中此蟲口中有横骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛旦可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種初覺即遍身覗之其一和正如黑子而皮繞四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶好生金犀角麝香

困水

並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方

急周繞遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百壯大良肘後同

又療射工毒方

白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上必効文仲備急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便冝療之方

便水磨犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之一方云服一方寸匕

又方

以白梅皮裹豉母蟲吞至六七枚勿住母蟲一枚置口中便差本方云取水上浮走豉

又射工毒蟲正黑狀如大蜚生齧髮而形有雌雄雄者口邊有兩横角角能屈伸有一長角横在口前弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢困水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上

擣常思草絞取汁以洗瘡出第八卷中

古今録驗蠆螫人方

取屋霤下土水和傅之立愈出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行反入水中此蟲口中有橫骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛旦可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種初覺即遍身視之其一和正如黑子而皮繞四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶好生金犀角麝香

並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方
急周繞遍去此瘡邊一寸輙炙一處百壯瘡上亦百
壯大良肘後同
又療射工毒方
白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上必効文仲備
急千金肘後同並出第九卷中
肘後初見此瘡便冝療之方
便水磨犀角塗之爍復塗亦取細屑和麝香塗之一
方云服一方寸匕
又方
以白梅皮裹豉毋蟲吞至六七枚勿住毋蟲一枚置口中便差本方云取水上浮走豉
又射工毒蟲正黑狀如大蜚生齧髮而形有雌雄雄者口邊有兩
橫角角能屈伸有一長角橫在口前弩檐臨其角端曲如上弩以
氣爲矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上

雪不凝氣蒸休休然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得
此若中毒仍爲屑與服夏月在水中則不可見乃言此蟲含沙射
人影便病欲渡水先以石投之則口邊角弩發矣若中此毒體覺
不快視有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方

取皂莢一挺長一尺二寸者搥碎以苦酒一升煎如餳

去滓傅毒上文仲備急同

又方

取馬齒莧擣飲汁一升滓以薄瘡上日四五過良文仲

備急同

集驗療射工毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方

取赤莧合莖葉擣絞取汁服一升日再三服千金備急

文仲必効刪繁肘後同 姚云服七合日四五服

又方

犀角 升麻 烏翣根各二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊久盡更作千金同

又方

取生茱萸莖葉一虎口斷去前後取握中者熟擣以水二升煎取八合頓服之千金同

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如壓子皮周遍悉赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或晡間寒熱一種如火灼熛起此者最急數日殺人此病令人寒熱方

烏翣根二兩　升麻二兩

右二味切以水三升煮取一升適寒温頓服之滓薄瘡上肘後千金文仲備急同古今録驗云烏扇無根用葉出第一卷中

千金療射工初中未有瘡但憎寒凛凛及其成瘡似蠼螋尿亦似瘭疽狀方

取芥子擣熟苦酢和厚塗瘡上半日痛便止古今録驗同

又方　取狼牙葉冬取根枝擣之令熟薄所中處又飲四五合汁

又云山中草木上石蛭平經切負勞也一作蛭著人則穿齧肌肉行人肉中侵淫墳起方

灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間趺上及著鞋處蛭不敢著人

又江南毒氣惡核以射工暴腫生瘡五香散方

甲香　犀角屑　鼈甲炙令黃　薰陸香

升麻　烏翣根　吴茱萸　沈香

丁香各三分　黄連　羚羊角屑　牡蠣熬

甘草炙　黄芩各四分　黄蘗六分

右十五味爲散水服方寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之以水和少許洗工忌莧菜猪肉海藻出第二十六卷中

救急療射工毒方

取葫蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方

取蜈蚣大者一枚炙擣末以苦酒和傅瘡上痛便止千金同

溪毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑東人呼作蘇駭切一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭微痛目眶疼心中煩懊四肢振焮腰背骨節皆強筋急兩膝疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過六七日下部膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉著為陽毒最急若瘡如蠡魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中

水當作數斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中莫令大熱熱即無力去滓消息適寒温以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作他病療之文仲千金翼備急同 大熱

又療中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許爲二服或乾以水絞取汁極佳集驗文仲備急千金同姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之

又方

取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中日三差文仲備急同

又方

擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同

又方

取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼備急云肘後同梨葉

又方

取大苺連根

右一味擣作屑服之亦可投水擣絞汁飲一二升并導下部生

蟲者夏月常行多齎此屑欲入水浴先以少屑投水上流便無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大佳文仲千金翼備急同

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒之狀呼爲溪温未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便死耳方家療此用藥與傷寒温疾頗相似今復疏其單療於此方

東向三禹步即以手左一攬取水將蒜一把熟擣以酒漬之去滓可飲兩杯當吐得吐便差此方甚効

備急療溪毒方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕肘後文仲備急同

又方

燒鮫魚皮以飲服方寸匕立差

又方

荆葉擣汁飲之佳千金不傳肘後同

水當作數斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中莫令大熱熱即無力去滓消息適寒温以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作他病療之文仲千金翼備急同

又療中水毒方

取梅若桃葉擣絞取汁三升許爲二服或乾以水絞取汁極佳集驗文仲備急千金同（姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之）

又方

取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中日三差文仲備急同

又方

擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同

又方

取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼備急云（肘後同梨葉）

又方

取大莓連根

右一味擣作屑服之亦可投水擣絞汁飲一二升并導下部生

蟲者夏月常行多齎此屑欲入水浴先以少屑投水上流便無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大佳文仲千金翼備急同

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒之狀呼爲溪温未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便死耳方家療此用藥與傷寒温疾頗相似今復疏其單療於此方

東向三禹步即以手左一攬取水將蒜一把熟擣以酒漬之去滓可飲兩柸當吐得吐便差此方甚効

備急療溪毒方

取五加根燒末以酒若漿服方寸匕肘後文仲備急同

又方

燒鮫魚皮以飲服方寸匕立差

又方

荆葉擣汁飲之佳千金不傳肘後同

又方　擣柒姑以塗之腰背諸處柒姑生東間細葉如蒜狀

又方　烏蒜一枚擣以酒和服半升得吐即差一名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方

取秋米一升鹽五升水一石煑作糜坐中即愈肘後文仲備急同

又方　取桃葉艾葉擣熟以水漬之絞取濃汁去滓著盆中坐有白蟲出差文仲備急同肘後云取桃皮葉無艾葉

又方　燒皂莢擣末以綿裹導之

又方　以鹽和皂莢末擣之綿裹導之

又方　末牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方

初覺便取溪蒜葪薟桃葉剉一斛蒸使遍熱出布席上解衣卧上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則差

巳五六日恐毒入腹不可先爾應先服藥東間諸山有大木名理櫝枝葉上似梨冬冬不凋剥取白皮皮重疊如紙搥破煑服一升日夜六七過無生者預取乾之亦單用蒨根白蘘荷根藍青汁並佳若卒無根皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煑取汁漬之若患腹中痛恐轉成蠱噉人腹藏者取猪脂二升熬令燥水一升絞取汁稍稍服之並出第八卷中

千金療溪毒方

取大蒜十枚合皮安皮熱灰中炮令熱刀切斷頭以柱所著毒處文仲備急崔氏同

又方

雄黄　朱砂　常山各等分

右三味五月五日午時使童子擣合之出第二十六卷中

張文仲療溪毒方

取蓼擣取汁服一二升又以塗周匝差

又方　取雄牛膝根一把擣水酒共一升漬絞取汁飲之日三

雄牛膝莖白紫色者是出第十卷中

沙蝨毒方六首

肘後中沙蝨毒論云山水間多有沙蝨其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰雨日行草中即著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水澡浴畢熟以巾拭身中數過又以故帛拭之一過乃傅粉也令東間水無不有此洗浴畢以巾拭爍爍如芒毛針刺熟看見處仍以竹葉抄拂去之此見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚爲佳仍數塗苦苣菜汁差已深者用針挑取得蟲子正如疥蟲著爪上映

其內

光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若止兩三處不能爲害多處不可盡挑灸若猶覺惛惛是其已大深便應依土俗作方術出之并作諸藥湯以浴皆得一二升沙出沙出都盡乃止若無方術痛飲醬酒取醉亦佳如其無則依此方爲療并雜用前中溪毒射工法急救七日中宜差不爾則仍變成溪毒如薤葉大長四五寸初著腹脅腫如刺則破雞擒之蟲出食雞或三四數過取盡乃止兼須服麝香犀角護其肉作此療之彼土有中之者不少呼此病爲⿰虫乎呼故切沙蟲吳音名沙作盜護如鳥長尾盜者言此蟲能招呼溪氣東間山行無處不有其蟲著人肉不痛不即覺者久久便生子在人皮中稍攻人則爲癭山行宜竹管盛鹽數視體足見者以鹽塗之便脫雜少石灰尤良亦斷血而辟水温

又療沙蝨毒方

以少許射罔傳瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一日輙以巴豆一枚二日則二枚計爲數並去皮心以水三升煑取一升盡服之未差即更可作服之文仲備急同

又方

斑猫二枚熬一枚研末服之燒一枚令煙絶末著瘡中千金文仲備急同

又方

取麝香大蒜合擣以羊脂和著筒中帶之行大良千金同

删繁療沙蝨方

以鹽五合以水一斗煑一沸以漬洗瘡出第十卷中

必効療沙蝨方

初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

犬咬人方九首

肘後犬咬人方

取竈中熱灰以粉上畢裹縛之千金同

又方　乾薑末服二方寸匕薑汁服半升亦良

集驗療凡犬咬人方

以苦酒和灰塗之良千金同

千金療凡犬咬人方

燒犬尾灰傅之日二又燒自死蛇灰末傅瘡中

又方

桃東南枝白皮一握以水一升煑取五合服之

又方

莨菪子七枚以水服之日一度差止

又方

梅子末以酒服之

又方

以臘月鼠一枚以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗療凡犬咬人方

先以水洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛

裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多惡狂發必誡小弱持杖預以防之而不免者莫及於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心神中醒然方知咬巳即狂是以深須知此此病至重世人皆輕之不以爲意坐之死者每年常有之旦昔初學醫未以爲業有人遭此將以問旦旦了不知報荅以是經旦手而死者非一由此說意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫枉死者半此言匪虛故將來學者非必此法餘一一方皆須沈思留作心意勤學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知訖極自誤也因方甲此一言言不盡意耳

又療狂犬咬人方

蛇脯一枚去頭炙擣末服五分匕日二

又方　服青布汁三升

又方　飲驢尿一二升良　驢尿

又方　擣莨菪根和鹽以傅之日三度

附後療猘犬咬人方

先嗍去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百日乃止忌酒千金文仲備急小品古今録驗同

又方　擣地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煑汁飲之過百日乃止亦末服方寸匕日三兼傅瘡上千金同

又方　擣薤絞取汁傅之又服一升日三須瘡差乃止亦治已差報發者千金同

又方　以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方

刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕巳發狂如猘犬者服
此藥即愈肘後同
又方
頭髮猬皮燒作灰末等分和水飲一盃若或巳目赤
口噤者可折齒灌之肘後千金同
又方
擣地黃汁飲之并塗瘡上過百日止肘後同
又衆療不差毒攻人煩亂喚巳作犬聲者方
髑髏骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂
犬咋人七日輒應一發過三七日不發則免也要過
百日乃爲大免每至七日輒當擣薤（一作韭）汁飲二三升
又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之瘡
未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於飯下
蒸生魚及就膩器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳
又若重發者療之方

生食蟾蜍膾絶良亦可燒炙食之不必令其人知初
得嚙便爲此則不發集驗文仲千金備急肘後同
剥作膾吞蒜虀下也

又方

擣生薑汁一升以來服之佳

崔氏療狂犬咬人方

凡被狂犬咬即急嗍去血急吐之勿錯嚥之然後擣
杏人和大蟲牙捻作餅子貼瘡上頓炙三七壯從此
以後每日炙一兩壯貼杏人餅子炙之須要滿百日
乃止百日内必莫使瘡差如無大蟲牙可單用杏人
亦得狂狗咬人每至七日即合一發但至七日即須
擣韭汁服一大合日再服之縱非至七日但一日兩
日服一兩合大妙如冬月無可取韭根擣汁服之又
三兩日取杏人一合擣碎熟研濾取汁和大蟲牙齒

無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合以和杏人酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗之更佳

又方

以大蟲骨灰和杏人膏以塗之甚良

救急療狂犬齧人無問深淺者方

初被咬便以泠水洗令血斷封裹著如其瘡大及深宜放流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風千萬不畏凡初被咬即覔一切物與喫後不發也出第八卷中

必効療狂犬咬方

梔子皮燒灰　石硫黃末

右二味擣爲末傅瘡日一易救急同

又方　取蚯蚓糞水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方　驢屎汁飲一升即差

又方　杏人切去尖　豆豉各一兩　韭根一握淨洗

右三味擣爲餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾炷以炙餅上熱徹即差

又方　虎骨　石灰

右二味以臘月猪脂和作餅子暴乾擣末以傅之良並出第六卷中

猪齧人方二首

千金療猪齧人方

鍊松脂貼上

又方　屋霤中泥以傅之並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

肘後療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方
炙瘡中及腫上即差
又方
取婦人月經傅之最良姚云神効
集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方
割雞冠血點所齧瘡中日三若父馬用雌雞草馬用雄雞肘後同
千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方
取馬鞭梢三尺鼠矢二七枚燒末以猪膏和塗之立愈備急小品集驗必効古今録驗同出第二十六卷中（肘後云取馬鞭梢二寸）
剥死馬馬骨傷人方三首
肘後療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方
取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今

録驗小品同
集驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方
絞飲其失汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中
古今録驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方
服人屎汁出第四十五卷中
馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首
肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方
以熱桑灰汁更番漬之常日爲之冷即易數日
乃愈若痛止而腫不消煑炙石令熱以熨之灸瘡
上亦佳集驗千金同
又方
擣麻子以水絞取汁飲一𠦃日三服
又方
酒漬馬目毒公少少飲之
小品療馬骨所刺及馬血入人攻瘡中毒痛欲死方

肘後療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

灸瘡中及腫上即差

又方

取婦人月經傅之最良姚云神効

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方

割雞冠血點所齧瘡中日三若父馬用雌雞草馬

用雄雞肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方

取馬鞭梢三尺鼠矢二七枚燒末以猪膏和塗之

立愈備急小品集驗必効古今錄驗同出第二十

六卷中肘後云取馬鞭梢二寸

剥死馬骨傷人方三首

肘後療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今

録驗小品同

集驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

絞飲其失汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今録驗療剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

服人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方

以熱桑灰汁更番漬之常日爲之冷即易數日

乃愈若痛止而腫不消煑炙石令熱以熨之炎瘡

上亦佳集驗千金同

又方

擣麻子以水絞取汁飲一升日三服

又方

酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入人攻瘡中毒痛欲死方

人糞泥之又擣馬莧傅之出第十卷中

删繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方

馬糞乾者止一物粉瘡孔上揜瘡口也

又方

雄黃　乾薑

右二味分等擣末内瘡口中即差

又方

大小蒜擣熬煖用薄瘡上

又方

以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬馬汗及馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以猪膏和傅之備急千金集驗同

又方

以水漬瘡數易水漬之千金備急同

又方

以石灰傅上千金備急同

集驗療人先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡及拂略著致令腫痛方

大飲醇酒取醉即愈肘後千金同出第八卷中

千金療馬汗入人瘡方

燒雞毛末以酒服方寸匕集驗同

又方

煑沸湯及熱以漬之冷復易之小品同出第二十六卷中

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最爲貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黄黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要次之君子所附卷末傳以意焉凡騎馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也出第九卷中

肘後療馬熱蟲顙黑汗鼻中有膿腔水草不進方

黃瓜樓根　貝母　桔梗　大青
梔子人　吳藍　欵冬花　大黃
白鮮皮　黃芩　鬱金各二大兩　黃蘗
馬牙消各四大兩
右十三味擣篩患相當及常要啖重者藥三大兩地黃半斤
豉二合蔓菁油四合和合齋前啖至晚飼犬効
又蟲顙重者方
葶藶子一合熬令紫色擣如泥　桑白皮一大握　大棗二十枚擘
右三味以水二升煑取一升去滓入葶藶合調勻適寒溫灌
口隔日又灌重者不過再差
又療馬脊瘡方
黃丹傅之避風即差
又療馬羯骨脹方

取四十九隻羊蹄燒之熨脊上冷即易之如無羊蹄

楊柳枝指麤者炙熨之不論數差

又療馬後冷方

豉葱薑各一兩水五升煮取半和酒灌之

又療馬目暈方

霜後乾楮葉細篩末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方

大豆熬焦和生油麻擣傅之醋泔淨洗

又方

樗根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了

塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方

巴豆（去皮心） 膩粉

右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

備急療驢馬蟲顙方

全高

生地黃汁一升　桑根白皮五兩　紫菀三兩　射干二兩
麻黃一兩　葱白一斤　蘇二合　蜜一合
右八味切以水一斗五升煮取八升去滓内麝香末一豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與一分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與之其藥更加地黃及葱白蜜豉以水三五升煮取多少依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入即不得用金高每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之即差灌後三兩日伺候看鼻中膿絕顚斷即差如不斷用後法桑白皮一斤細切以水三升煮取一升去滓每旦灌鼻孔中灌時入研麝香一豆大佳

又馬湓方

大黃　黃芩　鬱金　當歸
芍藥　紫菀　芎藭　白朮
牛膝　細辛各一兩

右十味合擣末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黃黑汗方

割上斷訖取陳久靴瓜頭水漬汁灌口如不足用大黃當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌口如不定破尾使骨纔血出即止肘後同

又療馬起臥胞轉并腸結並用此方

細辛　防風　芍藥各一兩　鹽一升

右四味切以水五升煑取二升半去滓分二度灌後前灌方

芒消　鬱金　寒水石　大青各一兩

右四味切以水五升煑取二升去滓以油酒各半升和調分二度灌口肘後同

又療馬心黄并肺熱方

大黄　黄芩　芍藥　細辛各一兩

右四味切以水五升煑取二升半油半升酒半升調和分爲三度灌口如不定鹽半升水一升半温如人肌和鹽灌後即定

又春冬灌馬方

大黄　鬱金　黄芩　細辛

芍藥　桔梗　升麻　麻黄

大青　茵蔯　白术　芒消

寒水石　朴消各一兩

右十四味擣爲散若春灌即和雞子油量水多少攪調灌口若冬灌即切以煎之訖冷和油及酒灌口

又療馬蟲顙十年以上灌鼻一兩度無不差方

醬清和膽半合攪令調分兩度灌鼻每一灌停一兩日將息不得傷多多即傷馬故録之令知肘後同

又療馬蟲顙方候馬鼻沫出梁腫起即不可療

硇砂二酸棗許研 猪脂臘月者二雞子許

右二味先研硇砂令極細爲末然後熬猪脂及硇砂煎一沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊久若患一鼻減藥之半兩鼻患兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻後一二日更有熏法如後茛菪子別擣藜蘆穀精草乾膝葶藶子別擣各等分爲末相和以麻撚如燭燒一頭內馬鼻中令煙入効仍仰馬頭令稍高

又療馬臚脹轉欲死方

擣蒜內小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌口立差

又方

騎走上坡用木腹下來去捺以手內大孔中探却糞大効採法剪却指甲以油塗手恐損破腸也肘後同

又方

但以鹽四升人尿和灌口

又方

擣蒜三升哺之小馬分半

又療馬患月怜方

取鬼微熱挼揩之立差鬼微如地菌夏月得濕多聚生糞中見日消黒者是

又療馬食著地膽等蟲輙困脹悶立死方

取桑根入地一尺者去黄皮剉之以水煎取濃汁急灌口止毒勝甘草

又療馬嗽方

取麻子一斗飼之立定若腔□色焦與喫即光澤肘後同

又馬跙蹄方

於馬櫪下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石如雞子許大滿中填實令馬立其上兩日即差肘後同

又馬每月一兩度灌油鹽永不著黃方

以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之

又馬脊瘡方

取馬通汁及熱遍瘡上塗之

又療馬疥方

雲花草一兩狀如麻黃而堅實　熏黃二兩　附子一枚用藜蘆二兩亦効

右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時令水乾然傅藥不過五六遍無不差韓玉家盛談効驗但苦不識雲花出第九卷中　王家

又療馬筋瘙方

硇砂　藜蘆　槐子　葶藶子各半兩

又方

騎走上坡用木腹下來去捺以手内大孔中探却糞大効探法剪却指甲以油塗手恐損破腸也肘後同

又方

但以鹽四升人尿和灌口

又方

擣蒜三升哺之小馬分半

又療馬患月伶方

取兎微熱挼指之立差兎微如地菌夏月得濕多聚生糞中見日消黒者是

又療馬食著地膽等蟲輙困脹悶立死方

取桑根入地一尺者去黄皮剉之以水煎取濃汁急灌口止毒勝甘草

又療馬嗽方

取麻子一斗飼之立定若腔口色焦與喫即光澤肘後同

又馬跙蹄方

於馬櫪下當馬前脚闊一尺許掘渠深一尺許取石
如雞子許大滿中塡實令馬立其上兩日即差肘後同

又馬每月一兩度灌油鹽永不著黄方

以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之

又馬脊瘡方

取馬通汁及熱遍瘡上塗之

又療馬疥方

雲花草一兩狀如麻黄而堅實 熏黄二兩 附子一枚用藜蘆二兩亦効

右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時令水乾然傅藥不過五六遍無不差韓玉家盛談効驗但苦不識雲花出第九卷中

又療馬筋瘙方

硇砂 藜蘆 槐子 葶藶子各半兩

熏黃　石硫黃　黃蘗　巴豆
烏麻各少許　蜜　猪膏各半兩
右十一味擣篩末蜜猪膏和藥如泥傅瘡上
又方
取一杯酒酢并麥米等相和令調塗布上重裹上用
麻纒每傅先以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再差止
牛狗疾方六首
肘後療牛疫病方
取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良
又療牛馬六畜水穀疫病方
取酒和麝香少許和灌之
又療六畜脊瘡焦痂方
以麪糊封之即落
又療牛脹方

以猪脂和小兒屎灌口差

又療牛喫蓿苜草誤喫地膽蟲肚脹欲死方

以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

救急療犬疥方

蛇皮燒灰和粥與喫差出第九卷中

牛舐觸腸出方一首

救急療牛舐觸腸出方

硇砂一大兩 乾薑二小兩

右二味爲末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處訖用

粟穀葉爲末以傅之即却入大良神効出第九卷中

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕氈罽法五首

救急油衣粘法

以黃土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水

濯去之不粘也

又韉被蟲蝕方

取吳茱萸擣末和麪作糊塗韉面煎茱萸水刷之其蟲永斷

又氈被蟲蝕法

刈取黃蒿有子者暴乾鋪氈中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氈褥洗不去法

以嚼杏人洗之立去除采色衣物等著車脂及油膩等米研煮作飲洗之即不損緋紫碧緑

又方

煑小便和皂莢洗佳以酒洗亦佳以蜜和湯洗之平復不損色並試有効雖是小事亦爲切要以附之服餌之末出第九卷中

外臺秘要方卷第四十

皇祐三年五月二十六日
内降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘴癘其尤甚
一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此札瘥亦緣醫工謬妄
增其疾臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除素問病源外餘
傳習偽書偽書舛本故所學淺性註誤病者欲望
聖慈特出祕閣所藏醫書委官選其要用者校定一本降付杭
州開板模印庶使
聖澤及於幽隱民生免於天橫奉
聖旨宜令逐路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘴癘
之處於聖惠方内寫録合用藥方出牓曉示及遍下諸縣許
人抄劄仍令祕閣檢外臺祕要三兩本送國子監是校勘醫書
官子細校勘聞奏劄付孫兆准此至治平二年二月二日准中書
劄子校正醫書所狀醫書内有外臺祕要一項今訪聞前校正官

孫兆較對已成所有淨草見在本家欲乞指揮下本家取赴
本局修寫進冊所貴早得了當候指揮奉
聖旨依所申施行至四年三月
進呈訖

右外臺秘要方四十卷唐鄴郡太守王燾撰臣等謹按燾自序稱便繁臺閣二十餘載久知弘文館圖籍方書等繇是覩奥升堂皆探其秘要蓋以其職在臺閣故名云外臺舊說以為出守于外之義殆不然也史載燾性至孝毋有疾彌年不廢帶視絮湯藥數從高醫游遂窮其術顏真卿之保平原也燾又以衆來歸想燾忠孝之誠發於天性推以及活人之術此其所以有是書之撰歟攷醫方之書以漢南陽張氏為祖而諸師祕惜遂失其真燾之所覩仍為晉王熙撰次舊面則其可據以訂今本之譌者亦極多矣他至如晉唐方書其傳于今者不過僅僅晨星而燾之所纂極為贍富則在今之世欲窺古經方之遺者舍是書將奚以哉其於醫家至急至要猶水火菽粟不可一日缺也燾撰是書後未甚行于世至宋

取是書校刋

仁宗嘉祐中始命儒臣校正板行之於是世得讀而用之
元明以來竪競俗習少有能講古經方者其書復就韜
朙末葉有程衍道者獨能取是校刋公世然其所
獲僅不過寫本亥豕魯魚固所不免若在
皇國從來亦少傳本正德中山脇尚德取程本覆刻以
行然校勘不能精學者頗有遺憾焉臣等欽惟
大府仁治文教之隆資諸聖經賢傳而無不臻金匱玉
版之富比於瑯嬛二酉而無不備至於是書往有北宋槧
本嘗許臣等拜閲其本文字端雅紙刻精良足以訂程
刻沿誤惜僅存十一卷不獲見其全平安荻野元凱家亦
藏有同種宋本憾猶屬零殘不足以補其缺佚也仍更
物色之仄聞紀藩醫員竹田純道家藏有足本係其
祖昌慶入明時所齎歸臣等因疏請從其本補完之而

大府亟下　教使進之兼　命臣等以校訂之任臣等不
堪感躍取而閲之其本亦一與　官庫所貯同而首尾完
全無一鈌脱眞爲希覯之珍函也仍倩巧手影寫二部其
偶文字漫漶不可讀及一二差違不得不待點勘者則又
更從　官庫本及荻野元凱本巢氏病源孫氏千金等書
校之别作攷異以附後其一納于　官庫以補舊本之缺其
一弆于醫學以備子弟講誦庶幾乎始得窺嘉祐之眞
矣顧嘉祐之眞卽王氏之眞而王氏之眞卽南陽以降古
經方之眞則豈可不謂之醫家之至寶也耶蓋此本既
佚于海外而復顯於
皇國臣等以菲才叨預期盛舉何其幸也抑
大府好生爲政屢刊醫書以助拯濟曩歳己酉使臣等
刊布宋板千金方天下之言方術者均蒙　厚澤倘使是

仁宗嘉祐中始命儒臣校正板行之於是世得讀而用之
元明以來槩競俗習少有能講古經方者其書復就韜
埋至明末葉有程衍道者獨能取是校刊公世然其所
獲僅不過寫本亥豕魯魚固所不免若在
皇國從來亦少傳本正德中山脇尚德取程本覆刻以
行然校勘不能精學者頗有遺憾焉臣等欽惟
大府仁治文教之隆資諸聖經賢傳而無不臻金匱玉
版之富比於瑯嬛二酉而無不備至於是書往有北宋槧
本嘗許臣等拜閱其本文字端雅紙刻精良足以訂程
刻沿誤惜僅存十一卷不獲見其全平安荻野元凱家亦
藏有同種宋本憾猶屬零殘不足以補其缺佚也仍更
物色之仄聞　紀藩醫員竹田純道家藏有足本係其
祖昌慶入明時所齎歸臣等因疏請從其本補完之而

大府亟下　教使進之兼　命臣等以校訂之任臣等不
堪感躍取而閱之其本亦一與　官庫所貯同而首尾完
全無一缺脫真爲希購之珍函也仍倩巧手影寫二部其
偶文字漫漶不可讀及一二差違不得不待點勘者則又
更從　官庫本及荻野元凱本巢氏病源孫氏千金等書
校之別作攷異以附後其一納于　官庫以補舊本之缺其
一弆于醫學以備子弟講誦庶幾乎始得窺嘉祐之真
矣顧嘉祐之真即王氏之真而王氏之真即南陽以降古
經方之真則豈可不謂之醫家之至寶也耶蓋此本既
佚于海外而復顯於
皇國臣等以菲才叨預期盛舉何其幸也抑
大府好生爲政屢刊醫書以助拯濟曩歲己酉使臣等
刊布宋板千金方天下之言方術者均蒙　厚澤倘使是

書亦得附之梨棗與孫氏之書同傳不朽則豈非醫林之盛事生民之大幸耶此臣等之至願也臣等不勝惶恐之至謹附書卷末並以志企望之意焉

嘉永六年歲在癸丑四月己卯侍醫尚藥醫學教諭法印臣多紀元堅侍醫醫學教諭法眼臣喜多村直寛西城侍醫醫學教諭兼督務法眼臣多紀元昕等謹跋